

Pakendi infoleht: teave kasutajale

AirFluSal® Aërosol 25/125 mikrogrammi, aerosool, suspensioon  
AirFluSal® Aërosol 25/250 mikrogrammi, aerosool, suspensioon

salmeterool (salmeteroolksinafoaadina)/flutikasoonpropionaat

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest siin on oluline teave teie jaoks.

Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.

Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla kahjulik teistele, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.

Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Selle infolehe sisu:

1. Mis on AirFluSal Aërosol ja milleks seda kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või millal peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on AirFluSal Aërosol ja milleks seda ravimit kasutatakse?

AirFluSal Aërosol sisaldab kahte ravimit: salmeterool ja flutikasoonpropionaat:

Salmeterool on pika toimeajaga bronhodilataator. Bronhodilataatorid aitavad hoida kopsude hingamisteed avatuna. See muudab õhu sisse- ja väljahingamise lihtsamaks.

Toime kestab vähemalt 12 tundi.

Flutikasoonpropionaat on kortikosteroid, mis vähendab kopsude turset ja ärritust.

Seda ravimit ei soovitata kasutada lastel.

Arst on teile selle ravimi määranud, et aidata ennetada hingamisprobleeme nagu astma. Te peate seda ravimit kasutama iga päev vastavalt arsti juhistele. See tagab, et see toimib hästi teie astma reguleerimisel.

See ravim aitab peatada hingeldust ja õhupuudust. Kuid seda ei tohi kasutada äkilise hingeldus- või õhupuudusehoo leevendamiseks. Kui see juhtub, peate kasutama kiiretoimelist leevendavat "hädaabi" inhalaatorit nagu salbutamool. Te peate alati oma kiiretoimelist "hädaabi" inhalaatorit kaasas kandma.

2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

Te olete allergiline mõne selle ravimi koostisosa suhtes. Neid aineid leiate jaotisest 6.

Millal peate olema selle ravimiga eriti ettevaatlik?

Võtke ühendust oma arsti või apteekriga enne selle ravimi kasutamist, kui teil esineb alljärgnevat:  
südamehaigus, sealhulgas ebaregulaarne või kiire südamepegevus;  
üliaktiivne kilpnääre;  
kõrge vererõhk;  
suhkruhaigus (diabetes mellitus) (see ravim võib tõsta teie veresuhkru taset);  
madal kaaliumitase veres;  
tuberkuloos (TBC), kui teil see on või on olnud minevikus, või muud kopsuinfektsioonid.

Võtke ühendust oma arstiga, kui teil on hägune nägemine või muud nägemishäired.

Kas te kasutate veel muid ravimeid?

Kas te kasutate lisaks AirFluSal Aërosolile veel muid ravimeid, olete seda hiljuti teinud või on võimalik, et hakkate lähitulevikus muid ravimeid kasutama? Rääkige sellest oma arsti või apteekriga. See kehtib ka astmaravimite ja käsimüügiravimite kohta. See on oluline, sest see ravim ei pruugi sobida koos mõnede teiste ravimitega.

Rääkige oma arstile, kui te kasutate järgmisi ravimeid, enne kui hakkate kasutama AirFluSal Aërosoli:

Beetablokaatorid (nagu atenolool, propranool ja sotalool). Beetablokaatorid kasutatakse tavaliselt kõrge vererõhu või muude südamehaiguste raviks.

Ravimid infektsioonide raviks, sealhulgas mõned HIV ravimid (nagu ritonaviir, kobitsistaat, ketokonasool, itrakonasool ja erütromütsiin). Mõned neist ravimitest võivad suurendada flutikasoonpropionaadi või salmeterooli kogust teie kehas. See võib suurendada AirFluSal Aërosoli kõrvaltoimete riski, sealhulgas ebaregulaarset südamelööki, või süvendada kõrvaltoimeid. Teie arst võib soovida teid hoolikalt jälgida, kui te neid ravimeid kasutate.

Kortikosteroidid (võetud suu kaudu või manustatud süstina). Kui olete neid ravimeid hiljuti kasutanud, võib see ravim suurendada teie neerupealiste kahjustamise riski.

Diureetikumid, tuntud ka kui veetabletid, mida kasutatakse kõrge vererõhu raviks.

Teised bronhodilataatorid (nagu salbutamool).

Ksantiiniravimid. Neid kasutatakse sageli astma raviks.

Rasedus ja imetamine

Kas olete rase, arvate, et olete rase, soovite rasestuda või toidate last rinnaga? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga enne selle ravimi kasutamist.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

On ebatõenäoline, et see ravim mõjutab autojuhtimise või masinate käsitlemise võimet.

3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu teie arst või apteeker on teile öelnud. Kas kahtlete õiges kasutamises? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Kasutage seda ravimit iga päev, kuni teie arst soovib lõpetada. Ärge kasutage rohkem kui soovitatud annus. Kahtluse korral võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Te ei tohi selle ravimi kasutamist lõpetada ega vähendada ilma eelnevalt oma arstiga konsulteerimata.

See ravim tuleb sisse hingata suu kaudu kopsudesse.

Soovitav annus on: Täiskasvanud

AirFluSal Aërosol 25/125: kaks pihustust kaks korda päevas

AirFluSal Aërosol 25/250: kaks pihustust kaks korda päevas

Kui kasutate seda ravimit kaks korda päevas, võivad teie sümptomid olla hästi kontrolli all. Kui see on nii, võib teie arst otsustada vähendada annust kord päevas. Annust võib muuta järgmiselt:

üks kord öösel – öiste kaebuste korral

üks kord hommikul – päevase kaebuste korral

On väga oluline, et järgiksite oma arsti juhiseid, kui palju pihustusi peate manustama ja kui sageli peate oma ravimit kasutama.

Kui kasutate seda ravimit astma raviks, soovib teie arst regulaarselt teie sümptomeid kontrollida.

Kui teie astma või hingamine halveneb, rääkige sellest kohe oma arstile. Näiteks võite märgata, et teil on rohkem vilistavat hingamist, sagedamini rindkere pingetunne või peate rohkem kasutama oma kiiretoimelist hädavajalikku ravimit. Kui mõni ülaltoodud kaebustest ilmneb, peate seda ravimit siiski jätkama, kuid ärge suurendage pihustuste arvu. Teie seisund võib halveneda ja te võite tõsiselt haigestuda. Pöörduge oma arsti poole, kuna võite vajada täiendavat ravi.

Kasutamine lastel

Seda ravimit ei soovitata kasutada lastel.

Kasutusjuhised

Teie arst või apteeker peab andma teile juhised oma inhalaatori õige kasutamise kohta.

Nad peavad regulaarselt kontrollima, kuidas te inhalaatorit kasutate. Kui te ei kasuta selle ravimi inhalaatorit õigesti või ettenähtud viisil, võib see tähendada, et see ei aita teie astmat nii, nagu peaks.

Ravim asub surve all olevas metallist pihustis, mis on paigutatud plastist hoidikusse koos huulikuga.

Inhalaatoril on esiküljel indikaator, mis näitab, kui palju annuseid on veel alles. Kui kasutate inhalaatorit, loendab annuse indikaator tavaliselt iga 5 kuni 7 pihustuse järel numbri tagasi.

Annuse indikaator näitab, kui palju pihustusi on inhalaatoris veel umbes alles.

Ärge laske inhalaatorit maha kukkuda, sest siis võib indikaator tagasi lugeda.

Teie inhalaatori testimine

1. Kui kasutate oma inhalaatorit esimest korda, testige, kas see töötab. Eemaldage huuliku kaitsekork, pigistades õrnalt pöidla ja nimetissõrmega külgedelt ja tõmmates korgi ära.
2. Et olla kindel, et see töötab, raputage inhalaatorit hästi, suunake huulik endast eemale ja vajutage pihustit; pihustage 4 korda õhku, raputades inhalaatorit iga kord enne õhku pihustamist. Annuse indikaator näitab numbrit 120, see on pihustuste arv, mis inhalaatoris

on. Kui te pole oma inhalaatorit nädal või kauem kasutanud, pihustage kaks korda ravimit õhku.

### Teie inhalaatori kasutamine

Enne inhalaatori kasutamist on oluline alustada võimalikult aeglaselt hingamisega.

1. Seiske või istuge sirgelt, kui hakkate inhalaatorit kasutama.
2. Eemaldage huuliku kate (nagu kirjeldatud 1. etapis: „Inhalaatori testimine“). Kontrollige huuliku sisemust ja välispinda, et veenduda selle puhtuses ja et seal poleks lahtisi esemeid./
3. Raputage inhalaatorit 4 või 5 korda, et veenduda, et kõik lahtised esemed on eemaldatud ja sisu on ühtlaselt segunenud..
4. Hoidke inhalaatorit püstiasendis, põial all, huuliku taga. Hingake korralikult välja nii palju kui suudate.
5. Asetage huulik suhu hammaste vahele. Sulgege huuled selle ümber. Ärge hammustage seda..
6. Hoidke hinge kinni, võtke inhalaator suust välja ja eemaldage sõrm inhalaatori ülaosalt. Hoidke hinge kinni mõne sekundi jooksul või nii kaua, kui saate seda ilma suurema vaevata teha.
7. Oodake umbes pool minutit iga ravimi pihustuse manustamise vahel ja korrake seejärel samme 3 kuni 7.
8. Loputage seejärel suu veega ja sülitage välja ja/või peske hambaid. See võib aidata vältida soori (seeninfektsiooni suus) ja kähedust.
9. Pärast kasutamist asetage alati kaitsekate tagasi huuliku peale, et hoida seda tolmuvabana. Kui huuliku kate on õigesti paigaldatud, klõpsab see oma kohale. Kui kate ei klõpsa oma kohale, pöörake see ümber ja proovige uuesti. Ärge kasutage liiga palju jõudu.
10. Te ei tohiks kiirustada samme 4, 5, 6 ja 7. On oluline, et hingaksite võimalikult aeglaselt vahetult enne inhalaatori kasutamist. Esimestel kordadel, kui inhalaatorit kasutate, tehke seda peegli ees. Kui näete „udu“ ilmumist inhalaatori ülaosas või suu külgedel, peate alustama uuesti 3. sammust.

Kui teil on inhalaatori kasutamine keeruline, võib teie arst või muu tervishoiutöötaja soovitada kasutada vahekambrikambrit, näiteks Volumatic.

Kui teil on inhalaatori kasutamine keeruline, võib teie arst või mõni teine tervishoiutöötaja soovitada kasutada vahekambriga inhalaatorit, näiteks Volumatic® või AeroChamber Plus® koos oma inhalaatoriga. Teie arst, apteeker või muu tervishoiutöötaja peaks teile näitama, kuidas kasutada eelkambrit koos inhalaatoriga, kuidas eelkambrit hooldada ja vastama küsimustele, mis teil võivad tekkida. On oluline, et kui kasutate eelkambrit koos oma inhalaatoriga, ei lõpetaks ega

vähendaks te selle kasutamist ilma arstiga konsulteerimata. Samuti on oluline, et te ei muudaks kasutatava eelkambri tüüpi ilma arstiga konsulteerimata. Kui lõpetate eelkambri kasutamise või muudate kasutatava eelkambri tüüpi, võib arst vajada teie astma kontrolli all hoidmiseks vajaliku ravimi annuse kohandamist.

Rääkige alati oma arstiga enne, kui muudate midagi oma astmaravis.

Inimestel, kellel on nõrgad käed, võib olla lihtsam hoida inhalaatorit mõlema käega. Asetage kaks nimetissõrme inhalaatori peale ja mõlemad pöidlad allapoole, suuosa taha.

Peate meeles pidama, et vahetate oma inhalaatori välja, kui annuseindikaator näitab numbrit 40 ja annuseindikaatori värv muutub rohelisest punaseks. Lõpetage inhalaatori kasutamine, kui annuseindikaator näitab 0, kuna pihustis olevad pihustid ei pruugi olla piisavad täielikuks annuseks. Ärge kunagi proovige muuta annuseindikaatori numbreid ega eemaldada annuseindikaatorit pihustist. Loenduri asendit ei saa muuta ja loendur on pihustiga püsivalt kinnitatud.

### Teie inhalaatori puhastamine

Et vältida inhalaatori ummistumist, on oluline seda puhastada vähemalt kord nädalas.

Inhalaatori puhastamiseks:

- eemaldage suuosa kaitsekork

- ärge kunagi eemaldage metallist pihustit plastkorpusest

- puhastage suuosa ja plastkorpuse sise- ja väliskülge kuiva lapi või salvrätikuga

- asetage kaitsekork tagasi suuosa peale. See klõpsab oma kohale, kui see on õigesti

- paigaldatud. Kui see ei klõpsa oma kohale, pöörake kork ümber ja proovige uuesti. Ärge kasutage liiga palju jõudu.

Ärge asetage metallist pihustit vette.

Kas olete seda ravimit liiga palju kasutanud?

On oluline, et kasutaksite inhalaatorit vastavalt juhistele. Kui hingate kogemata sisse suurema annuse kui soovitatud, rääkige sellest oma arstile või apteekrile. Võite märgata, et teie südamelöögid on kiiremad kui tavaliselt ja tunnete end värisevana. Teil võib esineda ka pearinglust, peavalu, lihasnõrkust ja liigesevalu.

Kui olete pikka aega kasutanud suuremaid annuseid, peate küsima nõu oma arstilt või apteekrilt. Suuremad annused sellest ravimist võivad vähendada neerupealiste poolt toodetud steroidhormoonide hulka.

Kas olete unustanud seda ravimit kasutada?

Ärge võtke kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha. Võtke oma järgmine annus lihtsalt tavalisel ajal.

Kui lõpetate selle ravimi kasutamise

On väga oluline, et kasutaksite seda ravimit iga päev vastavalt juhistele. Jätkake selle kasutamist, kuni arst ütleb teile lõpetada. Ärge lõpetage järsku ega vähendage äkki selle ravimi annust. See võib põhjustada teie hingamisprobleemi halvenemist.

Lisaks võib selle ravimi järsk lõpetamine või annuse vähendamine (väga harvadel juhtudel) põhjustada neerupealiste probleeme (neerupealiste puudulikkus). See võib mõnikord põhjustada kõrvaltoimeid. Need kõrvaltoimed võivad olla järgmised:

- kõhuvalu
- väsimus ja isutus, halb enesetunne
- iiveldus ja kõhulahtisus
- kaalukaotus
- peavalu või unisus
- madal veresuhkru tase
- madal vererõhk ja kontrollimatud kehatõmblused, sageli osana epilepsiahoogust (krambihoo).

Kui teie keha on stressis, näiteks palaviku, trauma (nagu autoõnnetus), infektsiooni või operatsiooni ajal, võib neerupealiste puudulikkus süveneda ja teil võivad tekkida ülalmainitud kõrvaltoimed. Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. Nende sümptomite vältimiseks võib teie arst määrata lisaks kortikosteroide tablettidena (nagu prednisoloon).

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

#### 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi mitte kõigil ei pruugi neid esineda. Kõrvaltoimete riski vähendamiseks määrab teie arst selle ravimi madalaima võimaliku annuse, et teie astmat kontrolli all hoida.

Allergilised reaktsioonid: võib juhtuda, et teie hingamine halveneb järsult kohe pärast selle ravimi kasutamist. Teil võib tekkida tugev vilistav hingamine ja köha või hingeldus. Teil võib esineda ka sügelust, löövet (nõgestõbi) ja turset (tavaliselt näo, huulte, keele või kõri piirkonnas) või võite äkki tunda, et teie süda lööb väga kiiresti või tunnete end nõrgana või kergelt peapööritusena (see võib viia minestamiseni või teadvusekaotuseni). Kui teil tekib mõni neist kõrvaltoimetest või kui need ilmnevad järsult pärast selle ravimi kasutamist, lõpetage kasutamine ja teavitage sellest kohe oma arsti. Allergilised reaktsioonid esinevad mõnikord selle ravimi puhul (vähem kui 1-l 100-st kasutajast).

Muud kõrvaltoimed on loetletud allpool.

Väga sageli (esinevad rohkem kui 1-l 10-st kasutajast)

- peavalu – see paraneb tavaliselt ravi käigus
- KOK-iga patsientidel on teatatud külmetushaiguste arvu suurenemisest.

Sageli (esineb vähem kui 1-l 10-st kasutajast)

- soor (valulikud, kreemikad, paksenenud laigud) suus ja kurgus. Lisaks valulik keel, kähe hääl ja kurguärritus. See võib aidata, kui loputate suu kohe pärast iga ravimiannust veega ja sülitate kohe välja ja/või pesete hambaid. Teie arst võib määrata seenevastase ravimi teie soori raviks
- valulikud, paistes liigesed ja lihasvalu

lihaste krambid.

Järgmisi kõrvaltoimeid on samuti täheldatud kroonilise kopsuhaigusega patsientidel, kellel on püsiv hingamisteede ahenemine, mis teeb hingamise raskemaks (KOK):

kopsupõletik (pneumoonia). Rääkige oma arstile, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest selle ravimi kasutamise ajal – need võivad olla kopsupõletiku sümptomid:

- suurenenud limaeritus
- lima värvuse muutus
- palavik
- külmavärinad
- sagedasem köha
- suurenenud hingamisraskused

sinikad ja luumurrud

ninakõrvalkoobaste põletik (pingetunne või täiskõhutunne ninas, põskedes ja silmade taga, mõnikord tuikav valu)

madalam kaaliumisisaldus veres (võite tunda ebaregulaarset südamelööki, lihasnõrkust, krampe).

Mõnikord (esineb vähem kui 1-l 100-st kasutajast)

suurenenud suhkru (glükoosi) sisaldus veres (hüperglükeemia). Kui teil on suhkruhaigus (diabeet), võib olla vajalik sagedamini kontrollida veresuhkru taset ja võib-olla tuleb kohandada teie tavalist diabeediravimit

silmaläätsede hägustumine (katarakt)

kiirenenud südametegevus (tahhükardia)

tahtmatu värisemine (treemor) ja kiire või ebaregulaarne südametegevus (südamepekslemine). Need kõrvaltoimed on tavaliselt kahjutud ja vähenevad ravi käigus

valu rinnus

rahutu tunne (see esineb tavaliselt lastel)

nehäired

allergiline nahalööve (lööve).

Harva (esineb vähem kui 1-l 1000-st kasutajast)

hingamisraskused või vilistav hingamine, mis süveneb pärast selle ravimi kasutamist. Kui see juhtub, lõpetage selle inhalaatori kasutamine. Kasutage oma kiiretoimelist hädaabiinhalaatorit, et aidata hingamist, ja teavitage sellest kohe oma arsti.

see ravim võib mõjutada keha normaalset steroidhormooni tootmist, eriti kui olete kasutanud suuri annuseid pikka aega. Mõjud on:

- kasvupeetus lastel ja noorukitel kuni 18-aastased

- luude hõrenemine

- suurenenud silmasisene rõhk (glaukoom)

- kaalutõus

- kuukujuline nägu (Cushingi sündroom).

Teie arst jälgib teid regulaarselt nende kõrvaltoimete suhtes ja tagab, et kasutate oma astma kontrolli all hoidmiseks võimalikult väikest annust.

käitumise muutused, nagu ebatavaliselt aktiivne ja ärrituv olemine (need kõrvaltoimed esinevad tavaliselt lastel).

südamerütmihäire (arütmia). Teavitage sellest oma arsti, kuid ärge lõpetage selle ravimi kasutamist, kui arst ei ole seda öelnud.

söögitoru seeninfektsioon (ösofagus), mis võib põhjustada neelamisraskusi.

Pole teada (ei saa olemasolevate andmete põhjal määrata)

depressioon või agressioon. Need kõrvaltoimed esinevad sagedamini lastel

Hägune nägemine.

**Kõrvaltoimete teatamine**

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole mainitud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka otse Hollandi kõrvaltoimete keskusele Lareb. Veebisait:

www.lareb.nl. Kõrvaltoimetest teatamine aitab meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

## 5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud etiketil ja karbil pärast "Exp.". Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp.

Säilitada temperatuuril alla 25°C.

Hoida pihustit välispakendis valguse eest kaitstult.

Pihusti sisaldab vedelikku rõhu all.

Ärge torgake, purustage ega põletage pihustit, isegi kui see tundub tühi.

Nagu enamiku rõhu all olevate aerosoolinhalaatorite puhul, võib ravimi terapeutiline toime väheneda, kui pihusti on külm.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või WC-sse ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Need hävitatakse vastutustundlikult ja ei satu keskkonda.

## 6. Pakendi sisu ja muu teave

Millised ained on selles ravimis?

AirFluSal Aerosool 25/125 mikrogrammi, aerosool, suspensioon

Selle ravimi toimeained on salmeterool ja flutikasoonpropionaat. Iga mõõdetud annus sisaldab 25 mikrogrammi salmeterooli (salmeteroolksinafoadina) ja 125 mikrogrammi flutikasoonpropionaati.

Selle ravimi teine aine on norfluraan (HFA 134a) kui propellendigaas.

AirFluSal Aerosool 25/250 mikrogrammi, aerosool, suspensioon

Selle ravimi toimeained on salmeterool ja flutikasoonpropionaat. Iga mõõdetud annus sisaldab 25 mikrogrammi salmeterooli (salmeteroolksinafoadina) ja 250 mikrogrammi flutikasoonpropionaati.

Teine aine selles vahendis on norfluraan (HFA 134a) kui tõrjegaas.

See ravim sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.

Iga inhalaator sisaldab 12,5 grammi HFA 134a. See vastab 0,0179 tonnile CO<sub>2</sub>-le (globaalne soojendamise potentsiaal GWP = 1430).

Kuidas AirFluSal Aerosool välja näeb ja kui palju on pakendis?

Inhalaator koosneb alumiiniumist pihustuspudelist (plasma FCP kaetud aerosool) sobiva doosimisventiiliga ja polüpropüleenist korgiga hoidikuga, millel on doosinäidik, pakitud pappkarpi.

Pihustuspudel sisaldab valget, homogeenet suspensiooni.

Iga pihustuspudel sisaldab 120 inhalatsiooni.

Pakendi suurus:  
1 inhalaator x 120 inhalatsiooni.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja Sandoz B.V.  
Hospitaaldreef 29  
1315 RC Almere  
Holland

Tootja  
Salutas Pharma GmbH  
Otto-von-Guericke Allee 1  
39179 Barleben  
Saksamaa

Lek Pharmaceuticals d.d.  
Verovškova ulica 57  
1526 Ljubljana  
Sloveenia

Registrisse kantud:  
AirFluSal Aerosool 25/125 mikrogrammi, aerosool, suspensioon: RVG 118836  
AirFluSal Aerosool 25/250 mikrogrammi, aerosool, suspensioon: RVG 118837

See ravim on registreeritud EEA liikmesriikides järgmiste nimede all:

Holland      AirFluSal Aerosool 25/125 mikrogrammi, aerosool, suspensioon  
                 AirFluSal Aerosool 25/250 mikrogrammi, aerosool, suspensioon

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud mais 2025.