

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

AirFluSal® Aerosoli 25/125 mikrogrammaa, aerosoli, suspensio

AirFluSal® Aerosoli 25/250 mikrogrammaa, aerosoli, suspensio

salmeteroli (salmeteroliksinafoaattina)/flutikasonipropionaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.

Saatko jonkin haittavaikutuksen, joka on mainittu kohdassa 4? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Tämän pakkausselosteen sisältö:

1. Mikä AirFluSal Aerosoli on ja mihin sitä käytetään?
2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen?
3. Miten tätä lääkettä käytetään?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Miten tätä lääkettä säilytetään?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä AirFluSal Aerosol on ja mihin sitä käytetään?

AirFluSal Aerosol sisältää kaksi lääkettä: salmeteroli ja flutikasonipropionaatti:

Salmeteroli on pitkävaikutteinen keuhkoputkia laajentava lääke. Keuhkoputkia laajentavat lääkkeet auttavat pitämään keuhkojen hengitystiet avoimina. Tämä helpottaa ilman sisään- ja uloshengittämistä. Vaikutus kestää vähintään 12 tuntia.

Flutikasonipropionaatti on kortikosteroidi, joka vähentää keuhkojen turvotusta ja ärsytystä.

Tätä lääkettä ei suositella lasten käyttöön.

Lääkäri on määrännyt tämän lääkkeen auttamaan sinua hengitysvaikeuksien, kuten astman, ehkäisyssä. Sinun tulee käyttää tätä lääkettä päivittäin lääkärin ohjeiden mukaisesti. Tämä varmistaa, että se toimii hyvin astmasi hallinnassa.

Tämä lääke auttaa estämään hengenahdistuksen ja hengitysvaikeuksien esiintymistä. Sitä ei kuitenkaan saa käyttää äkillisen hengenahdistuskohtauksen tai hengitysvaikeuden lievittämiseen. Jos näin tapahtuu, sinun tulee käyttää nopeasti vaikuttavaa helpottavaa 'häätä'-inhalaattoria, kuten salbutamolia. Sinun tulee aina pitää nopeasti vaikuttava 'häätä'-inhalaattori mukana.

2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai milloin on oltava erityisen varovainen?

Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää?

Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineosalle. Nämä aineet löydät kohdasta 6.

Milloin on oltava erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos sinulla on jokin seuraavista:

sydänsairaus, mukaan lukien epäsäännöllinen tai nopea syke;
liikatoiminen kilpirauhanen;
korkea verenpaine;
diabetes (diabetes mellitus) (tämä lääke voi nostaa verensokeriasi);
matala kaliumtaso veressäsi;
tuberkuloosi (TBC), jos sinulla on tai on ollut tämä, tai muita keuhkoinfektioita.

Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö AirFluSal Aerosolin lisäksi muita lääkkeitä, oletko äskettäin käyttänyt tai aiotko mahdollisesti käyttää muita lääkkeitä lähitulevaisuudessa? Kerro siitä lääkäriillesi tai apteekkarillesi. Tämä koskee myös astmalääkkeitä ja lääkkeitä, joita voit saada ilman reseptiä. Tämä johtuu siitä, että tämä lääke ei välttämättä sovi käytettäväksi samanaikaisesti joidenkin muiden lääkkeiden kanssa.

Kerro lääkäriillesi, jos käytät seuraavia lääkkeitä ennen kuin käytät AirFluSal Aerosolia:

Beetasalpaajat (kuten atenololi, propranololi ja sotaloli). Beetasalpaajia käytetään yleensä korkean verenpaineen tai muiden sydänsairauksien hoitoon.

Lääkkeet infektoiden hoitoon, mukaan lukien jotkut hiv-lääkkeet (kuten ritonaviiri, kobisistaatti, ketokonatsoli, itrakonatsoli ja erytromysiini). Jotkut näistä lääkkeistä voivat lisätä flutikasonipropionaatin tai salmeterolin määrää kehossasi. Tämä voi lisätä AirFluSal Aerosolin haittavaikutusten riskiä, mukaan lukien epäsäännöllinen sydämenlyönti, tai se voi pahentaa haittavaikutuksia. Lääkärisi saattaa haluta seurata sinua tarkasti, jos käytät näitä lääkkeitä.

Kortikosteroidit (suun kautta otettuna tai injektiona annettuna). Jos olet äskettäin käyttänyt näitä lääkkeitä, tämä lääke voi lisätä lisämunuaisten vajaatoiminnan riskiä.

Diureetit, myös tunnettuina nesteenpoistolääkkeinä, joita käytetään korkean verenpaineen hoitoon.

Muut keuhkoputkia laajentavat lääkkeet (kuten salbutamoli).

Ksantiinilääkkeet. Näitä käytetään usein astman hoitoon.

Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, epäiletkö olevasi raskaana, suunnitteletko raskautta tai imetätkö? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkariisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

On epätodennäköistä, että tämä lääke vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

3. Kuinka käytät tätä lääkettä?

Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen lääkärisi tai apteekkarisi ohjeiden mukaisesti. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkariisi.

Käytä tätä lääkettä joka päivä, kunnes lääkärisi neuvoo lopettamaan. Älä käytä enempää kuin suositeltu annos. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkariisi. Älä lopeta tai vähennä tämän lääkkeen käyttöä keskustelematta ensin lääkärisi kanssa. Tämä lääke tulee hengittää suun kautta keuhkoihin.

Suosittelut annostus on: Aikuiset

AirFluSal Aerosoli 25/125: kaksi suihketta kahdesti päivässä
AirFluSal Aerosoli 25/250: kaksi suihketta kahdesti päivässä

Jos käytät tätä lääkettä kahdesti päivässä, oireesi voivat pysyä hyvin hallinnassa. Jos näin on, lääkärisi voi päättää vähentää annostasi yhteen kertaan päivässä. Annostusta voidaan muuttaa seuraavasti:

kerran yöllä – jos oireita esiintyy yöllä
kerran aamulla – jos oireita esiintyy päivällä

On erittäin tärkeää, että noudatat lääkärisi ohjeita siitä, kuinka monta suihketta sinun tulee ottaa ja kuinka usein sinun tulee käyttää lääkettäsi.

Jos käytät tätä lääkettä astmaan, lääkärisi haluaa säännöllisesti tarkistaa oireesi.

Jos astmasi tai hengityksesi huononee, kerro siitä välittömästi lääkärillesi. Saat esimerkiksi huomata, että hengityksesi vinkuu enemmän, tunnet rintakehäsi tiukemmaksi tai tarvitset enemmän nopeavaikutteista hätälääkettäsi. Jos jokin edellä mainituista oireista ilmenee, sinun tulee silti jatkaa tämän lääkkeen käyttöä, mutta älä lisää suihkeiden määrää. Tilasi voi pahentua ja voit sairastua vakavasti. Ota yhteyttä lääkäriisi, koska saatat tarvita lisähoitoa.

Käyttö lapsilla

Tätä lääkettä ei suositella lasten käyttöön.

Käyttöohjeet

Lääkärisi tai apteekkihenkilökunta antaa sinulle ohjeet inhalaattorisi oikeasta käytöstä. Heidän tulee säännöllisesti tarkistaa, miten käytät inhalaattoria. Jos et käytä tämän lääkkeen inhalaattoria oikein tai määräysten mukaisesti, se ei välttämättä auta astmaasi kuten pitäisi.

Lääke on paineistetussa metallisessa säiliössä, joka on asetettu muoviseen pidikkeeseen, jossa on suukappale.

Inhalaattorissa on etupuolella oleva indikaattori, joka näyttää, kuinka monta annosta on jäljellä. Kun käytät inhalaattoria, annosindikaattori laskee yleensä numeron takaisin 5–7 suihkeen välein. Annosindikaattori näyttää, kuinka monta suihketta inhalaattorissa on jäljellä.

Älä pudota inhalaattoria, koska silloin indikaattori voi laskea takaisin.

Inhalaattorin testaaminen

1. Kun käytät inhalaattoria ensimmäistä kertaa, testaa, toimiiko se. Poista suukappaleen suojus puristamalla varovasti peukalolla ja etusormella sivuilta ja vetämällä suojus pois.
2. Varmistaaksesi, että se toimii, ravista inhalaattoria hyvin, suuntaa suukappale pois päin itsestäsi ja paina säiliötä; suihkuta 4 suihketta ilmaan samalla kun ravistat inhalaattoria joka kerta ennen kuin suihkutat ilmaan. Annosindikaattori näyttää numeron 120, mikä on inhalaattorissa olevien suihkeiden määrä. Jos et ole käyttänyt inhalaattoria viikkoon tai pidempään, suihkuta kaksi suihketta lääkettä ilmaan.

Inhalaattorin käyttö

Ennen kuin käytät inhalaattoria, on tärkeää aloittaa hengittämällä mahdollisimman hitaasti.

1. Seiso tai istu suorassa, kun käytät inhalaattoria.
2. Poista suukappaleen suojus (kuten kuvattu kohdassa 1: "Inhalaattorin testaaminen"). Tarkista suukappaleen sisä- ja ulkopuoli varmistaaksesi, että se on puhdas eikä siinä ole irtonaisia esineitä.
3. Ravista inhalaattoria 4 tai 5 kertaa varmistaaksesi, että mahdolliset irtonaiset esineet on poistettu ja että sisältö on tasaisesti sekoittunut..
4. Pidä inhalaattoria pystyasennossa, peukalo alhaalla, suukappaleen takana. Hengitä hyvin ulos niin pitkälle kuin voit.
5. Aseta suukappale suuhusi hampaiden väliin. Sulje huulesi sen ympärille. Älä pure sitä..
6. Pidätä hengitystäsi, ota inhalaattori pois suustasi ja nosta sormesi inhalaattorin yläosasta. Pidätä hengitystäsi muutaman sekunnin ajan tai niin kauan kuin pystyt ilman suurta vaivaa.
7. Odota noin puoli minuuttia jokaisen lääkeannoksen välillä ja toista sitten vaiheet 3–7.
8. Huuhtelee sitten suusi vedellä ja sylje se ulos ja/tai harjaa hampaasi. Tämä voi auttaa estämään sammias (sieni-infektio suussa) ja käheys.
9. Aseta käytön jälkeen aina suojakorkki takaisin suukappaleen päälle, jotta se pysyy pölyttömänä. Kun suukappaleen korkki on kunnolla paikallaan, se napsahtaa paikoilleen. Jos korkki ei napsahda paikoilleen, käännä se toisinpäin ja yritä uudelleen. Älä käytä liikaa voimaa.
10. Älä kiirehdi vaiheita 4, 5, 6 ja 7. On tärkeää, että hengität mahdollisimman hitaasti juuri ennen inhalaattorin käyttöä. Ensimmäiset kerrat, kun käytät inhalaattoria, sinun tulisi tehdä tämä peilin edessä. Jos näet "sumua" ilmestyvän inhalaattorin yläosasta tai suusi sivuilta, sinun on aloitettava alusta vaiheesta 3.

Jos sinulla on vaikeuksia käyttää inhalaattoria, lääkärisi tai muu terveydenhuollon ammattilainen voi suositella käyttämään tilanjatketta, kuten Volumatic

Jos sinulla on vaikeuksia käyttää inhalaattoria, lääkärisi tai muu terveydenhuollon ammattilainen voi suositella käyttämään tilanjatketta, kuten Volumatic® tai AeroChamber Plus® yhdessä inhalaattorisi kanssa. Lääkärisi, apteekkihenkilökunta tai muu terveydenhuollon ammattilainen näyttää sinulle, kuinka käytät tilanjatketta inhalaattorisi kanssa, kuinka huollat tilanjatketta ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. On tärkeää, että kun käytät tilanjatketta inhalaattorisi kanssa, et lopeta tai vähennä sen käyttöä keskustelematta ensin lääkärisi kanssa. On myös tärkeää, ettet vaihda käyttämäsi tilanjatketta keskustelematta lääkärisi kanssa. Jos lopetat tilanjatkeen käytön tai vaihdat tilanjatkeen tyyppiä, lääkärisi saattaa joutua säätämään lääkitystä, joka tarvitaan astmasi hallintaan. inhalaattorisi kanssa, et lopeta tai vähennä sen käyttöä keskustelematta ensin lääkärisi kanssa. On myös tärkeää, ettet vaihda käyttämäsi tilanjatketta keskustelematta lääkärisi kanssa. Jos lopetat tilanjatkeen käytön tai vaihdat tilanjatkeen tyyppiä, lääkärisi saattaa joutua säätämään lääkitystä, joka tarvitaan astmasi hallintaan.

Keskustele aina lääkärisi kanssa ennen kuin teet muutoksia astman hoitoon.

Henkilöt, joilla on heikot kädet, saattavat löytää helpommaksi pitää inhalaattoria molemmilla käsillä. Aseta etusormet inhalaattorin päälle ja molemmat peukalot alapuolelle, suukappaleen taakse.

Muista vaihtaa inhalaattorisi, kun annososoitin näyttää numeroa 40 ja annososoittimen väri muuttuu vihreästä punaiseksi. Lopeta inhalaattorin käyttö, kun annososoitin näyttää 0, sillä jäljellä olevat annokset eivät välttämättä riitä täydelliseen annokseen. Älä koskaan yritä muuttaa annososoittimen numeroita tai irrottaa annososoitinta säiliöstä. Laskurin asentoa ei voi muuttaa ja laskuri on pysyvästi kiinnitetty säiliöön.

Inhalaattorisi puhdistaminen

Estääksesi inhalaattorisi tukkeutumisen, on tärkeää puhdistaa se vähintään kerran viikossa.

Inhalaattorisi puhdistamiseksi:

- poista suukappaleen suojus

- älä koskaan irrota metallista säiliötä muovikotelosta

- puhdistaa suukappaleen ja muovikotelon sisä- ja ulkopuoli kuivalla liinalla tai nenäliinalla

- asetaa suukappaleen suojus takaisin paikoilleen. Se napsahtaa paikoilleen, kun se on oikein

- asetettu. Jos se ei napsahda paikoilleen, käännä suojus toisinpäin ja yritä uudelleen. Älä

- käytä liikaa voimaa.

Älä laita metallista säiliötä veteen.

Oletko käyttänyt tätä lääkettä liikaa?

On tärkeää käyttää inhalaattoria ohjeiden mukaisesti. Jos hengität vahingossa suuremman annoksen kuin suositeltu, kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi. Saatat huomata, että sydämesi lyö nopeammin kuin normaalisti ja tunnet olosi vapisevaksi. Saatat myös kokea huimausta, päänsärkyä, lihasheikkoutta ja nivelkipua.

Jos olet käyttänyt suurempia annoksia pitkään, kysy neuvoa lääkäritäsi tai apteekkariltasi.

Suuremmat annokset tätä lääkettä voivat vähentää lisämunuaisten tuottamien steroidihormonien määrää.

Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä?

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen. Ota seuraava annos tavalliseen aikaan.

Jos lopetat tämän lääkkeen käytön

On erittäin tärkeää, että käytät tätä lääkettä joka päivä ohjeiden mukaisesti. Jatka käyttöä, kunnes lääkärisi kehottaa sinua lopettamaan. Älä lopeta äkillisesti tai vähennä annostasi äkillisesti. Tämä voi pahentaa hengitysvaivaasi.

Lisäksi äkillinen lopettaminen tai annoksen vähentäminen (hyvin harvinaisissa tapauksissa) voi aiheuttaa lisämunuaisten ongelmia (lisämunuaisten vajaatoiminta). Tämä voi joskus aiheuttaa haittavaikutuksia. Näitä haittavaikutuksia voivat olla:

vatsakipu

väsymys ja ruokahaluttomuus, huonovointisuus

pahoinvointi ja ripuli

painon lasku

päänsärky tai uneliaisuus

matala verensokeri

matala verenpaine ja hallitsemattomat kehon nykäykset, usein osana epileptistä kohtausta (kouristus).

Kun kehosi on stressissä, kuten kuumeen, trauman (kuten auto-onnettomuuden), infektion tai leikkauksen aikana, lisämunuaisten vajaatoiminta voi pahentua ja saatat saada jonkin yllä mainituista haittavaikutuksista. Jos saat haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin. Estääksesi näiden oireiden esiintymisen, lääkärisi voi määrätä lisäkortikosteroideja tablettimuodossa (kuten prednisolonia).

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä saakaan. Vähentääksesi haittavaikutusten riskiä mahdollisimman paljon, lääkärisi määrää pienimmän mahdollisen annoksen tämän lääkkeen hallitsemiseksi astmaasi.

Allergiset reaktiot: saatat huomata, että hengityksesi huononee äkillisesti heti tämän lääkkeen käytön jälkeen. Saatat kokea voimakasta hengityksen vinkumista ja yskää tai hengästyä. Saatat myös kokea kutinaa, ihottumaa (nokkosihottuma) ja turvotusta (yleensä kasvojen, huulten, kielen tai kurkun alueella) tai saatat äkillisesti tuntea, että sydämesi lyö erittäin nopeasti tai tunnet itsesi heikoksi tai huimaavaksi (tämä voi johtaa pyörtymiseen tai tajunnan menetykseen). Jos saat jonkin näistä haittavaikutuksista tai jos ne ilmenevät äkillisesti tämän lääkkeen käytön jälkeen, lopeta käyttö ja kerro siitä välittömästi lääkärillesi. Allergiset reaktiot ovat joskus mahdollisia tämän lääkkeen kanssa (alle 1 käyttäjällä 100:sta).

Muut haittavaikutukset on lueteltu alla.

Hyvin yleiset (esiintyvät yli 1 käyttäjällä 10:stä)

päänsärky – tämä yleensä paranee hoidon aikana

COPD-potilailla on raportoitu lisääntyntä vilustumisten määrää.

Usein (esiintyy alle 1:llä 10:stä käyttäjästä)

sammasta (kivuliaita, kermanvärisiä, paksuuntuneita kohtia) suussa ja kurkussa. Lisäksi kivulias kieli, käheä ääni ja kurkun ärsytys. Se voi auttaa, jos huuhtelet suusi vedellä heti lääkkeen ottamisen jälkeen ja sylkäiset sen heti pois ja/tai harjaat hampaasi. Lääkärisi voi määrätä sienilääkkeen sammasinfektion hoitoon
kivuliaat, turvonneet nivelet ja lihaskipu
lihaskrampit.

Seuraavia haittavaikutuksia on myös raportoitu potilailla, joilla on krooninen keuhkosairaus, johon liittyy hengitysteiden jatkuva ahtautuminen, mikä vaikeuttaa hengittämistä (COPD):

keuhkokuume (pneumonia). Kerro lääkärillesi, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista tämän lääkkeen käytön aikana – nämä voivat olla keuhkokuumeen oireita:

- lisääntynyt limaneritys
- liman värin muutos
- kuume
- vilunväristykset
- useammin yskä
- lisääntyneet hengitysvaikeudet

mustelmat ja luunmurtumat

poskionteloiden tulehdus (paineen tai täyteyden tunne nenässä, poskissa ja silmien takana, joskus jyskyttävä kipu)

alhaisempi kaliumin määrä veressä (voit saada epäsäännöllisen sydämen sykkeen, lihasheikkoutta, kouristuksia).

Joskus (esiintyy alle 1:llä 100:sta käyttäjästä)

kohonnut sokerin (glukoosin) määrä veressäsi (hyperglykemia). Jos sinulla on diabetes, voi olla tarpeen tarkistaa verensokeritasosi useammin ja mahdollisesti muuttaa tavanomaista diabeteslääkitystäsi

silmän linssin samentuminen (kaihi)

nopeutunut syke (takykardia)

tahaton vapina (tremor) ja nopea tai epäsäännöllinen syke (sydämentykytys). Nämä haittavaikutukset ovat yleensä harmittomia ja vähenevät hoidon aikana

rintakipu

levoton olo (tämä esiintyy yleensä lapsilla)

unihäiriöt

allerginen ihottuma (ihottuma).

Harvoin (esiintyy alle 1 käyttäjällä 1 000:sta)

hengitysvaikeudet tai hengityksen vinkuminen, joka pahenee tämän lääkkeen käytön jälkeen. Jos näin tapahtuu, lopeta tämän inhalaattorin käyttö. Käytä nopeavaikutteista hätäinhalaattoriasi hengityksen helpottamiseksi ja kerro siitä heti lääkärillesi.

tämä lääke voi vaikuttaa kehon normaaliin steroidihormonituotantoon, erityisesti kun käytät suuria annoksia pitkään. Vaikutukset ovat:

- kasvun hidastuminen lapsilla ja nuorilla alle 18-vuotiailla
- luuston oheneminen

silmänpaineen nousu (glaukooma)
painonnousu
kuukasvot (Cushingin oireyhtymä).

Lääkärisi tarkkailee sinua säännöllisesti näiden haittavaikutusten varalta ja varmistaa, että käytät pienintä mahdollista annosta tätä lääkettä astmasi hallitsemiseksi.

käytöksen muutokset, kuten epätavallinen aktiivisuus ja ärtyneisyys (nämä haittavaikutukset esiintyvät yleensä lapsilla).

sydämen rytmihäiriö (arytmia). Kerro siitä lääkärillesi, mutta älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä, ellei lääkärisi niin määrää.

sieni-infektio ruokatorvessa (esofagus), mikä voi aiheuttaa nielemisvaikeuksia.

Tuntematon (ei voida määrittää saatavilla olevien tietojen perusteella)

masennus tai aggressio. Nämä haittavaikutukset esiintyvät useammin lapsilla
Näön hämärtyminen.

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan.

Verkkosivusto:

www.lareb.nl. Haittavaikutuksista ilmoittamalla voit auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. Miten säilytät tätä lääkettä?

Pidä lasten ulottumattomissa ja näkyvistä.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Se löytyy etiketistä ja laatikosta merkinnän "Exp.:" jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivämäärä.

Säilytä alle 25°C.

Säilytä aerosoli ulkopakkauksessa valolta suojattuna.

Aerosoli sisältää paineenalaista nestettä.

Älä puhkaise, riko tai polta aerosolia, vaikka se vaikuttaisi tyhjältä.

Kuten useimmat paineen alaiset inhalaatiolääkkeet, lääkkeen terapeuttinen vaikutus voi heikentyä, kun aerosoli on kylmä.

Älä huuhtele lääkkeitä viemäriin tai WC:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekista, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Ne hävitetään vastuullisesti, jotta ne eivät päädy ympäristöön.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä aineita tämä lääke sisältää?

AirFluSal Aerosoli 25/125 mikrogrammaa, aerosoli, suspensio

Tämän lääkkeen vaikuttavat aineet ovat salmeteroli ja flutikasonipropionaatti. Jokainen mitattu annos tästä lääkkeestä antaa 25 mikrogrammaa salmeterolia (salmeteroliksi-nafoaattina) ja 125 mikrogrammaa flutikasonipropionaattia.

Tämän lääkkeen toinen aine on norfluraani (HFA 134a) ponneaineena.

AirFluSal Aerosoli 25/250 mikrogrammaa, aerosoli, suspensio

Tämän lääkkeen vaikuttavat aineet ovat salmeteroli ja flutikasonipropionaatti. Jokainen mitattu annos tästä lääkkeestä antaa 25 mikrogrammaa salmeterolia (salmeteroliksi-nafoaattina) ja 250 mikrogrammaa flutikasonipropionaattia.

Toinen aine tässä valmisteessa on norfluraani (HFA 134a) ponneaineena.

Tämä lääke sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.

Jokainen inhalaattori sisältää 12,5 grammaa HFA 134a. Tämä vastaa 0,0179 tonnia CO₂ (maapallon lämpenemispotentiaali GWP = 1430).

Miltä AirFluSal Aerosol näyttää ja kuinka paljon sitä on pakkauksessa?

Inhalaattori koostuu alumiinisesta sumutepullostasta (plasma FCP päällystetty aerosoli) sopivalla annosteluventtiilillä ja polypropeenikorkilla varustetulla pidikkeellä, jossa on annosindikaattori, pakattuna pahvilaatikkoon.

Sumutepullo sisältää valkoisen, homogeenisen suspension.

Jokainen sumutepullo sisältää 120 inhalaatiota.

Pakkauskoko:

1 inhalaattori x 120 inhalaatiota.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija Sandoz B.V.

Hospitaaldreef 29

1315 RC Almere

Alankomaat

Valmistaja

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Saksa

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova ulica 57

1526 Ljubljana

Slovenia

Rekisteriin merkitty:

AirFluSal Aerosol 25/125 mikrogrammaa, aerosoli, suspensio: RVG 118836

AirFluSal Aerosol 25/250 mikrogrammaa, aerosoli, suspensio: RVG 118837

Tämä lääke on rekisteröity EEA:n jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä:

Alankomaat AirFluSal Aerosol 25/125 mikrogrammaa, aerosoli, suspensio

AirFluSal Aerosol 25/250 mikrogrammaa, aerosoli, suspensio

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty toukokuussa 2025.