

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

AirFluSal® Aerozolis 25/125 mikrogramų, aerozolis, suspensija

AirFluSal® Aerozolis 25/250 mikrogramų, aerozolis, suspensija

salmeterolis (kaip salmeterolio ksinofaatas)/flutikazono propionatas

Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikta svarbi informacija.

Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.

Turite klausimų? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Neduokite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Jis gali pakenkti kitiems, net jei jų simptomai tokie patys kaip jūsų.

Ar pasireiškė šalutinis poveikis, nurodytas 4 skyriuje? Arba pasireiškė šalutinis poveikis, kuris nėra nurodytas šiame pakuotės lapelyje? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Šio pakuotės lapelio turinys:

1. Kas yra AirFluSal Aerozolis ir kam jis vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra AirFluSal Aerozolis ir kam jis vartojamas?

AirFluSal Aerozolis sudėtyje yra du vaistai: salmeterolis ir flutikazono propionatas:

Salmeterolis yra ilgai veikiantis bronchus plečiantis vaistas. Bronchus plečiantys vaistai padeda plaučių kvėpavimo takams išlikti atviriems. Tai palengvina oro įkvėpimą ir iškvėpimą. Poveikis trunka mažiausiai 12 valandų.

Flutikazono propionatas yra kortikosteroidas, kuris mažina plaučių patinimą ir dirginimą.

Šis vaistas nerekomenduojamas vaikams.

Gydytojas paskyrė šį vaistą, kad padėtų išvengti kvėpavimo problemų, tokių kaip astma. Jūs turite vartoti šį vaistą kasdien pagal gydytojo nurodymus. Tai užtikrina, kad jis veiksmingai reguliuoja jūsų astmą.

Šis vaistas padeda sustabdyti dusulio ir kvėpavimo sunkumų atsiradimą. Tačiau jis neturėtų būti naudojamas staigiam dusulio ar kvėpavimo sunkumų priepuoliui palengvinti. Jei taip atsitinka, turite naudoti greitai veikiantį palengvinantį „skubios pagalbos“ inhaliatorių, pvz., salbutamolį. Visada turite turėti savo greitai veikiantį „skubios pagalbos“ inhaliatorių su savimi.

2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?

Kada negalima vartoti šio vaisto?

Jūs esate alergiškas bet kuriai šio vaisto medžiagai. Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje.

Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą?

Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei turite šias problemas:

- širdies liga, įskaitant nereguliarų ar greitą širdies plakimą;
- pernelyg aktyvi skydliaukė;
- aukštas kraujospūdis;
- cukrinis diabetas (diabetes mellitus) (šis vaistas gali padidinti jūsų cukraus kiekį kraujyje);
- mažas kalio kiekis kraujyje;
- tuberkuliozė (TBC), jei sergate arba sirgote anksčiau, arba kitos plaučių infekcijos.

Kreipkitės į gydytoją, jei turite neryškų matymą ar kitus regėjimo sutrikimus.

Ar vartojate kitus vaistus?

Ar vartojate kitus vaistus be AirFluSal Aerozolio, ar neseniai vartojote, ar planuojate vartoti kitus vaistus artimiausiu metu? Pasakykite apie tai savo gydytojui arba vaistininkui. Tai taip pat taikoma astmos vaistams ir vaistams, kuriuos galite įsigyti be recepto. Taip yra todėl, kad šis vaistas gali būti netinkamas vartoti kartu su kai kuriais kitais vaistais.

Pasakykite savo gydytojui, jei vartojate šiuos vaistus, prieš pradėdami vartoti AirFluSal Aerozolį:

Beta blokatoriai (tokie kaip atenololis, propranololis ir sotalolis). Beta blokatoriai dažniausiai naudojami aukšto kraujospūdžio ar kitų širdies ligų gydymui.

Vaistai infekcijoms gydyti, įskaitant kai kuriuos vaistus nuo ŽIV (tokius kaip ritonaviras, kobicistatas, ketokonazolas, itrakonazolas ir eritromicinas). Kai kurie iš šių vaistų gali padidinti flutikazono propionato ar salmeterolio kiekį jūsų organizme. Tai gali padidinti šalutinio poveikio riziką vartojant AirFluSal Aerozolį, įskaitant nereguliarų širdies ritmą, arba gali pabloginti šalutinį poveikį. Gali būti, kad jūsų gydytojas norės atidžiai stebėti jus, jei vartojate šiuos vaistus.

Kortikosteroidai (vartojami per burną arba leidžiami injekcijomis). Jei neseniai vartojote šiuos vaistus, šis vaistas gali padidinti jūsų antinksčių pažeidimo riziką.

Diuretikai, taip pat žinomi kaip šlapimo išsiskyrimą skatinantys vaistai, naudojami aukšto kraujospūdžio gydymui.

Kiti bronchus plečiantys vaistai (tokie kaip salbutamolis).

Ksantino vaistai. Jie dažnai naudojami astmai gydyti.

Nėštumas ir žindymas

Ar esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, planuojate pastoti ar žindote kūdikį? Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Mažai tikėtina, kad šis vaistas turės įtakos vairavimo gebėjimams ir gebėjimui valdyti mechanizmus.

3. Kaip vartoti šį vaistą?

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė jūsų gydytojas arba vaistininkas. Jei abejojate dėl teisingo vartojimo, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Vartokite šį vaistą kasdien, kol jūsų gydytojas patars nutraukti. Nevartokite daugiau nei rekomenduojama dozė. Jei abejojate, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Negalite nutraukti ar sumažinti šio vaisto vartojimo, nepasitarę su savo gydytoju. Šis vaistas turi būti įkvėptas per burną į plaučius.

Rekomenduojama dozė yra: Suaugusiesiems

AirFluSal Arozolis 25/125: du įpurškimai du kartus per dieną

AirFluSal Arozolis 25/250: du įpurškimai du kartus per dieną

Jei šį vaistą vartojate du kartus per dieną, jūsų simptomai gali būti gerai kontroliuojami. Jei taip yra, jūsų gydytojas gali nuspręsti sumažinti dozę iki vieno karto per dieną. Dozė gali būti pakeista į:

vieną kartą naktį – jei simptomai pasireiškia naktį

vieną kartą ryte – jei simptomai pasireiškia dieną

Labai svarbu, kad laikytumėtės gydytojo nurodymų dėl įpurškimų skaičiaus ir kaip dažnai turėtumėte vartoti vaistą.

Jei šį vaistą vartojate astmai gydyti, jūsų gydytojas reguliariai norės stebėti jūsų simptomus.

Jei jūsų astma ar kvėpavimas pablogėja, nedelsdami praneškite gydytojui. Pavyzdžiui, galite pastebėti, kad dažniau „švilpiate“, dažniau jaučiate krūtinės spaudimą arba dažniau vartojate greitai veikiančius skubios pagalbos vaistus. Jei pasireiškia kuris nors iš aukščiau aprašytų simptomų, turėtumėte toliau vartoti šį vaistą, bet nedidinkite įpurškimų skaičiaus. Jūsų būklė gali pablogėti ir galite sunkiai susirgti. Kreipkitės į gydytoją, nes jums gali prireikti papildomo gydymo.

Vartojimas vaikams

Šis vaistas nerekomenduojamas vaikams.

Naudojimo instrukcijos

Jūsų gydytojas arba vaistininkas turi jums paaiškinti, kaip teisingai naudoti inhaliatorių. Jie turi reguliariai tikrinti, kaip naudojate inhaliatorių. Jei neteisingai naudojate šio vaisto inhaliatorių arba ne taip, kaip nurodyta, tai gali reikšti, kad jis nepadedą jūsų astmai taip, kaip turėtų.

Vaistas yra metalinėje slėginėje talpyklėje, įdėtoje į plastikinį laikiklį su kandikliu.

Inhaliatorius turi indikatorius priekyje, kuris rodo, kiek dozių dar liko. Naudojant inhaliatorių, dozės indikatorius paprastai po kiekvienų 5–7 įpurškimų atgal skaičiuoja skaičių. Dozės indikatorius rodo, kiek įpurškimų dar liko inhaliatoriuje.

Nenumeskite inhaliatoriaus, nes indikatorius gali pradėti skaičiuoti atgal.

Jūsų inhaliatoriaus testavimas

1. Jei pirmą kartą naudojate inhaliatorių, patikrinkite, ar jis veikia. Nuimkite apsauginį dangtelį nuo kandiklio, švelniai suspausdami šonus nykščiu ir smiliumi ir nuimdami dangtelį.
2. Kad įsitikintumėte, jog jis veikia, gerai suplakite inhaliatorių, nukreipkite kandiklį nuo savęs ir paspauskite talpyklę; purškite 4 įpurškimus į orą, kiekvieną kartą prieš purškiant į orą

suplakite inhaliatorių. Dozės indikatorius rodo skaičių 120, tai yra įpurškimų skaičius inhaliatoriuje. Jei savo inhaliatoriaus nenaudojote savaitę ar ilgiau, purškite du įpurškimus vaisto į orą.

### Jūsų inhaliatoriaus naudojimas

Prieš naudodami inhaliatorių, svarbu pradėti kvėpuoti kuo lėčiau.

1. Atsistokite arba sėdėkite tiesiai, kai naudojate inhaliatorių.
2. Nuimkite dangtelį nuo kandiklio (kaip aprašyta 1 žingsnyje: „Inhaliatoriaus testavimas“). Patikrinkite kandiklio vidų ir išorę, kad įsitikintumėte, jog jis švarus ir nėra laisvų daiktų./
3. Pakratykite inhaliatorių 4 ar 5 kartus, kad įsitikintumėte, jog pašalinti laisvi daiktai ir turinys tolygiai sumaišytas..
4. Laikykite inhaliatorių vertikaliai, su nykščiu apačioje, už kandiklio. Giliai iškvėpkite kiek galite..
5. Įdėkite kandiklį į burną tarp dantų. Uždarykite lūpas aplink jį. Nekąskite..
6. Lėtai ir giliai įkvėpkite per burną. Tiesiog pradėję įkvėpti, stipriai paspauskite aerozolio viršų, kad įpurkstumėte vaisto į burną, tuo pačiu tolygiai ir giliai įkvėpdami.
7. Sulaikykite kvėpavimą, išimkite inhaliatorių iš burnos ir nuimkite pirštą nuo inhaliatoriaus viršaus. Sulaikykite kvėpavimą kelias sekundes arba tiek, kiek galite be didelių pastangų.
8. Palaukite apie pusę minutės tarp kiekvieno vaisto purškimo ir tada pakartokite 3–7 žingsnius.
9. Po to praskalaukite burną vandeniu ir išspjaukite ir/arba išsivalykite dantis. Tai gali padėti išvengti pienligės (grybelinės infekcijos burnoje) ir užkimimo.
10. Po naudojimo visada uždėkite apsauginį dangtelį ant kandiklio, kad jis būtų be dulkių. Jei dangtelis tinkamai uždėtas, jis spragtelės į vietą. Jei dangtelis nespragteli į vietą, apverskite jį ir bandykite dar kartą. Nenaudokite per daug jėgos.

Jūs neturėtumėte skubėti atlikti 4, 5, 6 ir 7 žingsnių. Svarbu, kad prieš naudodami inhaliatorių, kvėpuotumėte kuo lėčiau. Pirmą kartą naudodami inhaliatorių, turėtumėte tai daryti stovėdami prieš veidrodį. Jei matote „rūką“ virš inhaliatoriaus arba šalia burnos, turėtumėte pradėti iš naujo nuo 3 žingsnio.

Jei jums sunku naudoti inhaliatorių, jūsų gydytojas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas gali rekomenduoti naudoti tarpinę, tokią kaip Volumatic® ar AeroChamber Plus® kartu su savo inhaliatoriumi. Jūsų gydytojas, vaistininkas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas turėtų jums parodyti, kaip naudoti tarpinę su inhaliatoriumi, kaip prižiūrėti tarpinę ir atsakyti į jūsų klausimus. Svarbu, kad naudodami tarpinę su savo inhaliatoriumi, nenustotumėte jos naudoti ar nesumažintumėte dozės, prieš tai nepasitarę su gydytoju. Taip pat svarbu nekeisti tarpinės tipo,

kurį naudojate, nepasitarę su gydytoju. Jei nustosite naudoti tarpinę arba pakeisite tarpinės tipą, jūsų gydytojas gali tekti koreguoti vaisto dozę, reikalingą jūsų astmai kontroliuoti. Visada pasitarkite su gydytoju prieš keisdami savo astmos gydymą.

Žmonėms su silpnomis rankomis gali būti lengviau laikyti inhaliatorių abiem rankomis. Padėkite du rodomuosius pirštus ant inhaliatoriaus viršaus ir abu nykščius apačioje, už kandiklio.

Turėtumėte prisiminti pakeisti savo inhaliatorių, kai dozės indikatorius rodo skaičių 40 ir dozės indikatorius spalva pasikeičia iš žalios į raudoną. Nustokite naudoti inhaliatorių, kai dozės indikatorius rodo 0, nes likusios purkštuko dozės gali būti nepakankamos pilnai dozei. Niekada nebandykite keisti skaičių ant dozės indikatorius ar nuimti dozės indikatorius nuo purkštuko. Skaitiklio padėtis negali būti pakeista ir skaitiklis yra nuolat pritvirtintas prie purkštuko.

#### Jūsų inhaliatoriaus valymas

Kad išvengtumėte inhaliatoriaus užsikimšimo, svarbu jį valyti bent kartą per savaitę.

Norėdami išvalyti savo inhaliatorių:

- nuimkite kandiklio apsauginį dangtelį
- niekada neišimkite metalinio purkštuko iš plastikinio laikiklio
- išvalykite kandiklio ir plastikinio laikiklio vidų ir išorę sausu skudurėliu ar servetėle
- uždėkite apsauginį dangtelį ant kandiklio atgal. Jis turėtų spragtelėti, kai yra tinkamai uždėtas. Jei jis nespragteli, apverskite dangtelį ir bandykite dar kartą. Nenaudokite per daug jėgos.

Nedėkite metalinio purkštuko į vandenį.

#### Ar naudojote per daug šio vaisto?

Svarbu naudoti inhaliatorių pagal instrukcijas. Jei netyčia įkvėpėte didesnę dozę nei rekomenduojama, pasakykite savo gydytojui ar vaistininkui. Galite pastebėti, kad jūsų širdies ritmas yra greitesnis nei įprastai ir jaučiatės drebulys. Taip pat galite jausti galvos svaigimą, galvos skausmą, raumenų silpnumą ir sąnarių skausmą.

Jei ilgą laiką naudojote didesnes dozes, turėtumėte kreiptis į gydytoją ar vaistininką patarimo. Didelės šio vaisto dozės gali sumažinti antinksčių gaminamų steroidinių hormonų kiekį.

#### Ar pamiršote naudoti šį vaistą?

Nevartokite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę. Tiesiog vartokite kitą dozę įprastu laiku.

#### Jei nustosite vartoti šį vaistą

Labai svarbu, kad šį vaistą vartotumėte kasdien pagal instrukcijas. Tęskite tol, kol gydytojas nurodys nutraukti. Nenutraukite staiga ir nesumažinkite šio vaisto dozės. Tai gali pabloginti jūsų kvėpavimo problemą.

Be to, staigus šio vaisto vartojimo nutraukimas arba dozės sumažinimas (labai retais atvejais) gali sukelti antinksčių problemas (antinksčių nepakankamumą). Dėl to kartais gali pasireikšti šalutinis poveikis. Šis šalutinis poveikis gali būti toks:

- pilvo skausmas

nuovargis ir apetito praradimas, bloga savijauta  
pykinimas ir viduriavimas  
svorio netekimas  
galvos skausmas arba mieguistumas  
žemas cukraus kiekis kraujyje  
žemas kraujospūdis ir nekontroliuojami kūno traukuliai, dažnai kaip epilepsijos priepuolio (traukulių) dalis.

Kai jūsų kūnas patiria stresą, pavyzdžiui, karščiavimą, traumą (pvz., autoavariją), infekciją ar operaciją, antinksčių nepakankamumas gali pablogėti ir gali pasireikšti vienas iš aukščiau išvardytų šalutinių poveikių. Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Kad šie simptomai nepasireikštų, gydytojas gali skirti papildomų kortikosteroidų tablečių pavidalu (pvz., prednizolono).

Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą? Kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

#### 4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir bet kuris vaistas, šis vaistas gali turėti šalutinį poveikį, nors ne kiekvienas jį patiria. Siekiant kuo labiau sumažinti šalutinio poveikio riziką, gydytojas paskirs mažiausią įmanomą šio vaisto dozę, kad kontroliuotų jūsų astmą.

Alerginės reakcijos: gali būti, kad jūsų kvėpavimas staiga pablogės iškart po šio vaisto vartojimo. Gali pasireikšti stiprus švokštimas ir kosulys arba dusulys. Taip pat gali pasireikšti niežulys, bėrimas (dilgėlinė) ir patinimas (dažniausiai veido, lūpų, liežuvio ar gerklės) arba galite staiga pajusti, kad jūsų širdis labai greitai plaka arba jaučiatės silpni ar apsvaigę (tai gali sukelti alpimą ar sąmonės netekimą). Jei pasireiškia bet kuris iš šių šalutinių poveikių arba jie staiga atsiranda po šio vaisto vartojimo, nutraukite vartojimą ir nedelsdami praneškite gydytojui. Alerginės reakcijos kartais pasireiškia vartojant šį vaistą (mažiau nei 1 iš 100 vartotojų).

Kitas šalutinis poveikis nurodytas žemiau.

Labai dažnai (pasireiškia daugiau nei 1 iš 10 vartotojų)  
galvos skausmas – paprastai pagerėja gydymo metu  
pranešta apie padidėjusį peršalimo atvejų skaičių pacientams, sergantiems LOPL.

Dažnai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 vartotojų)  
pienligė (skausmingos, kreminės spalvos, sustorėjusios dėmės) burnoje ir gerklėje. Be to, skausmingas liežuvis, užkimęs balsas ir gerklės dirginimas. Gali padėti, jei iš karto po kiekvienos vaisto dozės išskalaujate burną vandeniu ir iš karto išspjaunate ir/arba valote dantis. Jūsų gydytojas gali paskirti priešgrybelinį vaistą pienligei gydyti  
skausmingi, patinę sąnariai ir raumenų skausmas  
raumenų spazmai.

Šie šalutiniai poveikiai taip pat buvo pastebėti pacientams, sergantiems lėtine plaučių liga su nuolatiniu kvėpavimo takų susiaurėjimu, kuris apsunkina kvėpavimą (LOPL):

pneumonija (plaučių uždegimas). Pasakykite savo gydytojui, jei pasireiškia kuris nors iš šių simptomų vartojant šį vaistą – tai gali būti plaučių uždegimo simptomai:

- didesnis gleivių susidarymas
- gleivių spalvos pasikeitimas
- karščiavimas
- šaltkrėtis
- dažnesnis kosulys
- didesni kvėpavimo sunkumai

mėlynės ir kaulų lūžiai

nosies ančių uždegimas (spaudimo ar pilnumo jausmas nosyje, skruostuose ir už akių, kartais su pulsuojančiu skausmu)

mažesnis kalio kiekis kraujyje (gali pasireikšti nereguliarus širdies plakimas, raumenų silpnumas, spazmai).

Kartais (pasireiškia mažiau nei 1 iš 100 vartotojų)

padidėjęs cukraus (gliukozės) kiekis kraujyje (hiperglikemija). Jei sergate cukriniu diabetu, gali prireikti dažniau tikrinti cukraus kiekį kraujyje ir gali tekti koreguoti įprastinį diabeto gydymą kontroliuoti ir gali tekti koreguoti įprastinį diabeto gydymą

akies lęšiuko drumstumas (katarakta)

pagreitėjęs širdies plakimas (tachikardija)

nevalingas drebulys (tremoras) ir greitas arba nereguliarus širdies plakimas (palpitacijos).

Šalutiniai poveikiai dažniausiai yra nekenksmingi ir mažėja gydymo eigoje

skausmas krūtinėje

nerimo jausmas (dažniausiai pasireiškia vaikams)

sutrikęs miegas

alerginis odos bėrimas (bėrimas).

Retai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 1 000 vartotojų)

kvėpavimo sunkumai arba švokštimas, kuris pablogėja po šio vaisto vartojimo. Jei taip atsitinka, nutraukite šio inhaliatoriaus vartojimą. Naudokite greitai veikiančią skubios

pagalbos inhaliatorių, kad padėtumėte kvėpuoti, ir nedelsdami praneškite savo gydytojui.

Šis vaistas gali paveikti normalią steroidinių hormonų gamybą organizme, ypač jei ilgą laiką vartojote dideles dozes. Poveikiai yra:

sulėtėjęs augimas vaikams ir jaunuoliams iki 18 metų

kaulų retėjimas

padidėjęs akispūdis (glaukoma)

svorio padidėjimas

mėnulio veidas (Kušingo sindromas).

Jūsų gydytojas reguliariai tikrins šiuos šalutinius poveikius ir užtikrins, kad vartotumėte mažiausią įmanomą šio vaisto dozę, kad kontroliuotumėte savo astmą.

elgesio pokyčiai, tokie kaip neįprastas aktyvumas ir dirglumas (šalutiniai poveikiai dažniausiai pasireiškia vaikams).

širdies ritmo sutrikimas (aritmija). Praneškite savo gydytojui, bet nenutraukite šio vaisto vartojimo, nebent gydytojas nurodytų.

grybelinė stemplės infekcija (ezofagitas), dėl kurios gali būti sunku ryti.

Nežinoma (negali būti nustatyta pagal turimus duomenis)  
depresija arba agresija. Šie šalutiniai poveikiai dažniau pasireiškia vaikams  
Neryškus matymas.

Pranešimas apie šalutinius poveikius

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taip pat taikoma galimiems šalutiniams poveikiams, kurie nėra paminėti šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite tiesiogiai pranešti apie šalutinius poveikius per Nyderlandų šalutinių poveikių centrą Lareb. Svetainė:

Transtoyou

www.lareb.nl. Pranešdami apie šalutinius poveikius galite padėti mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

## 5. Kaip laikyti šį vaistą?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Nenaudokite šio vaisto pasibaigus tinkamumo laikui. Jis nurodytas ant etiketės ir dėžutės po „Exp.:“. Nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data.

Laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Laikyti flakoną išorinėje pakuotėje, kad būtų apsaugotas nuo šviesos.

Flakonas yra su skysčiu po slėgiu.

Flakono neperdurkite, nelaužykite ir nedeginkite, net jei atrodo, kad jis tuščias.

Kaip ir dauguma inhaliacinių vaistų aerozolyje (kuris yra po slėgiu), vaisto terapinis poveikis gali sumažėti, kai flakonas yra šaltas.

Vaistų neišpilkite į kriauklę ar tualetą ir nemeskite į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebevartojate. Jie bus sunaikinti atsakingu būdu ir nepateks į aplinką.

## 6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

AirFluSal Aerozolis 25/125 mikrogramų, aerozolis, suspensija

Veikliosios medžiagos šiame vaistiniame preparate yra salmeterolis ir flutikazono propionatas. Kiekviena išmatuota šio vaisto dozė suteikia 25 mikrogramus salmeterolio (kaip salmeterolio ksinafoato) ir 125 mikrogramus flutikazono propionato.

Kita medžiaga šiame vaistiniame preparate yra norfluranas (HFA 134a) kaip propelentas.

AirFluSal Aerozolis 25/250 mikrogramų, aerozolis, suspensija

Veikliosios medžiagos šiame vaistiniame preparate yra salmeterolis ir flutikazono propionatas. Kiekviena išmatuota šio vaisto dozė suteikia 25 mikrogramus salmeterolio (kaip salmeterolio ksinafoato) ir 250 mikrogramus flutikazono propionato.

Kita šio vaisto medžiaga yra norfluranas (HFA 134a) kaip propelentas.

Šis vaistas turi fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Kiekvienas inhaliatorius turi 12,5 gramų HFA 134a. Tai atitinka 0,0179 tonų CO<sub>2</sub> (globalinio atšilimo potencialas GWP = 1430).

Kaip atrodo AirFluSal Aerozolis ir kiek jo yra pakuotėje?

Inhaliatorius susideda iš aliuminio purkštuko (plazma FCP padengtas aerozolis) su tinkamu dozavimo vožtuvu ir polipropileno laikikliu su dangteliu ir dozės indikatoriumi, supakuotu į kartoninę dėžutę.

Purkštukas turi baltą, homogenišką suspensiją.

Kiekvienas purkštukas turi 120 inhaliacijų.

Pakuotės dydis:  
1 inhaliatorius x 120 inhaliacijų.

Prekybos leidimo turėtojas ir gamintojas Leidimo turėtojas Sandoz B.V.  
Hospitaaldreef 29  
1315 RC Almere  
Nyderlandai

Gamintojas  
Salutas Pharma GmbH  
Otto-von-Guericke Allee 1  
39179 Barleben  
Vokietija

Lek Pharmaceuticals d.d.  
Verovškova ulica 57  
1526 Ljubljana  
Slovėnija

Įregistruota registre:  
AirFluSal Aėerosol 25/125 mikrogramų, aerozolis, suspensija: RVG 118836  
AirFluSal Aėerosol 25/250 mikrogramų, aerozolis, suspensija: RVG 118837

Šis vaistas yra registruotas EEE valstybėse narėse šiais pavadinimais:  
Nyderlandai AirFluSal Aėerosol 25/125 mikrogramų, aerozolis, suspensija  
AirFluSal Aėerosol 25/250 mikrogramų, aerozolis, suspensija

Ši pakuotės lapelė paskutinį kartą patvirtinta 2025 m. gegužę.