

Prospect: informații pentru utilizator

AirFluSal® Aerosol 25/125 micrograme, aerosol, suspensie

AirFluSal® Aerosol 25/250 micrograme, aerosol, suspensie

salmeterol (ca salmeterolxinafoat)/propionat de fluticazonă

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie să-l citiți din nou.

Aveți întrebări? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Nu dați acest medicament altor persoane, deoarece este prescris doar pentru dumneavoastră. Poate fi dăunător pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră.

Aveți reacții adverse menționate la punctul 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Conținutul acestui prospect:

1. Ce este AirFluSal Aerosol și pentru ce se utilizează?
2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau când trebuie să fiți deosebit de atent?
3. Cum se utilizează acest medicament?
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este AirFluSal Aerosol și pentru ce se utilizează acest medicament?

AirFluSal Aerosol conține două medicamente: salmeterol și propionat de fluticazonă:

Salmeterolul este un bronhodilatator cu acțiune îndelungată. Bronhodilatatoarele ajută căile respiratorii din plămâni să rămână deschise. Acest lucru face mai ușor să inhalați și să expirați aerul. Efectul durează cel puțin 12 ore.

Propionatul de fluticazonă este un corticosteroid care reduce umflarea și iritația din plămâni.

Acest medicament nu este recomandat pentru utilizare la copii.

Medicul v-a prescris acest medicament pentru a vă ajuta să preveniți problemele respiratorii, cum ar fi astmul. Trebuie să utilizați acest medicament zilnic conform indicațiilor medicului dumneavoastră. Acest lucru asigură o bună funcționare în reglarea astmului dumneavoastră.

Acest medicament ajută la prevenirea apariției senzației de sufocare și a dificultății de respirație. Totuși, nu trebuie utilizat pentru a ameliora un atac brusc de sufocare sau dificultate de respirație. Dacă se întâmplă acest lucru, trebuie să utilizați un inhalator de urgență cu acțiune rapidă, cum ar fi salbutamolul. Trebuie să aveți întotdeauna la dumneavoastră inhalatorul de urgență cu acțiune rapidă.

2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de atent?

Când nu trebuie să utilizați acest medicament?

Sunteți alergic la oricare dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6.

Când trebuie să fiți deosebit de atent cu acest medicament?

Contactați medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament dacă aveți una dintre următoarele afecțiuni:

- o boală de inimă, inclusiv un ritm cardiac neregulat sau rapid;
- o tiroidă hiperactivă;
- o tensiune arterială ridicată;
- diabet zaharat (acest medicament poate crește glicemia);
- un nivel scăzut de potasiu în sânge;
- tuberculoză (TBC), dacă aveți sau ați avut în trecut, sau alte infecții pulmonare.

Contactați medicul dumneavoastră dacă aveți vedere încețoșată sau alte tulburări vizuale.

Utilizați și alte medicamente?

Utilizați pe lângă AirFluSal Aerosol și alte medicamente, ați făcut acest lucru recent sau există posibilitatea să utilizați alte medicamente în viitorul apropiat? Spuneți-i medicului sau farmacistului dumneavoastră. Acest lucru este valabil și pentru medicamentele pentru astm și medicamentele pe care le puteți obține fără prescripție medicală. Acest lucru se datorează faptului că acest medicament poate să nu fie potrivit pentru a fi utilizat împreună cu unele alte medicamente.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați următoarele medicamente, înainte de a utiliza AirFluSal Aerosol:

- Beta-blocante (cum ar fi atenolol, propranolol și sotalol). Beta-blocantele sunt de obicei utilizate pentru tratamentul hipertensiunii arteriale sau altor afecțiuni cardiace.
- Medicamente pentru tratamentul infecțiilor, inclusiv unele medicamente pentru HIV (cum ar fi ritonavir, cobicistat, ketoconazol, itraconazol și eritromicină). Unele dintre aceste medicamente pot crește cantitatea de propionat de fluticazonă sau salmeterol în corpul dumneavoastră. Acest lucru poate crește riscul de efecte secundare cu AirFluSal Aerosol, inclusiv un ritm cardiac neregulat, sau poate agrava efectele secundare. Este posibil ca medicul dumneavoastră să dorească să vă monitorizeze cu atenție dacă utilizați aceste medicamente.
- Corticosteroidi (administrați pe cale orală sau prin injecție). Dacă ați utilizat recent aceste medicamente, acest medicament poate crește riscul de afectare a glandelor suprarenale.
- Diuretice, cunoscute și sub numele de pastile de apă, care sunt utilizate pentru tratamentul hipertensiunii arteriale.
- Alți bronhodilatatori (cum ar fi salbutamol).
- Medicamente xantine. Acestea sunt adesea utilizate pentru a trata astmul.

Sarcina și alăptarea

Sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă, doriți să rămâneți gravidă sau alăptați? Contactați medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament.

Capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Este puțin probabil ca acest medicament să afecteze capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum se utilizează acest medicament?

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul dumneavoastră. Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Utilizați acest medicament în fiecare zi până când medicul dumneavoastră vă sfătuiește să opriți. Nu utilizați mai mult decât doza recomandată. În caz de îndoială, contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Nu trebuie să opriți sau să reduceți utilizarea acestui medicament fără a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră.

Acest medicament trebuie inhalat pe cale orală în plămâni.

Doza recomandată este: Adulți

AirFluSal Aerosol 25/125: două pufuri de două ori pe zi

AirFluSal Aerosol 25/250: două pufuri de două ori pe zi

Dacă utilizați acest medicament de două ori pe zi, simptomele dumneavoastră pot fi bine controlate. Dacă acesta este cazul, medicul dumneavoastră poate decide să vă reducă doza la o dată pe zi. Doza poate fi schimbată în:

- o dată înainte de culcare – pentru simptome nocturne
- o dată dimineața – pentru simptome diurne

Este foarte important să urmați instrucțiunile medicului dumneavoastră cu privire la numărul de pufuri pe care trebuie să le administrați și cât de des trebuie să utilizați medicamentul.

Dacă utilizați acest medicament pentru astm, medicul dumneavoastră va dori să vă monitorizeze regulat simptomele.

Dacă astmul sau respirația dumneavoastră se înrăutățește, spuneți-i imediat medicului dumneavoastră. De exemplu, puteți observa că respirați mai greu, că aveți mai des senzația de strângere în piept sau că trebuie să utilizați mai mult din medicația de urgență cu acțiune rapidă. Dacă apare oricare dintre simptomele descrise mai sus, trebuie să continuați să utilizați acest medicament, dar să nu creșteți numărul de pufuri. Afecțiunea dumneavoastră poate deveni mai gravă și puteți deveni grav bolnav. Mergeți la medicul dumneavoastră deoarece este posibil să aveți nevoie de tratament suplimentar.

Utilizare la copii

Acest medicament nu este recomandat pentru utilizare la copii.

Instrucțiuni de utilizare

Medicul sau farmacistul dumneavoastră trebuie să vă ofere instrucțiuni despre utilizarea corectă a inhalatorului. Ei trebuie să verifice regulat cum utilizați inhalatorul. Dacă nu utilizați inhalatorul acestui medicament corect sau conform prescripției, acest lucru poate însemna că nu vă ajută astmul așa cum ar trebui.

Medicamentul se află într-un recipient metalic sub presiune, plasat într-un suport de plastic cu piesă bucală.

Inhalatorul are un indicator pe partea din față care vă arată câte doze mai sunt disponibile.

Când utilizați inhalatorul, indicatorul de doză scade de obicei un număr după fiecare 5 până la 7 pufuri. Indicatorul de doză arată câte pufuri mai sunt aproximativ în inhalator.

Nu scăpați inhalatorul, deoarece indicatorul poate număra înapoi.

Testarea inhalatorului dumneavoastră

1. Dacă utilizați inhalatorul pentru prima dată, testați dacă funcționează. Îndepărtați capacul de protecție al piesei bucale prin apăsarea ușoară a părților laterale cu degetul mare și arătătorul și trăgând capacul.
2. Pentru a vă asigura că funcționează, agitați bine inhalatorul, îndreptați piesa bucală departe de dumneavoastră și apăsați recipientul; pulverizați 4 pufuri în aer în timp ce agitați inhalatorul de fiecare dată înainte de a pulveriza un puf în aer. Indicatorul de doză arată numărul 120, acesta este numărul de pufuri din inhalator. Dacă nu ați mai utilizat inhalatorul timp de o săptămână sau mai mult, pulverizați două pufuri de medicament în aer.

Utilizarea inhalatorului dumneavoastră

Înainte de a folosi inhalatorul, este important să începeți să respirați cât mai lent posibil.

1. Stați în picioare sau așezați-vă drept atunci când folosiți inhalatorul.
2. Îndepărtați capacul de pe piesa bucală (așa cum este descris în pasul 1 din: „Testarea inhalatorului dumneavoastră”). Verificați interiorul și exteriorul piesei bucale pentru a vă asigura că este curată și că nu sunt obiecte libere atașate./
3. Agitați inhalatorul de 4 sau 5 ori pentru a vă asigura că eventualele obiecte libere sunt îndepărtate și că conținutul este amestecat uniform..
4. Țineți inhalatorul în poziție verticală, cu degetul mare la bază, în spatele piesei bucale. Expirați bine cât de mult puteți.
5. Introduceți piesa bucală în gură între dinți. Închideți buzele în jurul ei. Nu mușcați..
6. Țineți-vă respirația, scoateți inhalatorul din gură și luați degetul de pe partea superioară a inhalatorului. Țineți-vă respirația câteva secunde sau cât timp puteți fără prea mult efort.
7. Așteptați aproximativ o jumătate de minut între administrarea fiecărei doze de medicament și apoi repetați pașii 3 până la 7.
8. Clătiți-vă gura cu apă și scuipați și/sau spălați-vă pe dinți. Acest lucru poate ajuta la prevenirea apariției candidozei (infecție fungică în gură) și a răgușelii.

9. Puneți întotdeauna capacul de protecție înapoi peste piesa bucală după utilizare, pentru a o menține fără praf. Dacă capacul piesei bucale este plasat corect, va face clic la loc. Dacă capacul nu face clic la loc, întoarceți-l invers și încercați din nou. Nu folosiți prea multă forță.
10. Nu trebuie să vă grăbiți cu pașii 4, 5, 6 și 7. Este important să inhalați cât mai lent posibil chiar înainte de utilizarea inhalatorului. Primele câteva ori când folosiți inhalatorul, ar trebui să faceți acest lucru în fața unei oglinzi. Dacă vedeți „ceată” apărând în partea superioară a inhalatorului sau pe părțile laterale ale gurii, trebuie să începeți din nou de la pasul 3.

Dacă aveți dificultăți în utilizarea inhalatorului, medicul dumneavoastră sau un alt profesionist din domeniul sănătății vă poate recomanda să folosiți o cameră de inhalare, cum ar fi Volumatic

Dacă găsiți dificil de utilizat inhalatorul, medicul dumneavoastră sau un alt furnizor de servicii medicale vă poate recomanda să utilizați o cameră de expansiune, cum ar fi Volumatic® sau AeroChamber Plus® în combinație cu inhalatorul dumneavoastră. Medicul, farmacistul sau un alt furnizor de servicii medicale ar trebui să vă demonstreze cum să utilizați camera de expansiune cu inhalatorul dumneavoastră, cum să întrețineți camera de expansiune și să răspundă la întrebările pe care le puteți avea. Este important ca, atunci când utilizați o cameră de expansiune împreună cu inhalatorul dumneavoastră, să nu opriți sau să reduceți utilizarea acestuia fără a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră. De asemenea, este important să nu schimbați tipul de cameră de expansiune pe care o utilizați fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă opriți utilizarea camerei de expansiune sau schimbați tipul de cameră de expansiune pe care o utilizați, medicul dumneavoastră poate fi nevoit să ajusteze doza de medicament necesară pentru a vă menține astmul sub control.

Discutați întotdeauna cu medicul dumneavoastră înainte de a face orice modificare în tratamentul dumneavoastră pentru astm.

Persoanele cu mâini slabe pot găsi mai ușor să țină inhalatorul cu ambele mâini. Plasați cele două degete arătătoare deasupra inhalatorului și ambele degete mari sub acesta, în spatele piesei bucale.

Trebuie să vă amintiți să înlocuiți inhalatorul de îndată ce indicatorul de doză arată numărul 40 și culoarea indicatorului de doză se schimbă de la verde la roșu. Opriți utilizarea inhalatorului dacă indicatorul de doză arată 0, deoarece pufurile rămase în recipientul cu aerosoli pot să nu fie suficiente pentru o doză completă. Nu încercați niciodată să schimbați cifrele de pe indicatorul de doză sau să detașați indicatorul de doză de recipientul cu aerosoli. Poziția contorului nu poate fi schimbată și contorul este atașat permanent de recipientul cu aerosoli.

Curățarea inhalatorului dumneavoastră

Pentru a preveni blocarea inhalatorului, este important să îl curățați cel puțin o dată pe săptămână.

Pentru a curăța inhalatorul dumneavoastră:

- îndepărtați capacul de protecție al piesei bucale
- nu scoateți niciodată recipientul metalic din suportul de plastic

curățați interiorul și exteriorul piesei bucale și suportul de plastic cu o cârpă uscată sau un șervețel
puneți capacul de protecție peste piesa bucală la loc. Acesta va face clic dacă este plasat corect. Dacă nu face clic, întoarceți capacul invers și încercați din nou. Nu folosiți prea multă forță.

Nu puneți recipientul metalic în apă.

Ați utilizat prea mult din acest medicament?

Este important să utilizați inhalatorul conform instrucțiunilor. Dacă inhalați accidental o doză mai mare decât cea recomandată, spuneți medicului sau farmacistului dumneavoastră. Puteți observa că aveți o frecvență cardiacă mai rapidă decât de obicei și că vă simțiți tremurând. De asemenea, puteți avea amețeli, dureri de cap, slăbiciune musculară și dureri articulare.

Dacă ați utilizat doze mai mari pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să cereți sfatul medicului sau farmacistului dumneavoastră. Dozele mai mari din acest medicament pot reduce cantitatea de hormoni steroizi produși de glandele suprarenale.

Ați uitat să utilizați acest medicament?

Nu luați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată. Luați pur și simplu următoarea doză la ora obișnuită.

Dacă încetați să utilizați acest medicament

Este foarte important să utilizați acest medicament în fiecare zi conform instrucțiunilor. Continuați să faceți acest lucru până când medicul dumneavoastră vă spune să opriți. Nu opriți brusc și nu reduceți brusc doza acestui medicament. Acest lucru poate face ca problema dumneavoastră respiratorie să se agraveze.

În plus, oprirea bruscă a utilizării acestui medicament sau reducerea dozei acestuia (în cazuri foarte rare) poate provoca probleme cu glandele suprarenale (insuficiență suprarenală). Acest lucru poate duce uneori la apariția unor efecte secundare. Aceste efecte secundare pot include:

- dureri de stomac
- oboseală și pierderea apetitului, senzație de rău
- greață și diaree
- pierderea în greutate
- dureri de cap sau senzație de somnolență
- niveluri scăzute de zahăr în sânge
- tensiune arterială scăzută și convulsii incontrolabile ale corpului, adesea ca parte a unei crize epileptice (convulsie).

Când corpul dumneavoastră este sub stres, cum ar fi în caz de febră, traumă (cum ar fi un accident de mașină), infecție sau intervenție chirurgicală, insuficiența suprarenală se poate agrava și este posibil să aveți una dintre efectele secundare menționate mai sus. Dacă aveți efecte secundare, contactați medicul sau farmacistul. Pentru a preveni apariția acestor simptome, medicul dumneavoastră poate prescrie corticosteroizi suplimentari sub formă de tablete (cum ar fi prednisolon).

Aveți alte întrebări despre utilizarea acestui medicament? Contactați medicul sau farmacistul.

4. Posibile efecte secundare

Ca orice medicament, și acest medicament poate avea efecte secundare, deși nu toată lumea le experimentează. Pentru a reduce cât mai mult posibil riscul de efecte secundare, medicul dumneavoastră va prescrie cea mai mică doză posibilă a acestui medicament pentru a vă controla astmul.

Reacții alergice: este posibil să observați că respirația dumneavoastră se înrăutățește brusc imediat după utilizarea acestui medicament. Puteți avea dificultăți mari de respirație șuierătoare și tuse sau să rămâneți fără suflare. De asemenea, puteți avea mâncărimi, erupții cutanate (urticarie) și umflături (de obicei ale feței, buzelor, limbii sau gâtului) sau puteți simți brusc că inima vă bate foarte repede sau vă simțiți slăbit sau amețit (acest lucru poate duce la leșin sau pierderea cunoștinței). Dacă aveți oricare dintre aceste efecte secundare sau dacă apar brusc după utilizarea acestui medicament, opriți utilizarea și informați imediat medicul dumneavoastră. Reacțiile alergice apar uneori la acest medicament (la mai puțin de 1 din 100 de utilizatori).

Alte efecte secundare sunt enumerate mai jos.

Foarte frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 utilizatori)

dureri de cap – acestea se ameliorează de obicei pe parcursul tratamentului
o creștere a numărului de răceli a fost raportată la pacienții cu BPOC.

Frecvent (apare la mai puțin de 1 din 10 utilizatori)

candidoză (zone dureroase, de culoare crem, îngroșate) în gură și gât. De asemenea, o limbă dureroasă, voce răgușită și iritație a gâtului. Poate ajuta să clătiți gura cu apă imediat după fiecare doză de medicament și să scuipați imediat după aceea și/sau să vă spălați pe dinți. Medicul dumneavoastră poate prescrie un antifungic pentru a trata candidoza
articulații dureroase, umflate și dureri musculare
crampe musculare.

Următoarele reacții adverse au fost raportate și la pacienții cu boală pulmonară cronică cu îngustare persistentă a căilor respiratorii, ceea ce face respirația mai dificilă (BPOC):

pneumonie (inflamație pulmonară). Informați medicul dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome în timpul utilizării acestui medicament – acestea pot fi simptome ale unei pneumonii:

creșterea producției de mucus
schimbarea culorii mucusului
febră
frisoane
tuse mai frecventă
dificultăți respiratorii crescute

vânătași și fracturi osoase

inflamația sinusurilor nazale (senzație de tensiune sau plenitudine în nas, obraji și în spatele ochilor, uneori cu o durere pulsatilă)

o cantitate mai mică de potasiu în sânge (puteți avea un ritm cardiac neregulat, slăbiciune musculară, crampe).

Uneori (apare la mai puțin de 1 din 100 utilizatori)

cantitate crescută de zahăr (glucoză) în sângele dumneavoastră (hiperglicemie). Dacă aveți diabet zaharat, poate fi necesar să vă verificați mai des nivelul glicemiei și poate fi necesar să vă ajustați medicația obișnuită pentru diabet
opacifierea cristalinului (cataractă)
ritm cardiac accelerat (tahicardie)
tremur involuntar (tremor) și un ritm cardiac rapid sau neregulat (palpitații). Aceste reacții adverse sunt de obicei inofensive și se reduc pe parcursul tratamentului
durere în piept
senzație de neliniște (acest lucru apare de obicei la copii)
tulburări de somn
erupție cutanată alergică (erupție).

Rare (apar la mai puțin de 1 din 1.000 de utilizatori)

dificultăți de respirație sau respirație șuierătoare care se agravează după utilizarea acestui medicament. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți utilizarea inhalatorului cu acest medicament. Folosiți inhalatorul de urgență cu acțiune rapidă pentru a vă ajuta respirația și informați imediat medicul dumneavoastră.

acest medicament poate afecta producția normală de hormoni steroizi în organism, mai ales când ați utilizat doze mari pentru o perioadă lungă de timp. Efectele sunt:

- creștere întârziată la copii și adolescenți până la 18 ani
- subțierea oaselor
- presiune intraoculară crescută (glaucom)
- creștere în greutate
- față rotundă (sindromul Cushing).

Medicul dumneavoastră vă va monitoriza regulat pentru aceste reacții adverse și se va asigura că utilizați cea mai mică doză posibilă din acest medicament pentru a vă controla astmul.

schimbări de comportament, cum ar fi activitate neobișnuită și iritabilitate (aceste reacții adverse apar de obicei la copii).

tulburare de ritm cardiac (aritmie). Informați medicul dumneavoastră, dar nu opriți utilizarea acestui medicament decât dacă medicul dumneavoastră vă spune să o faceți.

o infecție fungică a esofagului, care poate cauza dificultăți la înghițire.

Necunoscut (nu poate fi determinat cu datele disponibile)

depresie sau agresivitate. Aceste reacții adverse apar mai frecvent la copii

Vedere încețoșată.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți reacții adverse, contactați medicul sau farmacistul. Acest lucru se aplică și pentru posibilele reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin Centrul Olandez de Raportare a Reacțiilor Adverse Lareb. Website:

www.lareb.nl. Raportând reacțiile adverse, ne puteți ajuta să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează acest medicament?

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă și pe cutie după „Exp.:”. Aceasta include o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Păstrați recipientul în ambalajul exterior pentru a-l proteja de lumină.

Recipientul conține un lichid sub presiune.

Nu perforați, nu rupeți și nu ardeți recipientul, chiar dacă pare gol.

Ca și în cazul majorității medicamentelor inhalatorii sub formă de aerosol (care sunt sub presiune), efectul terapeutic al medicamentului poate scădea atunci când recipientul este rece. Nu aruncați medicamentele pe chiuvetă sau în toaletă și nu le aruncați la gunoi. Întrebați farmacistul ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai folosiți. Acestea vor fi distruse în mod responsabil și nu vor ajunge în mediu.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce substanțe conține acest medicament?

AirFluSal Aerosol 25/125 micrograme, aerosol, suspensie

Substanțele active din acest medicament sunt salmeterol și propionat de fluticazonă.

Fiecare doză măsurată din acest medicament eliberează 25 micrograme de salmeterol (ca salmeterolxinafoat) și 125 micrograme de propionat de fluticazonă.

Cealaltă substanță din acest medicament este norfluran (HFA 134a) ca gaz propulsor.

AirFluSal Aerosol 25/250 micrograme, aerosol, suspensie

Substanțele active din acest medicament sunt salmeterol și propionat de fluticazonă.

Fiecare doză măsurată din acest medicament eliberează 25 micrograme de salmeterol (ca salmeterolxinafoat) și 250 micrograme de propionat de fluticazonă.

Cealaltă substanță din acest medicament este norfluran (HFA 134a) ca propulsor.

Acest medicament conține gaze cu efect de seră fluorurate.

Fiecare inhalator conține 12.5 grame HFA 134a. Acest lucru corespunde cu 0.0179 tone CO₂ (potențial de încălzire globală GWP = 1430).

Cum arată AirFluSal Aerosol și ce conține un ambalaj?

Inhalatorul constă dintr-un recipient de aluminiu (aerosol acoperit cu plasmă FCP) cu o valvă de dozare adecvată și un suport cu capac din polipropilenă cu indicator de doză ambalat într-o cutie de carton.

Recipientul conține o suspensie albă, omogenă.

Fiecare recipient conține 120 de inhalări.

Mărimea ambalajului:
1 inhalator x 120 inhalări.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producător Deținătorul autorizației Sandoz B.V.
Hospitaaldreef 29
1315 RC Almere
Olanda

Producător
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke Allee 1
39179 Barleben
Germania

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova ulica 57
1526 Ljubljana
Slovenia

Înregistrat în registru sub:
AirFluSal Aërosol 25/125 microgram, aerosol, suspensie: RVG 118836
AirFluSal Aërosol 25/250 microgram, aerosol, suspensie: RVG 118837

Acest medicament este înregistrat în statele membre ale SEE sub următoarele denumiri:
Olanda AirFluSal Aërosol 25/125 microgram, aerosol, suspensie
AirFluSal Aërosol 25/250 microgram, aerosol, suspensie

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în mai 2025.