

KASUTUSJUHEND: TEAVE KASUTAJALE

FUCIDIN 2%, salv (Naatriumfusidaat 20 mg/g),
FUCIDIN 2%, kreem (Fusidiinhape (veevaba) 20 mg/g),
FUCIDIN intertulle 2%, immutatud sidemega marli (Naatriumfusidaat 20 mg/g)

Lugege kogu pakendi infoleht hoolikalt läbi, sest see sisaldab teile olulist teavet. See ravim on saadaval ilma retseptita. Parima ravitulemuse saavutamiseks tuleb FUCIDINI siiski kasutada vastavalt juhistele.

Hoidke pakendi infoleht alles. Võib-olla soovite seda hiljem uuesti lugeda.

Küsige oma apteekrilt, kui vajate lisateavet või nõu.

Kui teie sümptomid halvenevad, peate kindlasti arsti külastama

Kui mõni loetletud kõrvaltoimetest teid oluliselt häirib või märkate kõrvaltoimeid, mida selles kasutusjuhendis ei ole mainitud, teavitage palun oma arsti või apteekrit.

See pakendi infoleht sisaldab:

1. Mis on FUCIDIN ja milleks seda kasutatakse?
2. Mida peate teadma enne FUCIDINI kasutamist?
3. Kuidas FUCIDINI kasutada?
4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?
5. Kuidas FUCIDINI säilitada?
6. Lisateave

1. MIS ON FUCIDIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE?

Antibiootikum paikseks kasutamiseks nahal.

FUCIDIN 2%, salv ja FUCIDIN 2%, kreem kasutatakse järgmistel juhtudel:

- Nakkused nahal, mis on tundlikud antibiootikumi suhtes, mida preparaat sisaldab, näiteks:

Impetiigo

parasiitide põhjustatud nahavigastuste sekundaarsed infektsioonid

Furunklid ja ulatuslik impetiigo (täiendava ravina suukaudse antibiootikumiga)

Furunklid ja furunkuloos

Panaritium (sõrme või varba põletik)

Karvanääpsu infektsioon

pindmised nahahaavandid

- Infektsioonide ennetamine: kirurgias nahatrauma korral, näiteks põletuste või haavade puhul
- Bakterite eemaldamine ninaõõntest tervetel kandjatel, eriti kui nad puutuvad kokku toiduainete või nakkusohtlike patsientidega.

FUCIDIN 2%, kreemi kasutatakse eriti mädaste, niiskete haavade korral ka nahavoltides; kreem on näole esteetiliselt sobivam kui FUCIDIN 2%, salv.

FUCIDIN Intertulle 2%, immutatud sidemega marli:

Kasutatakse pindmiste nakatunud haavade ja pindmiste nahainfektsioonide, pindmiste nahavigastuste korral haavade või põletuste tõttu või pindmiste kirurgiliste sekkumiste, pindmiste ja sügavate põletuste korral.

2. MIDA PEATE TEADMA ENNE FUCIDINI KASUTAMIST?

Fucidini ei tohi kasutada

Kui olete ülitundlik (allergiline) fusidiinhappe või Fucidini koostisosade suhtes. Kui teil on rinnainfektsioon ja te toidate rinnaga. On oht, et toode imendub imiku organismi.

Ärge kasutage Fucidini märgadel, mädanevatel haavadel, nahavoltides või avatud jalgadel.

Fucidini kasutamisel on vajalik eriline ettevaatus.

Kui kasutate Fucidini pikka aega. Ravi kestus peab olema piiratud ajaga, mis on vajalik vigastuse paranemiseks, et vähendada resistentsuse riski.

Kui kasutate Fucidini imikul. Ärge kandke seda suurele nahapinnale, kuna üldiste toksiliste efektide (kollatõbi) võimalust ei saa täielikult välistada.

Kui kasutate Fucidini silmade lähedal. Aluseline ravimvorm võib põhjustada põletustunnet ja silmade ärritust. Ärge kandke silma ega silmalaugude siseküljele; juhusliku silma sattumise korral loputage rohke veega.

Fucidin intertulle ei tohiks kasutada raskelt vigastatud nahal, kuna immutatud sidemega marli ei ole steriilne.

Fusidiinhappe kasutamisel on teatatud bakteriaalse resistentsuse tekkimisest. Nagu kõigi antibiootikumide puhul, võib pikaajaline või korduv kasutamine suurendada resistentsuse tekkimise riski.

Pöörduge oma arsti poole, kui mõni ülaltoodud hoiatus kehtib teie kohta või on varem kehtinud.

Fucidini kasutamisel koos teiste ravimitega ei ole teada koostoimeid.

Vajadusel võib koos FUCIDIN 2% salvi, FUCIDIN 2% kreemi või FUCIDIN intertulle 2% immutatud sidemega kasutada teisi infektsioonivastaseid ravimeid üldise manustamise teel.

Fucidini kasutamisel koos toidu ja jookidega

Ei ole kohaldatav.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Inimeste kohta on teada ainult ebapiisavad andmed FUCIDIN 2% salvi, FUCIDIN 2% kreemi ja FUCIDIN intertulle 2% immutatud sideme ohutuse kohta raseduse ajal. Kuigi Fucidini kasutamisel raseduse ajal ei ole kunagi teatatud kahjulikest tagajärgedest, tuleb siiski olla ettevaatlik raseduse esimese kolme kuu jooksul. Suurte nahapindadele kandmist tuleb vältida. Küsige nõu oma arstilt või apteekrilt enne ravimi võtmist.

Imetamine

Imetamise ajal tuleb Fucidini vältida.

Küsi nõu oma arstilt või apteekrilt enne ravimi võtmist.

Autojuhtimine ja masinate käsitlemine

Fusiidhappel ei ole või on ebaoluline mõju autojuhtimisele ja masinate käsitlemise võimele.

Olulised andmed Fucidini teatud muude koostisosade kohta

FUCIDIN 2% salv ja FUCIDIN Intertulle 2% immutatud sidemegaas sisaldavad tsetüülalkoholi ja villarasva, mis võivad kohapeal põhjustada nahärritust (nt kontaktdermatiit).

FUCIDIN 2% salv ja FUCIDIN Intertulle 2% immutatud sidemegaas sisaldavad butüülhüdrosütolueeni (E321), mis võivad kohapeal põhjustada nahärritust (nt kontaktdermatiit), silmade ja limaskestade ärritust.

FUCIDIN 2% kreem sisaldab tsetüülalkoholi ja kaaliumsorbaati, mis võivad kohapeal põhjustada nahärritust (nt kontaktdermatiit).

FUCIDIN 2% kreem sisaldab butüülhüdrosüanisooli (E320), mis võivad kohapeal põhjustada nahärritust (nt kontaktdermatiit), silmade ja limaskestade ärritust.

3. KUIDAS FUCIDINI KASUTADA?

Kasutage Fucidini alati täpselt arsti juhiste järgi. Palun küsige oma arstilt või apteekrilt, kui te pole milleski kindel.

FUCIDIN 2%, salv, FUCIDIN 2%, kreem: Kandke üks kuni kaks korda päevas puhastatud nakatunud alale; salvi võib kasutada koos sidemega või ilma.

FUCIDIN INTERTULLE 2%, immutatud sidemegaas: Katke nakatunud nahapiirkonnad. Mädate haavade korral tuleb sidet tavaliselt vahetada iga 24 tunni järel. Muudel juhtudel võib side jääda kauemaks.

Kui olete kasutanud suuremat kogust Fucidini, kui peaksite

Kui olete kasutanud või võtnud liiga palju Fucidini, peaksite kohe pöörduma oma arsti, apteekri või mürgistuskeskuse poole (070/245 245).

Kuigi liiga sagedase või rohke kasutamise korral, eriti suurtele nahapindadele, on teoreetiline võimalus üldiste kõrvaltoimete (nt kollatõbi) tekkeks, ei ole seni kirjeldatud ühtegi üleannustamise juhtumit.

Kui olete unustanud Fucidini kasutada

Järgmise võimaluse korral peate kandma tavalise koguse Fucidini. Te ei pea kandma kahekordset kogust.

Kui lõpetate Fucidini kasutamise

Pärast ravi lõpetamist võib nahahaigus uuesti ilmned.

4. MILLISED KÕRVALTOIMED ON VÕIMALIKUD?

Nagu kõik ravimid, võib ka FUCIDIN põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Palun teavitage oma arsti või apteekrit, kui mõni loetletud kõrvaltoimetest teid oluliselt häirib või kui märkate kõrvaltoimeid, mida selles pakendi infolehes ei ole nimetatud.

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on nahareaktsioonid ja eriti reaktsioonid manustamiskohas. On teatatud allergilistest reaktsioonidest.

Nagu kõigi antibiootikumide puhul, on ka siin oht sekundaarseteks infektsioonideks mittetundlike mikroobide poolt. Pärast FUCIDIN intertulle 2%, immutatud sidemega kasutamist võib nahk olla tundlikum, ilma et ravi lõpetamine oleks vajalik.

Immuunsüsteemi häired

Ülitundlikkusreaktsioon

Naha ja nahaaluskoe haigused

Sügelus

Nahaärritus

Põletustunne nahal

Kipitus nahal

Kuiv nahk

Lööve

Kontaktdermatiit

Ekseem

Naha punetus (erüteem)

Nõgestõbi (urtikaaria)

Sügelev turse nahal ja/või limaskestadel (angioödeem) Turse silma ümber

5. KUIDAS FUCIDINI SÄILITADA?

Ravimeid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis, mitte säilitada üle 25°C.

Te ei tohi ravimit kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimit ei tohi visata kanalisatsiooni ega olmeprügi hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas ravimit hävitada, kui te seda enam ei vaja. See meede aitab kaitsta keskkonda.

6. LISAINFORMATSIOON

Mida Fucidin sisaldab

Toimeained on:

FUCIDIN salv 2%: Naatriumfusidaat 20 mg/g

FUCIDIN kreem 2%: Fusidiinhape (veevaba) 20 mg/g

FUCIDIN INTERTULLE 2%, immutatud sidemegaas: Naatriumfusidaat 20 mg/g

Muud koostisosad on:

FUCIDIN 2%, salv / FUCIDIN intertulle 2%, immutatud sidemegaas:
Tsetüülalkohol - villavaha – vedel parafiin – vaseliin - All-rac-alfa-tokoferool -
butüülhüdrosütolueen (E321)

FUCIDIN 2%, KREEM:

Butüülhüdrosüanisool (E320) - tsetüülalkohol - glütserool – vedel parafiin - kaaliumsorbaat -
polüsorbaat 60 – valge vaseliin – All-rac-alfa-tokoferool - vesinikkloriidhape - steriilne vesi.

Kuidas Fucidin välja näeb ja pakendi sisu

FUCIDIN 2%, SALV: Nahasalv tuubides 15 g ja 30 g.

FUCIDIN 2%, KREEM: Nahakreem tuubides 15 g ja 30 g.

FUCIDIN INTERTULLE 2%, immutatud sidemegaas: Kompresse suurusega 10 x 10 cm ja 10 x
30 cm, immutatud 1,5 g FUCIDIN salviga (dm² kohta), eraldi pakitud.

Ravimi müügiloo hoidja ja tootja:

Registreerimise omanik

LEO Pharma N.V./S.A.

Duwijckstraat 17

B-2500 Lier

Tel.: +32 (0)3 7407868

Faks: +32 (0)3 740 78 69

E-post: leo-pharma.be@leo-pharma.com

Tootja:

Fucidin kreem ja Fucidin salv:

LEO laboratories Ltd

285 Cashel Road

Dublin 12 (Iirimaa)

FUCIDIN intertulle 2%, immutatud sidemegaas:

LEO Pharmaceutical Products

Industriparken 55

2750 Ballerup (Taani)

Registreerimisnumbrid:

Fucidin 2% salv: BE014682

Fucidin 2% kreem: BE146465

FUCIDIN intertulle 2%, immutatud sidemegaas: BE013641

Apteegis väljastatav.

Seda kasutusjuhendit kinnitati viimati 06/2011.