

VARTOJIMO INSTRUKCIJA: INFORMACIJA VARTOTOJUI

FUCIDIN 2%, tepalas (Natrio fusidatas 20 mg/g),
FUCIDIN 2%, kremas (Fusidino rūgštis (bevandenė) 20 mg/g),
FUCIDIN intertulle 2%, impregnuota tvarsliaiva (Natrio fusidatas 20 mg/g)

Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį, nes jame pateikiama svarbi informacija Jums. Šis vaistas parduodamas be recepto. Norint pasiekti geriausią gydymo rezultatą, FUCIDIN turi būti vartojamas pagal nurodymus.

Išsaugokite pakuotės lapelį. Galbūt norėsite jį perskaityti dar kartą vėliau. Kreipkitės į savo vaistininką, jei Jums reikia daugiau informacijos ar patarimo. Jei Jūsų simptomai pablogėja, būtinai turite kreiptis į gydytoją apsilankyti. Jei kuri nors iš išvardytų šalutinių reakcijų Jus stipriai veikia arba pastebite šalutinių reakcijų, kurios nėra nurodytos šiame pakuotės lapelyje, informuokite savo gydytoją arba vaistininką.

Šis pakuotės lapelis apima:

1. Kas yra FUCIDIN ir kam jis vartojamas?
2. Ką turite žinoti prieš vartodami FUCIDIN?
3. Kaip vartoti FUCIDIN?
4. Kokios galimos šalutinės reakcijos?
5. Kaip laikyti FUCIDIN?
6. Papildoma informacija

1. KAS YRA FUCIDIN IR KAM JIS NAUDOJAMAS?

Antibiotikas vietiniam naudojimui ant odos.

FUCIDIN 2%, tepalas ir FUCIDIN 2%, kremas naudojami šiais atvejais:

- Odos infekcijos, kurias sukelia bakterijos, jautrios antibiotikui, esančiam preparate, pavyzdžiui:
 - Impetiga
 - antrinės odos sužalojimų infekcijos, kurias sukelia parazitai
 - Furunkulai ir plačiai paplitusi impetiga (kaip papildomas gydymas antibiotikais per bendrą kelią)
 - Furunkulai ir furunkuliozė
 - Panaritium (piršto ar kojos piršto uždegimas)
 - Plaukų šaknų infekcija
 - paviršinės odos opos
- Infekcijų prevencija: chirurgijoje esant odos traumoms, pavyzdžiui, nudegimams ar žaizdoms
- Bakterijų pašalinimas iš nosies ertmių sveikų nešiotojų, ypač jei jie kontaktuoja su maistu ar pacientais, turinčiais infekcijos riziką.

FUCIDIN 2%, kremas ypač naudojamas pūliuojančioms, šlapiuojančioms žaizdoms taip pat ir odos raukšlėse; kremas estetiškai labiau tinka veido naudojimui nei FUCIDIN 2%, tepalas.

FUCIDIN Intertulle 2%, impregnuota tvarsčio marlė:

Naudojama paviršinėms infekcijoms žaizdoms ir paviršinėms odos infekcijoms, paviršinėms odos traumoms dėl sužalojimų ar nudegimų arba paviršinėms chirurginėms intervencijoms, paviršinėms ir gilioms nudegimams.

2. KĄ TURITE ŽINOTI PRIEŠ NAUDOJANT FUCIDIN?

Fucidin negalima naudoti

Jei esate padidėjęs jautrumas (alergiškas) fusidino rūgščiai arba bet kuriai Fucidin sudedamajai daliai.

Jei turite krūties infekciją ir maitinate krūtimi. Yra pavojus, kad produktas gali būti absorbuotas kūdikiui.

Nenaudokite Fucidin ant šlapių, pūliuojančių žaizdų, odos raukšlėse ar ant atvirų kojų.

Ypatingas atsargumas reikalingas naudojant Fucidin

Jei ilgai naudojate Fucidin. Gydymo trukmė turi būti ribojama iki laikotarpio, reikalingo žaizdos gijimui, siekiant sumažinti atsparumo riziką.

Jei tepate Fucidin kūdikiui. Netepkite ant didelio odos ploto, nes negalima visiškai atmesti bendrų toksinių efektų (gelta) galimybes.

Jei tepate Fucidin šalia akių. Bazinė vaisto forma gali sukelti deginimo pojūtį ir akių dirginimą. Netepkite akyse ir vidinėje vokų pusėje; atsitiktinai patekus į akis, gausiai praplaukite vandeniu.

Fucidin intertulle neturėtų būti naudojamas ant stipriai pažeistos odos dėl impregnuotos tvarsčio marlės nesterilumo.

Naudojant fusidino rūgštį buvo pranešta apie bakterinio atsparumo atsiradimą. Kaip ir su visais antibiotikais, ilgalaikis ar pakartotinis naudojimas gali padidinti atsparumo atsiradimo riziką. Kreipkitės į savo gydytoją, jei kuri nors iš aukščiau paminėtų įspėjimų jums tinka arba buvo tinkama praeityje.

Naudojant Fucidin su kitais vaistais nėra žinomų sąveikų.

Jei reikia, kartu su FUCIDIN 2%, tepalu, FUCIDIN 2%, kremu arba FUCIDIN intertulle 2%, impregnuota tvarsčio marle, gali būti naudojami kiti vaistai nuo infekcijos per bendrą kelią.

Naudojant Fucidin kartu su maistu ir gėrimais

Netinka.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Yra tik nepakankamai duomenų apie FUCIDIN 2%, tepalo, FUCIDIN 2%, kremu ir FUCIDIN intertulle 2%, impregnuotos tvarsčio marlės saugumą nėštumo metu žmonėms. Nors niekada nebuvo pranešta apie neigiamas pasekmes naudojant Fucidin nėštumo metu, pirmuosius tris nėštumo mėnesius reikia būti atsargiems. Reikia vengti naudojimo ant didelių odos plotų. Prieš vartodami bet kokį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Žindymo laikotarpis

Žindymo laikotarpiu reikia vengti Fucidin.

Prieš vartodami bet kokį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Vairavimo gebėjimai ir mašinų valdymas

Fusidino rūgštis neturi arba turi nereikšmingą poveikį vairavimo gebėjimams ir gebėjimui valdyti mašinas.

Svarbi informacija apie tam tikras kitas Fucidin sudedamąsias dalis

FUCIDIN 2% tepalas ir FUCIDIN Intertulle 2% impregnuota tvarsliaiva turi cetilo alkoholio ir vilnos riebalų, kurie gali sukelti vietinį odos sudirginimą (pvz., kontaktinį dermatitą).

FUCIDIN 2% tepalas ir FUCIDIN Intertulle 2% impregnuota tvarsliaiva turi butilhidroksitoluoną (E321), kuris gali sukelti vietinį odos sudirginimą (pvz., kontaktinį dermatitą), akių ir gleivinių sudirginimą.

FUCIDIN 2% kremas turi cetilo alkoholio ir kalio sorbato, kurie gali sukelti vietinį odos sudirginimą (pvz., kontaktinį dermatitą).

FUCIDIN 2% kremas turi butilhidroksianizolį (E320), kuris gali sukelti vietinį odos sudirginimą (pvz., kontaktinį dermatitą), akių ir gleivinių sudirginimą.

3. KAIP NAUDOTI FUCIDIN?

Visada naudokite Fucidin tiksliai pagal gydytojo nurodymus. Jei nesate tikri, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

FUCIDIN 2%, tepalas, FUCIDIN 2%, kremas: Tepkite vieną ar du kartus per dieną ant pažeistų vietų po užkrėstos srities valymo; tepalą galima naudoti su tvarščiu arba be jo.

FUCIDIN INTERTULLE 2%, impregnuota tvarsliaiva: Uždenkite užkrėstas odos vietas.

Ant pūliuojančių žaizdų tvarstį paprastai reikia keisti kartą per 24 valandas. Kitais atvejais tvarstis gali būti laikomas ilgiau.

Jei panaudojote didesnį kiekį Fucidin, nei turėtumėte

Jei panaudojote arba suvartojote per daug Fucidin, nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba apsinuodijimų kontrolės centrą (070/245 245).

Nors per dažnas arba per gausus naudojimas, ypač ant didelių odos plotų, teoriškai gali sukelti bendrąsias šalutines reakcijas (pvz., gelta), iki šiol nebuvo aprašytas nė vienas perdozavimo atvejis.

Jei pamiršote panaudoti Fucidin

Kitą kartą turite užtepti įprastą Fucidin kiekį. Jums nereikia tepti dvigubo kiekio.

Jei nutraukėte Fucidin naudojimą

Po gydymo pabaigos odos liga gali vėl pasireikšti.

4. KOKS GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS?

Kaip ir visi vaistai, FUCIDIN gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems. Prašome informuoti savo gydytoją arba vaistininką, jei kuris nors iš išvardytų šalutinių poveikių jus labai paveikia arba pastebite šalutinį poveikį, kuris nėra nurodytas šiame pakuotės lapelyje.

Dažniausi šalutiniai poveikiai yra odos reakcijos, ypač reakcijos vartojimo vietoje. Buvo pranešta apie alergines reakcijas.

Kaip ir vartojant visus antibiotikus, yra rizika susirgti antrinėmis infekcijomis dėl nejautrių mikroorganizmų. Po FUCIDIN intertulle 2% impregnuotos tvarsčio marlės naudojimo oda gali tapti jautresnė, tačiau gydymo nutraukti nereikia.

Imuninės sistemos sutrikimai

Padidėjusio jautrumo reakcija

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Niežulys

Odos dirginimas

Degimo pojūtis odoje

Dilgčiojimo pojūtis odoje

Sausa oda

Bėrimas

Kontaktinis dermatitas

Egzema

Odos paraudimas (eritema)

Dilgėlinė (urtikarija)

Niežtintis odos ir/ar gleivinių patinimas (angioedema) Patinimas aplink akis

5. KAIP LAIKYTI FUCIDIN?

Vaistus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Laikykite originalioje pakuotėje, ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Pasibaigus ant pakuotės nurodytam galiojimo laikui, vaisto vartoti negalima. Galiojimo data nurodo paskutinę mėnesio dieną.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Paklauskite vaistininko, kaip išmesti vaistą, jei jo nebereikia. Ši priemonė padeda apsaugoti aplinką.

6. PAPILDOMA INFORMACIJA

Kas yra Fucidin sudėtyje

Veikliosios medžiagos yra:

FUCIDIN tepalas 2%: Natrio fusidatas 20 mg/g

FUCIDIN kremas 2%: Fusidino rūgštis (be vandens) 20 mg/g

FUCIDIN INTERTULLE 2%, impregnuota tvarsliava: Natrio fusidatas 20 mg/g

Kiti komponentai yra:

FUCIDIN 2%, tepalas / FUCIDIN intertulle 2%, impregnuota tvarsliaiva:
Cetilo alkoholis - vilnos vaškas – skystas parafinas – vazelinas - All-rac-alfa-tokoferolis -
butilhidroksitoluenas (E321)

FUCIDIN 2%, KREMAS:

Butilhidroksianizolas (E320) - cetilo alkoholis - glicerolis – skystas parafinas - kalio sorbatas -
polisorbatas 60 – baltas vazelinas – All-rac-alfa-tokoferolis - druskos rūgštis - sterilus vanduo.

Kaip atrodo Fucidin ir pakuotės turinys

FUCIDIN 2%, TEPALAS: Odos tepalas tūbelėse po 15 g ir 30 g.

FUCIDIN 2%, KREMAS: Odos kremas tūbelėse po 15 g ir 30 g.

FUCIDIN INTERTULLE 2%, impregnuota tvarsliaiva: Kompresai 10 x 10 cm ir 10 x 30 cm,
impregnuoti 1,5 g FUCIDIN tepalu (vienam dm²), supakuoti atskirai.

Farmacinis verslininkas ir gamintojas:

Registracijos savininkas

LEO Pharma N.V./S.A.

Duwijckstraat 17

B-2500 Lier

Tel.: +32 (0)3 7407868

Faksas: +32 (0)3 740 78 69

El. paštas: leo-pharma.be@leo-pharma.com

Gamintojas:

Fucidin kremas ir Fucidin tepalas:

LEO laboratories Ltd

285 Cashel Road

Dublin 12 (Airija)

FUCIDIN intertulle 2%, impregnuota tvarsliaiva:

LEO Pharmaceutical Products

Industriparken 55

2750 Ballerup (Danija)

Registracijos numeriai:

Fucidin 2% tepalas: BE014682

Fucidin 2% kremas: BE146465

FUCIDIN intertulle 2%, impregnuota tvarsliaiva: BE013641

Receptinis vaistas.

Ši pakuotės informacija paskutinį kartą patvirtinta 06/2011.