

## BRUKSINFORMASJON: INFORMASJON FOR BRUKEREN

FUCIDIN 2%, salve (Natriumfusidat 20 mg/g),  
FUCIDIN 2%, krem (Fusidinsyre (vannfri) 20 mg/g),  
FUCIDIN intertulle 2%, impregnert bandasjegas (Natriumfusidat 20 mg/g)

Les hele pakningsvedlegget nøye, for det inneholder viktig informasjon for deg. Dette legemidlet er tilgjengelig uten resept. For å oppnå best mulig behandlingsresultat, må FUCIDIN brukes i henhold til forskriftene.

Oppbevar pakningsvedlegget. Du kan ha behov for å lese det igjen senere. Spør apoteket ditt hvis du trenger mer informasjon eller råd. Hvis symptomene dine forverres, må du absolutt oppsøke en lege. Hvis noen av de oppførte bivirkningene påvirker deg betydelig, eller hvis du merker bivirkninger som ikke er oppgitt i denne bruksinformasjonen, vennligst informer legen din eller apoteket.

Dette pakningsvedlegget inneholder:

1. Hva er FUCIDIN og hva brukes det til?
2. Hva må du ta hensyn til før du bruker FUCIDIN?
3. Hvordan skal FUCIDIN brukes?
4. Hvilke bivirkninger er mulige?
5. Hvordan skal FUCIDIN oppbevares?
6. Ytterligere informasjon

### 1. HVA ER FUCIDIN OG HVA BRUKES DET TIL?

Antibiotikum for lokal bruk på huden.

FUCIDIN 2%, salve og FUCIDIN 2%, krem brukes i følgende tilfeller:

- Hudinfeksjoner forårsaket av bakterier som er følsomme for antibiotikaet som preparatet inneholder, for eksempel:
  - Impetigo
  - sekundære infeksjoner av hudskader forårsaket av parasitter
  - Furunkler og omfattende impetigo (som en supplerende behandling til et antibiotikum via generell vei)
  - Furunkler og furunkulose
  - Panaritium (betennelse i finger eller tå)
  - Infeksjon i hårsekkene
  - overfladiske hudsår
- Forebygging av infeksjoner: i kirurgi ved hudtraumer, for eksempel brannskader eller sår
- Fjerning av bakterier i nesegangene hos friske bærere, spesielt når de er i kontakt med matvarer eller pasienter med infeksjonsrisiko.

FUCIDIN 2%, krem brukes spesielt på purulente, væskende sår også i hudfolder; kremen er estetisk mer egnet for bruk i ansiktet enn FUCIDIN 2%, salve.

FUCIDIN Intertulle 2%, impregnert bandasjegas:

Brukes på overfladiske infiserte sår og overfladiske hudinfeksjoner, overfladiske hudskader fra sår eller brannskader eller overfladiske kirurgiske inngrep, overfladiske og dype brannskader.

## 2. HVA MÅ DU VITE FØR DU BRUKER FUCIDIN?

### Fucidin må ikke brukes

Hvis du er overfølsom (allergisk) overfor fusidinsyre eller noen av innholdsstoffene i Fucidin.

Hvis du har en infeksjon i brystet og ammer. Det er fare for at produktet kan bli absorbert av spedbarnet.

Ikke bruk Fucidin på væskende, pussende sår, i hudfolder eller på åpne ben.

### Spesiell forsiktighet ved bruk av Fucidin er nødvendig

Hvis du bruker Fucidin over lang tid. Behandlingsvarigheten må begrenses til den perioden som er nødvendig for å helbrede skaden for å redusere risikoen for resistens. Hvis du påfører Fucidin på et spedbarn. Ikke påfør på et stort hudområde, da man ikke helt kan utelukke muligheten for generelle toksiske effekter (gulsott).

Hvis du påfører Fucidin nær øynene. Den basiske legemiddelformen kan forårsake en brennende følelse og irritasjon i øynene. Ikke påfør i øynene og på innsiden av øyelokkene; ved utilsiktet kontakt med øynene, skylt grundig med vann.

Fucidin intertulle bør ikke brukes på alvorlig skadet hud på grunn av den ikke-sterile impregnerte bandasjegazen.

Ved bruk av fusidinsyre har det blitt rapportert om forekomst av bakteriell resistens. Som med alle antibiotika kan bruk over lengre tid eller gjentatt bruk øke risikoen for utvikling av resistens.

Kontakt legen din hvis noen av de ovennevnte advarslene gjelder deg eller har gjeldt deg tidligere.

Ved bruk av Fucidin med andre legemidler er det ingen kjente interaksjoner.

Om nødvendig kan andre legemidler mot infeksjon brukes sammen med FUCIDIN 2%, salve, FUCIDIN 2%, krem eller FUCIDIN intertulle 2%, impregnert bandasjegaze.

Ved bruk av Fucidin sammen med mat og drikke

Ikke relevant.

### Graviditet og amming

#### Graviditet

Det er bare utilstrekkelige opplysninger om sikkerheten ved bruk av FUCIDIN 2%, salve, FUCIDIN 2%, krem og FUCIDIN intertulle 2%, impregnert bandasjegaze under graviditet hos mennesker. Selv om det aldri har blitt rapportert om uheldige konsekvenser ved bruk av Fucidin under graviditet, må man være forsiktig i de første tre månedene av svangerskapet. Bruk på store hudområder må unngås. Spør legen din eller apoteket om råd før du tar et legemiddel.

#### Amming

Under amming må Fucidin unngås.

Spør legen din eller apoteket om råd før du tar et legemiddel.

### Kjøring og bruk av maskiner

Fusidinsyre har ingen eller en ubetydelig innvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

### Viktig informasjon om visse andre ingredienser i Fucidin

FUCIDIN 2% salve og FUCIDIN Intertulle 2% impregnert bandasjegas inneholder cetylalkohol og ullfett, som kan forårsake lokal hudirritasjon (f.eks. kontakteksem).

FUCIDIN 2% salve og FUCIDIN Intertulle 2% impregnert bandasjegas inneholder butylhydroksytoluen (E321), som kan forårsake lokal hudirritasjon (f.eks. kontakteksem), irritasjon av øyne og slimhinner.

FUCIDIN 2% krem inneholder cetylalkohol og kaliumsorbat, som kan forårsake lokal hudirritasjon (f.eks. kontakteksem).

FUCIDIN 2% krem inneholder butylhydroksyanisol (E320), som kan forårsake lokal hudirritasjon (f.eks. kontakteksem), irritasjon av øyne og slimhinner.

### 3. HVORDAN SKAL FUCIDIN BRUKES?

Bruk alltid Fucidin nøyaktig som foreskrevet av legen din. Spør legen din eller apoteket hvis du er usikker.

FUCIDIN 2%, salve, FUCIDIN 2%, krem: Påfør en til to ganger daglig på de infiserte områdene etter rengjøring; salven kan brukes med eller uten bandasje.

FUCIDIN INTERTULLE 2%, impregnert bandasjegas: Dekk de infiserte hudområdene. På sår med puss må man vanligvis bytte gasbindet en gang hver 24. time. I andre tilfeller kan gasbindet ligge lenger.

Hvis du har brukt mer Fucidin enn du burde

Hvis du har brukt eller inntatt for mye Fucidin, bør du umiddelbart kontakte legen din, apoteket eller Giftinformasjonen (070/245 245).

Selv om det teoretisk er mulig med generelle bivirkninger (f.eks. gulsott) ved for hyppig eller rikelig bruk, spesielt på store hudområder, har det hittil ikke vært rapportert om noen tilfeller av overdosering.

Hvis du har glemt å bruke Fucidin

Ved neste anledning må du påføre den vanlige mengden Fucidin. Du trenger ikke påføre en dobbel mengde.

Hvis du avbryter bruken av Fucidin

Etter avsluttet behandling kan hudsykdommen dukke opp igjen.

### 4. Hvilke bivirkninger er mulige?

Som alle legemidler kan FUCIDIN ha bivirkninger, men de oppstår ikke hos alle. Informer legen eller apoteket ditt hvis noen av de oppførte bivirkningene påvirker deg betydelig, eller hvis du merker bivirkninger som ikke er nevnt i denne bruksanvisningen.

De vanligste bivirkningene er hudreaksjoner og spesielt reaksjoner på applikasjonsstedet. Allergiske reaksjoner er rapportert.

Som med alle antibiotika er det en risiko for sekundære infeksjoner av ikke-følsomme bakterier. Etter bruk av FUCIDIN intertulle 2%, impregnert bandasjegas kan huden bli mer følsom, uten at det er nødvendig å avslutte behandlingen.

Sykdommer i immunsystemet

Overfølsomhetsreaksjon

Sykdommer i hud og underhud

Kløe

Hudirritasjon

Brennende følelse i huden

Prikkende følelse i huden

Tørr hud

Utslett

Kontaktdermatitt

Eksem

Rødhet i huden (erytem)

Elveblest (urtikaria)

Kløende ødem i hud og/eller slimhinner (angioødem) Ødem rundt øyet

5. Hvordan skal FUCIDIN oppbevares?

Oppbevar legemidler utilgjengelig for barn.

Oppbevares i originalemballasjen, ikke lagres over 25°C.

Du må ikke bruke legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen gjelder den siste dagen i måneden.

Legemidlet må ikke kastes i avløpsvann eller husholdningsavfall. Spør apoteket ditt hvordan du skal kaste legemidlet når du ikke lenger trenger det. Dette tiltaket bidrar til å beskytte miljøet.

6. Ytterligere informasjon

Hva Fucidin inneholder

De aktive stoffene er:

FUCIDIN salve 2%: Natriumfusidat 20 mg/g

FUCIDIN krem 2%: Fusidinsyre (vannfri) 20 mg/g

FUCIDIN INTERTULLE 2%, impregnert bandasjegas: Natriumfusidat 20 mg/g

De andre innholdsstoffene er:

FUCIDIN 2%, salve/ FUCIDIN intertulle 2%, impregnert bandasjegas:  
Cetylalkohol - ullvoks – flytende parafin – vaselin - all-rac-alfa-tokoferol - butylhydroksytoluen (E321)

FUCIDIN 2%, KREM:  
Butylhydroksyanisol (E320) - cetylalkohol - glyserol – flytende parafin - kaliumsorbat - polysorbat 60 – hvit vaselin – All-rac-alfa-tokoferol - saltsyre - sterilt vann.

Hvordan Fucidin ser ut og innholdet i pakken  
FUCIDIN 2%, SALVE: Hudsalve i tuber på 15 g og 30 g.  
FUCIDIN 2%, KREM: Hudkrem i tuber på 15 g og 30 g.  
FUCIDIN INTERTULLE 2%, impregnert bandasjegas: Kompress av 10 x 10 cm og 10 x 30 cm impregnert med 1,5 g salve FUCIDIN (per dm<sup>2</sup>), individuelt pakket.

Farmasøytisk entreprenør og produsent:

Innehaver av registreringen  
LEO Pharma N.V./S.A.  
Duwijckstraat 17  
B-2500 Lier  
Tlf.: +32 (0)3 7407868  
Faks: +32 (0)3 740 78 69  
E-post: [leo-pharma.be@leo-pharma.com](mailto:leo-pharma.be@leo-pharma.com)

Produsent:  
Fucidin Krem og Fucidin Salve:  
LEO laboratories Ltd  
285 Cashel Road  
Dublin 12 (Irland)

FUCIDIN intertulle 2%, impregnert bandasjegas:  
LEO Pharmaceutical Products  
Industriparken 55  
2750 Ballerup (Danmark)

Registreringsnumre:  
Fucidin 2% salve: BE014682  
Fucidin 2% krem: BE146465  
FUCIDIN intertulle 2%, impregnert bandasjegas: BE013641

Reseptpliktig.

Denne bruksinformasjonen ble sist godkjent i 06/2011.