

FUCIDIN HYDROCORTISONE 20 MG/G + 10 MG/G, kreem Fusidiinhape ja hüdrokortisoon

Lugege kogu pakendi infoleht hoolikalt läbi enne, kui alustate selle ravimi kasutamist.

- Hoidke see pakendi infoleht alles. Võib-olla soovite seda hiljem uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pöörduge oma arsti või apteekri poole.
- See ravim on teile isiklikult välja kirjutatud. Ärge andke seda teistele edasi. See võib teistele inimestele kahju teha, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kui mõni loetletud kõrvaltoimetest teid oluliselt häirib või märkate kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole nimetatud, informeerige palun oma arsti või apteekrit.

See pakendi infoleht sisaldab:

1. Mis on Fucidin Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g, kreem ja milleks seda kasutatakse?
2. Mida peate teadma enne Fucidin Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g, kreemi kasutamist?
3. Kuidas Fucidin Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g, kreemi kasutada?
4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?
5. Kuidas Fucidin Hydrocortisone 20 mg/g + 10 mg/g, kreemi säilitada?
6. Lisainformatsioon

1. MIS ON FUCIDIN HYDROCORTISONE 20 MG/G + 10 MG/G, KREEM JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE?

Kreem antibiootikumi (fusidiinhape) ja põletikuvastase ainega, mis on saadud kortisoonist (hüdrokortisoonatsetaat).

Fucidin Hydrocortisone on soovitatav ekseemi ja nahapõletiku korral, mis on seotud bakteriaalse infektsiooniga.

2. MIDA PEATE TEADMA ENNE FUCIDIN HYDROCORTISONE 20 MG/G + 10 MG/G, KREEMI KASUTAMIST,

Fucidin Hydrocortisone ei tohi kasutada:

- Kui olete allergiline fusidiinhappe, hüdrokortisooni või Fucidin Hydrocortisone mõne muu koostisosa suhtes.
- Kui teil on viiruste põhjustatud nahahaigus (nagu ohatis, tuulerõuged, vöötohatis), seenhaigused, nahatuberkuloos või süüfilis.
- Kui teil on suuümbruse nahapõletik.
- Kui teil on naha koe kadu (atroofia).
- Tavalise või punetava akne korral.
- Nahahaavade või -haavandite korral

Fucidin Hydrocortisone'i kasutamisel on vajalik eriline ettevaatus:

- Kui kasutate kreemi silmade ümbruses. Fucidin Hydrocortisone'i ei tohi kanda silmalauagudele ega silmade ümbrusesse.
- Kui kasutate kreemi pikka aega. Kortisooni derivaatide pikaajalist kasutamist tuleb lastel vältida.

- Järgige arsti ettekirjutusi. Ravi kestus peab piirduma ajaga, mis on vajalik vigastuse paranemiseks, et vältida resistentsuse teket.
- Kui tekib ärritus, tuleb ravi lõpetada.
- Kui kortikosteroide kasutatakse suurtele nahapindadele, katva sideme all, limaskestadel või nahavoltides, võivad tekkida üldised kõrvaltoimed. Fucidin Hydrocortisone'i ei tohi kasutada limaskestadel ja avatud haavadel.
- Kortisooni derivaadid aeglustavad armistumist.
- Kui teil on habras pindmised veresooned või sügelus päraku või suguelundite piirkonnas.
- Nendel juhtudel tuleks vältida Fucidin Hydrocortisone'i kasutamist.
- Kasutamine peaks piirduma 2 nädalaga.

Süsteemne ravi on vajalik, kui bakteriaalne infektsioon püsib.

Võtke ühendust oma arstiga, kui mõni ülaltoodud hoiatus kehtib teie kohta või on varem kehtinud.

Fucidin Hydrocortisone'i kasutamine koos teiste ravimitega
Palun teavitage oma arsti või apteekrit, kui kasutate teisi ravimeid või olete neid hiljuti kasutanud, isegi kui need on käsimüügiravimid.

Fucidin Hydrocortisone'i kasutamine koos toidu ja jookidega
Ei kohaldata.

Rasedus

Fusidiinhappe kohta ei ole kliinilisi andmeid kasutamise kohta raseduse ajal. Loomkatsed ei viita otsestele ega kaudsetele kahjulikele mõjudele rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele ega postnataalsele arengule (1,2,3). Hüdrokortisoonatsetaadi imendumine pärast paikset manustamist on piiratud ja andmed raseduse ajal kasutamise kohta ei viita kahjulikele tagajärgedele lootele/vastsündinule (4,5,6). Rasedatele naistele määramisel tuleb olla ettevaatlik.

Imetamine

Imikul ei ole oodata mingeid toimeid, kuna fusidiinhappe ja hüdrokortisoonatsetaadi süsteemne kokkupuude imetava naisega pärast paikset manustamist (7, 8) on tühine. Fucidin Hydrocortisone võib kasutada imetamise ajal. Kui kreemi kasutatakse nibul, tuleb kõik kreemijäägid enne imetamist eemaldada.

Küsige nõu oma arstilt või apteekrilt enne ravimi võtmist.

Autojuhtimine ja masinate käsitsemine

Fucidin Hydrocortisone kreemil ei ole või on ebaoluline mõju autojuhtimisele ja masinate käsitlemise võimele.

Olulised andmed Fucidin Hydrocortisone teatud muude koostisosade kohta Fucidin Hydrocortisone kreem sisaldab butüülhüdroksüanisooli ja setüülalkoholi, mis võivad põhjustada kohalikke nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Butüülhüdroksüanisool võib põhjustada ka silmade ja limaskestade ärritust.

3. KUIDAS KASUTADA FUCIDIN HYDROCORTISONE 20 MG/G + 10 MG/G, KREEMI?

Kasutage Fucidin Hydrocortisone'i alati täpselt arsti juhiste järgi. Kui te ei ole milleski kindel, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Kandke kolm korda päevas eelnevalt puhastatud kahjustatud nahale. Kreemi pealekandmisel ärge hõõruge nahka liigselt.

Kui olete kasutanud rohkem Fucidin Hydrocortisone'i, kui peaksite:

Kui olete kasutanud liiga palju Fucidin Hydrocortisone'i, pöörduge kohe oma arsti, apteekri või mürgistuskeskuse poole (070/245 245).

Üleannustamise juhtumeid ei ole seni kirjeldatud. Korduvate või liialdatud kasutuste korral võivad tekkida üldised kõrvaltoimed.

Kui olete unustanud Fucidin Hydrocortisone'i kasutada:

Kandke järgmisel võimalusel tavaline kogus Fucidin Hydrocortisone kreemi. Te ei pea seejärel kahekordset kogust kreemi kandma.

Kui lõpetate Fucidin Hydrocortisone'i kasutamise:

Pärast ravi lõpetamist on võimalik, et nahahaigus ilmneb uuesti.

Kui teil on küsimusi ravimi kasutamise kohta, küsige oma arstilt või apteekrilt.

4. MILLISTE KÕRVALTOIMETEGA VÕIB ARVESTADA

Nagu kõik ravimid, võib ka FUCIDIN HYDROCORTISONE põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

- Kõige sagedasem kõrvaltoime on ärritus manustamiskohas.
- Sügelus
- Nahaärritus
- Ajutine põletav või torkiv tunne nahal
- Lööve
- Ekseemi ägenemine
- Allergilised reaktsioonid on äärmiselt haruldased.
- Järgnevaid kõrvaltoimeid on täheldatud paiksete kortikosteroidide kasutamisel, eriti oklusioonisidemete all:
 - o Põletustunne, sügelus, ärritus, kuivus, karvanääpsude põletik (follikuliit), liigne karvakasv (hüpertrichoos), aknetaoline lööve, naha värvimuutus, lööve suu ümber, kontaktdermatiit, naha pehmenemine, lisainfektsioon, naha õhenemine, triibud, väikesed villid.

Nagu kõigi antibiootikumide puhul, on ka siin oht resistentsete mikroobide põhjustatud sekundaarinfektsiooniks.

Kui märkate kõrvaltoimet, mida selles pakendi infolehes ei ole nimetatud või mida peate tõsiseks, teavitage sellest oma arsti või apteekrit.

5. KUIDAS SÄILITADA FUCIDIN HYDROCORTISONE 20 MG/G + 10 MG/G, KREEMI?

Hoidke ravimit lastele kättesaamatus kohas.

Ärge hoidke üle 25°C.

Ärge kasutage ravimit pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu, mis on tähistatud tähtedega EX. (kuu/aasta). Lühend EX. tähendab, et ravim aegub kuu viimasel päeval, mis on lühendi järel märgitud. Seda kuupäeva ei tohi ületada.

Ravimit ei tohi visata kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas ravimit hävitada, kui te seda enam ei vaja. See aitab kaitsta keskkonda.

6. LISAINFORMATSIOON

Mida Fucidin Hydrocortisone sisaldab

Toimeained on fusidiinhape (veevaba) 20 mg/g + hüdrokortisoonatsetaat 10 mg/g

Muud koostisosad (abiained) on butüülhüdrosüanisool – setanool – glütserool 85% - viskoosne parafiin – kaaliumsorbaat – polüsorbaat 60 – valge vaseliin – All-rac- α -tokoferool - puhastatud Vesi

Kuidas Fucidin Hydrocortisone välja näeb ja pakendi sisu Kreem, saadaval 15 g ja 30 g tuubides.

Ravimi müügiloo hoidja ja tootja

Müügiloo hoidja:

LEO Pharma nv/sa

Duwijckstraat 17

B - 2500 Lier

Tel: +32 (0)3 740 78 68

Faks: +32 (0)3 740 78 69

E-mail: leo-pharma.be@leo-pharma.com

Tootja:

LEO laboratories Ltd

285 Cashel Road

Dublin 12 (Iirimaa)

Registreerimisnumber: BE189612

Retseptiravim.

Kasutusjuhend kiideti viimati heaks 28. aprillil 2011

Üksikasjalik teave selle ravimi kohta on saadaval veebisaidil www.faggafmpsbe

Transtoyou