

Notice d'utilisation: Information pour utilisatrices

GinoRing®

0,120 mg/0,015 mg par 24 heures système de libération vaginale Étonogestrel/Éthinylestradiol

Informations importantes sur les contraceptifs hormonaux combinés (CHC):

- En cas de correct application compter ils à les les plus fiables réversibles méthodes contraceptives.
- Ils provoquent une légère augmentation du risque de un caillot sanguin dans les veines et artères, en particulier au première année de l'utilisation ou lors de la reprise de l'utilisation d'un contraceptif hormonal combiné après d'un interruption de 4 ou plusieurs semaines.
- Faites attention s'il vous plaît attentivement aux symptômes d'un caillot sanguin et adressez vous à à votre médecin, si vous soupçonnez, d'avoir cela (voirsection 2 « caillot sanguinCaillot sanguin).Lisez

vous Vous la entière notice attentivement avant, avant vous de l' utilisation de ce médicament commencer, car elle contient des informations importantes.

- Conservez vous la notice .. Peut-être souhaitez vous la relire plus tard ..
- vous avez d'autres questions , adressez-vous Vous vous à votre médecin ou pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut autres personnes nuire.
- Si vous effets secondaires remarquez, consultez votre médecin ou votre docteur ou pharmacien. Cela s'applique également à Effets secondaires, qui ne sont pas dans cette notice indiqués .. section 4. 4.

cette notice indique Qu'est-ce que

1. est GinoRing et pourquoi est-il utilisé er utilisé?
2. Qu'est-ce que devriez vous avant l' utilisation de GinoRing considérer?
 - 2.1 GinoRing ne doit pas être utilisé ,
 - 2.2 Mises en garde et précautions d'emploi
 - Caillots sanguins
 - Cancer
 - 2.3 Enfants et adolescents
 - 2.4 Utilisation de GinoRing avec d'autres médicaments Tests de laboratoire
 - 2.5
 - 2.5 Grossesse et Allaitement
 - 2.6 Aptitude à conduire et Capacité à utiliser des machines
3. Comment est GinoRing utilisé?
 - 3.1 Comment est GinoRing inséré et retiré
 - 3.2 Trois semaines Application, une semaine pause
 - 3.3 Quand est le premier anneau inséré
 - 3.4 Qu'est-ce que est à faire, si ...

Votre anneau accidentellement hors de votre vagin expulsé a été
Votre anneau temporairement en dehors du vagin était
Votre anneau se casse
Vous plus de un anneau inséré avez
Vous oublié avez, après la période sansanneau un nouveau nouveau Anneau insérer
Vous oublié avez, Anneau de retirer
Votre menstruation n'a pas eu lieu est Vous saignements inattendus avez
Vous le premier jour Votre menstruation retarder voulez
Vous Votre menstruation retarder voulez

3.5 Si Vous l' utilisation de GinoRing arrêter

4. Quels effets secondaires sont possible?
5. Comment est GinoRing conserver?
6. Contenu de l'emballage et autres informations
Ce que GinoRing contient
Comment GinoRing se présente et Contenu de la boîte
Pharmacien Entreprise et Fabricant

1. Qu'est-ce que c'est GinoRing et pourquoi est-il utilisé ?GinoRing

est un contraceptif hormonal Anneau vaginal, qui pour la contraception utilisé est. Chaque anneau contient deux hormones sexuelles féminines – étonogestrel et éthinylestradiol. L'anneau libère lentement de petites quantités ce Hormones dans le système circulatoire à partir de. En raison du faible quantité de hormones qui sont libérées , est GinoRing comme faible dosé hormonal Contraceptif considéré. Comme GinoRing deux différents types de hormones libère, on parle d'un contraceptif dit combiné hormonal hormonale contraceptif.

GinoRing agit comme une pilule contraceptive combinée (la «pilule »), mais au lieu chaque jour une pilule prendre, est l'anneau trois semaines ininterrompu appliqué.

GinoRing libère deux hormones sexuelles féminines libèrent , qui empêchent ,qu' un ovule des ovaires soit libéré libéré est. Si aucun ovule libéré est, vous ne pouvez pas tomber enceinte.

2. Que devez vous avant l' utilisation de GinoRing considérer?

Général Remarques

Veillez lire les informations concernant les caillots sanguins dans la section 2, avant de commencer le Application de GinoRing commencer. Il est particulièrement important de lire les symptômes d'un caillot sanguin de lire – voir section 2 «Caillot sanguin».

Dans cette notice sont différentes situations décrites, dans lesquelles vous devez interrompre l'utilisation de GinoRing ou dans lesquelles auxquels GinoRing moins fiable être peut. Dans ces situations vous devriez ne pas avoir de rapports sexuels ou utiliser des méthodes contraceptives non hormonales comme un préservatif Préservatif ou un autre méthode barrière appliquer.

Utilisez Vous pas la méthode du calendrier ou la méthode de la température. Ces méthodes

peuvent être peu fiables car GinoRing les fluctuations mensuelles de température et Changements du mucus cervical influence.

Comme d'autres contraceptifs offre GinoRing aucune protection contre les infections (SIDA) ou autres sexuellement transmissibles Maladies.

2.1 GinoRing ne doit pas être utilisé ,

GinoRing ne doit pas être utilisé , si un des points suivants s'applique à vous s'applique. Si un des suivants énumérés points à vous s'applique, vous devez le à votre médecin signaler .. Votre Médecin sera alors avec vous discuter, quelle autre forme de contraception pour vous mieux adaptée est.

- si vous un caillot sanguin dans une vaisseau sanguin des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP), des poumons (embolie pulmonaire, EP) ou d'un autre organe avez (ou dans le passé avaient);
- si vous connu est, que vous souffrez d'un trouble de la coagulation – par exemple déficit enprotéine -C,déficit en Antithrombine-III-déficit, Facteur-V-Leiden ou anticorps antiphospholipides;
- si vous êtes opéré être devez ou longtemps alité sont (voirvoir Section «Caillot sanguin»);
- si vous avez jamais une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral avez eu;
- si vous avez une angine de poitrine (une maladie, qui sévère douleurs thoraciques provoqué et un premier signe d'un infarctus du myocarde être peut) ou une transitoire ischémique attaque (AIT – transitoire Symptômes d'un accident vasculaire cérébral) avez (ou dans le passé avez eu);
- si vous souffrez d'une des maladies suivantes qui augmentent le risque pour un caillot sanguin dans une artère augmenter peuvent:
 - o diabète sévère avec lésion des vaisseaux sanguins
 - o très haute pression artérielle
 - o très haute Taux de lipides sanguins (Cholestérol ou Triglycérides)
 - o une Maladie, qui est connue sous le nom de Hyperhomocystéinémie connue est
- si vous souffrez d'une forme de Migraine ((sog. „Migraine avec aura“) souffrez ou dans le passé avez souffert ;si
- vous avez une pancréatite Pancréatite pancréatitePancréatiteassociée connecté avec élevés taux de lipides sanguins avez (aviez);
- si vous une grave maladie du foie avez (aviez) et votre fonction hépatique encore restreint est;
- si Vous un bénin ou malin tumeur du foie avez (aviez);
- si Vous cancer du sein ou un cancer dans les organes génitaux ont (avaient) ou un correspondant soupçon existe;
- si chez vous non élucidées saignements de la Vagin survenir;
- si vous allergique à l'éthinylestradiol ou étonogestrel ou un des en section 6. mentionnés autres composants de ce médicament sont.

Si une des mentionnées conditions pour la première fois pendant l' utilisation de GinoRing apparaître, retirez immédiatement l'anneau et et contactez votre médecin . Jusqu'à

l'éclaircissement, vous devriez utiliser une méthode contraceptive non hormonale. GinoRing ne doit pas.

utilisé. pas appliqué seront, si vous Hépatite C avez et médicaments, qui Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir, Dasabuvir, Glecaprevir/Pibrentasvir ou Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir contenir, prendre (voir section 2.4 «Utilisation de GinoRing avec d'autres médicaments Médicaments»).

2.2 Mises en garde et Précautions

Quand devriez-vous consulter votre médecin ? Consultez immédiatement un médecin si vous avez besoin

- d'aide médicale Signes d'un caillot sanguin remarquer, qui pourraient signifier, que vous avez un caillot sanguin dans la jambe (c.-à-d. thrombose veineuse profonde), un caillot sanguin dans le (c.-à-d. embolie pulmonaire), un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral avoir (voir la section «caillot sanguin» ci-dessous).

Pour une description de la Symptômes de cet effets indésirables graves voir la section « Comment reconnaître un caillot sanguin » Caillot sanguin Informez.

médecin, Leur Médecin, si un des points suivants s'applique à vous.

Si la maladie se déclare ou s'aggrave pendant l'utilisation de GinoRing aggravé, devriez-vous également votre médecin informer.

- si un proche parent cancer du sein a ou avait;
- si vous Épilepsie avoir (voir section 2.4 «Utilisation de GinoRing avec d'autres médicaments Médicaments»);
- si vous avez une maladie du foie (p. ex. Jaunisse) ou une maladie de la vésicule biliaire (p. ex. calculs biliaires) avez;
- si vous avez la maladie de Crohn ou colite ulcéreuse (chronique inflammatoire maladie intestinale) avoir;
- si vous lupus systémique érythémateux (LES – une maladie, qui votre système immunitaire affecte) avoir;
- si vous un hémolytique-urémique syndrome (SHU – un trouble de la coagulation sanguine, qui entraîne une insuffisance rénale) avez ;
- si vous anémie falciforme Drépanocytose (une héréditaire maladie des globules rouges) avez;
- si vous augmentée Taux de lipides sanguins hypertriglycéridémie Hypertriglycéridémie avez ou cette maladie dans votre Famille survenu est. Hypertriglycéridémie a été avec un risque accru pour une pancréatite Pancréatite inflammation du pancréas Pancréas associée ;
- si vous opéré être devez ou longtemps temps alité êtes (voir section 2 «caillots sanguins»);
- si vous récemment avez accouché avoir, est Votre risque de caillots sanguins augmenté. Demandez à votre médecin, quand bientôt après l'accouchement vous avec le utilisation de GinoRing commencer pouvez;

- si vous dans les veines sous la peau une inflammation avez (thrombophlébite superficielle);
- si vous varices (varices) avez;
- si les symptômes suivants pendant une grossesse ou de la précédente utilisation de de Hormones sexuelles pour la première fois chez vous sont apparus ou se sont aggravés: p. ex. trouble de l'audition, porphyrie (une maladie du sang), herpès gestationis (pendant der Grossesse survenant Éruption cutanée avec formation de vésicules), Sydenham-Chorée (une Maladie des nerfs avec involontairement survenant mouvements);
- si vous Chloasma (jaune-brun taches pigmentaires, appelées « taches de grossesseTaches de grossesse,principalement sur le visage)avez (ouaviez).Si oui, oui, puis devriez vous excessive lumière du soleil ou UV-rayonnement éviter;
- si c'est pour médicales raisons pour vous difficile ,GinoRing GinoRing à appliquer; Vous avez p. ex. constipation, un prolapsus utérin ou douleurs pendant le rapport sexuel;
- si vous urinezfréquemment , de manière urgente doivent et cependant un brûlure et/ou douleurs ressentir et ne pas localiser l'anneau dans le vagin localiser pouvoir. Ces symptômes peuvent un Signes pour être, que GinoRing accidentellement dans la vessie inséré a été;
- si vous symptômes d'un angio-œdème sur vous remarquez, comme gonflements de visage, langue etou gorge etou difficultés à avaler ou éruption cutanée éventuellement avec des difficultés respiratoires, devraient Vous immédiatement votre médecin consulter. Médicaments, qui contiennent des œstrogènes contenir, peuvent les symptômes d'un héréditaire et acquis angio-œdème provoquer ou aggraver.

CLOQUET DE SANG

Lors de l' utilisation d'un combiné hormonal contraceptif tel que GinoRing votre risque de la formation d'un caillot sanguin est plus élevé, comme si vous n'en utilisez aucun. Dans de rares cas peut un caillot sanguin vaisseaux sanguins obstruer et provoquer des problèmes graves.

Les caillots sanguins peuvent survenir

- dans veines (dite. «thrombose veineuse», «thromboembolie veineuse» ou TEV)
- dans les artères (dite. «thrombose artérielle”, „artérielle Thromboembolie” ou ATE).

La guérison d'un caillot sanguin n'est pas toujours complète. Rarement peut il conduire à graves persistants symptômes viennent et très rarement évoluent caillot sanguin mortellement.

Il est important de ne pas oublier que le risque global d'un nuisible à la santé caillots sanguins en raison de GinoRing faible est.

COMMENT RECONNAÎTRE UN CAILLOT SANGUIN

Consultez un de toute urgence médecin immédiatement ,si vous présentez l'un des symptômes suivants Signes ou symptômes remarquer.

Apparaît chez vous un de ces signes ?	À quoi pourriez-vous souffrir? Gonflement
d'une jambe ou le long de d'une veine dans la jambe ou le pied, surtout si les symptômes	Thrombose veineuse profonde de la jambe

<p>suyvants apparaissent en même temps :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Douleur ou sensibilité dans la jambe, qui peut seulement lors de la station debout ou de la marche ; - Chaleur de la jambe touchée ; - Changement de couleur de la peau de la jambe, par exemple apparition de pâleur, rougeur ou coloration bleue. 	
<p>soudaine inexplicquée essoufflement ou respiration rapide ; toux soudaine sans cause évidente, avec possibilité de cracher du sang ; douleur thoracique aiguë, qui s'aggrave à l'inspiration profonde ; forte étourdissement ou sensation de vertige ; plus rapide ou irrégulier battement de cœur ; fortes douleurs d'estomac.</p> <p>Si vous n'êtes pas sûr, parlez à un médecin, car certains de ces symptômes comme la toux ou l'essoufflement avec un médecin, car certains de ces symptômes tels que la toux ou l'essoufflement maladie plus légère Maladie comme p. ex. d'un inflammation des voies respiratoires (p. ex. d'un rhume infectieux) confondus peuvent être.</p>	<p>Embolie pulmonaire</p>
<p>Symptômes, qui souvent dans un œil apparaît : immédiat perte de la vision ou vision floue indolore qui peut progresser vers une perte de la vision. Thrombose d'une veine rétinienne (caillot de sang</p>	<p>Thrombose d'une veine rétinienne (caillot sanguin une veine dans l'œil) Douleur thoracique,</p>
<p>malaise, malaise, Pression, Sensation de lourdeur;</p>	<p>Infarctus du myocarde</p>
<p>Sensation d'oppression- ou Sensation de plénitude dans la poitrine, bras ou sous le sternum; Sensation de plénitude, Indigestions ou Sensation d'étouffement; dans le dos, mâchoire, cou, bras et Estomac douleurs irradiantes dans le haut du corps ; Transpiration, Nausée, Vomissements ou Vertiges ; extrême Faiblesse, Anxiété ou Essoufflement ; rapide ou irréguliers Battements de cœur.</p>	
<p>soudaine Faiblesse ou Engourdissement du visage, du bras ou de la jambe, particulièrement prononcé d'un côté du corps ; soudain confusion, difficultés d'élocution ou de compréhension ; soudain troubles de la vision dans un ou les deux yeux ; soudain difficultés à marcher, vertiges, perte d'équilibre ou troubles de la coordination ; soudain grave ou plus longtemps maux de</p>	<p>Accident vasculaire cérébral</p>

tête persistants d'origine inconnue ; perte de connaissance ou évanouissement avec ou sans crise convulsive. Dans certains cas, les symptômes d'un AVC peuvent être temporaires et s'accompagner d'une et complète récupération presque immédiate. Cependant, vous devriez consulter un médecin de toute urgence car vous pourriez à nouveau subir un AVC pourraient.	
Gonflement et légère bleutée décoloration d'un membre ; fortes douleurs abdominales (abdomen aigu).	Caillots sanguins qui obstruent d'autres vaisseaux sanguins obstruer

CAILLOT DE SANG DANS UNE VEINE

Que peut se passer, si se dans une veine un caillot sanguin forme?

- L' utilisation combinés hormonaux contraceptifs a été associée à un risque de Caillot sanguin dans une veine (thrombose veineuse) en relation avec. Ces effets secondaires surviennent cependant rarement . La plupart du temps, apparaissent seulement dans le première année de l'application d'un combiné hormonal contraceptif sur.
- Si il se produit dans une veine de la jambe ou pied à un Caillot sanguin vient, peut ceci un profond thrombose veineuse profonde (TVP) provoquer.
- Si un caillot sanguin de la jambe dans le poumon se déplace et se là se fixe, peut cela une embolie pulmonaire provoquer.
- Très rarement peut se un caillot sanguin dans une veine d'un autre Organes comme p.ex. l' œil (thrombose d'une veine rétinienne) se forment.

Quand est le risque de la formation d'un caillot sanguin dans d'une veine au plus grand?

Le risque de la formation d'un caillot sanguin dans une veine est au cours de la première année de la première utilisation d'un combiné hormonal contraceptif au plus grand. Le risque peut également augmenté être, si vous l' utilisation d'un combiné hormonale contraceptif (même ou autre médicament) après une interruption de 4 ou plusieurs semaines reprendre ..

Après la première année diminue le risque, il reste mais toujours légèrement plus élevé, que si aucun contraceptif hormonal combiné n'était utilisé.

Si vous le traitement de GinoRing arrêtez, revient le risque d' un caillot sanguin en quelques semaines à la valeur normale retour.

Comment grand est le risque de la formation d'un caillot sanguin?

Le risque dépend de votre naturel naturel Risque pour VTE et du type de de vous utilisé combiné hormonal contraceptif.

Le risque total pour un caillot sanguin dans la jambe ou poumon (TVP ou LE) avec GinoRing est faible.

- Environ 2 sur 10.000 femmes, qui ne sont ni enceintes ni un contraceptif hormonal combiné Contraceptif appliquer, subir dans le cours d'une année un caillot sanguin.
- Environ 5 à 7 sur 10.000 femmes, qui un Levonorgestrel, Noréthistérone ou un Norgestimate contenant combiné hormonal contraceptif utiliser, subir au cours d'une année un caillot sanguin.
- Environ 6 à 12 sur 10.000 Femmes, qui un Norelgestromin ou Étonogestrel contenant combiné hormonal contraceptif comme GinoRing utilisent, subissent au cours d'une année un Caillot sanguin.
- Le risque de la formation d'un caillot sanguin est selon votre historique médical personnel variable élevé (voir suivant Section „Facteurs, qui augmentent le risque de un caillot sanguin dans une veine augmentent“).

	Risque de la formation d'un caillot sanguin par an
Femmes qui ne préparation hormonale combinée sous forme d'une pilule/d'un patch/d'un anneau utilisent et ne sont pas enceintes	Environ 2 sur 10.000 femmes
Femmes, qui une Levonorgestrel, Norethisterone ou Norgestimate contenant combiné hormonal pilule utiliser	Environ 5 – 7 sur 10.000 femmes
Femmes, qui GinoRing utilisent	Environ 6 – 12 sur 10.000 femmes

Facteurs, qui augmentent le risque de un caillot sanguin dans une veine augmentent

Le risque de un caillot sanguin avec GinoRing est faible, mais est par certaines maladies et facteurs de risque augmenté. Le risque est augmenté:

- si vous êtes fortement obèse êtes (indice de masse corporelle ou IMC supérieur à 30 kg/m²);
- si chez un de vos proches parents à un jeune âge (c.-à-d. plus jeune de 50 ans) un caillot sanguin dans le jambe, dans le poumon ou dans un autre organe s'est produit .. ce cas Chute avez vous peut-être une héréditaire trouble de la coagulation sanguine;
- si vous opéré devez être ou en raison d'une blessure ou maladie longue durée alité sont ou un jambe plâtrée est. Il est possible, que l' application de GinoRing plusieurs semaines avant une Opération ou en cas de mobilité réduite terminée doit être. Si vous arrêtez l'utilisation de GinoRing arrêter devez, consultez votre Votre médecin, quand vous l' utilisation reprendre pouvez;
- si vous plus âgé devenez (notamment à partir d'un âge d'environ environ 35 ans);
- si vous il y a quelques semaines accouché ..

risque de la formation d' un caillot sanguin augmente avec avec le Nombre des présentes Maladies et Facteurs de risque.

Voyages en avion (> 4 heures) peuvent votre Risque pour un caillot sanguin temporairement augmenter, en particulier si chez vous d'autres des facteurs énumérés sont présents.

Il est important que vous informiez votre médecin, si un de ces points s'applique à vous ,même si vous ne êtes pas sûr .. médecin peut alors puis décider, GinoRing d'arrêter.
Informez votre médecin de ,si il y a un des points mentionnés ci-dessus pendant le le Application de GinoRing à un changement se produit, p.ex. si chez un proche parent d' origine inconnue une thrombose survient ou si vous prendre beaucoup de poids ..

Que

peut se passer ,si se dans une artère un caillot de sang se forme ??

Exactement comme un caillot sanguin dans une veine peut aussi un caillot dans une artère provoquer des problèmes graves. Il peut entraîner Exemple un infarctus ou accident vasculaire cérébral provoquer.

Facteurs, qui augmentent le risque de un caillot sanguin dans une artère augmenter

Il est important, à noter, que le risque de un infarctus ou accident vasculaire cérébral en raison de l' utilisation de GinoRing très faible est, cependant augmenter peut:

- avec l'âge croissant (plus âgé de plus de 35 ans);
- si vous fumez. Lors de l' utilisation d'un contraceptif hormonal combiné comme GinoRing est conseillé, d'arrêter de fumer .. vous ne pouvez pas arrêter de fumer et plus âgé plus de 35 ans sont, peut votre médecin vous conseiller, un autre type de contraceptif utiliser;
- si vous êtes en surpoids ;;
- si vous avez une hypertension artérielle;
- si l'un de vos proches à un jeune âge(moins de 50ans un infarctus ou accident vasculaire cérébral avait. Dans ce cas vous pourriez également avoir un risque accru d' un infarctus ou accident vasculaire cérébral avoir;
- si vous ou un de vos proches parents avez un taux élevé de lipides sanguins (cholestérol ou triglycérides) avez;
- si vous migraine et en particulier Migraine avec Aura avez;
- si vous souffrez de problèmes cardiaques (maladie des valves cardiaques, trouble du rythme appelé fibrillation auriculaire);
- si vous avez du diabète avez.

Si plus de un de ces points s'applique à vous , ou une de ces maladies est particulièrement grave ,votre peut médecin Risque pour le développement d'un caillot sanguin supplémentairement augmenté être.

Informez votre médecin de ,si il y a un des ci-dessus en haut mentionnés points pendant der application de GinoRing un changement y a, p. ex. si vous commencez à fumer , chezun einem proches proches de inconnue cause une thrombose survient ou si vous prenez beaucoup.

cancer

Les informations suivantes ont été reçues de études, qui avec des contraceptifs combinés, qui sont destinés à être pris (contraceptifsoraux , pilule), ont été. . Ils pourraient pour GinoRing s'appliquer. Informations sur le utilisation de contraceptifs hormonaux, qui sont vagin utilisés (comme dans GinoRing), ne sont pas disponibles.

Cancer du sein a été chez les femmes, qui combinent des pilules prennent, légèrement plus souvent trouvé. Il est cependant pas connu, si cela est dû à la prise de la pilule attribuable est. Cela peut par exemple aussi à cela attribuable être, que les femmes, qui prennent la pilule prennent, plus souvent médicalement examiner se faire et ainsi plus souvent tumeurs trouvées seront. Après arrêt de la pilule combinée diminue la fréquence élevée des cancers du sein de nouveau progressivement diminue.

Il est important que vous fassiez régulièrement vos seins palper. Vous devriez consulter votre médecin, si vous découvrez Nodule ressentir. Signalez à votre médecin également, si un proche parent cancer du sein a ou a déjà eu (voir section 2.2 „Mises en garde et Précautions d'emploi”).

Chez les utilisatrices de pilules, il a été rarement rapporté des tumeurs hépatiques bénignes et encore plus rarement des tumeurs hépatiques malignes. Recherchez Vous votre médecin consulter, si des fortes douleurs abdominales surviennent.

Il a été rapporté ,que chez chez Utilisatrices de comprimés combinés rarement cancer de l'endomètre (muqueuse utérine) et des ovaires se produit. Cela pourrait également pour GinoRing s'appliquer, il a été cependant pas encore confirmé.

Troubles psychiatriques Maladies

Certaines femmes, qui utilisent des contraceptifs comme GinoRing appliquent, rapportent sur dépression ou dépressive humeur. dépressions peuvent graves être et occasionnellement à des pensées suicidaires conduire. Si chez vous des sautes d'humeur et dépressifs symptômes survenir, laissez vous faire le plus rapidement possible par votre médecin médicalement conseiller.

2.3 Enfants et adolescents

La sécurité et efficacité de GinoRing chez les adolescents de moins de 18 ans n'ont pas été étudiés.

2.4 Utilisation de GinoRing avec d'autres médicaments Informez

vous sur toujours votre médecin, quels autres médicaments ou préparations à base de plantes vous prenez ou utilisez. Informez vous également tout autre Médecin ou dentiste, qui vous un autre médicament prescrit, (ou. pharmacien), que vous GinoRing utilisez .. Vous pouvez vous aussi dire si vous méthodes supplémentaires de contraception (par ex. un préservatif pour l'homme) utiliser devez et ,le cas échéant , combien de temps, oui, combien de temps, ou si lors de la utilisation d'un autre médicament, que vous avez besoin, quelque chose modifié doit être.

Certains médicaments peuvent

- avoir une influence sur le niveaux sanguins de GinoRing ont;
- son contraceptive effet réduire;
- saignements inattendus provoquer.

Cela comprend médicaments pour Traitement de:

- o épilepsie (p. ex. Primidone, Phénytoïne, Barbituriques, Carbamazépine, Oxcarbazépine, Topiramate, Felbamate);
 - o tuberculose (p. ex. Rifampicine);
 - o infections à VIH (p. ex. Ritonavir, Nelfinavir, Nevirapine, Efavirenz);

 - o Infections par le virus de l'hépatite C (p. ex. Bocéprévir, Télaprévir (p. ex. Bocéprévir, Télaprévir) autres
 - o maladies infectieuses (p. ex. Griséofulvine); Hypertension artérielle
 - o dans les vaisseaux sanguins des poumons (Bosentan Bosentan);
 - o dépressifs troubles (le médicament à base de plantes millepertuis).
-
- Si vous prenez des médicaments ou préparations à base de plantes, qui l'efficacité de GinoRing réduire pourraient, devrait en plus une méthode contraceptive barrière (par exemple un préservatif pour l'homme) être utilisée .. médicaments peuvent réduire l'efficacité Efficacité de GinoRing à 28 jours, après vous l' utilisation terminée avez, affecter. C'est pourquoi il est nécessaire, le supplémentaire contraceptive méthode barrière également longtemps appliquer. Remarque: N'utilisez GinoRing pas avec un diaphragme, un capot cervical un Cape cervicale ou un préservatif pour femmes.
 - GinoRing peut l' efficacité d'autres médicaments affecter, par ex.
 - médicaments contenant de la ciclosporine contenir
 - de l'antiépileptique lamotrigine (ceci pourrait à une fréquence accrue d'accidents conduire

 -). GinoRing ne doit pas être utilisé, si vous avez l'hépatite C et prenez des médicaments, qui quelle Ombitasvir Paritaprevir Ritonavir, Dasabuvir, Glecaprevir Pibrentasvir ou Sofosbuvir Velpatasvir Voxilaprevir contiennent, car ces les résultats d'un test sanguin de la fonction hépatique augmentent pouvoir (Augmentation des ALT enzymes hépatiques).
Votre médecin vous prescrira un autre contraceptif avant le début du traitement avec ce médicament prescrire.
Deux semaines après la fin du traitement peut être GinoRing recommencé. Voir section 2.1 «GinoRing ne doit pas être utilisé ».

Questions Vous votre médecin ou pharmacien, avant de prendre un médicament.

Pendant l' utilisation de GinoRing vous pouvez Utiliser des tampons. Insérez vous d'abord GinoRing avant, avant d'insérer un tampon .. prudent, lorsque vous retirez le tampon retirez le tampon enlever, et faites attention vous à, que GinoRing ne soit pas accidentellement retiré avec tiré. Si cela se produit, alors rincez rincer Vous l'anneau simplement avec froid à tiède eau rincer et remettre le immédiatement à nouveau insérer.

L'anneau peut se casser, si dans le vagin simultanément d'autres préparations, comme lubrifiants ou médicaments pour le traitement des infections utilisés (voir section 3.4 « Qu'est-ce que est à faire si ... Votre Anneau se casse”).

L'Utilisation de spermicides ou produits contre les infections fongiques pour application dans le Vagin affecte pas la contraceptive efficacité de GinoRing.

Tests de laboratoire

GinoRing peut le résultat de certains tests de laboratoire influencer. Informez vous s'il vous plaît c'est pourquoi le médical personnel sur, que vous GinoRing utilisez, si chez vous un test sanguin ou test urinaire effectué est.

2.5 Grossesse et allaitement

GinoRing ne doit pas par les femmes enceintes ou par les femmes, qui soupçonnent, elles pourraient être enceintes, utilisé être. Si vous pendant l'utilisation de GinoRing enceinte devenez, vous devriez retirer l'anneau et consulter votre médecin ..

Si Vous le utilisation de GinoRing souhaitez arrêter, parce que vous enceinte devenir souhaitez, consultez s'il vous plaît les informations dans la section 3.5 «Si Vous le utilisation de GinoRing arrêter voulez.

L'utilisation de GinoRing pendant l'allaitement n'est généralement pas recommandée. Si vous pendant la période d'allaitement GinoRing utiliser voulez, alors discutez en avec votre médecin . Aptitude à conduire.

2.6 capacité à la conduite Utilisation de machines

Il est improbable, que GinoRing votre aptitude à conduire et votre capacité à utiliser des machines soit affectée.

3. Comment est GinoRing utiliser?

Vous pouvez GinoRing vous-même insérer et retirer. Lorsque vous pour la première fois GinoRing utilisez, vous dira votre médecin quand insérer le GinoRing . L'anneau vaginal doit être inséré le jour approprié de votre cycle menstruel inséré seront (voir section 3.3 «Quand est le premier GinoRing inséré») et reste là pour trois consécutifs suivants semaines. Vous devriez vérifier régulièrement, si l'anneau GinoRing est encore dans votre vagin . (p.ex. avant et après le Rapports sexuels), pour être sûr de ne pas être enceinte . Après la troisième semaine retirer. Après le troisième Semaine enlever Vous GinoRing. Maintenant suit une 1-semaine de pause de l'anneaulibre période. Normalement vous serez vous pendant cette période libre de l'anneau vos règles avoir.

Utilisez vous GinoRing pas ensemble avec certaines méthodes barrières pour femmes, comme un diaphragme pour l'application dans le vagin, d'une cape cervicale ou d'un préservatif pour la femme. Ces méthodes barrières pour la contraception ne doivent pas être utilisées comme méthode contraceptive supplémentaire car GinoRing pour la correcte insertion et position d'un diaphragme, d'une cape cervicale ou d'un préservatif pour la femme entraver peut être. Cependant peut un préservatif pour l'homme comme méthode barrière supplémentaire appliquée

3.1 être. Comment utiliser GinoRing inséré et

1. retiré Avant d'insérer l'anneau, vérifiez Vous, si peut-être le date de péremption dépassée a été (voir section 5 « Comment conserver GinoRing conserver? »).
2. Lavez vous vos mains Mains, avant vous insérer l'anneau ou retirer ..
3. vous pour l'insertion la position la plus confortable pour vous, comme un fléchi jambe, accroupi ou couché.
4. Prenez le GinoRing du sachet .. le sachet pour une utilisation ultérieure Utilisation sur.
5. Tenez vous GinoRing entre le pouce et l'index fermement, pressez vous les côtés opposés ensemble et insérez vous Vous GinoRing dans le vagin insérer (voir illustrations 1 – 4). Si GinoRing correctement inséré ,vous ne devriez rien sentir .. Avoir Vous le sentiment, que GinoRing n'est pas correctement placé, alors poussez le doucement un peu plus profondément dans le vagin. Il est pas important, que l'anneau à un endroit précis dans le vagin se trouve.
6. Après trois semaines retirez le GinoRing du vagin ,en tirant Vous avec le doigt dans l'anneau accrocher ou le bord avec deux doigts saisir et l' anneau retirer (voir illustration 5). Si vous le position de l'anneau dans le vagin senti avez, le cependant retirer ne pouvez pas ,alors vous devriez consulter votre médecin Médecin consulter.
7. Le utilisé anneau peut, de préférence dans le sac, avec les déchets ménagers éliminé être. Veuillez éliminer le GinoRing ne sur les toilettes.



Illustration 1
Prenez le GinoRing du sachet



Illustration 2
Pressez le anneau ensemble




Illustration 3

Prenez le pour la Insertion de l'anneau un confortable position une



Figure 4A

Figure 4B

Figure 4C

Insérez Vous l'anneau avec une main dans le vagin un (Figure 4A); si nécessaire, peuvent les lèvres avec l'autre main écartées être. Insérez vous l'anneau dans le vagin, jusqu'à ce qu'il se sente confortablement ajusté (Illustration 4B). Laissez vous l'anneau pendant 3 semaines dans cette position (illustration 4C).



Illustration 5

GinoRing peut être accroché des index ou Saisir avec le index- et le majeur de le vagin retiré être.

3.2 Trois semaines d'application, une Semaine Pause

1. Avec Début de l'insert doit l' anneau vaginal pour trois consécutives semaines suivantes être inséré rester.
2. Après trois semaines retirer Vous l'anneau le même jour de la semaine et environ à la même heure, à laquelle vous avez inséré l'anneau inséré . Exemple : Exemple: Vous avez GinoRing un mercredi ,environ à 22:00 heures ,inséré .. devriez vous retirer l'anneau trois semaines Semaines plus tard, le mercredi, environ à 22:00 heures, retirer.
3. Après avoir retiré l'anneau , appliquezvous un une Semaine long aucun anneau sur. Pendant cette semaine vous devriez recevoir vos règles .. commencent habituellement deux à trois trois Jours, après vous GinoRing retiré avez.
4. Après exactement une semaine (de nouveau le même jour de la semaine, environ à la même Temps) insérez vous un nouveau anneau insérez. Même alors, si vos règles sont encore.

Si le nouveau Anneau plus de trois heures trop tard inséré est, peut l' effet contraceptif être compromis. Suivez les instructions le Instructions dans section 3.4 « Que est à faire, si ... vous avez oublié ,après la période sans anneau d'insérerun nouvel anneau nouveaux Anneau insérer”.

Si vous le ci-dessus décrites instructions suivez, vous aurez vos règles chaque mois environ à la même heure obtenir.

3.3 Quand sera le premier anneau inséré

- Si vous au mois précédent n'avez pas hormonaux contraceptifs utilisé avez Insérez vous le premier GinoRing le premier jour de votre cycle menstruel (c.-à-d. le premier jour des règles) insérer. GinoRing commence immédiatement à agir. Vous devez aucune autres méthodes contraceptives utiliser.
- Vous pouvez GinoRing également les jours 2 – 5 de votre cycle menstruel insérer insérer. Cependant devriez vous alors pendant la première sept jours de GinoRing utilisation également un autre contraceptif (comme un préservatif) appliquer, lorsque vous avez des rapports sexuels . Cela s'appliquecependant seulement ,si vous GinoRing pour la première fois utilisez ..
- Si Vous dans précédent mois un combiné pilule pris avez
- Insérez vous GinoRing au plus tard le premier jour après la période desans comprimés Votre Pilule un. Contient Votre boîte de pilules aussi Comprimés sans substance active, mettez Vous GinoRing au plus tard le premier Jour après le Prise du dernier sans substance active comprimé un. Si vous n'êtes pas sûr ,quel comprimé c'est , demandezà votre médecin Votre médecin ou pharmacien. Ne prolongez jamais la période prescrite sans hormonesde la pilule. Si vous
- prenez la pilule régulièrement et correctement prise correct pris avoir et Vous vous sûr êtes, que vous ne enceinte êtes, pouvez vous à n'importe quel jour commencer la prise de pilule terminer et immédiatement avec le utilisation de GinoRing commencer.
- Si vous au mois précédent un patch contraceptif utilisé avez
- Insérez vous GinoRing au plus tard le premier jour après la période sans patch temps un. Ne prolongez jamais la période sans patchprescrit e

- Si Vous le patch contraceptif régulièrement et correctement appliqué avez et vous êtes sûr ,que vous n'êtes pas enceinte , sont, pouvez Vous à n'importe quel jour utilisation du patch contraceptif arrêter et immédiatement avec l' utilisation de GinoRing commencer.
- Si Vous en précédent mois une minipilule (pilule progestativepure) pris avez Vous pouvez la prise de la minipilule à n'importe quel jour arrêter et au prochain jour à habituelle heure de prise GinoRing insérer. Utilisez vous mais pendant les sept premiers jours de l'application des anneau supplémentaires méthodes contraceptives (comme un préservatif), si vous avez des rapports sexuels ..
- vous au mois précédent une injection hormonale une Injection hormonale, un implant ou un stérilet hormonal spirale (un DIU – système de libération intra-utérin de progestatif) utilisé avez Posez vous GinoRing à le Jour un, auquel le votre prochaine injection hormonale due serait, ou auquel le jour, auquel le votre implant ou le contenant des hormones stérilet retiré est. Utilisez vous pendant les premiers sept jours de l'utilisation de l'anneau méthodes contraceptives (comme un préservatif), si vous avez des rapports sexuels ..
- un accouchement Après
- un accouchement votre médecin vous conseillera, que votre médecin vous conseille, Vous Votre première normale menstruation attendre, avant vous de l' utilisation de GinoRing commencer. Parfois c'est aussi possible possible, plus tôt à commencer. Votre médecin vous conseillera .. vous allaitez et GinoRing utiliser voulez, devriez vous cela cela d'abord avec votre médecin discuter.
- Après une fausse couche ou une interruption de grossesse
- Votre médecin vous conseillera en conséquence ..

3.4 Qu'est-ce que est à faire, si ...

Votre anneau accidentellement hors de votre vagin expulsé a été

GinoRing peut accidentellement hors de vagin expulsé seront, pour exemple si il n'est pas correctement inséré a été, lors de l'extraction d'un tampon, pendant le rapport sexuel, en cas de constipation ou en cas de un prolapsus utérin. C'est pourquoi vous devriez vérifier régulièrement , sile anneau est encore dans votre vagin . (p.ex.avant et après le du Rapports sexuels).

Votre Anneau temporairement en dehors du vagin était

GinoRing peut vous éventuellement encore avant une grossesse protéger, cela est cependant de cela dépendant, combien de temps l'anneau en dehors de votre vagin était.

Si l'anneau

- moins de trois heures en dehors du vagin était, protège il vous encore avant une grossesse. Rincez Vous l'anneau avec froid à tiède (pas chaude) eau rincer et placez

Vous le dès que que possible de nouveau un, cependant seulement alors, si l'anneau n'a pas été plus de trois heures en dehors du vagin était.

- pendant le première ou deuxième semaine d'utilisation plus de trois heures en dehors du vagin était, peut il vous peut-être pas plus avant une grossesse protéger. Rincez le anneau avec de l'eau froide à tiède (pas chaude) eau et remettez l'anneau dans le Vagin un, dès que vous y pensez. L'anneau doit au moins les prochains sept jours sans interruption être inséré rester. Si vous pendant cette sept jours rapports sexuels avoir, alors utilisez vous également un préservatif pour l'homme. Êtes vous dans la première Semaine d'utilisation et vous avez pendant la précédente sept jours rapport sexuel, vous pourriez être enceinte être devenue. Dans ce cas contactez s'il vous plaît Votre médecin.
- pendant la troisième semaine d'utilisation plus de trois heures en dehors du vagin était, peut il vous éventuellement pas plus avant une grossesse protéger. Vous devriez cet anneau jeter et une des options suivantes choisir:
 - 1) Insérez vous immédiatement un nouveau anneau un. Ainsi commencez Vous la prochaines trois semaines d'utilisation. Vos règles peuvent ne pas survenir, il pourrait cependant saignements intermenstruels ou saignements de contact survenir.
 - 2) Insérez vous pas anneau en. Attendez vous vos règles avant et insérez vous puis dans de sept jours, après le précédent anneau expulsé ou retiré a été, un nouvel anneau insérer. De ce possibilité devriez vous seulement usage faire, si vous GinoRing dans les précédents sept jours sans interruption utilisé aviez.
- Si se GinoRing pour une période inconnue en dehors du vagin se trouvait, vous êtes peut-être pas protégée contre une grossesse. Vous devraient un test de grossesse effectuer et votre médecin consulter, avant vous un nouveau anneau insérer.

Votre anneau se casse

GinoRing peut casser. Dans le cadre d'une rupture de l'anneau il a été signalé des blessures dans le vagin .. vous remarquez que GinoRing GinoRing cassé est, alors utilisez vous ceci pas plus, mais commencez vous dès que possible avec un nouveau nouveaux Anneau. Utilisez vous pendant les sept prochains jours des méthodes contraceptives supplémentaires (comme un préservatif pour l'homme). Avez-vous eu des rapports sexuels Rapports sexuels avant avant Vous ont remarqué, que l'anneau cassé est, alors contactez votre médecin s'il vous plaît ..

plus de un anneau inséré mariné avoir

Il n'y a aucune notifications sur effets graves d'une surdosage des hormones contenues dans GinoRing avant contenues Si vous. plus que par inadvertance plus comme un anneau inséré avoir, peuvent Nausées, Vomissements ou Saignements intermenstruels survenir. Retirez vous les anneaux en excès et consultez Vous votre médecin sur, si ces symptômes persistent.

Vous avez oublié ,après la période sans anneaulibre un nouveau nouveau Anneau insérer

Si votre période sans anneau dure plus de sept jours a duré: Dès que vous vous en apercevez, insérez vous un nouvel anneau dans le Vagin un. Utilisez vous des méthodes contraceptives (comme un préservatif pour l'homme), si vous dans les prochains sept jours rapports sexuels avoir. Avez vous pendant la période sans anneau libre temps des rapports sexuels, alors il y a la possibilité, que vous êtes devenue enceinte. En ce cas contactez votre immédiatement médecin . Plus long temps la période sans anneau a duré , plus grand est le risque le Risque, que vous enceinte devenue êtes.

Vous oublié avez, l'anneau de retirer

- Si votre anneau entre trois à quatre semaines inséré était, est le contraceptive effet pas affecté. Continuez vous avec une semainesans anneau continuez et reprenez vous puis un nouveau Ring un.
- Si votre Ring plus de quatre semaines inséré était, il y a la possibilité enceinte de devenir. Contacter votre médecin ,avant d'insérer un nouvel anneau . Votre.

n'a pas eu lieu

- Vous avez les instructions d'utilisation pour GinoRing exactement suivi Si vos règles n'ont pas eu lieu est, vous cependant les instructions d'utilisation pour GinoRing exactement suivi et aucun autres Médicament prisutilisé avez, donc est il très improbable, que vous enceinte êtes. Continuez vous avec le Application de GinoRing comme d'habitude continue. Si vos règles toutefois deux fois consécutivement ne se produisent pas, alors il y a la possibilité, que Vous enceinte êtes. Discutez avec votre immédiatement médecin votre médecin. Appliquez vous le prochain GinoRing seulement après, que Votre médecin une grossesse exclue a.
- Vous avez les instructions d'utilisation pour GinoRing pas suivi Si vos règles n'ont pas eu lieu est, Vous le instructions d'utilisation pour GinoRing pas suivi avez et le à attendu saignement mensuel pendant la première période sansanneau libre ne se produit pas, pourrait il se peut que vous soyez enceinte .. votre médecin , avant d'insérerun nouveau GinoRing . nouveaux GinoRing insérer.

Vous inattendues saignements avez

Pendant le utilisation de GinoRing surviennent chez certaines femmes entre les normales menstruations inattendues saignements de la Vagin sur. Il pourrait être que vous des produits d'hygiène utiliser devez. Laissez vous GinoRing sur chaque cas dans le vagin et appliquer vous l' application comme d'habitude continuer. Durent les irrégulières saignements persistent, deviennent ils plus forts ou se répètent ils ces, ainsi cherchez vous s'il vous plaît votre médecin consultez.

vous le premier jour vos règles reporter voulez

Si vous GinoRing comme prescrit appliquer, sera Votre menstruation (hémorragie de privation) pendant la semaine sans anneau libre semaine commencera. Si vous le premier jour de la menstruation changer voulez, ainsi raccourcir (mais jamais prolonger!) Vous la période sans anneau libre temps.

Par exemple : Commencez votre menstruation habituellement un jour Vendredi, ainsi pouvez-vous cela à partir du prochain mois au mardi (trois jours plus tôt) déplacer. devez doivent l'anneau seulement trois jours plus tôt que d'habitude insérer.

Si vous la période sans anneau libre temps très raccourcir (par ex. trois jours ou moins), ainsi peut-il se peut que que votre menstruation mensuelle ne survienne pas. Pendant l'utilisation de l'anneau prochain peuvent cependant Saignements intermenstruels (Gouttes de sang ou taches de sang) ou hémorragies de rupture se produisent.

Consultez votre médecin pour un conseil, si vous ne vous sentez pas sûr sont, comment Vous procéder devez.

Vous Votre menstruation retarder voulez

Bien que cela ne soit pas la prescription d'utilisation recommandée correspond, pouvez Vous Votre Menstruation (hémorragie de privation) retarder, en vous passant le délai sans anneau libre et en utilisant immédiatement après l'anneau usagé un nouveau Anneau insérer.

Le nouveau anneau peut jusqu'à trois semaines dans le vagin rester. L'utilisation du nouveau Anneau peuvent saignements de contact (gouttes de sang ou taches de sang) ou saignements intermenstruels survenir. Si vous souhaitez, que vos règles commencent, retirez vous l'anneau simplement. Maintenez vous la normale semaine sans anneau période de et insérez vous ensuite un nouvel anneau un.

Vous pouvez votre médecin pour conseil demander, avant de décider de retarder vos règles mensuelles de retarder.

3.5 Si vous le traitement de GinoRing souhaitez arrêter

vous pouvez le traitement de GinoRing, quand vous voulez arrêter. Si Vous pas enceinte devenir souhaitez, alors demandez à votre médecin pour d'autres méthodes contraceptives Méthodes contraceptives.

vous l'utilisation de de GinoRing en raison d'un désir d'enfant arrêter, alors vous devriez vous attendre une menstruation normale avant d'essayer de tomber enceinte., enceinte à être. Cela aide, à calculer la date d'accouchement de calculer.

4. Quelles effets secondaires sont possibles?

Comme tous les médicaments peut ce médicament avoir des effets secondaires, qui, la mais pas chez chaque apparaître doivent. Si vous effets secondaires obtenez, en particulier en particuliersi ces sont graves et persistants, sont, ou si votre votre état de santé change et vous cela à GinoRing attribuez, parlez vous s'il vous plaît avec votre médecin.

Toutes les femmes qui utilisent des contraceptifs hormonaux combinés, ont un risque accru de caillots sanguins dans les veines (thromboembolie veineuse [VTE]) ou artères (artérielle Thromboembolie [ATE]). Pour plus de détails sur les différents risques en rapport avec l'utilisation des contraceptifs hormonaux combinés voir 2 « Que devriez-vous vous avant l'utilisation de GinoRing prendre en compte?».

Vous devriez immédiatement consulter votre médecin, si vous d'un des symptômes suivants d'un angio-œdème sur vous remarquer : gonflements du visage, langue etou gorge etou difficultés à avaler ou éruption cutanée éventuellement avec des difficultés respiratoires (voir également section

«Mises en garde et précautions d'emploi»).

Utilisatrices de GinoRing avoir sur les effets secondaires suivants signalé:

Fréquent: peut jusqu'à à 1 sur 10 femmes concerner

- Douleurs abdominales, Sensation de malaise (nausée)
- Infections du vagin par levures (comme «muguet»); inconfort dans le vagin en raison de l'anneau; démangeaisons dans la région génitale; écoulement de la vagin
- Maux de tête ou migraine; humeur dépressive Troublediminution de la libido douleurs mammaires
- Douleurs thoraciquesdouleurs dans le bassin ;règles douloureuses Règles menstruelles
- Acné
- Prise de poids
- L'anneau est expulsé

Occasionnellement: peut jusqu' à 1 sur 100 femmes concerner

- Troubles visuels; Vertiges
- Ventre gonflé; Vomissements; Diarrhée ou Constipation
- Fatigue, Malaise, Irritabilité; Changements d'humeur; Sautes d'humeur
- Rétention de liquides dans le corps (Œdèmes)
- Cystite ou Inflammation du voies urinaires
- Difficultés ou douleurs à la miction; sensation d'urgence urinaire, mictions fréquentes
- problèmes pendant les rapports sexuels comme douleurs, Saignements ou le partenaire sexuel ressent l'anneau
- Augmentation de la pression artérielle
- Augmentation de l'appétit
- Douleurs dorsales; Crampes musculaires; Douleurs dans les jambes ou bras
- Sensibilité réduite de la peau
- Douleurs thoraciques ou Augmentation des seins; fibrokystique Mastopathie (Kystes dans les seins, qui enflent ou douloureux peuvent devenir)
- Inflammation du col de l'utérus; Formation de polypes dans le col de l'utérus (Tumeurs dans le col de l'utérus); Éversion du col de l'utérus (Ectropion)
- Changements des comportements hémorragiques (il peut par ex. y avoir desrègles abondantes, longues ou irrégulières menstruations survenir ou celles-ci peuvent complètement s'arrêter); Symptômes dans la région pelvienne; syndrome prémenstruel; crampe utérine
- vaginite (causée par bactéries ou champignons); brûlure, odeur, douleurs, Plaintes ou Sécheresse dans le vagin ou les parties génitales externes
- Perte de cheveux, Eczéma, Démangeaisons, Éruption cutanée ou Bouffées de chaleur

- Urticaire

Rarement: peut à jusqu'à 1 sur 1.000 femmes affecter

- Caillots sanguins nuisibles dans une veine ou artère, par exemple :
 - o dans un jambe ou pied (c.-à-d. TVP)
 - o dans un poumon (c.-à-d. EP)
 - o infarctus du myocarde
 - o accident vasculaire cérébral
 - o mini-accident vasculaire cérébral ou transitoire, un accident vasculaire cérébral semblable à symptômes, qui sont qualifiées de transitoires ischémique attaque (AIT) désignées sont
 - o caillot sanguin dans le foie, l' estomac/intestin, les reins ou l' œil.

La probabilité de un caillot sanguin peut augmenté être, si vous souffrez d'une autre maladie qui ce risque augmente (plus d'informations sur les maladies, qui risque pour un caillot sanguin augmenter, et les symptômes d'un caillot sanguin voir section 2).

- Écoulement lacté de la glande mammaire

Non connu (Fréquence sur la base des données disponibles non estimable)

- Chloasma (taches pigmentaires jaunâtres-brunes dans la peau, principalement sur le visage)
- Problèmes de pénis chez partenaire sexuel (comme irritation cutanée, éruption cutanée, démangeaisons)
- le anneau peut sans assistance médicale pas retiré être (par exemple parce que l'anneau à la cloison vaginale adhère)
- lésions dans le vagin causées par rupture de l'anneau

Chez les utilisatrices de contraceptifs hormonaux combinés il a été rapporté cancer du sein et tumeurs hépatiques rapporté. Pour plus d'informations à ce sujet voir section 2.2 «Mises en garde et précautions d'emploi, cancer».

GinoRing peut se casser. Autres Informations à ce sujet voir section 3.4 « Que faire si votre anneau ... casse » .Rapport.

indésirables de Effets secondaires

Si vous effets secondaires remarquez, contactez votre médecin ou votre pharmacien . Cela s'applique également aux effets secondaires, qui ne sont pas mentionnés dans cette notice . sont. Vous pouvez effets secondaires également directement à l'Institut fédéral pour les médicaments et dispositifs médicaux, Dépt. Pharmacovigilance, Kurt-Georg- Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Site web : www.bfarm.de signaler.

En vous Effets secondaires signaler, pouvez Vous à cela contribuer, que plus d'informations sur la sécurité de ce médicament à disposition fournie être.

5. Comment est GinoRing à conserver?

Conservez ce médicament hors de la portée des enfants ..

vous remarquez qu'un enfant a avec le dans GinoRing contenues hormones dans Contact entré est, alors demandez votre médecin pour conseil. Pour

ce médicament sont concernant concernant le Température aucune particulières conditions de stockage nécessaires. Dans l'emballage d'origine conserver, pour protéger le contenu de la lumière contre protéger.

GinoRing doit au plus tard un mois avant expiration du sur la boîte pliante après «utilisable jusqu'à» indiquée date de péremption inséré être. La date de péremption se réfère à le dernier jour du indiqué mois.

N'utilisez pas GinoRing si vous voyez des changements de couleur ou des signes visibles de dommages remarquer.

Ce médicament peut un risque pour l'environnement représenter. Après le retrait devrait GinoRing dans le sachet remis et celui-ci correctement fermé être. Le fermé sachet devrait avec le normal déchets ménagers ou à la pharmacie pour une élimination appropriée selon les exigences locales rapporté être.

Éliminer Vous médicaments jamais par les eaux usées (p.ex. pas par les toilettes ou le lavabo). Demandez vous à Votre pharmacie, comment le médicament à éliminer est, si vous ne l'utilisez plus utiliser. Vous contribuez ainsi à la protection de l'environnement chez. Autres Informations trouvez vous sous www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Contenu de la boîte et autres informations

Ce que GinoRing contient

Les principes actifs sont: Etonogestrel et Ethinylestradiol

GinoRing contient 11,0 mg Etonogestrel et 3,474 mg Ethinylestradiol. Sur une période de 3 semaines libère l'anneau en moyenne chacun 0,120 mg Etonogestrel et 0,015 mg d'éthinylestradiol en 24 heures libre.

Le autres composants sont: Poly(éthylène-co-acétate de vinyle) (72:28) 28 % acétate de vinyle et polyuréthane (un plastique, qui n'est pas par le corps absorbé est).

À quoi GinoRing ressemble et Contenu de l'emballage

GinoRing est un anneau souple transparent transparent incolore à presque incolore anneau, avec un diamètre extérieur de 54 mm et un diamètre de section de 4 mm.

Chaque anneau est dans un Sachet en aluminium emballé. Le sachet est avec cette notice et étiquettes adhésives pour votre agenda dans une boîte pliante emballé. Les étiquettes adhésives Étiquettes adhésives aider vous à penser quand quand vous GinoRing insérer et retirer devez.

Chaque boîte contient 1 anneau

3 anneaux

6 Anneaux

Il est possible que toutes les tailles de conditionnement ne soient pas commercialisées .

Exploitant Pharmaceutique et Fabricant

Exploitant Pharmaceutique Exeltis Germany GmbH Adalperostraße 84

85737 Ismaning www.exeltis.de

Téléphone: 089 4520529 – 0

Télécopie : 089 4520529 – 99

Fabricant

Laboratorios León Farma, S.A.
Polígono Industrial Navatejera;
La Vallina s/n;
24008-Villaquilambre, León
Espagne

Ce médicament est dans les États membres de l' Espace économique européen (EEE) sous la désignation suivante approuvé:

Danemark: Ornibel 120/15 microg./24 heures, système de délivrance vaginale

Allemagne: GinoRing 0,120 mg/0,015 mg par 24 heures vaginal système de libération de substance active

Estonie : Ornique

Finlande: Ornibel 0,120 mg / 0,015 mg par 24 heures, médicament à libération prolongée, par voie vaginale

Autriche: GinoRing Anneau vaginal 0,120 mg/0,015 mg par 24 heures vaginales système de libération de substance active

Lituanie: Ornique 120/15 microgrammes/24 heures d'utilisation dans le vagin système

Lettonie: Ornique 120/15 microgrammes/24 heures vaginales d'administration sistēma

Pays-Bas: Ornibel 0,120/0,015 mg par 24 heures, dispositif pour usage vaginal

Norvège: Ornibel

Pologne: Ginoring

Suède: Ornibel

Slovaquie: Ornibel 0.120/0.015 mg pour 24 heures vaginal insert

Tchéquie: Ornibel 0,120 mg/0,015 mg par 24 heures

Hongrie: Ladeering 0.120/0.015 mg par 24 heures, système d'administration vaginal

Cette notice a été dernièrement révisée en septembre 2022.