

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

Ibuprofeeni 400 mg, tabletit

Ibuprofeeni 600 mg, tabletit

Tietoa käyttäjälle

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.
- Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.
- Saatko jonkin haittavaikutuksen, joka on mainittu kohdassa 4? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota silloin yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Tämän pakkausselosteen sisältö

1. Mikä ibuprofeeni on ja mihin tätä lääkettä käytetään?
2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen?
3. Kuinka käytät tätä lääkettä?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Kuinka säilytät tätä lääkettä?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. MIKÄ IBUPROFEENI ON JA MIHIN TÄTÄ LÄÄKETTÄ KÄYTETÄÄN?

Ibuprofeeni kuuluu ei-steroidisten tulehduskipulääkkeiden (NSAID) ryhmään. Sillä on tulehdusta, kipua ja kuumetta alentava vaikutus.

Ibuprofeeni-tabletteja käytetään erilaisten kipujen, kuten hammassäryn, päänsäryn, kuukautiskipujen, lihaskipujen ja reumaattisten kipujen hoitoon. Lisäksi kuumeen ja kivun hoitoon flunssan ja vilustumisen yhteydessä sekä rokotuksen jälkeen, akuutin ja kroonisen nivelreuman aiheuttamien kipujen ja tulehdusten hoitoon; tuki- ja liikuntaelimistön kivuliaiden tulehdusten hoitoon sekä hammashoidon ja leikkausten jälkeisten kipujen hoitoon.

2. MILLOIN ET SAA KÄYTTÄÄ TÄTÄ LÄÄKETTÄ TAI MILLOIN SINUN ON OLTAVA ERITYISEN VAROVAINEN?

Milloin et saa käyttää tätä lääkettä?

- Kun sinulla on vakava sydämen vajaatoiminta (sydämen pumppausteho on riittämätön).
- jos olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineelle. Nämä aineet löytyvät kohdasta 6.
- aiemman maha-suolikanavan verenvuodon tai perforaation esiintyessä NSAID-lääkkeiden käytön seurauksena.
- jos olet aiemmin saanut allergisia reaktioita tai astmakohtauksia, hengitysvaikeuksia, tukkoisen nenän tai ihottumaa kutinan ja paukamien kanssa käytettyäsi asetyylisalisyylihappoa tai muita tulehduskipulääkkeitä, kipulääkkeitä ja kuumetta alentavia lääkkeitä.

- jos sinulla on aiemmin ollut maha-suolikanavan verenvuoto tai perforaatio NSAID-lääkkeiden käytön seurauksena.
- jos sinulla on tai on ollut jokin seuraavista sairauksista: mahahaava, pohjukaissuolihaava, maha-suolikanavan verenvuodot tai aivoverenvuoto.
- jos sinulla on aktiivinen tai aiemmin toistuvasti esiintynyt mahahaava/verenvuoto (kaksi tai useampia selkeitä todetun haavauman tai verenvuodon jaksoja).
- jos sinulla on vakava maksan vajaatoiminta tai vakava munuaisten vajaatoiminta (munuaisten ja/tai maksan toiminta on huomattavasti heikentynyt).
- jos sinulla on taipumus verenvuotoihin tai sinua hoidetaan antikoagulanttilääkkeillä.
- kun olet raskauden kolmannella kolmanneksella.

Milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ibuprofeenin käytön yhteydessä on raportoitu allergisen reaktion merkkejä, kuten hengitysvaikeuksia, kasvojen ja kaulan alueen turvotusta (angioedeema), rintakipua. Lopeta ibuprofeenin käyttö välittömästi ja ota heti yhteys lääkäriin tai ensiapuun, jos koet jonkin näistä merkeistä.

Vakavia ihoreaktioita, mukaan lukien eksfoliatiivinen dermatiitti, erythema multiforme, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi, lääkereaktio eosinofilian ja systeemisten oireiden kanssa (DRESS), akuutti yleistynyt pustulaarinen eksanteema (AGEP) on raportoitu ibuprofeenin yhteydessä. Lopeta ibuprofeenin käyttö ja hakeudu välittömästi lääkäriin, jos koet jonkin näistä vakavista ihoreaktioista, kuten kohdassa 4 on kuvattu.

Sydänsairaudet

Tulehduskipulääkkeet/kivunlievittäjät, kuten ibuprofeeni, voivat liittyä hieman lisääntyneeseen sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskiin, erityisesti suurilla annoksilla. Älä ylitä suositeltua annosta tai hoidon kestoa.

Keskustele hoidostasi lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista, jos sinulla on:

- sydänongelmia, mukaan lukien sydämen vajaatoiminta, angina (rintakipu), tai jos sinulla on ollut sydänkohtaus, ohitusleikkaus, ääreisvaltimosairaus (huono verenkierto jaloissa tai jaloissa johtuen ahtaista tai tukkeutuneista suonista) tai aivohalvaus (mukaan lukien 'mini-aivohalvaus' tai ohimenevä iskeeminen kohtaus 'TIA').
- korkea verenpaine, diabetes tai korkea kolesteroli, suvussa sydänongelmia tai aivohalvaus, tai jos tupakoit.

Maha-suolikanavan sairaudet

Ibuprofeenin käyttöä tietyn ryhmän kipulääkkeiden kanssa, joilla on myös tulehdusta ja kuumetta alentava vaikutus (NSAID-lääkkeet), mukaan lukien selektiiviset COX-2-estäjät, tulee välttää.

Maha-suolikanavan verenvuotoja, haavaumia ja perforaatioita, jotka voivat olla hengenvaarallisia, on raportoitu ibuprofeenin käytön yhteydessä.

Iho-oireet

Vakavia iho-oireita on raportoitu tämän lääkkeen käytön yhteydessä. Lopeta lääkkeen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos saat ihottumaa, limakalvovaurioita (leesioita), rakkuloita tai muita allergisia reaktioita. Nämä voivat olla merkkejä erittäin vakavasta iho-oireesta. Katso kohta 4. Näiden reaktioiden riski on suurin ensimmäisen hoitokuukauden aikana.

Vesirokon (varicella) yhteydessä suositellaan, ettei ibuprofeenia käytetä.

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi ennen tämän lääkkeen ottamista, jos:

- Olet iäkäs, koska sinulla voi esiintyä todennäköisemmin haittavaikutuksia, erityisesti maha-suolikanavan verenvuotoja ja perforaatioita, jotka voivat olla hengenvaarallisia.
- Olet aiemmin sairastanut maha- tai pohjukaissuolihaavan, ja potilaiden, joilla on veren hyytymishäiriöitä, maksa- tai munuaistoiminnan häiriöitä, kohonnut verenpaine tai sydänsairauksia, tulee olla erityisen varovaisia ibuprofeenin käytössä.
- saat maha-suolikanavan verenvuodon, joka ilmenee mustana, erittäin pahanhajuisena ulosteena, veriarvojen poikkeavuuksia (esimerkiksi spontaanisti ilmeneviä mustelmia iholla ja limakalvoilla tai sitkeä kurkkukipu) tai merkittäviä maksan toimintahäiriöitä (esimerkiksi ihon tai silmäluomien keltaisuus), ibuprofeenihoito tulee lopettaa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä lääkäriisi.
- sinulla on infektio – katso kohta "Infektiot" alla.

Sinulla on heikentynyt munuaistoiminta. Lääkärisi voi määrätä sinulle vähemmän ibuprofeenia kuin kohdassa "Annostus" on mainittu.

Pitkäaikainen käyttö, suuret annokset ja kivunlievittäjien huolimaton käyttö voivat aiheuttaa päänsärkyä, jota ei voida hoitaa lääkkeen suuremmalla määrällä kerrallaan. Jos tämä tilanne ilmenee, sinun tulee ilmoittaa siitä lääkärille (katso Haittavaikutukset). Haittavaikutusten riski minimoidaan käyttämällä pienintä tehokasta annosta mahdollisimman lyhyen ajan.

Infektiot

Ibuprofeeni voi peittää infektioiden oireita, kuten kuumetta ja kipua. Siksi on mahdollista, että ibuprofeeni viivästyttää infektion asianmukaista hoitoa, mikä voi johtaa lisääntyneeseen komplikaatioriskiin. Tämä on havaittu bakteerien aiheuttamassa keuhkokuumeessa ja bakteeri-ihoinfektioissa, joita voi esiintyä vesirokon yhteydessä. Jos käytät tätä lääkettä infektion aikana ja infektiosi oireet jatkuvat tai pahenevat, sinun tulee välittömästi kääntyä lääkärin puoleen.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Huomaa: seuraavat huomautukset voivat koskea myös lääkkeiden käyttöä jonkin aikaa sitten tai pian.

Tässä kohdassa mainitut lääkkeet voivat olla sinulle tuttuja toisella nimellä, usein kauppanimellä. Tässä kohdassa mainitaan vain lääkkeen vaikuttavan aineen tai vaikuttavien aineiden ryhmän nimi, ei kaupp nimi! Tarkista siksi aina pakkauksesta tai pakkausselosteesta, mikä on käyttämiesi lääkkeiden vaikuttava aine.

Ibuprofeeni voi vaikuttaa muihin lääkkeisiin tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen. Esimerkiksi:

- verenhennuslääkkeet (ne ovat lääkkeitä, jotka estävät veren hyytymistä, esim. aspiriini/asetyylihalisyylisyylihappo, varfariini, tiklopidiini)
- verenpaineen alentajat (ACE:n estäjät kuten kaptopriili, beetasalpaajat kuten atenololi, angiotensiini-II-reseptorin salpaajat kuten losartaani)
- Kortikosteroidit (lisämunuaiskuoren hormoni, jolla on mm. tulehdusta ehkäisevä vaikutus, esim. prednisoloni), koska ne voivat lisätä mahahaavojen tai mahalaukun verenvuodon riskiä.
- Metotreksaatti (reuman hoidossa), koska metotreksaatin pitoisuus voi nousta 24 tuntia ennen tai jälkeen ibuprofeenin ottamisen.
- Digoksiini (sydänlääke).
- Fenytosiini (epilepsiaan).
- Litium (maanis-depressiivisyyteen).

Jotkut muut lääkkeet voivat myöskin vaikuttaa ibuprofeenihoitoon tai ibuprofeeni voi vaikuttaa niihin. Kysy siksi aina lääkäriltäsi tai apteekista ennen kuin käytät ibuprofeenia yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Oletko raskaana, epäiletkö olevasi raskaana, haluatko tulla raskaaksi tai imetätkö? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Hedelmällisyys

Tämä tuote kuuluu lääkeryhmään (NSAID:t), jotka voivat käytettäessä vaikuttaa haitallisesti naisten hedelmällisyyteen. Tämä on palautuvaa lopettamalla lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Älä käytä tätä lääkettä raskauden viimeisten kolmen kuukauden aikana; se voi vahingoittaa syntymätöntä lastasi tai aiheuttaa ongelmia synnytyksessä. Syntymätön lapsesi voi kärsiä munuais- ja sydänongelmista. Lääke voi vaikuttaa sinuun ja vauvaasi alttiuteen verenvuodoille ja johtaa siihen, että synnytys tapahtuu myöhemmin tai kestää odotettua kauemmin. Älä käytä tätä lääkettä raskauden ensimmäisten 6 kuukauden aikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä ja lääkärisi suosittele sitä. Jos sinua on hoidettava tänä aikana tai yrität tulla raskaaksi, on käytettävä pienintä mahdollista annosta ja hoidon on oltava mahdollisimman lyhyt. Raskauden 20. viikosta alkaen tämä lääke – jos sitä käytetään pidempään kuin muutama päivä – voi aiheuttaa syntymättömälle lapsellesi munuaisongelmia, mikä voi johtaa siihen, että lapsella on liian vähän lapsivettä ympärillään (oligohydramnion) tai verisuonen ahtauma lapsesi sydämessä (ductus arteriosus). Jos sinua on hoidettava pidempään kuin muutama päivä, lääkärisi voi suositella lisätarkastuksia.

Imetys

Ibuprofeeni erittyy äidinmaitoon. Kysy siksi ensin lääkäriltäsi ennen kuin päätät imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ibuprofeenin käytön yhteydessä voit kokea huimausta. Jos tunnet huimausta, ota tämä huomioon ja voi olla tarpeen olla osallistumatta liikenteeseen tai olla käyttämättä koneita.

3. MITEN KÄYTÄT TÄTÄ LÄÄKETTÄ?

Käytä tätä lääkettä aina täsmälleen kuten lääkärisi tai apteekkisi on kertonut. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Pienintä tehokasta annosta on käytettävä lyhimmän ajan, joka on tarpeen oireiden lievittämiseksi. Jos sinulla on infektio, ota heti yhteyttä lääkäriin, jos oireet (kuten kuume ja kipu) jatkuvat tai pahenevat (katso kohta 2).

Jos käytetään pienintä tehokasta annosta mahdollisimman lyhyen ajan, joka on tarpeen oireiden hallitsemiseksi, sivuvaikutukset voidaan minimoida (katso "Ole erityisen varovainen Ibuprofeenin kanssa").

Noudata aina lääkärisi määräämää käyttöä. Alla on esitetty joitakin tavanomaisia annoksia.

Lääkärisi määräämä käyttö voi kuitenkin poiketa tästä. Yritä ottaa annokset joka päivä samaan aikaan. Suositellut annokset:

Reuma ja muut nivelvaivat

1200-1600 mg päivässä jaettuna 3-4 annokseen. Vakavissa tapauksissa annosta voidaan tilapäisesti nostaa enintään 2400 mg:aan päivässä, jaettuna 4 annokseen, kunnes akuutti vaihe on hallinnassa.

Kipu hammaslääketieteellisten toimenpiteiden ja leikkausten jälkeen sekä kuukautiskipu

Aloitusannos: 1200 mg päivässä jaettuna 3-4 annokseen. Tarvittaessa annosta voidaan nostaa 1600 mg:aan päivässä jaettuna 3-4 annokseen.

Kuume ja kipu flunssan ja vilustumisen yhteydessä sekä rokotuksen jälkeen, hammassärky, päänsärky, lihaskipu ja reumaattinen kipu

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset: aloitusannos 400 mg, tarvittaessa 200-400 mg joka 4-6 tunti. Enintään 1200 mg päivässä.

Ota tabletit lasillisen vettä kanssa, aterian aikana tai heti sen jälkeen.

Reumapotilaat, joilla on aamujäykkyyttä, voivat ottaa ensimmäisen annoksen heti heräämisen jälkeen tyhjään vatsaan saadakseen nopean vaikutuksen.

Oletko käyttänyt liikaa tätä lääkettä?

Jos olet ottanut enemmän Ibuprofeenia kuin sallittu tai jos lapsi on vahingossa ottanut tätä lääkettä, sinun on välittömästi mentävä lääkärin tai lähimmän päivystyksen puoleen ja otettava lääkepakkaus ja tämä pakkausseloste mukaan.

Yliannostuksen oireita voivat olla pahoinvointi, vatsakipu, oksentelu (mahdollisesti verinen), verenvuodot mahassa ja suolistossa (katso myös kohta 4 alla), ripuli, päänsärky, korvien soiminen, sekavuus ja nopeasti liikkuvat silmät. Suurilla annoksilla on raportoitu uneliaisuutta, rintakipua, sydämentykytystä, tajunnan heikkenemistä, lihaskouristuksia koko kehossa (kouristuksia, erityisesti lapsilla), heikkouden tunnetta ja huimausta, verta virtsassa, alhainen kaliumtaso veressä, kehon kylmä

tunne ja hengitysvaikeudet. Akuutti munuaisten vajaatoiminta voi esiintyä. Lisäksi voi esiintyä matalaa verenpainetta.

Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä?

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos on kuitenkin melkein aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen.

Jos olet unohtanut ottaa useamman kuin yhden annoksen, ota yhteyttä lääkäriisi.

Jos lopetat tämän lääkkeen käytön?

Ota aina yhteyttä lääkäriisi, jos haluat lopettaa tämän lääkkeen käytön, koska kipua lievittävä ja tulehdusta vähentävä vaikutus heikkenee muutaman päivän kuluttua ja alkuperäiset oireet voivat palata.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikilla lääkkeillä, myös tällä lääkkeellä voi olla haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä saakaan.

Ibuprofeenin kaltaiset lääkkeet voivat liittyä hieman lisääntyneeseen sydänkohtauksen ("sydäninfarkti") tai aivohalvauksen riskiin.

Lopeta ibuprofeenin käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos koet jonkin seuraavista oireista:

- Punertavia, ei-koholla olevia, pyöreitä läiskiä (maalitaulun muotoisia) vartalolla, usein keskellä rakkuloita, ihon kuoriutumista, haavaumia suussa, kurkussa, nenässä, sukupuolielimissä ja silmissä. Nämä vakavat ihottumat voivat edeltää kuumetta ja flunssan kaltaisia oireita [eksfoliatiivinen dermatiitti, erythema multiforme, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi].
- Laaja-alainen ihottuma, korkea ruumiinlämpö ja suurentuneet imusolmukkeet (DRESS-oireyhtymä).
- Punainen, hilseilevä laaja-alainen ihottuma, johon liittyy ihonalaisia kyhmyjä ja rakkuloita sekä kuumetta. Oireet ilmenevät yleensä hoidon alussa (akuutti yleistynyt pustulaarinen eksanteemi).

Jos tuotetiedot sisältävät jo vastaavan tai tiukemman neuvon SCAR:ien suhteen, vastaava tai tiukempi neuvo pysyy voimassa ja sitä on noudatettava.

Lääkkeellä voi olla toivotun vaikutuksen lisäksi myös ei-toivottuja vaikutuksia, niin sanottuja haittavaikutuksia. Seuraavat haittavaikutukset voivat esiintyä ibuprofeenin käytön yhteydessä:

- ruoansulatushäiriöt, joihin liittyy ylävatsan täyteen tunne, vatsakipu, röyhtäily, pahoinvointi, oksentelu ja närästys (dyspepsia), ilmavaivat (flatulenssi), ummetus (konstipatio), vatsakipu ja ripuli, ruoansulatuskanavan verenvuoto ja haavan, perforaation, veren ulosteessa, kutina, polttava tunne ja peräsuolen limakalvon ärsytys, turvonnut limakalvo liiallisen verensaannin vuoksi, veren oksentaminen ja ruoansulatuskanavan tulehduksen paheneminen (Crohnin tauti).
- huimaus, päänsärky, korvien soiminen, uneliaisuus, unettomuus
- nesteen kertyminen (erityisesti nilkan ympärille)
- turvonnut silmät, näön hämärtyminen ja silmien ärsytys
- ihottuma ja kutina (yliherkkyyden vuoksi)

- vakava ihoreaktio, johon liittyy rakkuloita, mukaan lukien Stevens-Johnsonin oireyhtymä (tila, jossa on punaisia rakkuloita, eroosiota, veristä tai rupista ihoa) ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi (sairaus, jossa on rakkuloita ja ihon yläkerroksen kuoriutumista)
- muutoksia veren koostumuksessa
- nesteen kertyminen (edeeman muodostuminen)
- korkea verenpaine (hypertensio)
- sydämen vajaatoiminta
- vakava ihoreaktio, joka tunnetaan nimellä DRESS-oireyhtymä, voi esiintyä. DRESS-oireita ovat: ihottuma, kuume, imusolmukkeiden turvotus ja eosinofiilien (eräänlainen valkosolu) lisääntyminen.
- Punainen ihottuma ihollasi, jossa on ihonalaisia kyhmyjä ja rakkuloita. Kyhmyissä on mätää. Ihottuma esiintyy erityisesti ihopoimuissa, vartalolla ja yläraajoissa ja siihen liittyy kuumetta hoidon alussa (akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi AGEP). Lopeta tämän lääkkeen käyttö, jos saat näitä oireita, ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Esiintymistiheys tuntematon. Katso myös kohta 2.
- iho voi herkistyä valolle – esiintymistiheys tuntematon
- rintakipu, joka voi olla merkki mahdollisesta vakavasta allergisesta reaktiosta, nimeltään Kounis-oireyhtymä

Jos sinulla on kurkkukipua tai mustelmia iholla tai limakalvoilla, ota yhteyttä lääkäriisi.

Jos sinulla on verenvuotoa maha-suolikanavasta tai jos edellä mainitut haittavaikutukset ilmenevät vakavassa muodossa tai odottamattomia haittavaikutuksia ilmenee, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos saat haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (www.fimea.fi). Haittavaikutuksista ilmoittamalla voit auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. MITEN SÄILYTÄT TÄTÄ LÄÄKETTÄ?

Pidä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

Säilytä Ibuprofeeni-tabletit alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa huoneenlämmössä (15 - 25 °C).

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Se löytyy pakkauksesta merkinnän "Ei käytettäväksi jälkeen:" ja läpipainopakkausista merkinnän "Exp" jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivämäärä.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai WC:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekista, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Ne hävitetään vastuullisesti, eivätkä ne päädy ympäristöön.

6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA

Mitä aineita tämä lääke sisältää?

Tämän lääkkeen vaikuttava aine on ibuprofeeni

Muut tämän lääkkeen aineet ovat: laktoosi, mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti, kolloidinen piidioksidi, hydroksipropyylimetyyliselluloosa, glyseryylietriaseetaatti ja väriaineet titaanidioksidi (E171) ja erytrosiini (E127).

Miltä Ibuprofeeni-tabletit näyttävät ja kuinka paljon niitä on pakkauksessa?

Tabletit ovat vaaleanpunaisia.

Tabletit on pakattu laatikoihin, joissa on 3 läpipainopakkausta, joissa kussakin on 10 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

GenRx B.V. Dijkgraaf 30

6921 RL Duiven

Valmistaja:

FAL Duiven BV Dijkgraaf 30

6921 RL Duiven

Ibuprofeenitabletit on rekisteröity numerolla RVG 18544 (400 mg tabletit) ja RVG 18545 (600 mg tabletit).

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty helmikuussa 2025.