

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Jardiance 10 mg plėvele dengtos tabletės
Jardiance 25 mg plėvele dengtos tabletės
empagliflozinas

Atidžiai perskaitykite visą šį pakuotės lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.
- Jeigu turite klausimų, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
- Neduokite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Jis gali pakenkti kitiems, net jei jų simptomai tokie patys kaip jūsų.
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, apie kurį nėra paminėta 4 skyriuje, arba pasireiškė šalutinis poveikis, kuris nėra paminėtas šiame pakuotės lapelyje, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šio pakuotės lapelio turinys

1. Kas yra Jardiance ir kam jis vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Jardiance ir kam jis vartojamas?

Kas yra Jardiance?

Jardiance sudėtyje yra veikliosios medžiagos empagliflozino.

Jardiance priklauso vaistų grupei, vadinamai natrio-gliukozės kotransporterių-2 (SGLT2) inhibitoriais.

Kam vartojamas Jardiance?

2 tipo cukrinis diabetas

- Jardiance vartojamas 2 tipo cukriniam diabetui gydyti suaugusiems ir vaikams nuo 10 metų, kai negalima kontroliuoti vien mitybos planu ir fiziniu aktyvumu.
- Jardiance gali būti vartojamas be kitų vaistų pacientams, kurie negali vartoti metformino (kito antidiabetinio vaisto).
- Jardiance taip pat gali būti vartojamas kartu su kitais vaistais diabetui gydyti. Tai gali būti vaistai, vartojami per burną arba leidžiami injekcijomis, pavyzdžiui, insulinas.

Jardiance veikia blokuodamas SGLT2 baltymą inkstuose. Tai leidžia pašalinti cukrų (gliukozę) per šlapimą. Taip Jardiance sumažina cukraus kiekį kraujyje.

Šis vaistas taip pat gali padėti išvengti širdies ligų pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu.

Tęskite savo mitybos planą ir būkite aktyvūs. Svarbu tai daryti, kaip aptarta su gydytoju, vaistininku ar slaugytoju.

Širdies nepakankamumas

- Jardiance vartojamas širdies nepakankamumui gydyti suaugusiems pacientams, kurie patiria simptomus dėl sumažėjusios širdies funkcijos.

Lėtinė inkstų liga

- Jardiance vartojamas lėtinei inkstų ligai gydyti suaugusiems pacientams.

Kas yra 2 tipo cukrinis diabetas?

2 tipo cukrinis diabetas yra liga, kurią lemia tiek jūsų genetika, tiek gyvenimo būdas. Jei sergate 2 tipo cukriniu diabetu, jūsų kasa negamina pakankamai insulino, kad kontroliuotų gliukozės kiekį kraujyje, ir jūsų kūnas negali efektyviai naudoti savo insulino. Tai sukelia aukštą gliukozės koncentraciją kraujyje, kuri gali sukelti medicines problemas, tokias kaip širdies ligos, inkstų ligos, aklumas ir prasta kraujotaka rankose ir kojose.

Kas yra širdies nepakankamumas?

Širdies nepakankamumas atsiranda, kai širdis yra per silpna arba per standi ir negali tinkamai veikti. Tai gali sukelti rimtų medicininių problemų ir gydymą ligoninėje. Dažniausi širdies nepakankamumo požymiai yra dusulys, nuolatinis nuovargis arba labai didelis nuovargis ir kulkšnių patinimas.

Jardiance padeda apsaugoti jūsų širdį nuo silpnėjimo ir sumažina jūsų simptomus.

Kas yra lėtinė inkstų liga?

Lėtinė inkstų liga yra ilgalaikė liga. Ją gali sukelti kitos ligos, tokios kaip diabetas ir aukštas kraujospūdis. Taip pat gali būti, kad jūsų organizmo imuninė sistema puola inkstus. Jei turite lėtinę inkstų ligą, jūsų inkstai palaipsniui nebegali išvalyti ir filtruoti kraujo. Tai gali sukelti rimtų medicininių problemų, tokių kaip patinusios kojos, širdies nepakankamumas ar būtinybė gydytis ligoninėje.

Jardiance padeda apsaugoti jūsų inkstus nuo funkcijos praradimo.

2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?

Kada negalima vartoti šio vaisto?

- Esate alergiškas bet kuriai šio vaisto medžiagai. Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje.

Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą?

Nedelsdami susisiekite su savo gydytoju arba artimiausia ligonine:

Ketoacidozė (kraujo rūgštėjimas)

- jei pasireiškia tokie simptomai kaip greitas svorio kritimas, pykinimas ar vėmimas, pilvo skausmas, stiprus troškulys, greitas ir gilus kvėpavimas, sumišimas, neįprastas mieguistumas ar nuovargis, saldus kvapas iš burnos, saldus ar metalinis skonis burnoje arba kitoks šlapimo ar prakaito kvapas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba artimiausią ligoninę. Šie simptomai gali būti ketoacidozės – rimtos, kartais gyvybei pavojingos būklės, kai laboratoriniais tyrimais nustatomas padidėjęs ketoninių kūnų kiekis kraujyje

ar šlapime, požymis. Ilgai nevalgant ar negeriant, vartojant daug alkoholio, dehidratacijos atveju, staiga sumažinus insulino dozę arba padidėjus insulino poreikiui dėl didelių chirurginių intervencijų ar sunkios ligos, ketoacidozės rizika gali padidėti. Manote, kad turite ketoacidozę? Nedelsdami susisieki su savo gydytoju arba artimiausia ligonine. Nustokite vartoti šį vaistą, kol nepasitarsite su gydytoju.

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą ir gydymo metu susisieki su savo gydytoju, vaistininku ar slaugytoju:

- jei turite 1 tipo diabetą. Šis tipas dažniausiai prasideda jauname amžiuje ir jūsų organizmas negamina insulino. Jei turite 1 tipo diabetą, negalite vartoti Jardiance.
- jei turite rimtų inkstų problemų. Gali būti, kad gydytojas jums nurodys vartoti 1 tabletę po 10 mg kartą per dieną. Taip pat gydytojas gali paprašyti vartoti kitą vaistą (taip pat žiūrėkite 3 skyrių, „Kaip vartoti šį vaistą?“).
- jei turite rimtų kepenų problemų – gydytojas gali paprašyti vartoti kitą vaistą.
- jei jums gresia dehidratacija, pavyzdžiui:
 - jei vemiate, turite viduriavimą ar karščiavimą arba negalite valgyti ar gerti
 - jei vartojate vaistus, kurie padidina šlapimo gamybą (diuretikai) arba sumažina kraujospūdį
 - jei esate 75 metų ar vyresni.

Galimi simptomai nurodyti 4 skyriuje po „Dehidratacija“. Jūsų gydytojas gali paprašyti nutraukti Jardiance vartojimą, kol pasveiksite, kad išvengtumėte per didelio kūno skysčių praradimo. Klauskite apie būdus, kaip išvengti dehidratacijos.

- jei turite sunkią inkstų ar šlapimo takų infekciją su karščiavimu. Jūsų gydytojas gali paprašyti nutraukti Jardiance vartojimą, kol pasveiksite.

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei jaučiate simptomų derinį: skausmą, jautrumą, paraudimą ar patinimą lytinių organų srityje arba tarp lytinių organų ir išangės, kartu su karščiavimu ar bendru negalavimu. Šie simptomai gali rodyti retą, bet sunkią ar net gyvybei pavojingą infekciją, vadinamą perineumo nekrotizuojančiu fascitu arba Fournier gangrena, kuri pažeidžia audinius po oda. Fournier gangrena turi būti nedelsiant gydoma.

Pėdų priežiūra

Kaip ir visiems diabetu sergantiems pacientams, jums svarbu reguliariai tikrinti savo pėdas ir laikytis visų jūsų sveikatos priežiūros specialisto patarimų dėl pėdų priežiūros.

Inkstų funkcija

Jūsų inkstai turi būti patikrinti prieš pradėdami gydymą ir vartojant šį vaistą.

Šlapimo gliukozė (cukrus jūsų šlapime)

Dėl šio vaisto veikimo būdo jūsų šlapimas bus teigiamas cukrui, kol vartosite šį vaistą.

Vaikai ir jaunuoliai iki 18 metų

Vaikai nuo 10 metų ir vyresni, sergantys 2 tipo diabetu, gali vartoti Jardiance. Vaikams, jaunesniems nei 10 metų, duomenų nėra.

Ar jūs, ar jūsų vaikas, esate jaunesni nei 18 metų ir jums, ar jūsų vaikui, reikia gydyti širdies nepakankamumą ar lėtinę inkstų ligą? Tada Jardiance vartojimas nerekomenduojamas. Tyrimai su šiais pacientais nebuvo atlikti.

Ar vartojate kitus vaistus?

Ar vartojate kitus vaistus be Jardiance, ar neseniai vartojote, ar yra galimybė, kad netrukus vartosite kitus vaistus? Pasakykite tai savo gydytojui ar vaistininkui.

Svarbu pasakyti savo gydytojui:

- jei vartojate vaistus, kurie padidina šlapimo gamybą (diuretikai). Jūsų gydytojas gali paprašyti nutraukti Jardiance vartojimą. Galimi per didelio skysčių praradimo simptomai nurodyti 4 skyriuje.
- jei vartojate kitus vaistus, kurie mažina cukraus kiekį kraujyje, pavyzdžiui, insuliną ar „sulfonilkarbamido darinius“. Jūsų gydytojas gali norėti sumažinti šių kitų vaistų dozę, kad išvengtumėte per mažo gliukozės kiekio kraujyje (hipoglikemijos).
- jei vartojate ličio. Jardiance gali sumažinti ličio kiekį jūsų kraujyje.

Nėštumas ir žindymas

Ar esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, norite pastoti ar maitinate krūtimi? Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku. Nevartokite Jardiance, jei esate nėščia. Nežinoma, ar Jardiance gali pakenkti negimusiam vaikui. Nevartokite Jardiance, jei maitinate krūtimi. Nežinoma, ar Jardiance patenka į motinos pieną.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Jardiance turi nedidelį poveikį gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.

Šio vaisto vartojimas kartu su vaistais, vadinamais „sulfonilkarbamido dariniais“, arba su insulinu gali sukelti per mažą gliukozės kiekį kraujyje (hipoglikemiją). Tai gali sukelti tokius simptomus kaip drebulys, prakaitavimas ir regėjimo pokyčiai, ir tai gali paveikti jūsų gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus. Nevairuokite ir nenaudokite įrankių ar mechanizmų, jei jaučiatės apsvaigę vartodami Jardiance.

Jardiance sudėtyje yra laktozės

Jardiance sudėtyje yra laktozės (pieno cukraus). Jei jūsų gydytojas jums pasakė, kad netoleruojate tam tikrų cukrų, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su savo gydytoju.

Jardiance sudėtyje yra natrio

Šiame vaistiniame preparate yra mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg) vienoje tabletėje, tai reiškia, kad jis iš esmės yra „be natrio“.

3. Kaip vartoti šį vaistą?

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė jūsų gydytojas. Jei abejojate dėl teisingo vartojimo, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Kiek turėtumėte vartoti?

- Rekomenduojama pradėti vartoti Jardiance 1 kartą per dieną po 1 tabletę po 10 mg. Jei sergate 2 tipo cukriniu diabetu, jūsų gydytojas nuspręs, ar reikia padidinti dozę iki 1 tabletės po 25 mg 1 kartą per dieną, jei tai būtina jūsų cukraus kiekiui kraujyje kontroliuoti.
- Jei turite inkstų problemų, jūsų gydytojas gali apriboti dozę iki 1 tabletės po 10 mg 1 kartą per dieną.
- Jūsų gydytojas paskirs jums tinkamą stiprumą. Nepakeiskite dozės, nebent jūsų gydytojas jums tai nurodė.

Kaip vartoti šį vaistą?

- Nurykite tabletę visą su vandeniu.
- Tabletę galite vartoti su maistu arba be jo.
- Tabletę galite vartoti bet kuriuo paros metu. Tačiau stenkitės ją vartoti kasdien tuo pačiu metu. Tai padės jums prisiminti, kad ją reikia vartoti.

Jei sergate 2 tipo cukriniu diabetu, jūsų gydytojas gali skirti Jardiance kartu su kitu antidiabetiniu vaistu. Nepamirškite vartoti visų vaistų pagal gydytojo nurodymus, kad pasiektumėte geriausią rezultatą savo sveikatai.

Tinkama mitybos programa ir fizinis aktyvumas padeda jūsų kūnui geriau panaudoti cukraus kiekį kraujyje. Svarbu tęsti gydytojo rekomenduotą mitybos planą ir fizinį aktyvumą, kol vartojate Jardiance.

Ar išgėrėte per daug šio vaisto?

Jei išgėrėte per daug Jardiance, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba tiesiogiai vykite į ligoninę. Pasiimkite vaistų dėžutę.

Ar pamiršote išgerti šį vaistą?

Ką daryti, jei pamiršote išgerti tabletę, priklauso nuo to, kiek laiko liko iki kitos dozės.

- Jei iki kitos dozės liko 12 valandų ar daugiau, išgerkite Jardiance, kai tik prisiminsite. Tada kitą dozę išgerkite įprastu laiku.
- Jei iki kitos dozės liko mažiau nei 12 valandų, praleistos dozės nebevartokite. Tada kitą dozę išgerkite įprastu laiku.
- Nevartokite dvigubos Jardiance dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę.

Jei nustojate vartoti šį vaistą

Nenustokite vartoti Jardiance nepasitarę su gydytoju. Tačiau nustokite vartoti Jardiance, jei manote, kad turite ketoacidozę (žr. 'Ketoacidozė' skyriuje 'Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą?'). Jei sergate 2 tipo cukriniu diabetu ir nustojate vartoti Jardiance, jūsų cukraus kiekis kraujyje gali padidėti.

Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką ar slaugytoją.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir visi vaistai, šis vaistas gali sukelti šalutinį poveikį, nors ne kiekvienas jį patiria.

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba artimiausią ligoninę, jei pasireiškia bet kuris iš šių šalutinių poveikių:

Sunkios alerginės reakcijos, pasitaiko kartais (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 100 asmenų)

Galimi sunkios alerginės reakcijos požymiai gali būti:

- veido, lūpų, burnos, liežuvio ar gerklės patinimas, dėl kurio gali būti sunku kvėpuoti ar ryti.

Ketoacidozė (kraujo rūgštėjimas), kartais pasitaiko (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 100 asmenų)

Tai yra ketoacidozės požymiai (taip pat žr. 2 skyrių „Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą“):

- padidėjusi „ketonų kūnų“ koncentracija kraujyje ar šlapime
- greitas svorio netekimas
- pykinimas ar vėmimas
- pilvo skausmas
- stiprus troškulys
- greitas ir gilus kvėpavimas
- sumišimas
- neįprastas mieguistumas ar nuovargis
- saldus kvapas iš burnos, saldus ar metalinis skonis burnoje arba kitoks šlapimo ar prakaito kvapas.

Šie simptomai gali pasireikšti nepriklausomai nuo cukraus kiekio kraujyje. Jūsų gydytojas gali nuspręsti laikinai arba visam laikui nutraukti gydymą Jardiance.

Kuo greičiau susisieki su savo gydytoju, jei patiriate šiuos šalutinius poveikius:

Žemas cukraus kiekis kraujyje (hipoglikemija), labai dažnai pastebimas (gali pasireikšti daugiau nei 1 iš 10 asmenų)

Jei vartojate Jardiance kartu su kitu vaistu, kuris gali sukelti žemą cukraus kiekį kraujyje, pvz., sulfonilkarbamido dariniu ar insulinu, rizika susirgti žemu cukraus kiekiu kraujyje yra didesnė. Žemo cukraus kiekio kraujyje simptomai gali būti: drebulys, prakaitavimas, labai nerimastingas ar

- sumišęs jausmas, greitas širdies plakimas jaustis sutrikusiam, greitas širdies plakimas
- pernelyg didelis alkis, galvos skausmas.

Jūsų gydytojas jums pasakys, kaip gydyti mažą cukraus kiekį kraujyje ir ką daryti, jei pasireiškia bet kuris iš aukščiau paminėtų simptomų. Jei jaučiate mažo cukraus kiekio kraujyje simptomus, valgykite gliukozės tabletes, užkandį su daug cukraus arba gerkite vaisių sultis. Jei įmanoma, išmatuokite cukraus kiekį kraujyje ir pailsėkite.

Šlapimo takų infekcija, dažnai pastebima (gali pasireikšti iki 1 iš 10 žmonių) Šlapimo takų infekcijos simptomai yra:

- deginimo pojūtis šlapinantis
- šlapimas atrodo drumstas
- skausmas dubens srityje arba skausmas vidurinėje nugaros dalyje (kai inkstai yra užkrėsti).

Norėjimas šlapintis arba dažnesnis šlapinimasis gali būti dėl Jardiance veikimo mechanizmo, bet taip pat gali būti šlapimo takų infekcijos simptomai. Jei pastebite tokių simptomų padidėjimą, taip pat turėtumėte kreiptis į savo gydytoją.

Dehidratacija, labai dažnai pastebima (gali pasireikšti daugiau nei 1 iš 10 žmonių)

Dehidratacijos simptomai nėra specifiniai, bet gali būti:

- neįprastas troškulys
- lengvumo pojūtis galvoje arba galvos svaigimas atsistojus
- nualpimas arba sąmonės netekimas.

Kiti šalutiniai poveikiai vartojant Jardiance:

Dažnai

- lytinių organų grybelinė infekcija (pienligė)
- daugiau šlapinimosi nei įprastai arba dažniau reikia šlapintis
- niežulys
- odos bėrimas arba raudona oda – gali niežėti ir būti su gumbeliais, skysčio išsiskyrimu arba pūslėmis
- troškulys
- kraujo tyrimas gali parodyti padidėjusį riebalų kiekį kraujyje (cholesterolis) kraujyje (cholesterolis) rodyti
- vidurių užkietėjimas.

Kartais

- dilgėlinė
- sunku ar skausminga šlapimo pūslės ištuštinimas
- kraujo tyrimas gali parodyti sumažėjimą, susijusį su inkstų funkcija (kreatininas ar šlapalas)
- kraujo tyrimas gali parodyti padidėjusį raudonųjų kraujo kūnelių kiekį kraujyje (hematokritas).

Retai

- nekrotizuojantis perineumo fascitas arba Fournier gangrena, sunki minkštųjų audinių infekcija lytinių organų ar tarp lytinių organų ir išangės srityje.

Labai retai

- inkstų uždegimas (tubulo-intersticinė nefritas).

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką ar slaugytoją. Tai taip pat taikoma galimiems šalutiniams poveikiams, kurie nėra paminėti šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite pranešti apie šalutinį poveikį tiesiogiai per nacionalinę pranešimų sistemą, nurodytą priede V. Pranešdami apie šalutinį poveikį, galite padėti mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti šį vaistą?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Nenaudokite šio vaisto po galiojimo pabaigos datos. Ją rasite ant lizdinės plokštelės ir ant dėžutės po „EXP“. Nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data.

Šiam vaistui nėra specialių laikymo sąlygų.

Nenaudokite šio vaisto, jei pastebėjote, kad pakuotė yra pažeista arba rodo klastojimo požymius.

Neleiskite vaistų į kriauklę ar tualetą ir nemeskite jų į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebevartojate. Tinkamai pašalinus vaistus, jie bus sunaikinti atsakingai ir nepateks į aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

- Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra empagliflozinas.
Kiekvienoje tabletėje yra 10 mg arba 25 mg empagliflozino.
- Kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra:
tabletės šerdis: laktozės monohidratas (žr. 2 skyriaus pabaigoje „Jardiance sudėtyje yra laktozės“), mikrokristalinė celiuliozė, hidroksipropilceliuliozė, kroskarmeliozės natrio (žr. 2 skyriaus pabaigoje „Jardiance sudėtyje yra natrio“), koloidinis bevandenis silicio dioksidas, magnio stearatas
plėvelės danga: hipromeliozė, titano dioksidas (E171), talkas, makrogolis (400), geltonasis geležies oksidas (E172).

Kaip atrodo Jardiance ir kiek jo yra pakuotėje?

Jardiance 10 mg plėvele dengtos tabletės yra apvalios, šviesiai geltonos, abipus išgaubtos ir turi nuožulnų kraštą. Vienoje pusėje yra įspaudas „S10“, o kitoje pusėje - Boehringer Ingelheim logotipas. Tablečių skersmuo yra 9,1 mm.

Jardiance 25 mg plėvele dengtos tabletės yra ovalios, šviesiai geltonos ir abipus išgaubtos. Vienoje pusėje yra įspaudas „S25“, o kitoje pusėje - Boehringer Ingelheim logotipas. Tabletės ilgis yra 11,1 mm, o plotis - 5,6 mm.

Jardiance tabletės yra tiekiamos perforuotose PVC/aliuminio vienkartinėse lizdinėse plokštelėse. Pakuočių dydžiai yra 7 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 60 x 1, 70 x 1, 90 x 1 ir 100 x 1 plėvele dengtų tablečių.

Gali būti, kad ne visos nurodytos pakuotės dydžiai yra parduodami jūsų šalyje.

Rinkodaros teisės turėtojas
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Vokietija

Gamintojas
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Vokietija

Boehringer Ingelheim Hellas Single Member S.A.
5th km Paiania – Markopoulo
Koropi Attiki, 19441
Graikija

Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Strasse 51 – 61
59320 Ennigerloh
Vokietija

Boehringer Ingelheim France
100-104 Avenue de France
75013 Paris
Prancūzija

Transtoyou

Dėl visos informacijos apie šį vaistą kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą:

Belgija
Boehringer Ingelheim SComm
Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Lietuvos filialas
Tel.: +370 5 2595942

Bulgarija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH ir
Co KG – filialas Bulgarija
Tel: +359 2 958 79 98

Liuksemburgas
Boehringer Ingelheim SComm
Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Čekijos Respublika
Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Tel: +420 234 655 111

Vengrija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Magyarországi Fióktelepe
Tel: +36 1 299 89 00

Danmark
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Tlf: +45 39 15 88 88

Malta
Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.
Tel: +353 1 295 9620

Deutschland
Boehringer Ingelheim Pharma-
GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland
Boehringer Ingelheim B.V.
Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti
Boehringer Ingelheim RCV-
GmbH & Co KG
Estijos filialas
Tel: +372 612 8000

Norge
Boehringer Ingelheim Danmark
Norvegijos filialas
Tlf: +47 66 76 13 00

Graikija
Boehringer Ingelheim Ελλάς -
Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Τηλ: +30 2 10 89 06 300

Austrija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Tel: +43 1 80 105-7870

Ispanija
Boehringer Ingelheim España, S.A.
Tel: +34 93 404 51 00

Lenkija
Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.
Tel.: +48 22 699 0 699

Prancūzija
Boehringer Ingelheim France S.A.S.
Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugalija
Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.
Tel: +351 21 313 53 00

Kroatija
Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Tel: +385 1 2444 600

Rumunija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Viena - Bukarešto filialas
Tel: +40 21 302 28 00

Airija

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.
Tel: +353 1 295 9620

Slovėnija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Ljublianos filialas
Tel: +386 1 586 40 00

Islandija

Vistor ehf.
Tel: +354 535 7000

Slovakijos Respublika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
organizacinis padalinys
Tel: +421 2 5810 1211

Italija

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Tel: +39 02 5355 1

Suomija

Boehringer Ingelheim Finland Ky
Tel: +358 10 3102 800

Kipras

Boehringer Ingelheim Hellas
Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Τηλ: +30 2 10 89 06 300

Švedija

-

Boehringer Ingelheim AB
Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV-
GmbH & Co KG
Latvijas filiāle
Tel: +371 67 240 011

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.
Tel: +353 1 295 9620

Ši pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas {mėnuo MMMM}.

Daugiau informacijos apie šį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros svetainėje:

<http://www.ema.europa.eu>.