

## Ulotka: informacje dla pacjenta

Jardiance 10 mg tabletki powlekane  
Jardiance 25 mg tabletki powlekane  
empagliflozyna

Przeczytaj uważnie całą ulotkę przed zażyciem tego leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla Ciebie.

- Zachowaj tę ulotkę. Może być potrzebna ponownie.
- Masz jeszcze pytania? Skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
- Nie przekazuj tego leku innym, ponieważ jest on przepisany wyłącznie Tobie. Może być szkodliwy dla innych, nawet jeśli mają takie same objawy jak Ty.
- Czy wystąpił u Ciebie któryś z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4? A może wystąpiło działanie niepożądane, które nie jest wymienione w tej ulotce? Skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

## Spis treści ulotki

1. Co to jest Jardiance i w jakim celu się go stosuje?
2. Kiedy nie wolno stosować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?
3. Jak stosować ten lek?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać ten lek?
6. Zawartość opakowania i inne informacje

### 1. Co to jest Jardiance i w jakim celu się go stosuje?

Co to jest Jardiance?

Jardiance zawiera substancję czynną empagliflozynę.

Jardiance należy do grupy leków nazywanych inhibitorami kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2).

Do czego stosuje się Jardiance?

Cukrzyca typu 2

- Jardiance jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat i starszych, której nie można kontrolować jedynie za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych.
- Jardiance może być stosowany bez innych leków u pacjentów, którzy nie mogą przyjmować metforminy (innego leku przeciwcukrzycowego).
- Jardiance może być również stosowany z innymi lekami do leczenia cukrzycy. Mogą to być leki przyjmowane doustnie lub podawane w formie zastrzyków, takie jak insulina.

Jardiance działa poprzez blokowanie białka SGLT2 w nerkach. Dzięki temu cukier we krwi (glukoza) jest usuwany z moczem. W ten sposób Jardiance obniża poziom cukru we krwi.

Ten lek może również pomóc w zapobieganiu chorobom serca u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Kontynuuj swoją dietę i ćwiczenia. Ważne jest, abyś kontynuował to zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

#### Niewydolność serca

- Jardiance jest stosowany w leczeniu niewydolności serca u dorosłych pacjentów, którzy doświadczają objawów z powodu zmniejszonej funkcji serca.

#### Przewlekła choroba nerek

- Jardiance jest stosowany w leczeniu przewlekłej choroby nerek u dorosłych pacjentów.

#### Co to jest cukrzyca typu 2?

Cukrzyca typu 2 to choroba wynikająca zarówno z predyspozycji genetycznych, jak i stylu życia. Jeśli masz cukrzycę typu 2, twoja trzustka nie produkuje wystarczającej ilości insuliny, aby kontrolować poziom glukozy we krwi, a twoje ciało nie jest w stanie skutecznie wykorzystać własnej insuliny. To prowadzi do wysokiego stężenia glukozy we krwi, co może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, choroby nerek, ślepotą i słabe krążenie krwi w ramionach i nogach.

#### Co to jest niewydolność serca?

Niewydolność serca występuje, gdy serce jest zbyt słabe lub sztywne i nie może prawidłowo funkcjonować. Może to prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i hospitalizacji. Najczęstsze objawy niewydolności serca to duszność, ciągłe zmęczenie lub bardzo duże zmęczenie oraz obrzęk kostek.

Jardiance pomaga chronić twoje serce przed osłabieniem i zmniejsza twoje objawy.

#### Co to jest przewlekła choroba nerek?

Przewlekła choroba nerek to długotrwała choroba. Może być spowodowana innymi chorobami, takimi jak cukrzyca i wysokie ciśnienie krwi. Może się również zdarzyć, że układ odpornościowy organizmu atakuje nerki.

Jeśli masz przewlekłą chorobę nerek, twoje nerki stopniowo przestają oczyszczać i filtrować krew. Może to prowadzić do poważnych problemów medycznych, takich jak obrzęk nóg, niewydolność serca lub konieczność leczenia szpitalnego.

Jardiance pomaga chronić twoje nerki przed utratą funkcji.

## 2. Kiedy nie wolno przyjmować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?

#### Kiedy nie wolno przyjmować tego leku?

- Jesteś uczulony na którykolwiek ze składników tego leku. Składniki te można znaleźć w punkcie 6.

#### Kiedy należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu tego leku?

Skontaktuj się bezpośrednio z lekarzem lub najbliższym szpitalem:

#### Kwasica ketonowa (zakwaszenie krwi)

- jeśli wystąpią objawy takie jak szybka utrata masy ciała, nudności lub wymioty, ból brzucha, silne pragnienie, szybkie i głębokie oddychanie, dezorientacja, nietypowa

senność lub zmęczenie, słodki zapach oddechu, słodki lub metaliczny smak w ustach lub inny zapach moczu lub potu, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Te objawy mogą wskazywać na 'kwasicę ketonową' – poważne, czasami zagrażające życiu zaburzenie, w którym w badaniach laboratoryjnych stwierdza się podwyższone stężenie 'ciał ketonowych' we krwi lub moczu. Przy długotrwałym niejedzeniu lub niepiciu, nadmiernym spożyciu alkoholu, odwodnieniu, nagłym obniżeniu dawki insuliny lub zwiększonym zapotrzebowaniu na insulinę z powodu dużych zabiegów chirurgicznych lub ciężkiej choroby, ryzyko wystąpienia kwasicy ketonowej może być zwiększone.

Czy uważasz, że masz kwasicę ketonową? Natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Przestań przyjmować ten lek, dopóki nie skonsultujesz się z lekarzem.

Skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką przed przyjęciem tego leku i w trakcie leczenia:

- jeśli masz 'cukrzycę typu 1'. Ten typ zwykle zaczyna się w młodym wieku i organizm nie produkuje insuliny. Nie wolno stosować Jardiance, jeśli masz cukrzycę typu 1.
- jeśli masz poważne problemy z nerkami. Lekarz może zalecić przyjmowanie 1 tabletki 10 mg raz dziennie. Może również zalecić przyjmowanie innego leku (patrz także punkt 3, 'Jak przyjmować ten lek?').
- jeśli masz poważne problemy z wątrobą – lekarz może zalecić przyjmowanie innego leku.
- jeśli jesteś narażony na ryzyko odwodnienia, na przykład:
  - jeśli masz wymioty, biegunkę lub gorączkę lub jeśli nie możesz jeść ani pić
  - jeśli stosujesz leki zwiększające produkcję moczu (diuretyki) lub obniżające ciśnienie krwi
  - jeśli masz 75 lat lub więcej.

Możliwe objawy są wymienione w punkcie 4 pod 'Odwodnienie'. Twój lekarz może poprosić cię o zaprzestanie przyjmowania Jardiance, dopóki nie wyzdrowiejesz, aby zapobiec utracie zbyt dużej ilości płynów ustrojowych. Zapytaj o sposoby zapobiegania odwodnieniu.

- jeśli masz ciężką infekcję nerek lub dróg moczowych z gorączką. Twój lekarz może poprosić cię o zaprzestanie przyjmowania Jardiance, dopóki nie wyzdrowiejesz.

Natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli odczuwasz kombinację objawów takich jak ból, tkliwość, zaczerwienienie lub obrzęk narządów płciowych lub okolicy między narządami płciowymi a odbytem, z gorączką lub ogólnym złym samopoczuciem. Objawy te mogą wskazywać na rzadką, ale poważną lub nawet zagrażającą życiu infekcję, zwaną martwiczym zapaleniem powięzi krocza lub zgorzelą Fourniera, która uszkadza tkankę pod skórą. Zgorzel Fourniera wymaga natychmiastowego leczenia.

#### Pielęgnacja stóp

Podobnie jak w przypadku wszystkich pacjentów z cukrzycą, ważne jest, abyś regularnie sprawdzał swoje stopy i stosował się do wszelkich zaleceń dotyczących pielęgnacji stóp od swojego opiekuna zdrowotnego.

#### Funkcja nerek

Twoje nerki powinny być kontrolowane przed rozpoczęciem leczenia i podczas stosowania tego leku.

#### Glukoza w moczu (cukier w moczu)

Ze względu na sposób działania tego leku, twój mocz będzie pozytywnie testowany na obecność cukru podczas stosowania tego leku.

Dzieci i młodzież do 18 lat

Dzieci w wieku 10 lat i starsze z cukrzycą typu 2 mogą stosować Jardiance. Dla dzieci poniżej 10 roku życia brak jest dostępnych danych.

Czy ty lub twoje dziecko jesteście młodszy niż 18 lat i musicie być leczeni z powodu niewydolności serca lub przewlekłej choroby nerek? W takim przypadku stosowanie Jardiance nie jest zalecane. Nie przeprowadzono badań u tych pacjentów.

Czy stosujesz inne leki?

Czy stosujesz inne leki oprócz Jardiance, czy niedawno to robiłeś, lub czy istnieje możliwość, że wkrótce zaczniesz stosować inne leki? Powiedz o tym swojemu lekarzowi lub farmaceucie. Ważne jest, aby powiedzieć swojemu lekarzowi:

- jeśli stosujesz leki zwiększające produkcję moczu (diuretyki). Twój lekarz może poprosić cię o zaprzestanie przyjmowania Jardiance. Możliwe objawy utraty zbyt dużej ilości płynów z organizmu są wymienione w punkcie 4.
- jeśli stosujesz inne leki obniżające poziom cukru we krwi, takie jak insulina lub pochodne sulfonilomocznika. Twój lekarz może chcieć zmniejszyć dawkę tych innych leków, aby zapobiec zbyt niskiemu poziomowi glukozy we krwi (hipoglikemii).
- jeśli stosujesz lit. Jardiance może obniżyć poziom litu we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Czy jesteś w ciąży, myślisz, że możesz być w ciąży, planujesz ciążę lub karmisz piersią? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą przed użyciem tego leku. Nie stosuj Jardiance, jeśli jesteś w ciąży. Nie wiadomo, czy Jardiance jest szkodliwy dla nienarodzonego dziecka. Nie stosuj Jardiance, jeśli karmisz piersią. Nie wiadomo, czy Jardiance przenika do mleka matki.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Jardiance ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przyjmowanie tego leku w połączeniu z lekami zwanymi „pochodnymi sulfonilomocznika” lub z insuliną może powodować zbyt niskie stężenie glukozy we krwi (hipoglikemię). Może to prowadzić do objawów takich jak drżenie, pocenie się i zmiany w widzeniu, i może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Nie prowadź pojazdów ani nie obsługuj narzędzi lub maszyn, jeśli czujesz się zawroty głowy podczas stosowania Jardiance.

Jardiance zawiera laktozę

Jardiance zawiera laktozę (cukier mleczny). Jeśli lekarz poinformował cię, że nie tolerujesz niektórych cukrów, skontaktuj się z lekarzem przed użyciem tego leku.

Jardiance zawiera sól

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, co oznacza, że jest zasadniczo „bezsodowy”.

### 3. Jak przyjmować ten lek?

Zawsze przyjmuj ten lek dokładnie tak, jak zalecił ci lekarz. Jeśli masz wątpliwości co do prawidłowego stosowania, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Ile należy przyjmować?

- Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania Jardiance 1 raz dziennie 1 tabletki 10 mg. Jeśli masz cukrzycę typu 2, lekarz zdecyduje, czy dawka zostanie zwiększona do 1 tabletki 25 mg 1 raz dziennie, jeśli to konieczne, aby kontrolować poziom cukru we krwi.
- Lekarz może ograniczyć dawkę do 1 tabletki 10 mg 1 raz dziennie, jeśli masz problemy z nerkami.
- Lekarz przepisze dawkę odpowiednią dla ciebie. Nie zmieniaj dawki, chyba że lekarz ci to zalecił.

Jak przyjmować ten lek?

- Połknij tabletkę w całości, popijając wodą.
- Możesz przyjmować tabletkę z jedzeniem lub bez.
- Możesz przyjmować tabletkę o dowolnej porze dnia. Staraj się jednak przyjmować ją codziennie o tej samej porze. To pomoże ci pamiętać o jej przyjęciu.

Jeśli masz cukrzycę typu 2, lekarz może przepisać Jardiance razem z innym lekiem przeciwcukrzycowym. Pamiętaj, aby przyjmować wszystkie leki zgodnie z zaleceniami lekarza, aby osiągnąć najlepsze wyniki dla swojego zdrowia.

Odpowiedni plan żywieniowy i ćwiczenia fizyczne pomagają organizmowi lepiej wykorzystywać cukier we krwi. Ważne jest, aby kontynuować plan żywieniowy i ćwiczenia zalecane przez lekarza podczas stosowania Jardiance.

Czy zażyłeś zbyt dużą dawkę tego leku?

Jeśli zażyłeś zbyt dużą dawkę Jardiance, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub udaj się bezpośrednio do szpitala. Zabierz ze sobą opakowanie leku.

Czy zapomniałeś zażyć tego leku?

To, co powinieneś zrobić, jeśli zapomnisz zażyć tabletkę, zależy od tego, ile czasu pozostało do następnej dawki.

- Jeśli do następnej dawki pozostało 12 godzin lub więcej, zażyj Jardiance, gdy tylko sobie przypomnisz. Następnie zażyj kolejną dawkę o zwykłej porze.
- Jeśli do następnej dawki pozostało mniej niż 12 godzin, nie należy już zażywać pominiętej dawki. Następnie zażyj kolejną dawkę o zwykłej porze.
- Nie zażywaj podwójnej dawki Jardiance, aby nadrobić pominiętą dawkę.

Jeśli przestaniesz zażywać ten lek

Nie przestawaj zażywać Jardiance bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Przestań zażywać Jardiance, jeśli podejrzewasz, że masz kwasicę ketonową (patrz 'Kwasica ketonowa' w sekcji 'Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując ten lek?'). Jeśli masz cukrzycę typu 2 i przestaniesz zażywać Jardiance, poziom cukru we krwi może wzrosnąć.

Masz inne pytania dotyczące stosowania tego leku? Skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

#### 4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek również może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeśli wystąpią u Ciebie następujące działania niepożądane:

Ciężka reakcja alergiczna, występuje czasami (może wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób)

Możliwe cechy ciężkiej reakcji alergicznej mogą obejmować:

- obrzęk twarzy, warg, ust, języka lub gardła, co może utrudniać oddychanie lub połykanie.

Kwasica ketonowa (zakwaszenie krwi), występuje czasami (może wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób)

To są cechy kwasicy ketonowej (patrz także punkt 2 'Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując ten lek?'):

- zwiększone stężenie 'ciał ketonowych' we krwi lub moczu
- szybka utrata masy ciała
- nudności lub wymioty
- ból brzucha
- silne pragnienie
- szybkie i głębokie oddychanie
- dezorientacja
- nietypowa senność lub zmęczenie
- słodki zapach oddechu, słodki lub metaliczny smak w ustach lub inny zapach moczu lub potu.

Te objawy mogą wystąpić niezależnie od poziomu cukru we krwi. Twój lekarz może zdecydować o tymczasowym lub trwałym przerwaniu leczenia Jardiance.

Skontaktuj się jak najszybciej z lekarzem, jeśli doświadczysz następujących działań niepożądanych:

Niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia), bardzo często obserwowany (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)

Jeśli przyjmujesz Jardiance z innym lekiem, który może powodować niski poziom cukru we krwi, takim jak pochodna sulfonilomocznika lub insulina, ryzyko wystąpienia niskiego poziomu cukru we krwi jest wyższe. Objawy niskiego poziomu cukru we krwi mogą obejmować:

- drżenie, pocenie się, silny niepokój lub uczucie dezorientacji, szybkie bicie serca
- nadmierny głód, ból głowy.

Twój lekarz powie Ci, jak leczyć niski poziom cukru we krwi i co zrobić, jeśli wystąpią u Ciebie któreś z wymienionych dolegliwości. Jeśli masz objawy niskiego poziomu cukru we krwi, zjedz tabletki glukozy, przekąskę z dużą ilością cukru lub wypij sok owocowy. Jeśli to możliwe, zmierz poziom cukru we krwi i odpocznij.

Zakażenie dróg moczowych, często obserwowane (może wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób) Objawy zakażenia dróg moczowych to:

- pieczenie podczas oddawania moczu
- mocz wygląda na mętny

- ból w miednicy lub ból w środkowej części pleców (gdy nerki są zainfekowane).

Potrzeba oddawania moczu lub częstsze oddawanie moczu może być spowodowane mechanizmem działania Jardiance, ale mogą to być również objawy zakażenia dróg moczowych. Jeśli zauważysz nasilenie takich objawów, skontaktuj się również z lekarzem.

Odwodnienie, bardzo często obserwowane (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)

Objawy odwodnienia nie są specyficzne, ale mogą obejmować:

- nietypowe pragnienie
- uczucie lekkości w głowie lub zawroty głowy przy wstawaniu
- omdlenie lub utrata przytomności.

Inne działania niepożądane podczas przyjmowania Jardiance:

Często

- grzybica narządów płciowych (drożdżyca)
- częstsze oddawanie moczu niż zwykle lub potrzeba częstszego oddawania moczu
- swędzenie
- wysypka skórna lub zaczerwienienie skóry – może swędzieć i towarzyszyć jej mogą guzki, wydzielina lub pęcherze
- pragnienie
- badanie krwi może wykazać wzrost poziomu tłuszczów w krwi (cholesterol)
- zaparcia.

Czasami

- pokrzywka
- trudności lub ból przy opróżnianiu pęcherza
- badanie krwi może wykazać spadek związany z funkcją nerek (kreatynina lub mocznik)
- badanie krwi może wykazać wzrost liczby czerwonych krwinek we krwi (hematokryt).

Rzadko

- martwicze zapalenie powięzi krocza lub zgorzel Fourniera, poważna infekcja tkanek miękkich narządów płciowych lub obszaru między narządami płciowymi a odbytem.

Bardzo rzadko

- zapalenie nerek (śródmięszowe zapalenie nerek).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią działania niepożądane, skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Dotyczy to również możliwych działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce. Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio poprzez krajowy system zgłaszania wymieniony w załączniku V. Zgłaszając działania niepożądane, możesz pomóc nam uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku.

## 5. Jak przechowywać ten lek?

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie używać tego leku po upływie terminu ważności. Termin ten znajduje się na opakowaniu blistra i na pudełku po 'EXP'. Podana jest tam data miesiąca i roku. Ostatni dzień tego miesiąca to data ważności.

Dla tego leku nie ma specjalnych warunków przechowywania.

Nie używać tego leku, jeśli zauważysz, że opakowanie jest uszkodzone lub nosi ślady manipulacji.

Nie wylewaj leków do zlewu ani toalety i nie wyrzucaj ich do kosza na śmieci. Zapytaj farmaceutę, co zrobić z lekami, których już nie używasz. Prawidłowe usuwanie leków zapewnia ich odpowiedzialne zniszczenie i zapobiega przedostawaniu się do środowiska.

## 6. Zawartość opakowania i inne informacje

Jakie substancje zawiera ten lek?

- Substancją czynną w tym leku jest empagliflozyna.  
Każda tabletką zawiera 10 mg lub 25 mg empagliflozyny.
- Inne substancje w tym leku to:  
rdzeń tabletki: laktoza jednowodna (patrz koniec punktu 2 pod 'Jardiance zawiera laktozę'), celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa (patrz koniec punktu 2 pod 'Jardiance zawiera sól'), koloidalny bezwodny dwutlenek krzemu, stearynian magnezu  
otoczka: hypromeloza, dwutlenek tytanu (E171), talk, makrogol (400), żółty tlenek żelaza (E172).

Jak wygląda Jardiance i ile znajduje się w opakowaniu?

Jardiance 10 mg tabletki powlekane są okrągłe, jasnożółte, dwuwypukłe i mają ścięte krawędzie. Na jednej stronie mają napis 'S10', a na drugiej logo Boehringer Ingelheim. Tabletki mają średnicę 9,1 mm.

Jardiance 25 mg tabletki powlekane są owalne, jasnożółte i dwuwypukłe. Na jednej stronie mają napis 'S25', a na drugiej logo Boehringer Ingelheim. Tabletki mają długość 11,1 mm i szerokość 5,6 mm.

Tabletki Jardiance są dostępne w perforowanych blistrach PVC/aluminium z jednostkowymi dawkami. Rozmiary opakowań to 7 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 60 x 1, 70 x 1, 90 x 1 i 100 x 1 tabletki powlekane.

Nie wszystkie wymienione rozmiary opakowań mogą być dostępne w Twoim kraju.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu  
Boehringer Ingelheim International GmbH  
Binger Strasse 173  
55216 Ingelheim am Rhein  
Niemcy

Producent  
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173  
55216 Ingelheim am Rhein  
Niemcy

Boehringer Ingelheim Hellas Single Member S.A.  
5th km Paiania – Markopoulo  
Koropi Attiki, 19441  
Grecja

Rottendorf Pharma GmbH  
Ostenfelder Strasse 51 – 61  
59320 Ennigerloh  
Niemcy

Boehringer Ingelheim France  
100-104 Avenue de France  
75013 Paryż  
Francja

Transtoyou

W celu uzyskania wszelkich informacji na temat tego leku prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

Belgia  
Boehringer Ingelheim SComm  
Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Litwa  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Filia Litwy  
Tel.: +370 5 2595942

Bułgaria  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH i  
Co KG – oddział Bułgaria  
Tel: +359 2 958 79 98

Luksemburg  
Boehringer Ingelheim SComm  
Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Republika Czeska  
Boehringer Ingelheim spol. s r.o.  
Tel: +420 234 655 111

Węgry  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Magyarországi Fióktelepe  
Tel: +36 1 299 89 00

Dania  
Boehringer Ingelheim Danmark A/S  
Tlf: +45 39 15 88 88

Malta  
Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.  
Tel: +353 1 295 9620

Niemcy  
Boehringer Ingelheim Pharma-  
GmbH & Co. KG  
Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Holandia  
Boehringer Ingelheim B.V.  
Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Estonia  
Boehringer Ingelheim RCV-  
GmbH & Co KG  
Eesti filiaal  
Tel: +372 612 8000

Norwegia  
Boehringer Ingelheim Danmark  
Norwegian branch  
Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα  
Boehringer Ingelheim Ελλάς -  
Μονοπρόσωπη Α.Ε.  
Τηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Tel: +43 1 80 105-7870

España  
Boehringer Ingelheim España, S.A.  
Tel: +34 93 404 51 00

Polska  
Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.  
Tel.: +48 22 699 0 699

Francja  
Boehringer Ingelheim France S.A.S.  
Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugalia  
Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.  
Tel: +351 21 313 53 00

Chorwacja  
Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.  
Tel: +385 1 2444 600

Rumunia  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Wiedeń - Oddział Bukareszt  
Tel: +40 21 302 28 00

Irlandia  
Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.  
Tel: +353 1 295 9620

Słowenia  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Oddział Lublana  
Tel: +386 1 586 40 00

Islandia  
Vistor ehf.  
Tel: +354 535 7000

Republika Słowacka  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
jednostka organizacyjna  
Tel: +421 2 5810 1211

Włochy  
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.  
Tel: +39 02 5355 1

Finlandia  
Boehringer Ingelheim Finland Ky  
Tel: +358 10 3102 800

Cypr  
Boehringer Ingelheim Hellas  
Μονοπρόσωπη Α.Ε.  
Τηλ: +30 2 10 89 06 300

Szwecja  
-  
Boehringer Ingelheim AB  
Tel: +46 8 721 21 00

Łatwija  
Boehringer Ingelheim RCV-  
GmbH & Co KG  
Latvijas filiāle  
Tel: +371 67 240 011

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)  
Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.  
Tel: +353 1 295 9620

Ta ulotka została ostatnio zatwierdzona w {miesiąc RRRR}.

Więcej informacji o tym leku jest dostępnych na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków: <http://www.ema.europa.eu>.