

## Notice d'emballage

Kliovance® 1 mg/0,5 mg comprimés pelliculés

Estradiol/acétate de noréthistérone

Lisez attentivement cette notice avant de commencer à prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne le donnez pas à d'autres personnes.

Cela pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre

pharmacien. Cela inclut tout effet indésirable possible non mentionné dans cette notice.

Voir section 4.

## Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Kliovance® et dans quel cas est-il utilisé
2. Ce que vous devez savoir avant de prendre Kliovance®
3. Comment prendre Kliovance®
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver Kliovance®
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que Kliovance® et à quoi sert-il

Kliovance® est un traitement hormonal substitutif (THS) combiné continu. Il contient deux types d'hormones féminines, un œstrogène et un progestatif. Kliovance® est utilisé chez les femmes ménopausées depuis au moins 1 an après leurs dernières règles naturelles.

Kliovance® est utilisé pour :

#### Soulagement des symptômes survenant après la ménopause

Pendant la ménopause, la quantité d'œstrogène produite par le corps d'une femme diminue.

Cela peut provoquer des symptômes tels que des bouffées de chaleur au niveau du visage, du cou et de la poitrine ('bouffées de chaleur'). Kliovance® atténue ces symptômes après la ménopause. Vous ne recevrez une prescription de Kliovance® que si vos symptômes entravent sérieusement votre vie quotidienne.

#### Prévention de l'ostéoporose

Après la ménopause, certaines femmes peuvent développer des os fragiles (ostéoporose). Vous devriez discuter de toutes les options disponibles avec votre médecin.

Si vous êtes à risque accru de fractures en raison de l'ostéoporose et que d'autres médicaments ne vous conviennent pas, vous pouvez utiliser Kliovance® pour prévenir l'ostéoporose après la ménopause.

Kliovance® est prescrit pour les femmes qui n'ont pas subi d'ablation de l'utérus et dont les règles ont cessé depuis plus d'un an.

Il n'y a qu'une expérience limitée du traitement des femmes de plus de 65 ans avec Kliovance®.

## 2. Ce que vous devez savoir avant de prendre Kliovance®

### Antécédents médicaux et examens réguliers

L'utilisation du THS comporte des risques qui doivent être pris en compte lors de la décision de commencer ou de continuer à le prendre.

L'expérience dans le traitement des femmes avec une ménopause prématurée (due à une insuffisance ovarienne ou à une chirurgie) est limitée. Si vous avez une ménopause prématurée, les risques liés à l'utilisation du THS peuvent être différents. Veuillez en parler à votre médecin.

Avant de commencer (ou de recommencer) le THS, votre médecin vous interrogera sur vos antécédents médicaux personnels et familiaux. Votre médecin peut décider de réaliser un examen physique. Cela peut inclure un examen de vos seins et/ou un examen interne, si nécessaire.

Une fois que vous avez commencé Kliovance®, vous devriez consulter votre médecin pour des examens réguliers (au moins une fois par an). Lors de ces examens, discutez avec votre médecin des avantages et des risques de continuer avec Kliovance®.

Faites des dépistages réguliers du sein, comme recommandé par votre médecin.

### Ne prenez pas Kliovance®

Si l'un des cas suivants s'applique à vous. Si vous n'êtes pas sûr de l'un des points ci-dessous, parlez-en à votre médecin avant de prendre Kliovance®.

#### Ne prenez pas Kliovance®:

Si vous avez, avez eu ou suspectez d'avoir un cancer du sein.

Si vous avez ou avez eu un cancer sensible aux œstrogènes, comme le cancer de la muqueuse de l'utérus (endomètre), ou si vous êtes suspecté d'en avoir un.

Si vous avez des saignements vaginaux inexplicables.

Si vous avez un épaissement excessif de la muqueuse de l'utérus (hyperplasie de l'endomètre) qui n'est pas traité.

Si vous avez ou avez déjà eu un caillot sanguin dans une veine (thrombose), comme dans les jambes (thrombose veineuse profonde) ou les poumons (embolie pulmonaire).

Si vous avez un trouble de la coagulation sanguine (tel qu'une déficience en protéine C, protéine S ou antithrombine).

Si vous avez ou avez déjà eu une maladie causée par des caillots sanguins dans les artères, comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une angine de poitrine.

Si vous avez ou avez déjà eu une maladie du foie et que vos tests de fonction hépatique ne sont pas revenus à la normale.

Si vous avez un problème sanguin rare appelé 'porphyrie' qui est transmis dans les familles (héréditaire).

Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'estradiol, à l'acétate de noréthistérone ou à l'un des autres ingrédients de Kliovance® (listés à la section 6 'Contenu de l'emballage et autres informations').

Si l'une des conditions ci-dessus apparaît pour la première fois pendant que vous prenez Kliovance®, arrêtez de le prendre immédiatement et consultez votre médecin immédiatement.

### Avertissements et précautions

Informez votre médecin si vous avez déjà eu l'un des problèmes suivants, avant de commencer le traitement, car ceux-ci peuvent réapparaître ou s'aggraver pendant le traitement avec Kliovance®. Si c'est le cas, vous devriez consulter votre médecin plus souvent pour des contrôles :

fibromes à l'intérieur de votre utérus  
croissance de la muqueuse utérine en dehors de votre utérus (endométriose) ou antécédents de croissance excessive de la muqueuse utérine (hyperplasie endométriale)  
risque accru de développer des caillots sanguins (voir 'Caillots sanguins dans une veine (thrombose)')  
risque accru de développer un œstrogène-sensible au cancer (comme avoir une mère, une sœur ou une grand-mère qui a eu un cancer du sein)  
hypertension artérielle  
un trouble hépatique, tel qu'un tumeur  
diabète  
calculs biliaires  
migraine ou maux de tête sévères  
une maladie du système immunitaire qui affecte de nombreux organes du corps (lupus érythémateux systémique, LES)  
épilepsie  
asthme  
une maladie affectant le tympan et l'audition (otosclérose)  
un niveau très élevé de graisses dans votre sang (triglycérides)  
rétention de liquide due à des problèmes cardiaques ou rénaux  
intolérance au lactose.

Arrêtez de prendre Kliovance® et consultez un médecin immédiatement

Si vous remarquez l'un des éléments suivants lors de la prise de THS :

l'une des conditions mentionnées dans la section 'Ne prenez pas Kliovance®'  
jaunissement de votre peau ou du blanc de vos yeux (jaunisse). Ceux-ci peuvent être des signes d'une maladie du foie  
une forte augmentation de votre pression artérielle (les symptômes peuvent être des maux de tête, de la fatigue, des étourdissements)  
des maux de tête de type migraineux qui surviennent pour la première fois  
si vous tombez enceinte  
si vous remarquez des signes de caillot sanguin, tels que :

- gonflement douloureux et rougeur des jambes
- douleur thoracique soudaine
- difficulté à respirer.

Pour plus d'informations, voir 'Caillots sanguins dans une veine (thrombose)'.

Remarque : Kliovance® n'est pas un contraceptif. Si cela fait moins de 12 mois depuis vos dernières règles ou si vous avez moins de 50 ans, vous pourriez encore avoir besoin d'utiliser une

contraception supplémentaire pour prévenir une grossesse. Parlez à votre médecin pour obtenir des conseils.

## THS et cancer

Épaississement excessif de la muqueuse de l'utérus (hyperplasie de l'endomètre) et cancer de la muqueuse de l'utérus (cancer de l'endomètre)

Prendre œstrogène-seul THS augmentera le risque d'épaississement excessif de la muqueuse de l'utérus (hyperplasie de l'endomètre) et de cancer de la muqueuse de l'utérus (cancer de l'endomètre).

Le progestatif dans Kliovance® vous protège de ce risque supplémentaire.

## Saignements irréguliers

Vous pouvez avoir des saignements irréguliers ou des gouttes de sang (spotting) pendant les 3 à 6 premiers mois de prise de Kliovance®.

Cependant, si les saignements irréguliers :

- se poursuivent pendant plus de 6 mois

- commencent après que vous ayez pris Kliovance® pendant plus de 6 mois

- continue après avoir arrêté de prendre Kliovance®

consultez votre médecin dès que possible.

## Cancer du sein

Les preuves montrent que la prise de œstrogène-progestatif ou œstrogène-seul THS augmente le risque de cancer du sein. Le risque supplémentaire dépend de la durée de prise du THS. Le risque supplémentaire devient évident après 3 ans d'utilisation. Après l'arrêt du THS, le risque supplémentaire diminuera avec le temps, mais le risque peut persister pendant 10 ans ou plus si vous avez utilisé le THS pendant plus de 5 ans.

## Comparer

Les femmes âgées de 50 à 54 ans qui ne prennent pas de THS, en moyenne, 13 à 17 sur 1 000 seront diagnostiquées avec un cancer du sein sur une période de 5 ans.

Pour les femmes âgées de 50 ans qui commencent à prendre un THS œstrogène-seul pendant 5 ans, il y aura 16-17 cas sur 1 000 utilisatrices (c'est-à-dire 0 à 3 cas supplémentaires).

Pour les femmes âgées de 50 ans qui commencent à prendre un THS œstrogène-progestatif pendant 5 ans, il y aura 21 cas sur 1 000 utilisatrices (c'est-à-dire 4 à 8 cas supplémentaires).

Les femmes âgées de 50 à 59 ans qui ne prennent pas de THS, en moyenne, 27 sur 1 000 seront diagnostiquées avec un cancer du sein sur une période de 10 ans.

Pour les femmes de 50 ans qui commencent à prendre œstrogène-seul THS pendant 10 ans, il y aura 34 cas sur 1 000 utilisatrices (c'est-à-dire 7 cas supplémentaires).

Pour les femmes de 50 ans qui commencent à prendre œstrogène-progestatif THS pendant 10 ans, il y aura 48 cas sur 1 000 utilisatrices (c'est-à-dire 21 cas supplémentaires).

Vérifiez régulièrement vos seins. Consultez votre médecin si vous remarquez des changements tels que :

- plissement de la peau
- changements au niveau du mamelon
- toute masse que vous pouvez voir ou sentir.

De plus, il est conseillé de participer aux programmes de dépistage par mammographie lorsqu'ils vous sont proposés. Pour le dépistage par mammographie, il est important d'informer l'infirmière/professionnel de santé qui réalise la radiographie que vous utilisez un THS, car ce médicament peut augmenter la densité de vos seins, ce qui peut affecter le résultat de la mammographie. Lorsque la densité du sein est augmentée, la mammographie peut ne pas détecter toutes les masses.

### Cancer de l'ovaire

Le cancer de l'ovaire est rare, beaucoup plus rare que le cancer du sein. L'utilisation de œstrogène-seul ou combiné œstrogène-progestatif THS a été associée à un risque légèrement accru de cancer de l'ovaire. Le risque de cancer de l'ovaire varie avec l'âge. Par exemple, chez les femmes âgées de 50 à 54 ans qui ne prennent pas de THS, environ 2 femmes sur 2 000 seront diagnostiquées avec un cancer de l'ovaire sur une période de 5 ans.

Pour les femmes qui ont pris un THS pendant 5 ans, il y aura environ 3 cas pour 2 000 utilisatrices (c'est-à-dire environ 1 cas supplémentaire).

### Effet du THS sur le cœur et la circulation

#### Caillots sanguins dans une veine (thrombose)

Le risque de caillots sanguins dans les veines est environ 1,3 à 3 fois plus élevé chez les utilisatrices de THS que chez les non-utilisatrices, surtout pendant la première année de traitement.

Les caillots sanguins peuvent être graves, et si l'un d'eux se déplace vers les poumons, il peut provoquer des douleurs thoraciques, un essoufflement, des évanouissements ou même la mort. Vous êtes plus susceptible de développer un caillot sanguin dans vos veines en vieillissant et si l'une des situations suivantes s'applique à vous. Informez votre médecin si l'une de ces situations s'applique à vous :

- vous êtes incapable de marcher pendant une longue période en raison d'une chirurgie majeure, d'une blessure ou d'une maladie (voir aussi section 3 'Si vous devez subir une intervention chirurgicale')
- vous êtes gravement en surpoids (IMC > 30 kg/m<sup>2</sup>)
- vous avez un problème de coagulation sanguine qui nécessite un traitement à long terme avec un médicament utilisé pour prévenir les caillots sanguins
- si l'un de vos proches a déjà eu un caillot sanguin dans la jambe, le poumon ou un autre organe
- vous avez un lupus érythémateux systémique (LES)
- vous avez un cancer.

Pour les signes d'un caillot sanguin, voir 'Arrêtez de prendre Kliovance® et consultez un médecin immédiatement'.

#### Comparer

En regardant les femmes dans la cinquantaine qui ne prennent pas de THS, en moyenne, sur une période de 5 ans, 4 à 7 sur 1 000 devraient avoir un caillot sanguin dans une veine.

Pour les femmes dans la cinquantaine qui prennent un THS œstrogène-progestatif depuis plus de 5 ans, il y aura 9 à 12 cas sur 1 000 utilisatrices (c'est-à-dire 5 cas supplémentaires).

#### Maladie cardiaque (crise cardiaque)

Il n'y a aucune preuve que le THS prévienne une crise cardiaque. Les femmes de plus de 60 ans qui utilisent œstrogène-progestatif THS sont légèrement plus susceptibles de développer une maladie cardiaque que celles qui ne prennent pas de THS.

#### Accident vasculaire cérébral

Le risque d'avoir un AVC est environ 1,5 fois plus élevé chez les utilisatrices de THS que chez les non-utilisatrices. Le nombre de cas supplémentaires d'AVC dus à l'utilisation du THS augmentera avec l'âge.

#### Comparer

En regardant les femmes dans la cinquantaine qui ne prennent pas de THS, en moyenne, 8 sur 1 000 seraient censées avoir un AVC sur une période de 5 ans.

Pour les femmes dans la cinquantaine qui prennent du THS, il y aura 11 cas sur 1 000 utilisatrices sur 5 ans (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires).

#### Autres conditions

Le THS ne prévient pas la perte de mémoire. Il existe certaines preuves d'un risque accru de perte de mémoire chez les femmes qui commencent à utiliser le THS après l'âge de 65 ans.

Parlez à votre médecin pour obtenir des conseils.

#### Utilisation d'autres médicaments

Certains médicaments peuvent interférer avec l'effet de Kliovance®. Cela pourrait entraîner des saignements irréguliers.

Cela s'applique aux médicaments suivants :

- Médicaments pour l'épilepsie (tels que le phénobarbital, la phénytoïne et la carbamazépine)

- Médicaments pour la tuberculose (tels que la rifampicine et la rifabutine)

- Médicaments pour les infections à VIH (tels que la névirapine, l'efavirenz, ritonavir et nelfinavir)

- Remèdes à base de plantes contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*)

- Médicaments pour les infections par le virus de l'hépatite C (comme le télaprévir).

D'autres médicaments peuvent augmenter les effets de Kliovance® :

- Médicaments contenant du kétoconazole (un fongicide).

Kliovance® peut avoir un impact sur un traitement concomitant avec la cyclosporine.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris des médicaments obtenus sans ordonnance, des médicaments à base de plantes ou d'autres produits naturels.

#### Analyses de laboratoire

Si vous avez besoin d'une analyse de sang, informez votre médecin ou le personnel du laboratoire que vous prenez Kliovance<sup>®</sup>, car ce médicament peut affecter les résultats de certains tests.

#### Prendre Kliovance<sup>®</sup> avec nourriture et boisson

Les comprimés peuvent être pris avec ou sans nourriture et boisson.

#### Grossesse et allaitement

Grossesse : Kliovance<sup>®</sup> est destiné uniquement aux femmes ménopausées. Si vous devenez enceinte, arrêtez de prendre Kliovance<sup>®</sup> et contactez votre médecin.

Allaitement : Vous ne devez pas prendre Kliovance<sup>®</sup> si vous allaitez.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Kliovance<sup>®</sup> n'a pas d'effet connu sur l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

#### Informations importantes concernant certains des ingrédients de Kliovance<sup>®</sup>

Kliovance<sup>®</sup> contient du lactose monohydraté. Si vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre Kliovance<sup>®</sup>.

### 3. Comment prendre Kliovance<sup>®</sup>

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Prenez un comprimé une fois par jour, à peu près à la même heure chaque jour. Une fois que vous avez terminé les 28 comprimés du paquet, commencez un nouveau paquet en continuant le traitement sans interruption.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du calendrier, voir les 'Instructions d'utilisation' à la fin de la notice.

Vous pouvez commencer le traitement avec Kliovance<sup>®</sup> n'importe quel jour qui vous convient. Cependant, si vous passez d'un produit THS lorsque vous avez des saignements mensuels, commencez votre traitement juste après la fin des saignements.

Votre médecin devrait viser à prescrire la dose la plus faible pour traiter votre symptôme aussi brièvement que nécessaire. Parlez à votre médecin si vous pensez que cette dose est trop forte ou pas assez forte.

Si vous prenez plus de Kliovance<sup>®</sup> que vous ne devriez

Si vous prenez plus de comprimés que ce qui vous a été prescrit, contactez votre médecin ou le centre antipoison centre Si vous oubliez de prendre

**Kliovance** ® Si vous oubliez de prendre votre comprimé à l'heure habituelle, prenez-le dans les 12 heures suivantes. Si plus de 12 heures se sont écoulées, sautez la dose oubliée et reprenez normalement le lendemain. Ne prenez pas de dose double pour compenser un comprimé oublié. Oublier une dose peut augmenter la probabilité de saignements intermenstruels et de spotting si vous avez encore votre utérus.

Si vous oubliez de prendre votre comprimé à l'heure habituelle, prenez-le dans les 12 heures suivantes. Si plus de 12 heures se sont écoulées, sautez la dose oubliée et reprenez normalement le lendemain. Ne prenez pas de dose double pour compenser un comprimé oublié. Oublier une dose peut augmenter la probabilité de saignements intermenstruels et de spotting si vous avez encore votre utérus.

**Kliovance** ® Si vous souhaitez arrêter de prendre

**Kliovance** ®, parlez-en d'abord à votre médecin. Votre médecin vous expliquera les effets de l'arrêt du traitement et discutera d'autres possibilités avec

vous. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale

Si vous allez subir une intervention chirurgicale, informez le chirurgien que vous prenez **Kliovance** ®. Vous devrez peut-être arrêter de prendre **Kliovance** ® environ 4 à 6 semaines avant l'opération pour réduire le risque de caillot sanguin (voir section 2, 'Caillots sanguins dans une veine (thrombose)'). Demandez à votre médecin quand vous pouvez recommencer à prendre **Kliovance** ® à nouveau.

#### 4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut avoir des effets secondaires, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les maladies suivantes sont signalées plus souvent chez les femmes utilisant un THS par rapport aux femmes n'utilisant pas de THS :

- cancer du sein

- croissance anormale ou cancer de la muqueuse de l'utérus (hyperplasie ou cancer de l'endomètre)

- cancer de l'ovaire

- caillots sanguins dans les veines des jambes ou des poumons (thromboembolie veineuse)

- maladie cardiaque

- AVC

- perte probable de mémoire si le THS est commencé après l'âge de 65 ans.

Pour plus d'informations sur ces effets secondaires, voir la section 2, 'Ce que vous devez savoir avant de prendre **Kliovance** ®'.

Hypersensibilité/allergie (effet secondaire peu fréquent – peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

Bien qu'il s'agisse d'un événement peu fréquent, une hypersensibilité/allergie peut survenir. Les signes d'hypersensibilité/allergie peuvent inclure un ou plusieurs des symptômes suivants : urticaire, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, hypotension (pâleur et froideur de la peau, rythme cardiaque rapide), sensation de vertige, sueurs, qui pourraient être des signes de réaction/choc anaphylactique. Si l'un des symptômes mentionnés apparaît, arrêtez de prendre Kliovance® et consultez immédiatement un médecin.

Effets secondaires très fréquents (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10)

- Douleur ou sensibilité des seins
- Saignement vaginal.

Effets secondaires fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

Maux de tête

- Prise de poids causée par la rétention d'eau
- Inflammation vaginale
- Migraine, nouvelle ou pire qu'avant
- Infection vaginale par un champignon
- Dépression, nouvelle ou pire qu'avant
- Nausée
- Augmentation ou gonflement des seins (œdème mammaire)
- Douleur dorsale
- Fibrome utérin (bénin tumeur), aggravation, apparition ou réapparition
- Gonflement des bras et des jambes (œdème périphérique)
- Augmentation de poids.

Effets secondaires peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Ballonnements, douleurs abdominales, gonflement, inconfort ou flatulences
- Acné
- Perte de cheveux (alopécie)
- Croissance anormale des poils (de type masculin)
- Démangeaisons ou urticaire
- Inflammation d'une veine (thrombophlébite superficielle)
- Crampes aux jambes
- Médicament inefficace
- Réaction allergique
- Nervosité.

Effets secondaires rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- Caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins des jambes ou des poumons (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire).

Effets secondaires très rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

- Cancer de la muqueuse de l'utérus (cancer de l'endomètre)
- Épaississement excessif de la muqueuse de l'utérus (hyperplasie de l'endomètre)
- Augmentation de la pression artérielle ou aggravation de l'hypertension
- Maladie de la vésicule biliaire, apparition/récurrence ou aggravation de calculs biliaires
- Sécrétion excessive de sébum, éruption cutanée

Crise aiguë ou récurrente d'œdème (œdème angioneurotique)  
Insomnie, vertiges, anxiété  
Changement du désir sexuel  
Troubles visuels  
Perte de poids  
Vomissements  
Brûlures d'estomac  
Démangeaisons vaginales et génitales  
Crise cardiaque et accident vasculaire cérébral.

#### Autres effets secondaires du THS combiné

maladie de la vésicule biliaire

divers troubles cutanés :

- décoloration de la peau, en particulier du visage ou du cou, connue sous le nom de « taches de grossesse » (chloasma)
- nodules cutanés rouges et douloureux (érythème noueux)
- éruption cutanée avec rougeurs ou plaies en forme de cible (érythème polymorphe)
- décolorations rouges ou violettes de la peau et/ou des muqueuses (purpura vasculaire).

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cela inclut tout effet secondaire possible non mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets secondaires directement via le système national de déclaration. En déclarant les effets secondaires, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

#### 5. Comment conserver Kliovance®

Conservez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et l'emballage extérieur après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver à une température inférieure à 25°C.

Ne pas réfrigérer.

Conservez le flacon dans l'emballage extérieur afin de le protéger de la lumière.

Ne jetez aucun médicament dans les eaux usées ou avec les déchets ménagers. Demandez à votre pharmacien comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures aideront à protéger l'environnement.

#### 6. Contenu de l'emballage et autres informations

Qu'est-ce que Kliovance® contient

Les substances actives sont l'estradiol 1 mg (sous forme d'hémihydrate d'estradiol) et l'acétate de noréthistérone 0,5 mg.

Les autres ingrédients sont : lactose monohydraté, amidon de maïs, copovidone, talc et stéarate de magnésium.

Le pelliculage contient : hypromellose, triacétine et talc.

À quoi Kliovance® ressemble et contenu de l'emballage

Les comprimés pelliculés sont blancs, ronds avec un diamètre de 6 mm. Les comprimés sont gravés NOVO 288 d'un côté et le logo de Novo Nordisk (un taureau Apis) de l'autre côté.

Tailles des emballages :

28 comprimés pelliculés dans un emballage-calendrier

Commercialisé par :

Novo Nordisk Pharmaceuticals Ltd  
Auckland

Fabriqué au Danemark par :

Novo Nordisk A/S  
2880 Bagsværd, Danemark

Cette notice a été approuvée pour la dernière fois : 23 février 2022

© 2022

Novo Nordisk A/S

Kliovance® est une marque déposée de Novo Nordisk FemCare AG, Suisse.

## INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR

Comment utiliser le calendrier de pilules

### 1. Régler le rappel du jour

Tournez le disque intérieur pour régler le jour de la semaine en face de la petite languette en plastique.

### 2. Prenez le comprimé du premier jour

Cassez le plastique languette et faites tomber le premier comprimé.

### 3. Déplacez le cadran chaque jour

Le jour suivant, déplacez simplement le cadran transparent dans le sens des aiguilles d'une montre d'un espace comme indiqué par la flèche. Faites tomber le comprimé suivant. N'oubliez pas de prendre seulement 1 comprimé une fois par jour.

Vous ne pouvez tourner le cadran transparent qu'après avoir retiré le comprimé de l'ouverture.