

## Bijsluiter

Kliovance® 1 mg/0,5 mg filmomhulde tabletten  
Estradiol/norethisteronacetaat

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u begint met het innemen van dit geneesmiddel, want het bevat belangrijke informatie voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.

Heeft u nog vragen, stel deze dan aan uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als hun ziekteverschijnselen dezelfde zijn als de uwe.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.

### Wat er in deze bijsluiter staat

1. Wat Kliovance® is en waarvoor het wordt gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Kliovance®
3. inneemt Hoe u<sup>Kliovance</sup>
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe te bewaren Kliovance®
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### 1. Wat Kliovance® is en waarvoor het wordt gebruikt

Kliovance® is een continue gecombineerde Hormoonvervangingstherapie (HRT). Het bevat twee soorten vrouwelijke hormonen, een oestrogeen en een progestageen. Kliovance® wordt gebruikt bij postmenopauzale vrouwen die ten minste 1 jaar geen natuurlijke menstruatie meer hebben gehad.

Kliovance® wordt gebruikt voor:

#### Verlichting van symptomen die optreden na de menopauze

Tijdens de menopauze daalt de hoeveelheid oestrogeen die door het lichaam van een vrouw wordt geproduceerd. Dit kan symptomen veroorzaken zoals een warme gezicht, nek en borst ('opvliegers'). Kliovance® verlicht deze symptomen na de menopauze. U krijgt alleen Kliovance® voorgeschreven als uw symptomen uw dagelijks leven ernstig belemmeren.

#### Preventie van osteoporose

Na de menopauze kunnen sommige vrouwen broze botten ontwikkelen (osteoporose). U dient alle beschikbare opties met uw arts te bespreken.

Als u een verhoogd risico op botbreuken heeft door osteoporose en andere medicijnen niet geschikt voor u zijn, kunt u Kliovance® gebruiken om osteoporose na de menopauze te voorkomen.

Kliovance® wordt voorgeschreven aan vrouwen die hun baarmoeder niet hebben laten verwijderen en van wie de menstruatie meer dan een jaar geleden is gestopt.

Er is slechts beperkte ervaring met de behandeling van vrouwen ouder dan 65 jaar met Kliovance®.

## 2. Wat u moet weten voordat u Kliovance®

inneemt

Medische geschiedenis en regelmatige controles

Het gebruik van HST brengt risico's met zich mee die in overweging moeten worden genomen bij het beslissen of u ermee wilt beginnen of doorgaan.

De ervaring met de behandeling van vrouwen met een voortijdige menopauze (door ovariumfalen of chirurgie) is beperkt. Als u een voortijdige menopauze heeft, kunnen de risico's van het gebruik van HST anders zijn. Praat met uw arts.

Zodra u bent begonnen met Kliovance® u moet uw arts regelmatig bezoeken voor controles (minstens één keer per jaar). Bespreek tijdens deze controles met uw arts de voordelen en risico's van het doorgaan met Kliovance®.

Ga voor regelmatige borstkankerscreening, zoals aanbevolen door uw arts.

Neem niet Kliovance®

Als een van de volgende op u van toepassing is. Als u niet zeker bent over een van de onderstaande punten, raadpleeg dan uw arts voordat u Kliovance®.

Neem niet Kliovance®:

Als u borstkanker heeft, heeft gehad of vermoedt dat u het heeft.

Als u kanker heeft of heeft gehad die gevoelig is voor oestrogenen, zoals kanker van het baarmoederslijmvlies (endometrium), of als u ervan wordt verdacht het te hebben.

Als u onverklaarbaar vaginaal bloedverlies heeft.

Als u overmatige verdikking van het baarmoederslijmvlies (endometriale hyperplasie) heeft die niet wordt behandeld.

Als u een bloedstolsel in een ader (trombose) heeft of ooit heeft gehad, zoals in de benen (diepe veneuze trombose) of de longen (longembolie).

Als u een bloedstollingsstoornis heeft (zoals proteïne C, proteïne S of antitrombine deficiëntie).

Als u een ziekte heeft of heeft gehad die wordt veroorzaakt door bloedstolsels in de slagaders, zoals een hartaanval, beroerte of angina.

Als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad en uw leverfunctietests zijn niet teruggekeerd naar normaal.

Als u een zeldzaam bloedprobleem heeft genaamd 'porfyrie' dat in families wordt doorgegeven (erfelijk).

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor estradiol, norethisteronacetaat of een van de andere ingrediënten van Kliovance® (vermeld in rubriek 6 'Inhoud van de verpakking en overige informatie').

Als een van de bovenstaande aandoeningen voor het eerst optreedt tijdens het gebruik van Kliovance®, stop dan onmiddellijk met het innemen en raadpleeg direct uw arts.

## Waarschuwingen en voorzorgen

Vertel uw arts als u ooit een van de volgende problemen heeft gehad, voordat u met de behandeling begint, aangezien deze kunnen terugkeren of verergeren tijdens de behandeling met Kliovance®. In dat geval moet u vaker voor controles naar uw arts gaan:

vleesbomen in uw baarmoeder  
groei van het baarmoederslijmvlies buiten uw baarmoeder (endometriose) of een geschiedenis van overmatige groei van het baarmoederslijmvlies (endometriale hyperplasie)  
verhoogd risico op het ontwikkelen van bloedstolsels (zie 'Bloedstolsels in een ader (trombose)')  
verhoogd risico op het krijgen van een oestrogeen-gevoelige kanker (zoals het hebben van een moeder, zus of grootmoeder die borstkanker heeft gehad)  
hoge bloeddruk  
een leveraandoening, zoals een goedaardige lever tumor  
diabetes  
galstenen  
migraine of ernstige hoofdpijn  
een ziekte van het immuunsysteem die veel organen van het lichaam aantast (systemische lupus erythematosus, SLE)  
epilepsie  
astma  
een ziekte die het trommelvlies en het gehoor aantast (otosclerose)  
een zeer hoog vetgehalte in uw bloed (triglyceriden)  
vochtretentie door hart- of nierproblemen  
lactose-intolerantie.

Stop met het innemen van Kliovance® en raadpleeg onmiddellijk een arts

Als u een van de volgende symptomen opmerkt bij het gebruik van HRT:

een van de aandoeningen genoemd in de sectie 'Niet gebruiken Kliovance®'  
vergeling van uw huid of het wit van uw ogen (geelzucht). Dit kunnen tekenen zijn van een leverziekte  
een grote stijging van uw bloeddruk (symptomen kunnen zijn hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid)  
migraine-achtige hoofdpijn die voor het eerst optreedt als u zwanger wordt  
als u tekenen van een bloedstolsel opmerkt, zoals:

- pijnlijke zwelling en roodheid van de benen
- plotselinge pijn op de borst
- moeite met ademen.

Voor meer informatie, zie 'Bloedstolsels in een ader (trombose)'.

Opmerking: Kliovance® is geen anticonceptiemiddel. Als het minder dan 12 maanden geleden is sinds uw laatste menstruatie of als u jonger bent dan 50 jaar, moet u mogelijk nog steeds aanvullende anticonceptie gebruiken om zwangerschap te voorkomen. Raadpleeg uw arts voor advies.

## HRT en kanker

Overmatige verdikking van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) en kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker)

Het innemen van oestrogeen-alleen HRT zal het risico op overmatige verdikking van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) en kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker) verhogen.

De progestageen in Kliovance® beschermt u tegen dit extra risico.

## Onregelmatige bloedingen

U kunt onregelmatige bloedingen of druppels bloed (spotting) hebben tijdens de eerste 3-6 maanden van het gebruik van Kliovance®.

Echter, als de onregelmatige bloeding:

langer dan de eerste 6 maanden aanhoudt

begint nadat u Kliovance® voor meer dan 6 maanden

gaat door nadat u bent gestopt met het innemen van Kliovance®

raadpleeg zo snel mogelijk uw arts.

## Borstkanker

Bewijs toont aan dat het gebruik van gecombineerde oestrogeen-progestageen of oestrogeen-alleen HRT het risico op borstkanker verhoogt. Het extra risico hangt af van hoe lang u HRT gebruikt. Het extra risico wordt duidelijk binnen 3 jaar gebruik. Na het stoppen met HRT zal het extra risico in de loop van de tijd afnemen, maar het risico kan 10 jaar of langer aanhouden als u HRT langer dan 5 jaar heeft gebruikt.

## Vergelijk

Vrouwen van 50 tot 54 jaar die geen HRT gebruiken, zullen gemiddeld 13 tot 17 op de 1.000 worden gediagnosticeerd met borstkanker over een periode van 5 jaar.

Voor vrouwen van 50 jaar die beginnen met het nemen van oestrogeen-alleen HRT gedurende 5 jaar, zullen er 16-17 gevallen zijn op 1.000 gebruikers (d.w.z. een extra 0 tot 3 gevallen).

Voor vrouwen van 50 jaar die beginnen met het nemen van oestrogeen-progestageen HRT gedurende 5 jaar, zullen er 21 gevallen zijn op 1.000 gebruikers (d.w.z. een extra 4 tot 8 gevallen).

Vrouwen van 50 tot 59 jaar die geen HRT gebruiken, zullen gemiddeld 27 op de 1.000 worden gediagnosticeerd met borstkanker over een periode van 10 jaar.

Voor vrouwen van 50 jaar die beginnen met het nemen van oestrogeen-alleen HRT gedurende 10 jaar, zullen er 34 gevallen zijn op 1.000 gebruikers (d.w.z. 7 extra gevallen).

Voor vrouwen van 50 jaar die beginnen met het nemen van oestrogeen-progestageen HRT gedurende 10 jaar, zullen er 48 gevallen zijn op 1.000 gebruikers (d.w.z. 21 extra gevallen).

Controleer regelmatig uw borsten. Raadpleeg uw arts als u veranderingen opmerkt zoals:  
putjes in de huid

veranderingen in de tepel  
knobbels die u kunt zien of voelen.

Daarnaast wordt u geadviseerd om deel te nemen aan mammografie screeningsprogramma's wanneer deze u worden aangeboden. Voor mammogram screening is het belangrijk dat u de verpleegkundige/zorgprofessional die de röntgenfoto maakt, informeert dat u HRT gebruikt, aangezien dit medicijn de dichtheid van uw borsten kan verhogen, wat de uitkomst van de mammogram kan beïnvloeden. Waar de dichtheid van de borst is verhoogd, kan mammografie niet alle knobbels detecteren.

### Eierstokkanker

Eierstokkanker is zeldzaam, veel zeldzamer dan borstkanker. Het gebruik van oestrogeen-alleen of gecombineerde oestrogeen-progestageen HRT is in verband gebracht met een licht verhoogd risico op eierstokkanker. Het risico op eierstokkanker varieert met de leeftijd. Bijvoorbeeld, bij vrouwen van 50 tot 54 jaar die geen HRT gebruiken, zullen ongeveer 2 vrouwen op 2.000 worden gediagnosticeerd met eierstokkanker over een periode van 5 jaar.

Voor vrouwen die 5 jaar HRT hebben gebruikt, zullen er ongeveer 3 gevallen per 2.000 gebruikers zijn (d.w.z. ongeveer 1 extra geval).

### Effect van HRT op hart en bloedsomloop

#### Bloedstolsels in een ader (trombose)

Het risico op bloedstolsels in de aderen is ongeveer 1,3 tot 3 keer hoger bij HST-gebruikers dan bij niet-gebruikers, vooral tijdens het eerste jaar van gebruik.

Bloedstolsels kunnen ernstig zijn, en als er een naar de longen reist, kan dit pijn op de borst, kortademigheid, flauwvallen of zelfs de dood veroorzaken.

U heeft meer kans op een bloedstolsel in uw aderen naarmate u ouder wordt en als een van de volgende situaties op u van toepassing is. Informeer uw arts als een van deze situaties op u van toepassing is:

- u kunt lange tijd niet lopen vanwege een grote operatie, verwonding of ziekte (zie ook rubriek 3 'Als u een operatie moet ondergaan')
  - u heeft ernstig overgewicht (BMI >30 kg/m<sup>2</sup>)
  - u heeft een bloedstollingsprobleem dat langdurige behandeling nodig heeft met een medicijn dat wordt gebruikt om bloedstolsels te voorkomen
  - als een van uw naaste familieleden ooit een bloedstolsel in het been, de long of een ander orgaan heeft gehad
  - u heeft systemische lupus erythematosus (SLE) u heeft kanker.
- Voor tekenen van een bloedstolsel, zie 'Stop met het innemen van

Kliovance @en raadpleeg onmiddellijk een arts'. Vergelijk

### Vergelijk

Voor vrouwen in de 50 die al meer dan 5 jaar oestrogeen-progestageen oestrogeen-progestageen HRT gedurende meer dan 5 jaar, zullen er 9 tot 12 gevallen zijn bij 1.000 gebruikers (d.w.z. een extra 5 gevallen).

### Hartziekte (hartaanval)

Er is geen bewijs dat HRT een hartaanval zal voorkomen. Vrouwen ouder dan 60 jaar die oestrogeen-progestageen HRT gebruiken, hebben iets meer kans op het ontwikkelen van hartziekte dan degenen die geen HRT gebruiken.

### Beroerte

Het risico op een beroerte is ongeveer 1,5 keer hoger bij HRT-gebruikers dan bij niet-gebruikers. Het aantal extra gevallen van beroerte door het gebruik van HRT zal toenemen met de leeftijd.

### Vergelijk

Bij vrouwen in de 50 die geen HRT gebruiken, zou gemiddeld 8 op de 1.000 een beroerte krijgen over een periode van 5 jaar.

Voor vrouwen in de 50 die HRT gebruiken, zullen er 11 gevallen zijn op 1.000 gebruikers over 5 jaar (d.w.z. 3 extra gevallen).

### Andere aandoeningen

HRT zal geheugenverlies niet voorkomen. Er is enig bewijs van een hoger risico op geheugenverlies bij vrouwen die HRT beginnen te gebruiken na de leeftijd van 65 jaar. Raadpleeg uw arts voor advies.

### Gebruik van andere medicijnen

Sommige medicijnen kunnen de werking van Kliovance®. Dit kan leiden tot onregelmatige bloedingen.

Dit geldt voor de volgende medicijnen:

- Medicijnen voor epilepsie (zoals fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine)

- Medicijnen voor tuberculose (zoals rifampicine en rifabutine)

- Medicijnen voor HIV-infecties (zoals nevirapine, efavirenz, ritonavir en nelfinavir)

- Kruidenremedies die Sint-Janskruid (*Hypericum perforatum*) bevatten

- Geneesmiddelen voor hepatitis C-infecties (zoals telaprevir).

Andere geneesmiddelen kunnen de effecten van Kliovance®:

- Geneesmiddelen die ketoconazol (een fungicide) bevatten.

Kliovance® kan invloed hebben op een gelijktijdige behandeling met cyclosporine. Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, inclusief geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, kruidenmiddelen of andere natuurlijke producten.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, inclusief geneesmiddelen die zonder recept zijn verkregen, kruidengeneesmiddelen of andere natuurlijke producten.

### Laboratoriumtests

Kliovance Kliovance<sup>Het innemen van</sup>Kliovance

® Kliovance® met voedsel en drank

De tabletten kunnen met of zonder voedsel en drank worden ingenomen.

## Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap: Kliovance® is alleen bedoeld voor gebruik bij postmenopauzale vrouwen. Als u zwanger wordt, stop dan met het innemen van Kliovance® en neem contact op met uw arts.

Borstvoeding: U mag geen Kliovance® innemen als u borstvoeding geeft.

## Autorijden en het gebruik van machines

Kliovance® heeft geen bekende invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

## Belangrijke informatie over enkele ingrediënten in Kliovance®

Kliovance® bevat lactosemonohydraat. Als u een intolerantie voor sommige suikers heeft, neem dan contact op met uw arts voordat u Kliovance®.

## 3. Hoe neemt u Kliovance®

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts u heeft verteld. Raadpleeg uw arts of apotheker als u het niet zeker weet.

Neem één tablet per dag, op ongeveer hetzelfde tijdstip elke dag. Zodra u alle 28 tabletten in de verpakking heeft ingenomen, begint u zonder onderbreking met een nieuwe verpakking.

Voor meer informatie over het gebruik van de kalenderverpakking, zie 'Gebruiksaanwijzing' aan het einde van de bijsluiter.

U kunt op een willekeurige dag beginnen met de behandeling met Kliovance®. Echter, als u overstapt van een HST-product waarbij u maandelijks bloedt, start dan uw behandeling direct na het einde van de bloeding. Uw arts moet proberen de laagste dosis voor te schrijven om uw symptomen zo kort mogelijk te behandelen. Spreek met uw arts als u denkt dat deze dosis te sterk of niet sterk genoeg is.

Uw arts moet proberen de laagste dosis voor te schrijven om uw symptoom zo kort mogelijk te behandelen. Praat met uw arts als u denkt dat deze dosis te sterk of niet sterk genoeg is.

Als u meer inneemt Kliovance® dan u zou moeten

Als u meer tabletten inneemt dan voorgeschreven, neem dan contact op met uw arts of het nationale vergiftigingscentrum Als u vergeet om

**Kliovance®** Als u vergeet uw tablet op de gebruikelijke tijd in te nemen, neem deze dan binnen de volgende 12 uur in. Als er meer dan 12 uur zijn verstreken, sla de gemiste dosis over en begin de volgende dag weer zoals normaal. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Het vergeten van een dosis kan de kans op doorbraakbloedingen en spotting vergroten als u nog een baarmoeder heeft.

Als u vergeet uw tablet op het gebruikelijke tijdstip in te nemen, neem deze dan binnen de volgende 12 uur in. Als er meer dan 12 uur zijn verstreken, sla de gemiste dosis over en begin de volgende dag weer normaal. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Het vergeten van een dosis kan de kans op doorbraakbloedingen en spotting vergroten als u nog uw baarmoeder heeft.

Kliovance® Als u wilt stoppen met het innemen van

Kliovance® Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag het uw arts of apotheker. Als u een operatie moet ondergaan

Als u een operatie moet ondergaan, vertel de chirurg dan dat u

Als u een operatie moet ondergaan

Als u een operatie ondergaat, vertel de chirurg dan dat u Kliovance®. U moet mogelijk stoppen met het innemen van Kliovance® ongeveer 4 tot 6 weken voor de operatie om het risico op een bloedstolsel te verminderen (zie rubriek 2, 'Bloedstolsels in een ader (trombose)'). Vraag uw arts wanneer u weer kunt beginnen met het innemen van Kliovance® opnieuw.

#### 4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, hoewel niet iedereen deze krijgt.

De volgende ziekten worden vaker gemeld bij vrouwen die HST gebruiken in vergelijking met vrouwen die geen HST gebruiken:

- borstkanker
- abnormale groei of kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie of kanker)
- eierstokkanker
- bloedstolsels in de aderen van de benen of longen (veneuze trombo-embolie)
- hartziekte
- beroerte
- waarschijnlijk geheugenverlies als HST wordt gestart boven de leeftijd van 65.

Voor meer informatie over deze bijwerkingen, zie rubriek 2, 'Wat u moet weten voordat u Kliovance® inneemt'.

Overgevoeligheid/allergie (ongewone bijwerking – kantot 1 op de 100 mensen treffen)

Hoewel het een ongewoon voorval is, kan overgevoeligheid/allergie optreden. Tekenen van overgevoeligheid/allergie kunnen een of meer van de volgende symptomen omvatten: netelroos, jeuk, zwelling, ademhalingsmoeilijkheden, lage bloeddruk (bleekheid en koude huid, snelle hartslag), duizeligheid, zweeten, wat tekenen kunnen zijn van een anafylactische reactie/schok. Als een van de genoemde symptomen optreedt, stop dan met het innemen van Kliovance® en zoek onmiddellijk medische hulp.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen meer dan 1 op de 10 mensen treffen)

- Pijn in de borsten of gevoelige borsten
- Vaginale bloeding.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen tot 1 op de 10 mensen treffen)

- Hoofdpijn
- Gewichtstoename door vochtretentie
- Vaginale ontsteking

Migraine, nieuw of erger dan voorheen  
Vaginale schimmelinfectie  
Depressie, nieuw of erger dan voorheen  
Misselijkheid  
Vergroting of zwelling van de borsten (borstoedeem)  
Rugpijn  
Uterusmyoom (goedaardig tumor), verergering, optreden of heroptreden  
Zwelling van armen en benen (perifeeroedeem)  
Gewichtstoename.

Ongewone bijwerkingen (kunnen tot 1 op de 100 mensen treffen)

Opgeblazen gevoel, buikpijn, zwelling, ongemak of winderigheid  
Acne  
Haaruitval (alopecia)  
Abnormale (mannelijke patroon) haargroei  
Jeuk of netelroos (urticaria)  
Ontsteking van een ader (oppervlakkige tromboflebitis)  
Beenkrampen  
Geneesmiddel niet effectief  
Allergische reactie  
Zenuwachtigheid.

Zeldzame bijwerkingen (kunnen tot 1 op 1.000 mensen treffen)

Bloedstolsels in de bloedvaten van de benen of de longen (diepe veneuze trombose, longembolie).

Zeer zeldzame bijwerkingen (kunnen tot 1 op 10.000 mensen treffen)

Kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker)  
Overmatige verdikking van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie)  
Verhoging van de bloeddruk of verergering van hoge bloeddruk  
Galblaasaandoening, optreden/heroptreden van galstenen of verergerd  
Overmatige talgafscheiding, huiduitslag  
Acute of terugkerende aanval van oedeem (angioneurotisch oedeem)  
Slapeloosheid, duizeligheid, angst  
Verandering in seksueel verlangen  
Visuele stoornissen  
Gewichtsverlies  
Braken  
Brandend maagzuur  
Vaginale en genitale jeuk  
Hartaanval en beroerte.

Andere bijwerkingen van gecombineerde HRT

galblaasaandoening

verschillende huidaandoeningen:

- verkleuring van de huid, vooral van het gezicht of de nek, bekend als 'zwangerschapsvlekken' (chloasma)

- pijnlijke roodachtige huidknobbels (erythema nodosum)
- uitslag met doelvormige roodheid of zweren (erythema multiforme)
- rode of paarse verkleuringen van de huid en/of slijmvliezen (vasculaire purpura).

#### Melden van bijwerkingen

Als u bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit omvat alle mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem. Door bijwerkingen te melden effecten u kan helpen meer informatie te geven over de veiligheid van dit medicijn.

#### 5. Kliovance ® Bewaar dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruik dit geneesmiddel niet na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking na 'EXP'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25°C.

Niet in de koelkast bewaren.

Bewaar de container in de buitenverpakking om te beschermen tegen licht.

Bewaar de container in de buitenverpakking om te beschermen tegen licht.

Gooi geen medicijnen weg via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker hoe u medicijnen kunt weggooien die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

#### 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

##### Wat Kliovance® bevat

De werkzame stoffen zijn estradiol 1 mg (als estradiolhemihydraat) en norethisteronacetaat 0,5 mg.

De andere ingrediënten zijn: lactosemonohydraat, maïszetmeel, copovidon, talk en magnesiumstearaat.

De filmomhulling bevat: hypromellose, triacetine en talk.

##### Hoe Kliovance® eruitziet en inhoud van de verpakking

De filmomhulde tabletten zijn wit, rond met een diameter van 6 mm. De tabletten zijn gegraveerd met NOVO 288 aan de ene kant en het Novo Nordisk-logo (een Apis-stier) aan de andere kant.

##### Verpakkingsgroottes:

28 filmomhulde tabletten in een kalenderverpakking

##### Op de markt gebracht door:

Novo Nordisk Pharmaceuticals Ltd  
Auckland

##### Geproduceerd in Denemarken door:

Novo Nordisk A/S

2880 Bagsværd, Denemarken

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd: 23 februari 2022

© 2022

Novo Nordisk A/S

Kliovance® is een handelsmerk van Novo Nordisk FemCare AG, Zwitserland.

## GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Hoe de kalenderverpakking te gebruiken

### 1. Stel de dagherinnering in

Draai de binnenste schijf om de dag van de week tegenover het kleine plastic lipje in te stellen.

### 2. Neem de tablet van de eerste dag

Breek het plastic lipje en kantel de eerste tablet eruit.

### 3. Verplaats de wijzer elke dag

De volgende dag verplaatst u eenvoudig de transparante wijzer 1 ruimte met de klok mee zoals aangegeven door de pijl. Kantel de volgende tablet eruit. Vergeet niet om slechts 1 tablet per dag in te nemen.

U kunt de transparante wijzer pas draaien nadat de tablet in de opening is verwijderd.