

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE

Euthyrox 25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 mikrogrammaa, tabletit

levotyroksiinatrium

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.
- Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.
- Saatko jonkin haittavaikutuksen, joka on mainittu kohdassa 4? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Tämän pakkausselosteen sisältö

1. Mikä Euthyrox on ja mihin sitä käytetään?
2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai milloin on oltava erityisen varovainen?
3. Miten tätä lääkettä käytetään?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Miten tätä lääkettä säilytetään?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mikä Euthyrox on ja mihin sitä käytetään?

Euthyroxin vaikuttava aine on levotyroksiini. Levotyroksiini muistuttaa suuresti luonnollista hormonia, jota kilpirauhanen tuottaa. Kilpirauhanen on pieni elin kurkunpään alapuolella molemmiin puoliin henkitorvea, joka tuottaa levotyroksiinia (kilpirauhashormonia). Tämä kilpirauhashormoni varmistaa, että tietyt kemialliset reaktiot kehossa (aineenvaihdunta) toimivat oikein. Jos kilpirauhanen tuottaa liian vähän kilpirauhashormoneja, Euthyroxin vaikuttava aine täydentää kehon hormonitarpeen.

Euthyroxia käytetään henkilöillä, jotka kärsivät tietyistä kilpirauhasen sairauksista, kuten:

Struma

Struma on sairaus, jossa kilpirauhanen on suurentunut. Potilas voi nähdä ja/tai tuntea kyhmyn kaulan etuosassa. Kilpirauhasen suurentuminen johtuu siitä, että kilpirauhanen stimuloituu tuottamaan kilpirauhashormoneja tiettyjen syiden (esimerkiksi liian vähäisen jodin saannin vuoksi) vuoksi.

Hypotyreoosi

Hypotyreoosissa (esimerkiksi kilpirauhasleikkauksen jälkeen) kilpirauhanen tuottaa liian vähän hormoneja. Jos kilpirauhanen tuottaa liian vähän hormoneja, kehon eri reaktiot hidastuvat. Euthyrox täydentää kehon hormonitarpeen.

Hypertyreoosi

Hypertyreoosissa kilpirauhanen tuottaa liikaa hormoneja. Jos kilpirauhanen tuottaa liikaa hormoneja, voit käyttää Euthyroxia vain, jos käytät lisäksi lääkettä, joka tukahduttaa kilpirauhasen toimintaa (tyreostaatti). Euthyrox varmistaa riittävän kilpirauhashormonin määrän kehossa.

Lisäksi Euthyroxia käytetään tietyissä kilpirauhaskasvaimissa ja kilpirauhasen toiminnan ja kilpirauhashormonien tuotannon tutkimisessa diagnoosin asettamiseksi.

Eikö vaivasi vähene tai paheneeko se jopa? Ota yhteyttä lääkäriisi.

2. Milloin et saa ottaa tätä lääkettä tai sinun on oltava erityisen varovainen sen kanssa?

Milloin et saa käyttää tätä lääkettä?

- Jos tiettyjä sairauksia ei hoideta, nimittäin: lisämunuaisen vajaatoiminta, aivolisäkkeen vajaatoiminta (aivolisäke liittyy hormonitasapainoon) ja sairaus, joka johtuu liiallisista kilpirauhashormoneista (tyreotoksikoosi).
- Akuutissa sydäninfarktissa, akuutissa sydänlihastulehduksessa (myokardiitti) ja/tai tietyssä akuutissa sairaudessa, jossa sekä sydänlihas että sitä ympäröivä kudος ovat tulehtuneet (pankardiitti).
- Älä ota Euthyroxia yhdessä kilpirauhasen toimintaa tukahduttavien lääkkeiden kanssa, jos olet raskaana (katso alla oleva kohta Raskaus ja imetys).
- Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineelle. Nämä aineet löydät tämän pakkausselosteen kohdasta 6.

Milloin sinun on oltava erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi ennen tämän lääkkeen ottamista,

- jos sinulla on tiettyjä sydänsairauksia (angina pectoris, sydämen vajaatoiminta ja rytmihäiriöt). Lääkärisi tarkistaa näissä tapauksissa säännöllisesti kilpirauhasen toimintaa.
- jos olet vaihdevuosien jälkeen ja kilpirauhasesi tuottaa riittämättömästi hormoneja, lääkärisi tarkistaa säännöllisesti kilpirauhasen toimintaa.
- jos sinulla on diabetes tai saat antikoagulaatiohoitoa (katso myös kohta "Euthyroxin käyttö yhdessä muiden lääkkeiden kanssa").
- jos lisämunuaisesi eivät toimi kunnolla (lisämunuaisen vajaatoiminta) ja lisämunuaisihormonien täydentämiseen tarkoitettu hoito ei ole riittävä.

Verenpainetta on seurattava säännöllisesti, kun levotyroksiinihoito aloitetaan hyvin pienipainoisilla keskosilla, koska verenpaineen nopea lasku (tunnetaan kiertokollapsina) voi ilmetä.

Jos sinun on käytettävä toista levotyroksiinia sisältävää tuotetta, kilpirauhasen epätasapaino voi ilmetä. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on kysyttävää lääkityksen vaihtamisesta.

Tämän muutoksen aikana lääkärisi seuraa sinua tarkasti jonkin aikaa (kliinisesti ja biologisesti). Kerro lääkärillesi, jos saat haittavaikutuksia, koska se voi viitata siihen, että annostasi on säädettävä ylös- tai alaspäin.

Hoidon alussa on tärkeää, että olet säännöllisesti yhteydessä hoitavaan lääkäriin.

Ota yhteyttä lääkäriisi,

- ennen kuin aloitat tai lopetat orlistaatin käytön tai muutat orlistaatin (lääke lihavuuden hoitoon) hoitoa; saatat tarvita tiiviimpää seuranta ja annoksen säätöä.
- jos koet psykoottisten häiriöiden merkkejä (saatat tarvita tiiviimpää seuranta ja annoksen säätöä).

Jos olet menossa laboratoriotutkimukseen kilpirauhashormonitasojen tarkistamiseksi, sinun on ilmoitettava lääkärillesi ja/tai laboratoriotyöntekijöille, että käytät tai olet äskettäin käyttänyt biotiinia (tunnetaan myös nimellä vitamiini H, vitamiini B7 tai vitamiini B8). Biotiini voi vaikuttaa laboratoriotutkimustuloksiin. Tutkimuksesta riippuen biotiinin käyttö voi aiheuttaa virheellisesti korkeita tai matalia tuloksia. Lääkärisi voi pyytää sinua lopettamaan biotiinin käytön ennen laboratoriotutkimusta. Sinun on myös tiedostettava, että muut käyttämäsi valmisteet, kuten monivitamiinit tai hiusten, ihon ja kynsien lisäravinteet, voivat myös sisältää biotiinia. Tämä voi vaikuttaa laboratoriotutkimustuloksiin. Ilmoita lääkärillesi ja/tai laboratoriotyöntekijöille, jos käytät tällaisia valmisteita (katso lisätietoja kohdasta 'Käytätkö muita lääkkeitä?').

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö Euthyroxin lisäksi muita lääkkeitä, oletko äskettäin käyttänyt tai aiotko mahdollisesti käyttää niitä pian? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi. Euthyrox voi vaikuttaa seuraavien lääkkeiden tehoon:

- Antidiabeteslääkkeet (verensokeria alentavat lääkkeet):
Euthyrox voi heikentää antidiabeteslääkkeesi tehoa, joten verensokeritasojen lisäseuranta voi olla tarpeen, erityisesti Euthyrox-hoidon alussa. Euthyroxin käytön aikana antidiabeteslääkkeesi annoksen säätö voi olla tarpeen.
- Kumariinijohdannaiset (lääkkeet, joita käytetään veritulppien estämiseen):
Euthyrox voi tehostaa näiden lääkkeiden vaikutusta, mikä lisää verenvuotoriskiä, erityisesti iäkkäillä. Verihyytymisarvojen säännöllinen seuranta voi olla tarpeen Euthyrox-hoidon alussa ja sen aikana. Euthyroxin käytön aikana kumariinilääkkeesi annoksen säätö voi olla tarpeen.

Varmista, että noudatat suositeltuja aikavälejä, jos käytät jotain seuraavista lääkkeitä:

- Lääkkeet, joita käytetään sappihappojen sitomiseen ja korkean kolesterolin alentamiseen (kuten kolestyramiini tai kolestipoli):
Varmista, että otat Euthyroxin 4-5 tuntia ennen näitä lääkkeitä, koska ne estävät Euthyroxin imeytymisen suolistossa.
- Antasidit (happorefluksin lievittämiseen), muut alumiinia sisältävät lääkkeet, rautaa sisältävät lääkkeet, kalsiumia sisältävät lääkkeet:
Varmista, että otat Euthyroxia vähintään 2 tuntia ennen näitä lääkkeitä, koska muuten ne voivat heikentää Euthyroxin vaikutusta.

Kerro lääkärillesi tai apteekkarillesi, jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt jotain seuraavista lääkkeistä, tai jos on mahdollista, että käytät niitä lähitulevaisuudessa, koska ne voivat heikentää Euthyroxin vaikutusta:

- Propyltiourasiili (kilpirauhaseen vaikuttava lääke),
- Glukokortikoidit (allergianvastaiset ja tulehdusta ehkäisevät lääkkeet),
- Beetasalpaajat (verenpainetta alentavat lääkkeet, joita käytetään myös sydän- ja verisuonitautien hoitoon),
- Sertraliini (masennuslääkkeet),
- Klorokiini tai proguaaniili (malariaa ehkäisevä tai hoitava lääke),
- Lääkkeet, jotka aktivoivat tiettyjä maksaentsyymejä, kuten barbituraatit (rauhottava, unilääke), karbamatsepiini (epilepsialääke, käytetään myös joissakin kipu- ja mielialahäiriöissä), tai tuotteet, jotka sisältävät mäkikuismaa (kasvirohdosvalmiste),
- Estrogeenia sisältävät lääkkeet hormonikorvaushoitoon vaihdevuosien aikana ja jälkeen tai raskauden ehkäisyyn,
- Sevelameeri (fosfaattia sitova lääke, jota käytetään kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoitoon),
- Tyrosiinikinaasin estäjät (syöpää ja tulehdusta ehkäisevät lääkkeet),
- Protonipumpun estäjät (kuten omepratsoli, esomepratsoli, pantopratsoli, rabepratsoli ja lansopratsoli) käytetään vähentämään mahalaukun tuottaman hapon määrää vähentäen, mikä voi estää levotyrokseenin imeytymistä suolistosta ja siten heikentää levotyrokseenin tehoa. Jos käytät levotyrokseenia samalla kun sinua hoidetaan protonipumpun estäjillä, lääkärisi tulee seurata kilpirauhastoimintaasi ja mahdollisesti säätää Euthyroxin annosta.
- Orlistaatti (lääke lihavuuden hoitoon).

Kerro lääkärillesi, jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt jotain seuraavista lääkkeistä, tai jos on mahdollista, että käytät niitä lähitulevaisuudessa, koska ne voivat voimistaa Euthyroxin vaikutusta:

- Salisylaattit (lääke, jota käytetään kivun lievittämiseen ja kuumeen alentamiseen),
- Dikumaroli (lääkeveritulppien ehkäisyyn),
- Furosemiidi suurinaannoksina 250 mg (diureetti),
- Klofibraatti (verenlipidejä alentava lääke).

Kerro lääkärillesi, jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt jotakin seuraavista lääkkeistä, tai jos on mahdollista, että käytät niitä lähitulevaisuudessa, koska ne voivat vaikuttaa Euthyroxin tehoon:

- Ritonavir, indinavir, lopinavir (proteaasi-inhibiittorit, lääkkeet HIV- infektion hoitoon),
- Fenytoiini (lääke epilepsiaan).

Kilpirauhashormonitasosi saattaa olla tarpeen tarkistaa säännöllisesti. Euthyrox-annostasi saattaa olla tarpeen muuttaa.

Kerro lääkärillesi, jos käytät amiodaronia (lääke epäsäännöllisen sydämen sykkeen hoitoon), koska tämä lääke voi vaikuttaa kilpirauhasen toimintaan ja toimivuuteen.

Jos sinun on tehtävä diagnostinen testi tai skannaus jodia sisältävillä varjoaineilla, kerro lääkärillesi, että käytät Euthyroxia, koska saatat saada injektioon, joka voi vaikuttaa kilpirauhasen toimintaan.

Jos käytät biotiinia tai olet äskettäin käyttänyt sitä, sinun on ilmoitettava siitä lääkärillesi ja/tai laboratoriotyöntekijöille, kun olet menossa laboratoriotutkimukseen kilpirauhashormonitasojen tarkistamiseksi. Biotiini voi vaikuttaa laboratoriotutkimuksen tuloksiin (katso kohta 'Milloin sinun on oltava erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?').

Kerro lääkärillesi tai apteekkarillesi, jos käytät muita lääkkeitä tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita voit saada ilman reseptiä.

Kilpirauhashormoneja ei saa käyttää painonpudotukseen. Kilpirauhashormonien käyttö ei vähennä painoasi, jos kilpirauhashormonitasosi ovat normaalialueella. Vakavia tai jopa hengenvaarallisia sivuvaikutuksia voi esiintyä, jos nostat annosta ilman lääkärin erityistä ohjetta. Suuria kilpirauhashormoniannoksia ei saa ottaa yhdessä tiettyjen painonpudotuslääkkeiden, kuten amfepramonin, kathiinin ja fenylpropanolamiinin, kanssa, koska vakavien tai jopa hengenvaarallisten sivuvaikutusten riski voi kasvaa.

Soijaa sisältävät tuotteet voivat vähentää levotyroksiinin imeytymistä elimistöön. Siksi Euthyrox-annostusta saattaa olla tarpeen muuttaa, erityisesti soijalisäravinteiden käytön alussa tai lopettamisen jälkeen.

Mihin sinun on kiinnitettävä huomiota syödessäsi ja juodessasi? Keskustele lääkärin kanssa, jos käytät soijaa sisältäviä tuotteita. Soijaa sisältävät tuotteet voivat vähentää levotyroksiinin imeytymistä. Siksi Euthyrox-annostusta saattaa olla tarpeen muuttaa, erityisesti soijalisäravinteiden käytön alussa tai lopettamisen jälkeen.

Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, epäiletkö olevasi raskaana, haluatko tulla raskaaksi tai imetätkö? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkariisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskauden hyväksi kuluksi tarvitaan riittävä määrä kilpirauhashormonia. Siksi sinun on jatkettava Euthyroxin käyttöä, jos olet raskaana. Raskauden aikana sinun ei tule käyttää Euthyroxia, jos käytät myös niin sanottuja tyreostaattisia lääkkeitä (lääkkeitä liiallisen kilpirauhashormonin hoitoon). Lääkärisi voi tarvittaessa muuttaa annostusta. Jos tulet raskaaksi, ota yhteyttä lääkäriisi.

Ei ole viitteitä siitä, että Euthyroxin käyttö imettävillä naisilla olisi haitallista normaalisti toimivan kilpirauhasen omaavalle imeväiselle. Jos imetät, sinun ei tule käyttää Euthyroxia, jos käytät myös niin sanottuja tyreostaattisia lääkkeitä (lääkkeitä liiallisen kilpirauhashormonin hoitoon).

Ajaminen ja koneiden käyttö

Euthyrox ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttöön.

Euthyrox sisältää natriumia

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli se on käytännössä 'natriumvapaa'.

3. Miten otat tämän lääkkeen?

Ota tämä lääke aina täsmälleen lääkärisi tai apteekkarisi ohjeiden mukaisesti. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkariisi.

Lääkärisi määrää sinulle annostuksen. Sinun tulee noudattaa sitä tarkasti. Yleensä lääkärisi määrää sinulle ensin matalan annoksen ja nostaa sitä tarvittaessa.

lääkille potilaille, potilaille, joilla on sepelvaltimotauti, ja potilaille, joilla on vakava tai pitkäaikainen kilpirauhasen vajaatoiminta, tulee antaa matala aloitusannos.

Potilaille, joilla on alhainen paino ja potilaille, joilla on huomattavasti suurentunut kilpirauhanen, voidaan yleensä käyttää pienempää ylläpitoannosta.

Jos lapsellasi on synnynnäinen kilpirauhasen vajaatoiminta, lääkäri voi suositella korkeampaa aloitusannosta, koska nopea korvaushoito on tärkeää.

Tavallinen annostusohjelma on esitetty alla olevassa taulukossa.

Indikaatio	Suositeltu annos (natriumlevotyrokksiini/päivä)			
Eutyreoottisen struuman hoito	75 – 200 mikrogrammaa			
Uusiutumisen ehkäisy struumaleikkauksen jälkeen	75 – 200 mikrogrammaa			
Korvaushoito kilpirauhasen vajaatoiminnassa	aikuisille		lapset	
aikuiset, kun kilpirauhanen ei tuota tarpeeksi				
- aloitusannos	25 – 50 mikrogrammaa		12,5 – 50 mikrogrammaa	
- ylläpitoannos	100 – 200 mikrogrammaa		100 – 150 mikrogrammaa per m ² kehon pinta-ala	
Korvaushoito samanaikaisesti hoito tyreostaateilla	50 – 100 mikrogrammaa			
hypertyreoosi				
Suppressiohoito	150 – 300 mikrogrammaa			
Kilpirauhassyöpä				
Diagnostinen käyttö	Viikko 4	Viikko 3	Viikko 2	Viikko 1
kilpirauhasen suppressiotutkimus	ennen testiä	ennen testiä	ennen testiä	ennen testiä
Euthyrox 200 µg	---	---	1 tabl/pv	1 tabl/pv
Euthyrox 100 µg	---	---	2 tabl/pv	2 tabl/pv
Euthyrox 150 µg	½ tabl/pv	½ tabl/pv	1 tabl/päivä	1 tabl/päivä

Sinun tulee ottaa Euthyrox kerran päivässä, puoli tuntia ennen aamiaista. On parasta ottaa Euthyrox pienen nestemäärän (esimerkiksi puoli lasillista vettä) kanssa.

Jos huomaat, että Euthyrox vaikuttaa liian voimakkaasti tai liian heikosti, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

Euthyroxia tulee yleensä käyttää pitkäaikaisesti.

Käyttö lapsilla

Lasten tulee ottaa Euthyrox vähintään puoli tuntia ennen päivän ensimmäistä ateriaa. Tablettien tulee liuottaa pieneen määrään vettä. Suspensio tulee ottaa lisäämällä siihen vielä enemmän nestettä. Suspensio tulee valmistaa vasta juuri ennen kuin annat sen lapsellesi.

Oletko ottanut liikaa tätä lääkettä?

Jos olet ottanut liikaa Euthyroxia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

Seuraavat oireet voivat viitata yliannostukseen: nopeutunut aineenvaihdunta, sydämentykytys, ahdistus, ärtyneisyys, kohtaukset, liiallinen liikkuvuus. Potilailla, joilla on riski psykoottisiin häiriöihin, voi esiintyä akuutin psykoosin oireita.

Oletko unohtanut ottaa tämän lääkkeen?

Älä ota kaksinkertaista annosta unohtuneen tabletin korvaamiseksi. Ota seuraava annos seuraavan aamiaisen yhteydessä.

Jos lopetat tämän lääkkeen ottamisen

Jos Euthyrox-hoito lopetetaan, kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyvät oireet voivat palata.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikilla lääkkeillä, myös tällä lääkkeellä voi olla haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä koe.

Voit kokea yhden tai useamman seuraavista haittavaikutuksista, jos käytät enemmän Euthyroxia kuin on määrätty tai jos et siedä määrättyä annosta (esim. kun annosta nostetaan nopeasti):

Epäsäännöllinen tai nopea sydämenlyönti, rintakipu, päänsärky, lihasheikkous tai kouristukset, punoitus (lämpö ja kasvojen punoitus), kuume, oksentelu, kuukautishäiriöt, pseudotumor cerebri (kohonnut paine päässä), vapina, levottomuus, unihäiriöt, hikoilu, painon lasku, ripuli.

Jos koet jonkin näistä haittavaikutuksista, ota yhteyttä lääkäriisi. Lääkärisi voi päättää keskeyttää hoidon useiksi päiviksi tai vähentää päivittäistä annosta, kunnes haittavaikutukset ovat hävinneet.

Allergiset reaktiot johonkin Euthyroxin ainesosista ovat mahdollisia (katso kohta 6. "Mitä aineita tämä lääke sisältää?"). Allergisia reaktioita voivat olla muun muassa kasvojen tai kurkun turvotus (angioedeema), ihottuma, ihottuma vaaleanpunaisilla paukamilla ja voimakas kutina (nokkosihottuma tai urtikaria). Jos näin tapahtuu, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos saat haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin. Tämä koskee myös haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle, verkkosivusto: www.lareb.nl. Ilmoittamalla haittavaikutuksista autat meitä saamaan enemmän tietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. Miten säilytät tätä lääkettä?

Pidä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

Säilytä alle 25°C alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Se löytyy läpipainopakkauksesta ja laatikosta merkinnän

“EXP” jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivämäärä.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai wc:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekista, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Kun hävität lääkkeit oikein, ne tuhoetaan asianmukaisesti eivätkä päädy ympäristöön.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä aineita tämä lääke sisältää?

- Tämän lääkkeen vaikuttava aine on levotyrokseeninatrium, jokainen tabletti sisältää vastaavasti 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 ja 200 mikrogrammaa levotyrokseeninatriumia.
- Muut tämän lääkkeen aineet ovat maissitärkkelys, sitruunahappo, kroskarmelloosinatrium, gelatiini, magnesiumstearaatti ja mannitoli (E421).

Miltä Euthyrox näyttää ja mitä pakkaus sisältää?

Euthyrox on valkoinen, pyöreä, molemmiin puolin tasainen tabletti, jossa on pyörästetty reuna, jakourre ja kaiverrus toisella puolella:

Euthyrox 25	: EM 25
Euthyrox 50	: EM 50
Euthyrox 75	: EM 75
Euthyrox 88	: EM 88
Euthyrox 100	: EM 100
Euthyrox 112	: EM 112
Euthyrox 125	: EM 125
Euthyrox 137	: EM 137
Euthyrox 150	: EM 150
Euthyrox 175	: EM 175
Euthyrox 200	: EM 200

Euthyrox on pakattu kalenteripakkaukseen. Jokainen laatikko sisältää 3 kalenteripakkausta, joissa on 30 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija Merck BV
Tupolevlaan 41-61
1119 NW Schiphol-Rijk

Valmistaja
Merck Healthcare KGaA
Frankfurter Str. 250
Darmstadt
Saksa

FAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U.
Avda. Leganés, 62
Alcorcón, 28923 Madrid
Espanja

Rekisteröity seuraavasti:

Euthyrox 25: RVG 11718
Euthyrox 50: RVG 11344
Euthyrox 75: RVG 21494
Euthyrox 88: RVG 101391
Euthyrox 100: RVG 09009
Euthyrox 112: RVG 101393
Euthyrox 125: RVG 15468
Euthyrox 137: RVG 101394
Euthyrox 150: RVG 11345
Euthyrox 175: RVG 26173
Euthyrox 200: RVG 26174.

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty helmikuussa 2024.