

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle de käyttäjä

Ripulilääke HTP Loperamide HCl 2 mg, kapselit

loperamidi-hydrokloridi

Lue huolellisesti koko pakkausseloste ennen kuin tätä lääkettä alat käyttää, sillä tila tärkeä tieto in sinulle .

Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen kuten kuvattu in tässä pakkausselosteessa tai kuten lääkärisi tai apteekki u että on kertonut.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Ehkä on u sitä myöhemmin taas tarvitset.
- Onko u vielä kysymyksiä? Ota sitten yhteyttä sinun apteekkari.
- Saatko haittavaikutuksia yksi seuraavista haittavaikutuksista jotka kohdassa 4 mainitaan? Tai saatko sinä haittavaikutuksen joka ei ei in tämä pakkausseloste on? Ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin.
- Onko sinun vaiva 2 2 jälkeen ei vähemmän, tai onko se jopa pahempi? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin.

Sisältö tästä tämä pakkausseloste

1. Mikä on Ripulilääke HTP Loperamide HCl 2 mg ja mihin käytetään tätä lääkettä ?Milloin
 2. et saa saatko tätä lääkettä ei käyttää tai täytyy olla erityisen varovainen sen kanssa olla?
 3. Kuinka käytetään tätä tätä lääkettä?
 4. Mahdolliset sivuvaikutukset
 5. Kuinka säilyttää te tämä lääke?
 6. Sisältö pakkauksen ja muut tiedot Mikä on
-
1. Ripulilääke HTP Loperamide HCl 2 mg HTP Loperamidi HCl 2 mg mihin käytetään tätä lääkettä käytetään käyttää?

Ripulilääke HTP Loperamide HCl sisältää loperamidihydrokloridia. Se on aine joka kuolema liian voimakkaat eteenpäin vievät liikkeet suoliston vähentää . Näinvarmistaa tämä aine aine ennen de toiminta van tämä lääke vastaan ripuli. Tämä lääke toimii vain missä se tarvitaan on, nimittäin suolistossa suoli. Se pysähtyy ripuli yleensä sisällä muutaman tunnin.

Ripulilääke HTP Loperamide HCl kapselit käytetään vastaan akuuttiin tai krooniseen ripuliin aikuisilla ja lapsilla alkaen ja lapsille 8 vuosi. Akuutti ripuli alkaa äkillisesti ja on yleensä viikon kuluessa ohi. Krooninen ripuli on pitkäkestoinen. Tämä lääke käytetään käytetään om de ripuli itse te torjua. Se hoitaa ei de syy ripulin ripuli. Jos syy ripulin ripuli tunnetaan on, täytyy tämä syy (myös) hoidetaan hoidettu.

Onko akuutti ripuli kahden 2 päivän ei vähemmän, tai tuleeko se jopa pahemmaksi? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäri.

2. Milloin et saa tätä lääkettä ei käyttää tai täytyy olla erityisen varovainen sen kanssa?

Milloin et saa tätä lääkettä ei käyttää?

- Olet allerginen jollekin yhden aineen aineista tässä tässä lääkkeessä. Nämä aineet voit löytää löytää kohdasta kohdasta 6.
- Et saa tätä lääkettä koskaan antaa lapsille alle 2 vuoden ikäisille.
- Kapselit eivät sovi lapsille alle 8 vuoden ikäisille vuosi (katso alla 'Milloin sinun täytyy olla erityisen varovainen olemaan tämän lääkkeen kanssa?').
- Käytä tätä lääkettä ei jos luulet ajattelee että de syy ei voida ripuli on myrkytys, esimerkiksi kanssa jonkin raskaan metallin (kuten elohopea, lyijy tai kadmium), voisi voida olla.
- Ette saa tätä lääkettä ei käyttää jos teillä on yksi 'megakoolon' on. Se on yksi voimakkaasti laajentunut paksusuoli ;; yksi vakava tilanne joka voi esiintyä potilailla joilla on Hirschsprungin tauti, Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus Crohnin tauti tai koliitti tunnistaa, erittäin tunnistaa hyvin yksi selvästi kivulias turvonnut vatsa, kuume ja yksi nopeutunut syke.
- Älä käytä tätä lääkettä jos sinulla itse asiassa on ummetus of the ei mitään käännettävää sisältöä suolisto on, minkä vuoksi siellä on vetinen uloste 'vuotaa'. Tämä esiintyy tietyissä suolistosairauksissa . Älä käytä.
- lääkettä älä käytä sitä jos sinä jatkuva vatsakipu on, jos sinä korkea kuume on jaai jos sinun uloste lima jaai veri sisältää. Tämä oireet voivat johtua kautta yksi ruokamyrkytys tai yksi infektio tai tulehdus ei käännettävää sisältöä paksusuoli ..
- tämä tämä lääke ei jos sinä yksi bakteeri tulehdus paksusuolen paksu jatai ohut suoli aiheuttama johtuen invasiiviset organismit, mukaan lukien Salmonella, Shigella en Campylobacter, on.
- Käytä tätä lääkettä ei jos teillä on vakava suolitulehdus on (esimerkiksi colitis ulcerosa tai pseudomembranoottinen koliitti seurauksena käytöstä käyttö alkaen tiettyjen antibioottien).
- Älä käytä tätä lääkettä ei kaikissa tapauksissa joissa normaali suolenliikkeet eivät saa olla tulla estetty. De anto täytyy välittömästi tulla keskeytetty jos ummetus tai vatsan turvotus.

Milloin täytyy olla erityisen varovainen olla tämän kanssa lääke?

Ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin ennen kuin käytät tätä lääkettä ..

lääkkeellä hoidetaan vain ripuli itse de ripuli itse käsitelty, mutta ei syy siihen . Jossyy on tiedossa , niin se täytyy erikseen hoitaa ,jos mahdollista . Kysy. Kysy kohdalla epäily aina sinun lääkäri.

Ota tätä lääkettä ei sisään ennen yksi muu sairaus kuin jota varten se tarkoitettu on (katso kohta 1) älä ota koskaan enempää kuin suositeltu määrä (katso kohta 3). Vakavia sydänongelmia (oireita kuten nopea tai epäsäännöllinen epäsäännöllinen syke) ovat raportoitu potilailla jotka liikaa loperamidia, vaikuttava aine Diarreeremmer HTP Loperamide HCl, ovat ottaneet . Jos sinulla on.

- Jos te ripuli on, menettää te paljon nestettä (kuivuminen). Met että neste menevät myös tärkeitä muita aineita hukkaan. Oireet kuivumisesta kuivuminen voida olla: yksi kuiva suu, huimaus ja/tai oksentelu.
Vaara kuivumisesta on erityisesti nuorilla lapsilla nuori lapset en vanhukset. Heillä täytyy siksi ensimmäinen toimenpide olla ripuli : nesteentäydentäminen kehossa ja pitää tasolla pysyä ja pitää tasolla. Se tarkoittaa: paljon juoda, ja sokeria ja suolaa täydentää. Voit ostaa apteekista tai apteekista tai kemikaliosta sitä varten yksi erityinen suola-sokeriseos (ORS nimeltään) saada, joka vedessä täytyy olla liuotettu. Kysy lääkäriltäsi tai apteekkariltasi tästä neuvoa ohjeita.

- Onko teillä aids ja saako teitä hoitoa ripuli hoidetaan tällä lääkkeellä? Lopetettävän lääkkeen heti kun koette haittaa siitä yksi turvonnut vatsa. Ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriin. Henkilöillä, joilla on ihmiset aids ja vakava suolistoinfektio suolistoinfektio infektiivinenkoliitti) jotka käyttivät loperamidia käyttivät (aine aine aine joka myös tässä tässä lääke on), on joitakin tapauksia raportoitu ummetuksesta ummetus kohonneella yksi lisääntynyt riski varten toksinen megakoolon. Se on yksi voimakas laajentunut paksu suoli, tunnistaa tunnistaa yhteydessä erittäin erittäin kivulias turvonnut vatsa, kuume ja nopea nopea sydämen.
- Toimiiko maksa vähemmän hyvin? Ota sitten yhteyttä lääkäriin ennen kuin käytät tätä lääkettä. Ehkä. täytyy olla hyvin tarkkailtavana tarkastettu tulla jos käytätte tätä lääkettä käytätte. Lisäksi on teillä ehkä tarve toiseen annokseen tarve jotta sivuvaikutuksia hermostoon välttääksenne välttää välttää.

Lapset

Lapset 2 asti 8 vuotta saavat käyttää ainetta loperamidi vain käyttää lääkärin määräyksestä tai lääkärin valvonnassa tai valvonnassa alkaen yksi lääkäri. Noudata aina päällä de annostus jonka lääkäri on määrännyt. Muuten ovat Ripulilääke HTP Loperamide HCl kapselit ei sopivia lapsille alle nuorempia dan 8 vuotta. Zij moeten esimerkiksi juoma loperamidin kanssa käyttää jotta oikea (alhaisempi) annos voidaan ottaa ..

täytyy te sinä lopettaa kanssa tämä lääke?

- Lopeta tämä lääke heti kun uloste kiinteämmäksi muuttuu tai heti kun enemmän kuin kaksitoista tuntia ei uloste enää on tapahtunut.
- Käytättekö tätä lääkettä vastaan akuutti ripuli? Jos ripuli ei vähene 48 tunnin 48 tunti sen jälkeen kun olet aloittanut tämän käytön jälkeen tätä lääkettä, lopeta käyttö tämän lääkkeen ja ota yhteyttä lääkäriin. Jos
- tätä lääkettä lääke ei lääkärin määräyksestä lääkärin yksi lääkäri käytetty, älä koskaan pidempään kuin 14 päivää käyttää. Ovatko sinun oireet jälkeen 14 päivää vielä ei kadonnut, ota yhteyttä sinun lääkäriin. Jos sinä tätä lääkettä kyllä käytät reseptin mukaan lääkärin sinun lääkärin, niin tulee lääkäri annosta säätää jos lääkäri oireet jälkeen 14 päivää vielä ei kadonneet ovat.
- Jos sinulla on ilmenee ummetusta tai turvonnut vatsa, lopeta välittömästi lääkkeen käyttö. käyttö alkaen tätä lääkettä ja ota yhteyttä sinun lääkäriin.
- Jos käytät tätä lääkettä krooniseen ripuliin, niin lääkäritulee sinun lääkäri jälkeen ei ainoa aika yrittää tai annostus kanssa sinä voi tulla alentaa tai että hoidon kanssa hoito voi tulla lopettaa.

Pidä huolellisesti aan de suositeltu annostus. Jos ylität suositellun annostuksen ylittää, on olemassa riski ummetuksesta. Voit tunnistaa tämän tunnistaa tunnistaa tunnistaa tunnistaa ummetus, yksi turvonnut vatsa ja se vuotaa vetistä ulostetta ..

te vielä muita lääkkeitä lääkkeet Käytättekö

te sinä vieressä Ripulilääke HTP Loperamide HCl vielä muita lääkkeitä, on te että äskettäin sitten tehnyt tai on se mahdollisuus että te lähitulevaisuudessa läheisessä tulevaisuus muut lääkkeet käyttää käyttämässä? Kerro se sitten sinun lääkäriin tai apteekkarille.

Ilmoita lääkäriin tai apteekkarille kun olet jos sinä yksi seuraavista alla olevista lääkkeistä ottaa:

- lääkkeet samankaltaisella vaikutuksella kehossa , koska odotetaan että ne vaikuttavat tämän lääkkeen vaikutukseen tämä lääke voida vahvistaa.
- lääkkeet jotka suoliston läpikulku nopeuttavat, koska odotetaan että ne voivat heikentää tämän lääkkeen vaikutusta voida vähentää.
- ritonaviiri (vastaan hiv-infektiot).
- kinidiini (hoito alkaen sydämen rytmihäiriöt).
- oraalinen desmopressiini (hoito virtsan-inkontinenssi).
- itrakonatsoli tai ketokonatsoli (hoito - sieni-infektiot).
- gemfibrotsiili (alentaa kolesterolia).

Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, ajatteletko olevasi raskaana , haluatko raskaaksitulla raskaana tulla of antaa teille imetys? Ota sitten yhteyttä teidän lääkäriin tai apteekkariin ennen kuin te tätä lääkettä käytätte.

Raskaus

Hyödyt hyödyt hoidosta yksi hoito kanssa tämä lääke täytyy olla punnittu vastaan de mahdolliset riskit, ennen tämä lääke käytetään raskauden aikana de raskauden, erityisesti aikana se ensimmäinen kolmannes. Kysy ensin lääkäritäsi. lääkäri

Imetys

Aine joka aiheuttaa vaikutuksen varten tämän lääkkeen alkaen vaikutus aine päätyy kokonaan pieninä määrinä rintamaitoon joutuu .. voit käyttää tätä lääkettä parempi ei käyttää jos imetät sinä rintamaitoa antaa. Jos kuitenkin aiot käyttää, lopeta imetys. Keskustele tästä tarvittaessa lääkärisi kanssa. Ajaminen ja

koneiden käyttö Käytettäessä lääkettä koneiden

käytön yhteydessä käyttö alkaen tämän lääkkeen voi aiheuttaa väsymystä, huimausta tai uneliaisuutta esiintyä. Ennen kuin ajat autoa tai vaarallisia koneita käytät menee käyttää, täytyy sinun tarkistaa onko se sinulla kyseessä tilanne on.

Ripulilääke HTP Loperamide HCl 2 mg sisältää laktoosia

Onko sinun lääkäri kertonut että u jotkut sokerit ei siedä? Ota sitten yhteyttä teidän lääkäriin ennen kuin te tätä lääkettä otatte.

3. Kuinka käytätte te tätä lääkettä?

Käyttö tätä lääkettä aina tarkalleen kuten kuvattu sisään tässä pakkausselosteessa tai kuten lääkärisi tai apteekkisi sinulle on kertonut .. Epäiletkö käyttöä oikea käyttö? Ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkariin ..

lääke on tarkoitettu aikuisille ja lapsille yli 8 vuotta sitten 8 vuosi. De suositeltu annostus on:

Aikuiset joilla on akuutti (äkillinen) ripuli

Aloita 2 kapselilla (4 mg) kerralla. Ota sen jälkeen jokaisen seuraavan löysän ulosteen jälkeen 1 kapseli (2 mg), niin kauan niin kauan kuin de ripuli kestää. Älä koskaan ota enempää kuin 8 kapselia (16 mg) päivässä yksi päivä.

Aikuiset joilla on krooninen (pitkäaikainen) ripuli

Aloita 2 kapselilla (4 mg) päivässä .. Tämä annos täytyy olla säädetty, kunnes sinulla on 1 kerran 2 kertaa päivässä kiinteä uloste . Yleensä tämä saavutetaan yhdellä annoksella tämä saavutetaan 1 asti 6 kapselia (2 asti 12 mg) per päivä. Älä koskaan ota enempää kuin 8 kapselia (16 mg) yhtenä päivänä.

Käyttö lapsilla Lapset

yli 8 vuotta joilla on akuutti ripuli ripuli

Aloita yhdellä kapselilla (2 mg). Anna sen jälkeen jokaisen seuraavan löysän ulosteen jälkeen 1 kapseli (2 mg), niin kauan kuin ripuli jatkuu. Kapselien määrä , jonka lapsi voi ottaa yksi päivä sisällä saa ottaa, on riippuvainen lapsen painosta lapsen katso tätä varten alla oleva taulukko. Älä anna lapselle koskaan enempää kuin 8 kapselia (16 mg) yhdessä päivässä päivä.

Lapset yli kuin 8 vuotta joilla on krooninen ripuli

Aloita 1 kapselilla (2 mg) per päivä. Tätä annosta tulee säätää ,kunnes lapsi 1 asti 2 kertaa per päivä kiinteä uloste on. Yleensä tämä saavutetaan 1 asti 6 kapselilla (2 asti 12 mg) per päivä .määrä määrä kapselit että yksi lapsi päivässä yksi päivä voi ottaa, on riippuvainen lapsen painosta lapsen, katso tätä varten alla oleva taulukko. Anna yksi lasta ei koskaan enempää kuin 8 kapselia (16 mg) päivässä yhtenä päivänä.

Kehonpaino kilogrammoina kilogramma (kg)	Enimmäis määrä Ripulilääke HTP Loperamide HCl kapselit päivässä
20 – 27 kg	3 kapselia
27 – 34 kg	4 kapselia
34 – 40 kg	5 kapselia
40 – 47 kg	6 kapselia
47 – 54 kg	7 kapselia
yli 54 kg	8 kapselia

Lapset 2 asti 8 vuotta

Tätä lääkettä ei saa antaa alle lapsille nuoremmille kuin 8 vuotta , onkuitenkin olemassa tuotteita kyllä tuotteita kanssa yksi alhaisempi vahvuus ja sisään muut annostusmuoto, joka enemmän sopiva ovat tälle ikäryhmälle ikäryhmä esimerkiksi yksi juoma), saatavilla saatavilla.

lääkkäät

Ei ole tarvetta muuttaa annosta iäkkäille . Heikentynyt munuaistoiminta.

tarvetta muuttaa

annosta heikentyneellä munuaistoiminnalla oleville potilaille . kanssa potilaat kanssa heikentynyt munuaistoiminta munuaistoiminta.

maksatoiminta Tätä

lääkettä tulee käyttää varovasti potilailla joilla on heikentynyt maksatoiminta kanssa yksi vähentynyt maksatoiminta in yhteydessä riskin kanssa haittavaikutuksista sivuvaikutukset katsokohta 2). Käyttötapa

Tapa Ota kapselit kokonaisina vesitilkan kanssa.

Onko sinulla liikaa otettu -sta tätä lääkettä käytetty?

Yliannostus tarkoittaa että sinä tai joku lähelläsi on ottanut enemmän tätä lääkettä kuin suositeltu on otettu sitten on ilmoitettu tässä tiedotteessa (katsoalla "Kuinka käytät tätä lääkettä ?"). Jos olet liikaa

Ripulilääke HTP Loperamide HCl ottanut liikaa otettu otettu, ota sitten välittömästi yhteyttä sinun lääkäriin tai mene sairaalaan se sairaalaan neuvoa . Seuraavatoireet voivat ilmetä : kohonnut , epäsäännöllinen, epäsäännöllinen syke, muutokset sisään sinun sykkeessä (nämä oireet voivat mahdollisesti vakavia ja jopa hengenvaarallisia seurauksia aiheuttaa), lihasjäykkyys, koordinaation puute liikkeet, uneliaisuus, ongelmat virtsata pissatessa ,heikko hengitys , pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, vatsakipu, vatsakrampit, ummetus, kuiva suu tai pienet silmänpupillit.

Lapset reagoivat voimakkaammin suuriin määriin Ripulilääke HTP Loperamide HCl kuin aikuiset . Jos. Jos yksi lapsi liikaa ottaa tai yksi näistä yllä mainituista oireista näyttää, soita sitten välittömästi yksi lääkäri.

Oletko unohtanut tämän lääkkeen ottaa käyttää?

Jos olet unohtanut tämän lääkkeen sisään ottaa , teese sitten kuitenkin ,ellei sinulla ole normaalia ulostetta normaali uloste on saanut. Ota ei kaksinkertainen annos korvataksesi unohtuneen annoksen kiinni ottaa . Varmista joka tapauksessa että on vähintään kaksi tuntia välissä tunti välillä kaksi annosta istuu.

Onko teillä vielä muita kysymyksiä käytöstä tämän lääkkeen ? Ota sitten yhteyttä lääkäriisitat apteekkariisi . Mahdolliset.

4. Mahdollinen sivuvaikutukset

Kuten jokainen lääke voi myös tämä lääke haittavaikutuksia olla, vaikka ei kaikki saa niitä kohdata ..

välittömästi lääketieteelliseen apuun apua kanssa:

Kipu ylävatsassa ylävatsa, vatsakipu joka säteilee selkään selkään, arkuus kanssa kosketus vatsan vatsa, kuume, nopea syke, pahoinvointi tai oksentelu. Tämä voi olla oireita ovat haimatulehduksesta tulehdus (akuutti haimatulehdus). Jos sinulla on oireita Jos sinulla on haittavaikutuksia yhdestä alkaen näistä alkaen oireista sivuvaikutukset, lopeta sitten käyttö lääkkeen ja hakeudu heti lääketieteelliseen apuun . esiintymistiheys näiden sivuvaikutusten on ei tiedossa (voi (voi kanssa saatavilla tiedot ei voida määrittää).

Muut mahdolliset sivuvaikutukset on alla lueteltu.

Usein (esiintyvät alle vähemmän kuin 1 kymmenestä käyttäjästä käyttäjät) Hermostojärjestelmän häiriöt: Päänsärky, huimaus Ruoansulatuskanavan häiriöt: Ummetus, pahoinvointi, ilmavaivat

Joskus (esiintyy alle 1:llä 100:sta käyttäjästä)Ruoansulatuskanavan häiriöt

Ruoansulatuskanavan sairaudet: Vatsakipu, epämukavuus vatsassa ,kuiva suu ,kipu ylävatsassa , oksentelu, närästyslho närästys
ja- ja ihosairaudet: Ihottuma

Harvoin (esiintyä alle 1:stä 1.000:sta käyttäjistä)Ruoansulatuskanavan häiriöt
Ruoansulatuskanavan sairaudet: vatsa ,makuhäiriöt Ei

tiedossa (voivoi kanssa saatavilla tiedot ei voida määrittää)

Immuunijärjestelmän häiriöt: Yliherkkyysreaktio, vakavat allergiset reaktiot (anafylaktinen reaktio (mukaan lukien anafylaktinen shokki) ja anafylaktoidi reaktio)

Hermostojärjestelmän häiriöt: Uneliaisuus, tajunnan menetys ,heikentynyt tajunta (stupefaktio), heikentynyt tajunta ,lisääntynyt kohonnut lihaskireys (hypertonia), koordinaatiohäiriöt

Silmäsairaudet: Pupillin supistuminen (mioosi) Ruoansulatuskanavan sairaudet

Ruoansulatuskanavan sairaudet: tai puuttuva suolen läpikulku (ileus ja paralyyttinen ileus), suurentuminen suurentuminen of paksusuoli suoli (megakoolon), kivulias kieli (glossodynia)

Iho- ja ihonalaiset sairaudet: Toksinen-allerginen reaktio korkeudella ihon iho ja ja limakalvot tunnusomaista kautta punoitus, muodostuminen alkaen rakkuloita ja irtoaminen ei käännettävää sisältöä epidermis (bulloosinen ihottuma (myös Stevens-Johnson-oireyhtymä, Lyell-oireyhtymä ja erythema multiforme)), turvonnut kasvot, nokkosihottuma, kutina

Munuaisten- ja virtsateiden sairaudet: Virtsan jääminen virtsarakkoon johtuen häiriintyneestä virtsarakon tyhjentymisestä häiriintynyt virtsarakon tyhjennys (virtsaretentio)

Yleiset sairaudet: Väsymys

Ilmoittaminen haittavaikutuksista alkaen haittavaikutuksista

Jos sinulla on haittavaikutuksia , ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi . Tämä koskee koskee myös sivuvaikutuksista mahdolliset haittavaikutukset jotka eivät tässä tässä pakkausselosteessa ovat.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan ilmoittaa kautta Alankomaiden

Haittavaikutuskeskus Lareb, verkkosivusto: www.lareb.nl. Ilmoittamalla haittavaikutukset ilmoittaa auttaa, voit sinä meitä saada lisää tietoa saada tästä turvallisuudesta tämän lääkkeen . Miten.

5. tätä lääkettä u tämä lääke?

Pidä poissa näkyvistä ja ulottuvilta lasten saatavilla .. alle 30 °C. Älä käytä

tätä lääkettä enää ei lisää na de äärimmäinen viimeinen käyttöpäivä. Se on löydettävissä

pakkauksesta päällä pakkauksesta jälkeen "Ei käytettävä jälkeen ." tai "Exp.:". Siellä on kuukausi ja kuukausi ja yksi vuosi. De viimeinen päivä van die kuukausi is de viimeinen viimeinen käyttöpäivä.

Avaamisen jälkeen tablettisäiliö vielä 12 kuukautta käyttökelpoinen. Säiliö huolellisesti suljettu säilyttää.

Huuhtelee lääkkeitä ei viemäriin tai WC:hen tai WC:hen ja heitä niitä ei roskakoriin roskakoriin. Kysy apteekkariltasi apteekkariltasi mitä tehdä lääkkeillä täytyy tehdä jotka te ei enää käytätte. Ne tuhotaan sitten vastuullisella tavalla hävitetään ja eivät pääse ympäristöön ympäristössä Sisältö.

6. Sisältö pakkauksen pakkaus ja muut tiedot Mitä aineet sisältää tässä lääkkeessä ? Vaikuttava

- aine tässä lääkkeessä on loperamidi hydrokloridi on loperamidihydrokloridi. Jokainen kapseli sisältää 2 mg loperamidihydrokloridia.
- Valmisteen muut aineet ovat tässä lääkkeessä laktoosi monohydraatti monohydraatti (katsokohta 2), maissitärkkelys, talkki, keskustelet, magnesiumstearaatti, gelatiini, titaanioksididi (E 171), kinoliininkeltainen (E104), indigotiini (E132), rautaoksididi keltainen (E172) ja rautaoksididi musta (E172).

Miltä näyttää Ripulilääke HTP Loperamidi HCl 2 mg ? en kuinka paljon on siinä yksi pakkaus? Ripulilääke HTP Loperamide HCl 2 mg, kapselit ovat läpinäkymättömiä tummanvihreitä/harmaita ja sisältävät yksi valkoinen jauhe.

Se lääke on pakattu sisään läpipainopakkaukseen (läpipainolevyt) 10 kapselin pakkauksissa 10:n kappaleen kappaletta pakkaukseen tai laatikko pilleripurkkiin jossa on 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 tai 5000 kapselia. 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 kapselia 5000:sta.

Ei kaikki mainitut pakkauskoost ovat markkinoilla saatavilla ..

luvan haltija myyntiluvan saamiseksi markkinoille tuominen ja valmistaja Haltija

luvan haltija myyntiluvan varten se kauppa tuoda markkinoille
Healthypharm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda Alankomaat

Valmistaja
Centrafarm Services B.V.
Van de Reijtstraat 31-E
4814 NE Breda
Alankomaat

STADA Arzneimittel AG
Stadastraße 2 - 18
61118 Bad Vilbel
Saksa

Rekisterissä rekisteröity alla

RVG 20642=15140, Ripulilääke HTP Loperamide HCl 2 mg, kapselit.

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty kesäkuussa 2022. Lisää tietoa on

saatavilla tarvittaessa. yli tämä lääke on saatavilla verkkosivustolla