

Bipacksedel: information för den användaren

Diarréhämmare HTP Loperamid HCl 2 mg, kapslar

loperamidhydroklorid

Läs noggrant hela bipacksedeln innan du detta läkemedel ska använda, eftersom det står viktig information i för dig.

Använd detta läkemedel alltid exakt som beskrivet i denna bipacksedel eller som din läkare eller apotekare du det har berättat.

- Förvara denna bipacksedel. Kanske har du den senare igen behöver.
- Har du ytterligare frågor? Kontakta då din apotekare.
- Får du besvär av en av de biverkningar som i avsnitt 4 står? Eller får du en biverkning som inte i denna bipacksedel står? Kontakta då din läkare eller apotekare.
- Blir ditt besvär efter 2 dagar inte mindre, eller blir det till och med värre? Kontakta då din läkare.

Innehåll av denna bipacksedel

1. Vad är Diarréhämmare HTP Loperamid HCl 2 mg och vad används denna medicin för?
 2. När får du detta läkemedel inte använda eller måste du vara extra försiktig med vara?
 3. Hur använder du detta läkemedel?
 4. Möjliga biverkningar
 5. Hur förvarar du detta läkemedel?
 6. Innehåll av förpackningen och övrig information Vad är
-
1. Diarréhämmare HTP Loperamid HCl 2 mg och vad används detta läkemedel för används?

Diarréhämmande HTP Loperamid HCl innehåller loperamidhydroklorid. Det är ett ämne som för starka framdrivande rörelser av tarmen tarmen minskar. Så ser detta ämne för de verkan av detta läkemedel mot diarré. Detta läkemedel verkar endast där det behövs är, nämligen i tarmen. Det stoppar diarré vanligtvis inom några timmar.

Diarréhämmande HTP Loperamid HCl kapslar används mot akut eller kronisk diarré hos vuxna och barn från från 8 år. Akut diarré börjar plötsligt och är vanligtvis inom en vecka över. Kronisk diarré är långvarig. Detta läkemedel används används om diarré själv att bekämpa. Det behandlar inte orsaken till diarrén . Om orsakentill diarrén är känd , måste den behandlas denna orsak (också) bli behandlad.

Blir akut diarré efter 2 dagar inte mindre, eller blir den till och med värre? Kontakta då din läkare.

2. När får du detta läkemedel inte använda eller måste du vara extra försiktig med vara?

När får du detta läkemedel inte använda?

- Du är allergisk mot en av de ämnen i denna läkemedel. Dessa ämnen kan du hitta i avsnitt 6.
- Du får detta läkemedel aldrig ge till barn yngre än 2 år.

- Kapslarna är inte lämpliga för barn yngre än 8 år (se under 'När måste du extra försiktig vara med detta läkemedel?').
- Använd detta läkemedel inte om du tror att de orsaken av diarré en förgiftning, till exempel med en tung metall (såsom kvicksilver, bly eller kadmium), skulle kan är.
- Du får detta läkemedel inte använda om du har 'megakolon' har. Det är en kraftigt utvidgad tjocktarm ;; en allvarlig situation som kan förekomma hos patienter med sjukdomen Hirschsprungs sjukdom, sjukdomen Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, att känna igen på en mycket smärtsamma uppsvällda buk, feber och en förhöjd hjärtfrekvens.
- Använd detta läkemedel inte om du egentligen en förstoppning av tarmar har, vilket det finns lite vattnig avföring 'läcker'. Detta förekommer vid vissa tarmsjukdomar tarmsjukdomar.
- detta läkemedel inte om du ihållande buksmärta har, om du hög feber har och över om din avföring slem och över blod innehåller. Denna symptom kan komma av en matförgiftning eller av en infektion eller inflammation i tjocktarmen ..
- detta detta medel inte om du en bakteriell inflammation av tjocktarmen och/ tunntarmen orsakad av invasiva organismer , inklusive inklusive av Salmonella, Shigella av Salmonella, Shigella en Campylobacter, har.
- Använd detta läkemedel inte om du en allvarlig tarminflammation har (till exempel kolit ulcerös eller pseudomembranös kolit ten följd av användning av vissa antibiotika).
- Använd detta läkemedel inte i alla fall där den normala tarmrörelser inte får bli undertryckt. De administrering måste omedelbart bli avbruten vid förstoppning eller buksvullnad.

När måste du vara extra försiktig med detta detta medel?

Kontakta din läkare eller apotekare innan du detta medel använder.

Med detta medel behandlas endast diarrén själv själv angripen, men inte orsaken till det . Om orsaken är känd , då måste den behandlas separat , om möjligt .Rådfråga vid möjlig .Rådfråga vid tvivel alltid din läkare.

Ta denna medicin inte för en annan sjukdom än den som den är avsedd för (se avsnitt 1) ta ta aldrig mer än den rekommenderade mängden (se avsnitt 3). Allvarliga hjärtproblem (symtom som en snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens) är rapporterade hos patienter som för mycket loperamid, den aktiva substansen i Diarréhämmare HTP Loperamid HCl, har intagit.

- Om du diarré har, förlorar du mycket vätska (uttorkning). Med den vätskan försvinner också viktiga andra ämnen bort. Symtom på uttorkning kan vara: en torr mun, yrsel och/eller kräkningar.
Risk för uttorkning finns särskilt hos små barn en äldre. Hos dem måste därför den första åtgärden vid diarré vara: att vätska i kroppen fyllas på och hållas på nivå hålla. Dat betyder: mycket dricka, och socker och salt tillföra. Du kan på apoteket eller drogist för en en speciell salt-sockerblandning (ORS kallad) få, som i vatten måste bli upplöst. Fråga din läkare eller apotekare om detta för råd.
- Har du aids och blir du för diarré behandlad med detta läkemedel? Sluta med detta läkemedel så snart du får problem med en svullen mage. Ta i det fallet kontakt med din läkare. Hos personer med aids och en allvarlig tarminfektion (infektiös kolit) som använde loperamid använde (den substans som också i detta läkemedel finns), har några fall rapporterats av förstoppning med en ökad risk för toxisk megakolon. Det är en stark

utvidgad tjock tarm, att känna igen på en mycket smärtsam uppsvälld buk, feber och en förhöjd hjärtfrekvens.

- Fungerar din lever mindre bra? Kontakta då din läkare innan du detta läkemedel ska användas. Kanske måste du bra övervakad bli om du detta läkemedel använder. Dessutom har du kanske en annan dos behöver för att biverkningar på nervsystemet undvika undvika.

Barn

Barn av 2 till 8 år får substansen loperamid endast använda på recept av en läkare eller under övervakning av en läkare. Följ alltid till den dosering som läkaren har föreskrivit. Dessutom är Diarréhämmare HTP Loperamid HCl kapslar inte lämpliga för barn yngre då 8 år. De måste till exempel dryck med loperamid använda för att rätt (lägre) dos kunna ta ..

måste du du sluta med detta läkemedel?

- Sluta med detta läkemedel så snart din avföring fastare blir eller så snart det går mer än tolv timmar ingen avföring mer har inträffat.
- Använder du detta läkemedel mot akut diarré? Om diarrén inte minskar inom 48 timmar efter du har börjat med användning av detta läkemedel, sluta då med användning av detta läkemedel och kontakta din läkare.
- Om du detta läkemedel inte på recept av en läkare används, bör du aldrig längre än 14 dagar använda. Är dina besvär efter 14 dagar fortfarande inte försvunnen, kontakta då din läkare. Om du detta läkemedel använder enligt ordination från din läkare, då kommer läkaren att justera dosen om det de klagomål efter 14 dagar ännu inte försvunnit är.
- Om du får besvär av förstoppning eller en uppsvälld mage, sluta då omedelbart med användning av detta läkemedel och kontakta din läkare.
- Om du detta läkemedel använder mot kronisk diarré, då kommer din läkare efter några tid försöka om doseringen vid dig kan bli sänkt eller att med behandlingen kan bli stoppad.

Håll dig noggrant till den rekommenderade doseringen. Om du överskrider den rekommenderade doseringen finns det, finns det en risk för tarmobstruktion. Du kan känna igen detta på förstoppning, en uppsvälld mage och det läckage av vattning avföring.

Använder du andra läkemedel använder

du du bredvid Diarréhämmande medel HTP Loperamid HCl ännu andra läkemedel, har du det nyligen gjort eller finns möjligheten att du i nära framtid andra läkemedel ska använda? Berätta det då din läkare eller apotekare.

Informera din läkare eller apotekare om du om du en av de följande läkemedel tar:

- läkemedel med liknande verkan i kroppen ,eftersom förväntas det att de påverkar effekten av detta medel medel kan förstärka.
- läkemedel som tarmrörelser påskyndar, eftersom förväntas att de kan minska effekten av denna medicin kan minska minska.
- motmot hiv-infektioner).
- kinidin (behandla av hjärtrytmrubbningar).
- oralt desmopressin (behandla av urin-inkontinens).
- itrakonazol eller ketokonazol (behandla av svampinfektioner).
- gemfibrozil (sänka av kolesterol).

Graviditet och amning

Är du gravid, tror du gravid att vara , vill dugravid bli bli av ger du ammar? Kontakta då din läkare eller apotekare innan du detta läkemedel använder.

Graviditet

De fördelar med en behandling med detta läkemedel måste vägas mot de potentiella riskerna ,innan detta läkemedel används under graviditeten , i graviditeten , igraviditeten särskilt under det första trimestern. Rådfråga först din läkare.

Amning

Det ämne som ansvarar för effekten av detta läkemedel medel kommer i hela små mängder i bröstmjölken hamna. Därför kan du detta läkemedel bättre inte använda om du ammar ger. Om du ändå ska använda, sluta då med amning. Rådfråga om detta vid behov med din läkare.

Körförmåga

och användning av maskiner Vid

Vid användning av detta läkemedel kan trötthet, yrsel eller dåsighet förekomma. Innan du ska köra bil eller farliga maskiner ska använda, måste du kontrollera om det hos dig är fallet .

Diarréhämmande HTP Loperamid HCl 2 mg innehåller laktos

Har din läkare sagt att du vissa sockerarter inte tål? Kontakta då din läkare innan du denna medicin tar.

3. Hur använder du denna medicin?

Använd detta läkemedel alltid exakt som beskrivet i denna bipacksedel eller som din läkare eller apotekare har det berättat för dig. Tvivlar du på rätt användning? Kontakta då din läkare eller apotekare.

Detta läkemedel är avsett för vuxna och barn över 8 år. De rekommenderad dosering är:

Vuxna med akut (plötslig) diarré

Börja med 2 kapslar (4 mg) på en gång. Ta därefter efter varje efterföljande lös avföring 1 kapsel (2 mg), så länge de diarré varar. Ta aldrig mer än 8 kapslar (16 mg) per en dag.

Vuxna med kronisk (långvarig) diarré

Börja med 2 kapslar (4 mg) per dag. Dessa dos måste bli justerad, tills du 1 till 2 gånger per dag fast avföring har. Vanligtvis blir detta uppnått med 1 till 6 kapslar (2 till 12 mg) per dag. Ta aldrig mer än 8 kapslar (16 mg) på en dag.

Användning hos barn

Barn äldre än 8 år med akut diarré

Börja med 1 kapsel (2 mg). Ge därefter efter varje efterföljande lös avföring 1 kapsel (2 mg), så länge diarréen varar . Antaletkapslar som ett barn kan ta per en dag i maj ta, är beroende av barnets kroppsvikt av barnet, se för detta nedanstående tabell. Ge ett barn aldrig mer än 8 kapslar (16 mg) på en dag.

Barn äldre än 8 år med kronisk diarré

Börja med 1 kapsel (2 mg) per dag. Denna dos måste justeras ,tills barnet 1 barnet 1 till 2 gånger per dag fast avföring har. Vanligtvis blir detta uppnått med 1 till 6 kapslar (2 till 12 mg) per dag. Antalet antalet kapslar som en barn på en dag får ta, är beroende av kroppsvikten hos barnet, se för detta nedanstående tabell. Ge en barn aldrig mer än 8 kapslar (16 mg) på en dag.

Kroppsvikt i kilogram (kg)	Maximalt antal Diarréhämmare HTP Loperamid HCl kapslar per dag
20 – 27 kg	3 kapslar
27 – 34 kg	4 kapslar
34 – 40 kg	5 kapslar
40 – 47 kg	6 kapslar
47 – 54 kg	7 kapslar
mer än 54 kg	8 kapslar

Barn av 2 till 8 år

Detta läkemedel får inte administreras till barn yngre än 8 år , detfinns dock andra produkter produkter med en lägre styrka och i annan administreringsform, som mer lämpliga är för denna åldersgrupp (till exempel en dryck), tillgänglig.

Äldre

Det finns ingen justering av dosen krävs för äldre.

Nedsatt njurfunktion

Det finns ingen justering av dosen krävs vid patienter med en nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Detta läkemedel ska användas försiktigt hos patienter med en nedsatt leverfunktion leverfunktion i samband med risk för biverkningar (se avsnitt 2).

Hur man tar

Svälj kapslarna hela med lite vatten.

Har du för mycket av detta läkemedel använt?

Överdoserering innebär att du eller någon i din omgivning mer av detta läkemedel har intagit då är anges i denna bipacksedel (se under "Hur använder du denna medicin?").

Om du för mycket Diarréhämmare HTP Loperamid HCl har tagit, ta då omedelbart kontakt med din läkare eller gå till sjukhuset för råd . Följandesymtom kan uppstå : ökad: , oregelbunden, oregelbundna hjärtslag, förändringar i ditt hjärtslag (dessa symtom kan potentiellt allvarliga och till och med livshotande konsekvenser ha), muskelstelhet, okoordinerade rörelser, dåsighet, problem att kissa ,svag andning , illamående, kräkningar, buksmärta, buksmärta, buksmärtor, förstoppning, torr mun eller små ögonpupiller.

Barn reagerar starkare på stora mängder Diarréhämmare HTP Loperamid HCl än vuxna. Om en barn för mycket intar eller en av de ovan nämnda symtomen uppvisar, ring då omedelbart en läkare.

Har du glömt denna medicin att använda?

Om du har glömt detta läkemedel i att ta, gör det då ändå, om inte du har normal avföring har haft. Ta ingen dubbel dos för att en glömd dos att komma ikapp. Se till i varje fall att det minst två timmar mellan två intag sitter.

Har du fortfarande andra frågor om användningen av användning av denna medicin? Kontakta då din läkare eller apotekare.

4. Möjliga biverkningar

Som varje läkemedel kan också detta läkemedel biverkningar ha, även om får inte alla det att göra.

Sök omedelbart medicinsk hjälp vid:

Smärta i övre magen, buksmärta som strålar mot ryggen, ömhet vid beröring av magen, feber, snabb hjärtslag, illamående eller kräkningar. Detta kan symtom vara på inflammation i bukspottkörteln (akut pankreatit).

Om du får problem med en av dessa biverkningar, sluta då med användning av läkemedlet och sök omedelbart medicinsk hjälp . Frekvensen av dessa biverkningar är inte känd (kankan med de tillgängliga data inte bestämmas kan).

Andra möjliga biverkningar listas nedan ..

förekommer hos mindre än 1 av 10 användare mindre än 1 av 10 användare) Sjukdomar i nervsystemet: Huvudvärk, yrsel Sjukdomar i mag-tarmkanalen: Förstoppning, illamående, gaser

Ibland (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)Sjukdomar i mag-tarmkanalen
Mag-tarmsjukdomar: Buksmärta, obehag i magen, torr mun, smärta i övre buken, kräkningar, halsbränna

Hud- och subkutana sjukdomar: Hudutslag

Sällan (förekommer hos mindre än 1 av 1.000 användare)Mag-tarmsjukdomar Mag-tarmsjukdomar: buk ,smakstörningar Okänd

(kan (kan med de tillgängliga data inte kan fastställas)

Immunsystemsjukdomar: Överkänslighetsreaktion, allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion (inklusive anafylaktisk chock) och anafylaktoid reaktion)

Nervsystemet: Sömnighet, förlust av medvetande, nedsatt medvetande (stupor), försvagat medvetande, ökad muskelspänning (hypertoni), koordineringsavvikelse Ögonsjukdomar:

Förträngning av pupillen (mios)

Mag-tarmsjukdomar: Minskad eller frånvarande tarmrörelse (ileus och paralytisk ileus), förstoring av tjock tarm (megakolon), smärtsam tunga (glossodyn)

Hud- och underhudssjukdomar: Toxisk-allergisk reaktion på nivå av hud och slemhinnor kännetecknas av rodnad, bildning av blåsor och lossnande av överhuden (bullös eruption (även Stevens-Johnsons-syndrom, Lyell-syndrom och erythema multiforme)), svullen ansikte, näselfeber, klåda

Njur- och urinvägssjukdomar: Kvarhållande av urin i blåsan på grund av en störd blåstömning (urinretention)

Allmänna tillstånd: Trötthet

Rapportera biverkningar av biverkningar

Får du besvär av biverkningar, kontakta då din läkare eller apotekare. Detta gäller också för möjliga biverkningar som inte i denna bipacksedel står. Du kan biverkningar också direkt rapportera via Nederländska Biverknings Centrum Lareb, webbplats: www.lareb.nl. Genom biverkningar att rapportera, kan du oss hjälpa mer information att få om säkerheten av denna läkemedel.

5. Hur förvarar u detta läkemedel?

Utanför synhåll och räckhåll för barn förvara. Förvara under 30 °C.

Använd detta läkemedel inte längre efter de sista hållbarhetsdatum. Den är att hitta på förpackningen efter "Ej att använda efter:" eller "Exp.:". Där står en månad och en år. Den sista dagen i den månaden är sista hållbarhetsdatumet.

Efter öppning av tablettbehållaren fortfarande 12 månader hållbar. Behållaren noggrant stängd hålla.

Skölj läkemedel inte genom diskhon eller toaletten och kasta dem inte i soptunnan. Fråga din apotekare vad du ska göra med läkemedel måste göra som du inte längre använder. De blir då på ett ansvarsfullt sätt förstörda och kommer inte ut i miljön hamna.

6. Innehåll av förpackningen och övrig information Vilka ämnen finns det i denna medicin?

- Den aktiva substansen i denna medicin är loperamidhydroklorid. Varje kapsel innehåller 2 mg loperamidhydroklorid.
- De andra ämnena i denna medicin är laktos monohydrat (se avsnitt 2), majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (E 171), kinolingult (E104), indigotin (E132), järnoxid gul (E172) och järnoxid svart (E172).

Hur ser Diarréhämmare HTP Loperamid HCl 2 mg ut en hur mycket finns det i en förpackning? Diarréhämmare HTP Loperamid HCl 2 mg, kapslar är ogenomskinliga mörkgröna2Fgrå och innehåller ett vitt pulver.

Det medel är förpackad i blisterförpackning (tryckförpackningar) med 10 kapslar med multiplar av 10 stycken i en låda eller i en tablettbehållare med 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 eller 5000 kapslar.

Inte alla nämnda förpackningsstorlekar blir i handeln förda.

Innehavare av tillståndet för att i handeln sätta och tillverkare

Innehavare av tillståndet för det i handel sätta

Healthypharm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda Nederländerna

Tillverkare
Centrafarm Services B.V.
Van de Reijtstraat 31-E
4814 NE Breda
Nederländerna

STADA Arzneimittel AG
Stadastraße 2 - 18
61118 Bad Vilbel
Tyskland

I registret registrerad under

RVG 20642=15140, Diarréhämmande HTP Loperamid HCl 2 mg, kapslar.

Denna bipacksedel är för den senast godkänd i juni 2022.

Mer information över detta läkemedel är tillgänglig på webbplatsen