

Prospecto: información para el usuario

Lyrica 25 mg cápsulas duras,
Lyrica 50 mg cápsulas duras,
Lyrica 75 mg cápsulas duras,
Lyrica 100 mg cápsulas duras,
Lyrica 150 mg cápsulas duras,
Lyrica 200 mg duras cápsulas,
Lyrica 225 mg duras cápsulas,
Lyrica 300 mg duras cápsulas
pregabalina

Lea cuidadosamente todo el prospecto antes de que este medicamento use usar porque hay está importante información en para usted.

- Guarde este prospecto. Quizás necesite usted lo más tarde de nuevo necesario.
- Tiene usted todavía preguntas? Entonces póngase en contacto con su médico o farmacéutico.
- No dé este medicamento a otros , porque es solopara usted prescrito . El prescrito. El puede perjudicial ser para otros, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Si experimenta
- efectos secundarios uno de los efectos secundarios que se mencionan en mueren en sección 4 figura? O tiene usted un efecto secundario que no en este prospecto figura? Entonces contacte a su médico o farmacéutico.

Contenido de este prospecto

1. Qué es Lyrica y para qué se este medicamento utiliza?
 2. Cuándo no debe este medicamento usar o debe tener especial cuidado con cuidado con ser?
 3. Cómo usa usted este medicamento?
 4. Posibles efectos secundarios
 5. Cómo almacena usted este medicamento?
 6. Contenido de la empaque y otra información
-
1. Qué es Lyrica y para qué se utiliza este medicamento?

Lyrica pertenece al grupo de medicamentos utilizados para de tratamiento de epilepsia, neuropático dolor y trastorno de ansiedad generalizada (GAD) en adultos.

Periférico y central neuropático dolor: Lyrica se utiliza en el tratamiento de dolores prolongados que son causados por lesiones de los nervios . Diversas enfermedades como la diabetes o herpes zóster culebrilla (zona) pueden periférico neuropático dolor causar. Percepciones del dolor pueden ser descritas como caliente, ardiente, palpitante, punzante, punzante, agudo, calambre, doloroso, hormigueo, entumecido, adormecido. Periférico y central neuropático dolor puede también acompañado ir con cambios de humor, trastornos del sueño, fatiga y puede afectar al funcionamiento físico y social funcionar el de total calidad de vida.

Epilepsia: Lyrica se utiliza en el tratamiento de ciertas formas de epilepsia en adultos

adultos (parciales ataques con o sin secundariamente generalizados ataques). Su médico le prescribirá Lyrica para apoyar el tratamiento de su epilepsia, si sus actuales medicamentos su condición no bajo control. Usted debe Lyrica además de su actual tratamiento tomar. Lyrica es. Lyrica es no destinado a solo ser utilizado, pero debe siempre ser utilizado en combinación con otros anti-epilépticos (medicamentos utilizados en epilepsia).

Generalizada trastorno de ansiedad: Lyrica se utiliza utilizado en el tratamiento de trastorno de ansiedad generalizada (TAG). Los síntomas del TAG son prolongados en excesiva ansiedad y preocupación que difícilmente controlable son. TAG puede también inquietud o una sensación de tensión o irritación causar, o puede asegurar que te sientas rápidamente cansado, te cuesta concentrarte, no puedes recordar nada o te sientas irritable doblado, o puede tensión muscular o trastornos del sueño causar. Esto no tiene nada que ver con el estrés y la tensión en la vida diaria.

2. Cuando puede este medicamento no usar o debe tener especial cuidado con ser?

Cuándo no debe este medicamento no usar?

Es alérgico a para uno de los componentes en este medicamento. Estos componentes puede encontrar en la sección 6.

Cuándo debe tener cuidado ser con este medicamento?

Póngase en contacto con su médico o farmacéutico antes de que este medicamento tome.

En algunos pacientes que usan Lyrica utilizan usar, son síntomas reportados que indican una una alérgica reacción. Estos síntomas incluyen hinchazón de la cara, labios, lengua en garganta pero también erupción cutánea. Usted debe inmediatamente contacto llamar con su médico si uno de estas reacciones en u ocurre.

En relación con el uso de pregabalina se ha informado de de graves cutáneas reacciones adversas (reacciones adversas en la piel), como el síndrome de Stevens-Johnson y tóxica epidérmica necrólisis. Deje de usar pregabalina pregabalina busque inmediatamente ayuda médica si es necesario usted uno de los en sección 4 descritos síntomas en relación con estos graves reacciones cutáneas observa.

- Durante el uso de Lyrica son mareos y somnolencia ocurrido, lo que el ocurrencia de accidentes (caídas) en pacientes mayores puede aumentar. Tenga por lo tanto cuidado hasta que u acostumbrado está a el efecto que este medicamento podría tener ..
- puede visión borrosa o pérdida de la visión visión de otros cambios del campo visual causar, de los cuales la mayoría temporalmente son. Usted debe lo inmediatamente a su médico informar si usted cambios de su visión nota.
- En ciertos pacientes con diabetes que en peso aumentan durante el tratamiento con pregabalina puede uno ajuste de su medicación para la diabetes necesario ser.
- Ciertos efectos secundarios como somnolencia pueden más frecuentemente ocurrir, porque pacientes con lesión medular otros medicamentos pueden usar para por ejemplo dolor o espasticidad tratar tratar. Estos medicamentos tienen los mismos efectos secundarios que pregabalina y de Gravedad de estos efectos secundarios puede aumentada estar con uso simultáneo ..
- están en algunos pacientes durante el uso uso de Lyrica notificaciones ha habido de insuficiencia cardíaca;

generalmente fueron estos pacientes mayores con enfermedades cardiovasculares enfermedades oculares. Antes de que usted comience a tomar de este medicamento debe le su médico informar si ha pasado problemas ha tenido de una enfermedad cardíaca.

- Hay hay en algunos pacientes durante el uso de Lyrica informes han sido de insuficiencia renal. Si usted durante el uso de Lyrica nota que orina menos orina, debe informar a su médico ya que esto puede mejorar al dejar de tomar el medicamento . Algunos.
- que pacientes la tratado fueron con anti-epilépticos como Lyrica, han tenido pensamientos sobre autolesiones o suicidio o han mostrado comportamiento suicida. Si en algún momento semejante pensamientos tiene o tal comportamiento muestra, póngase en contacto inmediatamente con su médico.
- Cuando Lyrica se toma con otros medicamentos que estreñimiento pueden causar (como algunos tipos analgésicos), es posible que problemas gastrointestinales ocurran (p. ej. estreñimiento, bloqueo o parálisis intestinal). Diga el su médico si usted estreñimiento tiene, especialmente si usted sensible a este problema es.
- Diga el su médico antes de usted comience con el uso de este medicamento si usted alguna vez abuso ha cometido o dependiente ha sido de alcohol, medicamentos en prescripción o drogas ilegales; esto puede significar que usted un mayor riesgo corre de dependiente volverse ser de Lyrica.
- Hay casos de convulsiones /ataques(convulsiones)reportados durante el uso de Lyrica o poco después del el detener con Lyrica. Póngase en contacto inmediatamente con su médico si hay en usted una convulsión ocurre.
- Hay casos de disminución de la función cerebral función cerebral encefalopatíaencefalopatía) reportado en un número de pacientes que Lyrica usaban. Estos pacientes tenían también otras afecciones. Informe a su médico si usted en el pasado sufrió ha tenido de graves enfermedades, como por ejemplo enfermedades hepáticas o renales.
- Ha habido informes de de dificultades respiratorias. Si usted sufre de de
- trastornos del sistema nervioso, trastornos del sistema respiratorio, insuficiencia renal o si usted es mayor de 65 años, puede su médico un otro esquema de dosificación prescribir. Comuníquese con su médico si usted dificultad para respirar o una respiración superficial tiene.

Dependencia

Algunas personas pueden de Lyrica dependientes volverse (una necesidad de seguir medicamento tomando continuar tomándolo). Pueden pueden síntomas de abstinencia experimentar cuando ellos dejan de tomarlo uso de Lyrica (ver sección 3, "Cómo usa usted este medicamento?" y "Si usted deja de usar este medicamento "). Si ustedse siente er preocupaciones sobre hace que usted de Lyrica dependiente puede volverse, es importante que usted su médico consulte.

Si usted uno de los siguiente síntomas nota durante el tomar de Lyrica, puede esto un signo ser que usted dependiente ha convertido:

- Usted debe el medicamento más tiempo tomar que recomendado por su prescriptor
- Usted tiene la sensación que usted más debe tomar que la recomendada dosis
- U uso el medicamento para otras razones que prescrito

- U ha repetidos, fallidos intentos hecho para dejar de con o control a obtener sobre el uso del medicamento
- Cuando usted deje de tomar el medicamento se siente usted no bien mal, en usted se siente mejor tan pronto como usted tome el medicamento nuevamente Si un

de estos síntomas observa , póngase en contacto con sumédico para el médico para el mejor proceso de tratamiento para usted discutir hablar, incluyendo cuando el un adecuado momento para dejar y cómo esto en un adecuado segura manera debe hacer.

Niños y jóvenes hasta 18 años

La seguridad y eficacia en niños y jóvenes (hasta la edad de 18 años) son no establecido. Lyrica no debe por lo tanto no ser aplicado en este grupo de edad.

Usa usted otros medicamentos medicamentos?

Usa usted además de Lyrica otros medicamentos medicamentosha usted hecho recientemente o existe la posibilidad de que posibilidad ese usted en el cercano futuro otros medicamentos va usar? Dígame eso a su médico o farmacéutico . Esoaplica también para medicamentos donde dónde u ninguno prescripción para necesario tiene.

Lyrica y ciertos otros medicamentos pueden interactuar afectar interacción). Eningestión con con ciertos otros medicamentos que un sedante efecto tienen (incluyendo opioides), puede Lyrica estos efectos potenciar, lo que puede conducir hasta paro respiratorio, coma y fallecimiento.

Mareos, somnolencia y disminución de la concentración pueden empeorar si Lyrica se administra junto con medicamentos administrado que:

- oxycodona (usado como analgésico)
- lorazepam (usado en el tratamiento de la ansiedad) o
- alcohol contener.

Lyrica puede simultáneamente con oral anticonceptivos se utilizan.

¿En qué debe usted prestar atención con la comida, bebidas y alcohol?

Las cápsulas de Lyrica pueden con o sin alimentos ser tomadas.

El se recomienda no consumir alcohol al beber durante el uso de Lyrica.

Embarazo y lactancia

Lyrica no debe durante el embarazo de durante el amamantamiento ser utilizado, a menos que su médico decida lo contrario. El uso de pregabalina durante el primer 3 meses de la embarazo puede malformaciones congénitas causar en el no nacido niño para lo cual un tratamiento médico necesario es. De un estudio en el que datos fueron evaluados de mujeres de Norte-Europeos países que durante el primer 3 meses del embarazo pregabalina habían tomado, pálido que 6 de cada 100 bebés tales defectos de nacimiento mostraron. En mujeres que durante el estudio no con pregabalina fueron tratadas, eran que 4 de cada 100 bebés. Malformaciones de la cara (labio leporino, mandíbula yo paladar), los ojos, el sistema nervioso (incluyendo el cerebro), riñones y órganos sexuales fueron reportados.

Mujeres que pueden quedar embarazadas deben usar anticonceptivos efectivos. Si está embarazada, piensa que está embarazada o quiere quedar embarazada o está dando el pecho? Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento.

Capacidad para conducir y el uso de máquinas

El uso de Lyrica puede causar mareos o somnolencia en reducida concentración. No debe conducir vehículos, operar máquinas u otras actividades de riesgo hasta que claro esté si este medicamento afecta su capacidad para realizar estas tareas.

Lyrica contiene lactosa monohidrato

Consulte a su médico antes de tomar este medicamento, si su médico le ha dicho que usted ciertos azúcares no puede tolerar ..

Este medicamento contiene sodio

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por cápsula, eso quiere decir que en realidad 'libre de sodio' es.

3. ¿Cómo usa usted este medicamento?

Use este medicamento siempre exactamente como su médico o farmacéutico le ha indicado. Si tiene dudas sobre el uso correcto? Póngase en contacto con su médico o farmacéutico. Tome no más del medicamento que a usted le ha prescrito.

Su médico determinará cuál dosis es para usted adecuada.

Lyrica es exclusivamente destinado para uso oral.

Periférico y central neuropático dolor, epilepsia o trastorno de ansiedad generalizada:

- Tome el número de cápsulas que su médico ha prescrito.
- La dosis está ajustada a usted y su cuadro clínico y será en general estar entre 150 y 600 mg por día.
- Su médico le dirá si debe tomar Lyrica dos veces o tres veces por día. Para dos veces por día tome Lyrica una vez por la mañana y una vez por la noche, cada día a aproximadamente la misma hora. Para tres veces al día tome Lyrica una vez por la mañana, una vez por la tarde y una vez 's noches, cada día a aproximadamente la misma hora.

Si tiene la impresión de que el efecto de Lyrica es demasiado fuerte o débil, leve que su médico o farmacéutico en.

Si usted es un paciente mayor (mayor de 65 años), debe tomar Lyrica en la habitual dosis, excepto si usted problemas con sus riñones tiene.

Es posible que su médico le un otro esquema de dosificación y otra dosis prescribe si usted problemas renales tiene.

Tome la cápsula entera con agua. Tome Lyrica

hasta que hasta que su médico le dice que usted puede dejar.

Ha usted demasiado de este medicamento usado ?Póngase en contacto con su médico o vaya artes de ga a el más cercano Primeros Auxilios del un hospital. Lleve su caja o frasco con cápsulas de Lyrica. Usted puede sentirse somnoliento, confundido, inquieto o inquieto sentir después usted demasiado Lyrica ha ingerido. Epilepsia ataques y inconsciencia (coma) han también reportado.

¿Ha olvidado este medicamento usar ¿?

Es importante tomar sus cápsulas de Lyrica cada día regularmente a la misma hora cada día tomar. Si usted ha olvidado una dosis en tomar , hagaesto entonces tan pronto como sea posible como usted lo recuerde ,excepto si es el tiempo es para su próxima dosis. En ese caso tome simplemente la siguiente dosis . Tome no doble dosis para para uno olvidar dosis en recuperar ..

deja de usar este medicamento No deje

repentinamente de tomar Lyrica. Si desea tomar de Lyrica. Si desea dejar de tomar Lyrica, consulte esto primero con su médico. Él o ella le indicará cómo hacerlo . Si debehacerlo su tratamiento se suspende, debe esto realizarse gradualmente durante un período de al menos 1 semana. Usted debe saber que hay en u ciertos efectos secundarios, llamados síntomas de abstinencia, pueden ocurrir después de la suspensión de un tratamientocorto o largo plazo con Lyrica. Estos efectos secundarios existir de: insomnio, dolor de cabeza, náuseas, sentirse ansioso ,diarrea ,síntomas gripales ,convulsiones ataques/convulsiones (convulsiones), nerviosismo, depresión, pensamientos de autolesión o suicidio, dolor, sudoración y mareos. Estas efectos secundarios pueden más frecuentemente ocurrir o más graves volverse si usted Lyrica por un período prolongado ha usado. Si usted síntomas de abstinencia experimenta, debe contacto tomar con su médico.

Tiene usted otras preguntas sobre el uso de este medicamento ? Póngase en contacto con? Entonces, póngase en contacto con médico o de farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Como cualquier medicamento puede también este medicamento efectos secundarios tener, aunque no todos los experimentan con ello.

Efectos secundarios que muy frecuentemente, en más de 1 de cada 10 personas, ocurren

- mareos, somnolencia, dolor de cabeza

Efectos secundarios que frecuentemente, en menos de 1 de cada 10 personas, ocurren

- aumento del apetito
- sensación de euforia, confusión, desorientación (desorientación), disminución del interés
- sexual, irritabilidad
- trastornos de atención, torpeza, trastorno de memoria, pérdida de memoria, incontrolado temblores o sacudidas, trastornos del habla, sensación de hormigueo ,entumecimiento

- entumecimiento, somnolencia/ somnolencia (sedación), letargo (letargia), insomnio, fatiga, u siente se anormal
- visión borrosa, visión doble ver
- mareo, problemas con equilibrio, caídas
- boca seca ,estreñimiento ,vómitos ,flatulencia flatulenciadiarrea diarrea, náuseas, hinchado abdomen
- problemas de erección
- hinchazón del cuerpo incluyendo las extremidades
- una sensación de embriaguez tener, manera anormal de caminar
- aumento de peso
- calambre muscular, dolor en las articulaciones, dolor de espalda, dolor en las extremidades (brazos y3F piernas)
- dolorido garganta

Efectos secundarios que a veces, en menos de 1 de cada 100 personas, ocurren

- pérdida de apetito, pérdida de peso, disminución del azúcar en sangre, aumento del azúcar en sangre
- cambiado autoconciencia, inquietud, depresión, agitación, cambios de humor, difícil de palabras poder encontrar, alucinaciones, anormales sueños, ataques de pánico, indiferencia, agresión, exaltación euforiadeterioro mental deterioroproblemas con pensar ,aumento aumentado sexual interés, problemas con el sexual funcionamiento incluyendo el difícil lograr de un clímax sexual, eyaculación retardada (eyaculación)
- cambios en la visión, movimientos oculares inusuales, cambios en la visión incluyendo visión de túnel (campo visual limitado),destellos de luz destellos de luzmovimientos espásticos
- movimientos, disminuido reflejos, hiperactividad, mareo al levantarse ,piel sensible ,pérdida delgusto , sensaciónde ardor en mover, disminuido conciencia, pérdida de conciencia, desmayo, aumentada sensibilidad al sonido, no sentirse bien sentir
- secos ojos, hinchados ojos, dolor ocular, débiles ojos, lagrimosos ojos, irritados ojos
- arritmias, acelerado frecuencia cardíaca, baja presión arterial, alta presión arterial, cambios en la frecuencia cardíaca, disminución funcionamiento del corazón
- rubor, sofocos
- dificultades respiratorias, seca nariz, congestionada nariz
- aumento producción de saliva, ardor acidez, entumecimiento alrededor de boca
- sudoración, erupción cutánea, frío escalofríos, fiebre
- espasmos musculares, hinchazón de las articulaciones, rigidez muscular, dolor incluyendo dolor muscular, dolor en el cuello
- dolor en el pecho
- difícil o doloroso orinar, incontinencia
- debilidad, sed, oprimido sensación en el pecho
- cambios en sangre- y resultados de pruebas hepáticas (aumento de creatinina fosfocinasa, alanina aminotransferasa y aspartato-aminotransferasa en la sangre, disminución del número de plaquetas en la sangre, deficiencia de glóbulos blancos que se manifiesta en aumento de sensibilidad a infecciones (neutropenia), más creatinina en la sangre, menos potasio en la sangre)
- hipersensibilidad, hinchado cara, picazón, erupción cutánea con intensa picazón y formación de

- ronchas (urticaria), rinorrea, epistaxis, tos, roncar
- doloroso menstruaciones
- frías manos y pies

Efectos secundarios que raramente, en menos de 1 de cada 1.000 personas, ocurren

- olfato anormal, movimiento del vista tan pronto como la cabeza se mueve, cambio
- en percepción de profundidad, destellos, pérdida de visión
- dilatar de la pupilas, bizco mirar
- frío sudor, sensación en la garganta, hinchada lengua inflamación
- del páncreas problemas
- con tragar tragar
- lento de disminuido movimiento del cuerpo
- problemas con escribir
- retención de líquidos en el (bajo)abdomen
- retención de líquidos en los pulmones
- convulsiones/espasmos (convulsiones)
- cambios en el ECG (electrocardiograma) que corresponden con alteraciones del
- ritmo cardíaco
- daño muscular
- secreción espontánea de los pechos, anormal crecimiento de los senos, formación de los senos en hombres
- patrón menstrual alterado patrón menstrual menstruacionesirregulares
- menstruacionesfuncionamiento
- reducido de sus riñones (insuficiencia renal),funcionamiento reducida excreción de orina, no
- poder orinar (retención urinaria)
- disminución del número de glóbulos blancos
- comportamiento inapropiado, conducta suicida, pensamientos suicidas
- alérgico reacciones, incluyendo posiblemente: dificultad para respirar , ojosinflamados (queratitis) y reacciones severas de la piel con piel con como características: rojizas, no elevadas, en forma de disco o circulares manchas en el tronco, a menudo con ampollas en el centro de ellas, descamación de la piel, úlceras en y alrededor de la boca, garganta, nariz o en los genitales y ojos; este grave erupción cutánea puede ser precedido por fiebre y síntomas gripales (síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica).
- ictericia (coloración amarillenta de piel y ojos)
- parkinsonismo, que son síntomas que en la enfermedad de Parkinson parecen, como temblor, dificultad para moverse (bradicinesiabradicinesia) en rígidos músculos

Efectos secundarios que muy raramente, en menos de 1 de cada 10.000 personas, ocurren

- insuficiencia hepática
- hepatitis (inflamación del hígado).

No conocido: frecuencia puede con los disponibles datos no ser determinada

- Dependiendo ser de Lyrica ('dependencia del medicamento').

Usted debe saber que hay en u ciertos efectos secundarios, llamados síntomas de abstinencia, pueden ocurrir después de la suspensión de un tratamiento corto o largo plazo con Lyrica (ver “Si usted deje de usar el medicamento este producto”).

Debe buscar inmediatamente consejo médico si nota que su lengua o lengua o cara comienza en a hincharse o si su piel roja se vuelve y hay ampollas o descamación comienza en a aparecer.

Ciertas efectos secundarios como somnolencia pueden ocurrir con más frecuencia, porque pacientes con lesión medular otros medicamentos pueden usar para por ejemplo dolor de espasticidad para tratar. Estos medicamentos tienen los mismos efectos secundarios que pregabalina y la gravedad de estos efectos secundarios puede aumentar son en simultáneo uso.

El siguiente efecto secundario ha sido reportado después de este medicamento en el mercado ha sido introducido: dificultad con respirar, superficial respiración.

El informar de efectos secundarios

¿Tiene efectos secundarios , póngase en contacto con, póngase en contacto con médico o farmacéutico . Esto también se aplica a para posibles efectos secundarios que no en este prospecto aparecen. Usted puede efectos secundarios también directamente informar a través del sistema nacional como indicado en apéndice V. Por efectos secundarios a informar, puede ayudarnos a obtener más información sobre la seguridad de este medicamento medicamento.

5. Cómo almacena usted este medicamento?

Fuera de la vista y alcance de niños mantener.

No use este medicamento después de n/a de última fecha de caducidad. Esa encuentra usted en la caja o la botella después de EXP. Allí aparece un mes y un año. El último día de mes es el última fecha de caducidad.

Para este medicamento no hay ninguna condiciones especiales.

. No medicamentos por el fregadero o el inodoro en tire los no en la basura. Pregunte a su farmacéutico qué hacer con medicamentos debe hacer que no utiliza más. Si usted medicamentos en la correcta manera elimina sean ellos en una responsable manera destruidos y lleguen ellos no al medio ambiente finalicen.

6. Contenido del empaque y otra información

¿Qué sustancias contiene este medicamento ?El

principio activo de este medicamento es pregabalina . Cada pregabalina. Cada dura cápsula contiene 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg o 300 mg pregabalina.

El otros componentes en este medicamento son: lactosa monohidrato, almidón de maíz, talco, gelatina, dióxido de titanio (E171), laurilsulfato de sodio, anhidro coloidal dióxido de silicio, tinta

negra (que goma laca, óxido de hierro negro (E172), propilenglicol y hidróxido de potasio contiene) en agua.

De 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg en cápsulas de 300 mg contienen también óxido de hierro (E172).

Cómo se ve Lyrica y cuánto hay en un empaque ?¿

- 25 mg cápsulas** Blancas duras cápsulas, con impresión "VTRS" en la parte superior de y "PGN 25" en la parte inferior de la cápsula
- 50 mg cápsulas** Blancas duras cápsulas, con impresión "VTRS" en la parte superior parte y "PGN 50" en el inferior parte de la cápsula. El inferior parte de la cápsula está marcada con una banda negra
- Cápsulas de 75 mg** Blanco-naranja cápsulas duras, con impresión "VTRS" en la parte superior parte y "PGN 75" en la parte inferior parte de la cápsula
- cápsulas de 100 mg** Naranja cápsulas duras cápsulas, con impresión "VTRS" en la parte superior parte y "PGN 100" en la parte inferior parte de la cápsula
- 150 mg cápsulas** Blancas duras cápsulas, con impresión "VTRS" en la parte superior parte y "PGN 150" en la parte inferior parte de la cápsula
- 200 mg cápsulas** Ligeramente naranja duras cápsulas, con impresión "VTRS" en la parte superior parte y "PGN 200" en la parte inferior parte de la cápsula
- cápsulas de 225 mg** Blanco-naranja claro duras cápsulas, con impresión "VTRS" en la parte superior parte y en "PGN 225" en la parte inferior de la cápsula
- 300 mg cápsulas** Blanco-naranja duras cápsulas, con impresión "VTRS" en la parte superior de y "PGN 300" en la parte inferior de la cápsula

Lyrica está disponible en ocho tamaños de envase fabricado de PVC con aluminio en el lado posterior: un envase de 14 cápsulas con 1 blíster, un envase de 21 cápsulas con 1 tira de blíster, un empaque de 56 cápsulas con 4 tiras de blíster, un empaque de 70 cápsulas con 5 tiras de blíster, un empaque de 84 cápsulas con 4 tiras de blíster, un empaque de 100 cápsulas con 10 tiras blíster, un empaque de 112 cápsulas con 8 tiras blíster y un blíster unitario perforado de 100 x 1 cápsulas. Lyrica está

también disponible en un frasco HDPE con 200 cápsulas para para de 25 mg, 75 mg, 150 mg en 300 mg concentraciones.

No todas las mencionadas tamaños de envase se en el mercado se comercializan.

Titular de la autorización para la comercialización mercado traer y fabricante

Titular de la autorización para la comercialización traer:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle al den IJssel, Países Bajos.

Fabricante:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Mooswaldallee 1, 79108 Freiburg im Breisgau, Alemania.

o

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom 2900, Hungría.

o

MEDIS INTERNATIONAL a.s., výrobní závod Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, República Checa.

Consulte para toda la información sobre este medicamento con el representante local del titular de la autorización para la en comercialización de:

Bélgica/Belgique/Bélgica

Viatrix

Tel/Tel: +32 (0)2 658 61 00

Lituania

Viatrix UAB

Tel: +370 52051288

Bulgaria

Mylan EOOD

Тел.: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Viatrix

Tél/Tel: +32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Viatrix CZ s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Viatrix Healthcare Kft.

Tel.: + 36 1 465 2100

Danmark

Viatrix ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Limited

Tel: (+356) 21 220 174

Deutschland
Viatri Healthcare GmbH
Tel: +49 (0)800 0700 800

Nederland
Mylan Healthcare BV
Tel: +31 (0)20 426 3300

Eesti
Viatri OÜ
Tel: +372 6363 052

Norge
Viatri AS
Tlf: +47 66 75 33 00

Ελλάδα
Viatri Hellas Ltd
Τηλ: +30 2100 100 002

Österreich
Viatri Austria GmbH
Tel: +43 1 86390

España
Viatri Pharmaceuticals, S.L.
Tel: +34 900 102 712

Polska
Viatri Healthcare Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 546 64 00

Francia
Viatri Salud
Tél: +33 (0)4 37 25 75 00

Portugal
Viatri Healthcare, Lda.
Tel: +351 21 412 72 00

Croacia
Viatri Viatri Hrvatska d.o.o.
Tel: + 385 1 23 50 599

Rumanía
BGP Products SRL

Tel: +40 372 579 000

Irlanda
Viatris Limited
Tel: +353 1 8711600

Eslovenia
Viatris d.o.o.
Tel: +386 1 236 31 80

Islandia
Icepharma hf.
Sími: +354 540 8000

República Eslovaca republika
Viatris Eslovaquia s.r.o.
Tel: +421 2 32 199 100

Italia
Viatris Pharma S.r.l.
Tel: +39 02 612 46921
Suomi/Finland

Viatris Oy
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος
GPA Pharmaceuticals Ltd
Τηλ: +357 22863100

Sverige
Viatris AB
Tel: +46 (0)8 630 19 00

Latvija
Viatris SIA
Tel: +371 676 055 80

Reino Unido (Irlanda del Norte)
Mylan IRE Healthcare Limited
Tel: +353 18711600

Este prospecto es para el última aprobado en {MM/JJJJ}.

Más información sobre este medicamento está disponible en el sitio web del Europeo Agencia de Medicamentos: <http://www.ema.europa.eu>.