

Pakendi infoleht: teave kasutajale de kasutaja

Lyrica 25 mg kõvad kapslid,  
Lyrica 50 mg kõvad kapslid,  
Lyrica 75 mg kõvad kapslid,  
Lyrica 100 mg kõvad kapslid,  
Lyrica 150 mg kõvad kapslid,  
Lyrica 200 mg kõvad kapslid,  
Lyrica 225 mg kõvad kapslid,  
Lyrica 300 mg kõvad kapslid  
pregabaliin

Lugege hästi kogu pakendi infoleht enne kui seda ravimit kasutate kasutama sest seal seisab oluline teave sees teie jaoks .

- Säilitage see pakendi infoleht. Võib-olla vajate seda hiljem uuesti ..
- teil te veel küsimused? Võtke ühendust oma arstiga või apteekriga.
- Andke seda ravimit mitte edasi teistele , sest see on ainult teile määratud . See. See võib kahjulik olla teistele ,segi kui on neil samad kaebused nagu teil. Kui
- teil tekib üks kõrvaltoimetest mis on kõrvaltoimed mis on rubriik 4 seisab? Või saate te ühe kõrvaltoime mis ei selles selles infolehes seisab? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

Sisu kohta selle pakendi infoleht

1. Mis on Lyrica ja milleks kasutatakse seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik ettevaatlik kaasa olema?
3. Kuidas kasutate te seda ravimit?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas säilitate te seda ravimit?
6. Sisu kohta pakend ja muu teave

1. Mis on Lyrica ja milleks kasutatakse seda ravimit ?Lyrica

kuulub rühma ravimite hulka mida kasutatakse ravimid jaoks de ravi van epilepsia, neuropaatiline valu ja üldistunud ärevushäire (GAD) täiskasvanutel täiskasvanud.

ja keskne neuropaatiline valu : Lyrica: Lyrica kasutatakse raviks juures de ravi van pikaajalised valud mis põhjustatud on poolt kahjustused närvide närvid. Erinevad haigused nagu diabeet või vöötohatis (vöötohatis) võivad perifeerne neuropaatiline valu põhjustada. Valutunnetused võivad olla kirjeldatud kui kuum, põletav, pulseeriv, tulistav, torkiv, terav, kramp, valulik, surisev, tuim, uinuv. Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu võib ka kaasas kaasa koos meeleolumuutustega, unehäiretega, väsimusega ja võib mõjutada on olema füüsilist ja sotsiaalset toimimist ja ja de kokku kvaliteet elust elu.

Epilepsia: Lyrica kasutatakse kasutatakse juures ravi ravi teatud teatud vormid epilepsia epilepsia juures

täiskasvanutel (osaline krambid koos või ilma sekundaarse üldistunud krambid). Teie arst määrab teile Lyrica välja toetuseks ravi jaoks teie epilepsia raviks epilepsia, kui teie praegused ravimid teie seisundit ei kontrolli all hoia. Te peate Lyrica lisaks teie praegusele ravile võtma. Lyrica on mitte mõeldud et ainult olema kasutatud, kuidpeab alati olema kasutatud koos kombinatsioonis teiste anti- epileptikumidega (ravimid (ravimid kasutatakse juures epilepsia).

Üldistunud ärevushäire: Lyrica kasutatakse juures juures ravis ravi üldistunud ärevushäire (GAD). Sümptomid GAD on pikaajalised pikaajaline ja liigne ärevus ja mure mis raske kontrollida on. GAD võib ka rahutust või tunne pingest või ärritust põhjustada, või, või võib põhjustada et sa tunned ennast kiiresti väsinuna, saraskesti suudad keskenduda, saei suuda enam meelde tuletada või oled kergesti ärrituv olete, või võib lihaspinget või unehäireid põhjustada. See ei ole midagi teha stressiga ja pingega igapäevaelus. Kui.

2. seda kas tohib see ravim mitte kasutada või peate olema eriti ettevaatlik sellega olema?

Millal ei tohi te seda ravimit mitte kasutada?

Te olete allergiline selle vastu üks kohta ained sees see ravim. Need ained saate leida jaotisest 6. Millal 6.

olema eriti ettevaatlik olema ettevaatlik on koos see ravim?

Võtke ühendust oma arstiga või apteekriga enne kui te seda ravimit võtate.

Mõnel patsiendil kes kasutavad Lyrica't esineb, on sümptomid teatatud mis viitavad allergilisele reaktsioonile allergiline reaktsioon. Need sümptomid hõlmavad turse näo nägu, huuled, keel en keel kuid ka levinud nahalööve. Te peate kohe ühendust võtma oma arstiga kui üks nendest reaktsioonidest ilmneb nende juures u esineb.

Seoses seoses kasutamise kasutamine alates pregabaliin on teatatud tehtud alates rasketest nahakahjustustest kõrvaltoimetest (kõrvaltoimetest nahal nahk), nagu see Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs. Lõpetage kasutamine alates pregabaliin ja kutsuge kohe meditsiinilist abi sisse kui te üks nendest rubriik 4 kirjeldatud sümptomid seoses seoses selle selle tõsised nahareaktsioonid täheldate.

- Lyrica kasutamine Lyrica on peapööritus ja unisus esineb, mille tõttu see esineb on õnnetuste (kukkumised) juures vanematel patsientidel võib suurenda. Olge seetõttu ettevaatlik kuni u harjunud olete selle mõjuga mida see ravim võiks võimalik omada.
- Lyrica võib hägune nägemine või kaotus nägemisvõimest nägemisvõime of teised muutused van het vaateväli põhjustada, mille de enamik ajutised on. Te peate het koheselt teatama oma arstile rääkima kui te muutusi oma teie nägemises täheldate.
- Mõnel teatud diabeedipatsiendil kes kaalus juurde võtavad ravi ajal raviga pregabaliiniga võib olla üks kohandamine alates nende diabeediravimid vajalik olema.
- Teatud kõrvaltoimed nagu unisus võivad sagedamini esineda, kuna patsiendid seljaaju vigastusega seljaajukahjustus teised ravimid võivad kasutada et näiteks valu või spastilisus ravida .. ravimid omavad samasuguseid kõrvaltoimeid nagu pregabaliin ja ja de Tõsidus sellest nendest kõrvaltoimetest võib suurenenud olla juures samaaegne kasutamine.
- On olemas mõnel mõnedel patsientidel ajal kasutamise kasutamine Lyrica teated olnud alates südamepuudulikkus;

enamasti olid need vanemad patsiendid südame- ja veresoonkonna haigused. Enne kui te alustate võtmist ravimi -st see ravim peab te teie arstile rääkima kui te olete minevikus kannatanud on kannatanud -st üks südamehaigus.

- On olemas juures mõned patsiendid ajal kasutamine kasutamine Lyrica teateid olnud neerupuudulikkus .. ajal kasutamine kasutamine Lyrica tähele panete et te vähem uriini plast, peate teavitama oma arstile kuna see võib paraneda ravimi kasutamise lõpetamisega ravim Mõned patsiendid.
- ravim kasutavad see ravitud saavad anti-epileptikumidega nagu Lyrica, on mõtteid olnud enese- vigastamisest või enesetapust või on enesetapukäitumist näidanud. Kui teil mingil hetkel selline mõtted on või selline käitumine näitab, võtke kohe ühendust oma arstiga.
- Kui Lyrica võetakse koos muude ravimitega mis kõhukinnisust võivad saada põhjustada (nagu mõned tüübid valuvaigistid), on võimalik et seedetrakti probleemid esinevad (nt. kõhukinnisus, ummistunud või halvatud sool). Rääkige sellest oma arstile kui teil kõhukinnisus on, eriti kui te olete tundlik selle probleemi suhtes. Rääkige
- sellest see teie arst enne te alustate selle kasutamisega alates seda ravimit kui te kunagi kuritarvitanud olete või sõltuvuses olnud painutatud olnud alkoholi, ravimid peal retsept või ebaseaduslikud narkootikumid; see võib tähendada et te suurem risk on sattuda sõltuvusse olla saada saama van Lyrica.
- Er zijn gevallen van toevallen/stuipen (convulsies) gemeld tijdens het gebruik van Lyrica of kort na het lõpetage Lyrica kasutamine. Võtke kohe ühendust oma arstiga kui teil tekib teil krambihoo ilmneb ..
- olnud juhtumeid vähenenud ajufunktsiooniga vähenenud entsefalopaatia (entsefalopaatia) teatatud juures mõned patsientide kes kasutasid Lyricat .. patsiendid olid ka muud haigused haigused. oma arstile teie arst kui te minevikus probleeme on olnud tõsiste haigustega haigusednagu näiteks maksa- või neeruhaigused neeruhaigused.
- olnud teateid teated juhtudest alates hingamisraskused. Kui teil on on alates
- närvisüsteemi häired, hingamissüsteemi häired, neerufunktsiooni häire või kui te vanem olete kui 65 aastat, võib teie arst teile ühe teine annustamisskeem välja kirjutama. Võtke ühendust teie arstiga kui te raskused hingamisega või madal hingamine on . Sõltuvus.

inimesed

Mõned inimesed võivad Lyrica sõltuvusse jääda (vajadus ravimi võtmiseks jätkuvalt võib tekkida ). Nad võivad võõrutusnähtud saada kui nad lõpetavad ravimi võtmise kasutamine Lyrica (vt rubriik 3, "Kuidas kasutate te seda ravimit?" ja "Kui te lõpetate selle kasutamise selle ravimi sederavimit "). Kui te er mured üle teeb et te Lyrica sõltuvusse võite jääda, on see oluline et te oma arst konsulteerite.

Kui te üks nendest järgmine kaebused tähele panete ajal see võtmine Lyrica, võib see olema märk olla et teie sõltuvuses olete saanud:

- Te peate ravimit ravim kauem võtma kui soovitatud poolt teie arst
- Te tunnete ravimit tunne et te rohkem peate võtma kui soovitatud annus
- Te kasutate ravimit ravim et muudel põhjustel kui ette nähtud
- Te olete korduvaid, ebaõnnestunud katseid teinud et lõpetada kasutamine koos või kontroll saada saama üle kasutamine ravimi ravim
- Kui te lõpetate ravimi võtmise ravimi ravim tunnete te ennast mitte hästi, ja te tunnete ennast paremini niipea kui te võtate ravimit jälle sisse

Kui te mõnda neist sümptomitest täheldate, võtke ühendust oma arstiga, et arst, et parim ravikuur jaoks teile arutama arutama, sealhulgas millal see üks sobiv hetk on lõpetada ja kuidas te seda edasi ühel ühel ohutu viis peab tegema.

Lapsed ja noorukid kuni 18 aastat

Ohutus ohutus ja tõhusus lastel lastel ja noorukitel (kuni vanuseni alates 18 aastat) on ei ole kindlaks tehtud. Lyrica ei tohi seetõttu ei kasutada sellel vanuserühmal. Kasutage.

veel muid ravimeid teised ravimid?

Kasutate te lisaks Lyrica veel teisi ravimeid, kas te seda hiljuti tegite või on olemas võimalus et see te lähedal tulevikus muud ravimid kasutama? Rääkige sellest siis oma arstile või apteekrile. Seektehtib ka nende ravimite kohta kus u pole retsepti vaja tarvis on.

Lyrica ja teatud muud ravimid võivad üksteist mõjutada (koostoime). manustamine koos teatud muud ravimid mis rahustav toime omavad ( sealhulgas opioidid ), võib Lyrica neid mõjusid tugevdada, mis võib viia kannatama kuni hingamise seiskumine, kooma ja surm. Peapööritus, unisus ja kontsentratsioonivõime langus võivad halveneda kui Lyrica koos ravimitega manustatakse ravimitega antakse need:

- oksükodoon (kasutatakse valuvaigistina valuvaigistilorsepaam (
- kasutatakse ärevuse raviks ) või alkohol
- sisaldavad ..

võib samaaegselt koos koos oraalne kontratseptiiv kasutatakse kasutatakse.

Millele peate te tähelepanu pöörama söömise, joomise ja alkoholiga?  
Lyrica kapslid võivad koos või ilma toiduta võtta võtta.

On soovitatav mitte alkoholi tarbida Lyrica kasutamise ajal. Rasedus ja imetamine

Lyrica ei tohi

kasutada raseduse ajal ja imetamise of raseduse ajal de imetamine kasutatakse kasutatud, välja arvatud teie arst otsustab teisiti. Hetkasutamine van pregabaliin raseduse ajal de esimesed 3 3 kuud alates rasedus võib sünnidefekte põhjustada juures see sündimata laps mille jaoks üks meditsiiniline ravi vajalik on. Uuringust üks uuring kus andmed olid hinnatud naiste seas Põhja-Euroopariikidest kes raseduse esimese 3 kuu 3 olid kasutanud pregabaliini pregabaliin oli võetud, kahvatu et 6 100-st beebit selliseid sünnidefekte näitasid. Naistel naised kes raseduse ajal uuringu käigus ei koos pregabaliiniga ei ravitud, olid et 4 100-st beebit. Väärarengud näo piirkonnas (lõhestunud huul, lõualuu ja/või suulagi), silmad, silmad, närvisüsteem närvisüsteem (sealhulgas de aju), neerud ja suguelundid teatati ..

kes rasedaks võivad jääda, peavad tõhusat rasestumisvastast kasutama kasutama. Kas olete rase, arvate te rase olevat, sooviterase jääda või toidate te rinnaga? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga enne enne u see ravim kasutatakse.

Sõiduvõime ja see kasutamine masinate

Kasutamine kasutamine Lyrica võib põhjustada peapööritust pearinglusunisust ja ja vähenenud kontsentratsioon. Te ei tohi ei sõidukeid juhtida, masinaid käsitseda või muid riskantseid tegevusi

teha, kuni on selge kas see ravim teie võime et eespool nimetatud ülesandeid välja teha viia, kas mitte mõjutab.

Lyrice sisaldab laktoosmonohüdraati

Konsulteerige oma arstiga enne kui seda ravim võtate, kui teie arst teile öelnud on et te teatud suhkruid ei saa taluda.

Lyrice sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) ühe kõva kapsli kohta, see tähendab et see on sisuliselt 'naatriumivaba'.Kuidas

### 3. kasutate te seda ravimit ??

Kasutamine seda ravimit alati täpselt nagu teie arst või apteeker teile seda on öelnud .. te õige kasutamise osas ? Võtke siis ühendust oma arstiga teie arst või apteeker. Võtke mitte rohkem ravimist kui teile on ette kirjutatud välja kirjutatud.

arst määrab kindlaks milline annus on teie u sobib on.

Lyrice on ainult mõeldud suukaudseks kasutamiseks ..

ja tsentraalne neuropaatiline valu ,epilepsia või üldistunud ärevushäire ärevushäire:

- Võtke arv kapsleid mis teie arst on määranud välja kirjutatud.
- on kohandatud teie jaoks ja teie haiguspildi jaoks ja ja saab üldiselt üldiselt olema vahel 150 ja 600 mg päevas päev.
- Teie arst saab teile öelda et te kas kaks korda või kolm korda päevas päevas Lyrice peab võtma. Kaks korda päevas võtate päevas Lyrice üks kord hommikul ja üks kord õhtul üks kord 's õhtuti sisse, iga päev umbes samal ajal .Kolm korda päevas võtke Lyrice üks kord hommikul , üks kord pärastlõunal, üks kord õhtul lõunasöögid en üks kord 's õhtul sisse, iga päev umbes samal ajal ..

mulje et Lyrice toime on liiga nõrk te tugev või liiga nõrk on, kerge siis teie arst või apteeker sisse.

Kui te olete üks vanem patsient (vanem kui 65 aastat), peab te Lyrice tavapärasest annuses võtma ,välja arvatud kui teil probleeme neerudega on . On võimalik.

teie võimalik see teie arst teid üks teine annustamisskeem ja/või teine annus määrab kui teil neeruprobleemid on.

Võtke kapsel sisse oma tervikuna koos veega.

Võtke Lyrice kuni teie arst teile räägib et teie saate lõpetada.

Kas teie liiga palju sellest ravimist kasutanud ?Võtke ühendust

teie arstiga või minge arstide ga kuni lähimasse kiirbiosakonda Esmaabi teenistus haigla .. oma karp karp võite tunda unisust ,segadust ,ärevust või of rahutu tundma pärast te liiga palju Lyrice on võtnud. Epileptilised hood ja teadvusetus (kooma) on ka teatatud.

Kas te unustasite seda ravimit kasutada? Kas see on oluline oma Lyrica kapsleid iga päev regulaarselt samal ajal võtta. aeg sisse te võtma. Kui te olete unustanud annuse võtma, tehke seda niikiiresti kui võimalik kui te sellele mõtlete, välja arvatud kuisee välja arvatud kui see aeg on järgmise teie järgmise annuse. Kui see juhtum võtke te lihtsalt järgmise annuse sisse. Võtke mitte kahekordset annust et kuni üks unustatud annus sisse võtta järele.

Kui te lõpetate ravimi kasutamise selle ravimi ravim Ärge äkki lõpetage võtmist Lyrica. Kui soovite Lyrica'st. Kui soovite lõpetama ravimite võtmist Lyrica, arutage seda kõigepealt oma arstiga. Teie arst ütleb teile, kuidas seda teha. Kui peab teha. Kui teie ravi lõpetatakse, peab see järk-järgult toimuma üle ühe perioodi vähemalt 1 nädal. Te peate teadma et seal võib olla juures u teatud kõrvaltoimed, nn võõrutusnähud, võivad ilmned pärast ravi lõpetamist koos lühiajalise või pikaajalise raviga Lyrica'ga. Need kõrvaltoimed koosnema millestki: unetus, peavalu, iiveldus, tunda ärevust, kõhulahtisus, gripilaadsed sümptomid, krambid //krambid (krambid), närvilisus, depressioon, mõtted enese vigastamisest või enesetapust, valu, higistamine ja peapööritus. Need kõrvaltoimed võivad sagedamini esinevad või tõsisemaks muutuda kui te Lyrica't pikka aega kasutanud olete. Kui teilvõõrutusnähud tekivad, peab teie ühendust võtma oma oma arstiga.

Kas teil veel muid küsimusi selle kasutamise kohta selle ravimi? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteeker.

#### 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim võib ka see ravim kõrvaltoimeid põhjustada, kuigi ei kõik saa nendega kokku puutuda.

Kõrvaltoimed mis väga sageli, rohkem kui 1 10-st inimesest, esinevad

- pearinglus, unisus, peavalu

Kõrvaltoimed mis sageli, juures vähem kui 1 10-st inimest, esineb

- suurenenud isu
- tunne rõõmust, segadus, kontrollimatus kontrollimatus desorientatsioon), vähenenud seksuaalne huvi,
- huvi, ärrituvus
- tähelepanuhäired, kohmakus, mäluhäire, mälukaotus, kontrollimatu värinad või värisemine, kõnehäired, surisev tunne, tuimus, peapööritus/ unisus (sedatsioon), unisus (letargia), unetus, väsimus, te tunnete ennast ebanormaalselt
- udune nägemine, kahelinägemine nägemine
- pearinglus, probleemid tasakaaluga, kukkumised kuiv
- suu, kõhukinnisus, oksendamise, gaasid kõhupuhituskõhulahtisus kõhulahtisus, iiveldus, puhitus kõht
- erektsioonihäired
- turse keha sealhulgas jäsemed keha kaasa arvatud
- jäsemed purjus tunne omada, ebanormaalne viis alates kõndimine
- kaalutõus

- lihaste kramp, valu liigestes liigesed, seljavalu, valu jäsemetes jäsemed (käed ja/või jalad)
- valus keel

Kõrvaltoimed mis mõnikord, juhtuvad vähem kui 1 inimesel 100-st inimest, esinevad

- isu kaotus ,kaalukaotus kaalulangusveresuhkru langus veresuhkru alandamineveresuhkru tõus veresuhkru tõus
- muutunud eneseteadvus, rahutus, depressioon, agitatsioon, meeleolumuutused, raske sõnu leida , hallutsinatsioonid, hallutsinatsioonid, ebanormaalne unenäod, paanikahood, ükskõiksus, agressioon, liialdatud ülevus, vaimne halvenemine, probleemid mõtlemisega ,suurenenud suurenenud seksuaalne huvi, probleemid seksuaalse funktsioneerimisega kaasa arvatud raskused seksuaalse haripunkti saavutamisel, hilinenud seemnepurse ( ejakulatsioon ) • (ejakulatsioon)
- muutused silma nägemises, ebatavalised silmaliigutused, muutused silma nägemises sealhulgas tunnelinägemine (piiratud nägemisväli), valgussähvatused, spastilised liigutused, vähenenud refleksid, hüperaktiivsus, peeringlus olema seismisel ,tundlik nahk ,maitsekaotus maitsekaotuspõletav tunne ,värinad vibratsioonid juures liikumine, vähenenud teadvus, kaotus teadvuse ,minestamine minestaminesuurenenud tundlikkus heli , ennastmitte hästi mitte maitsev tundma
- kuivad silmad, paistes silmad, silma valu, nõrgad silmad, vesised silmad, ärritunud silmad
- südame rütmihäired, kiirenenud südame löögisagedus, madal vererõhk, kõrge vererõhk, muutused südame löögisageduses südame löögisagedus, vähenenud südame töö
- punetus, kuumahood
- hingamisraskused, kuiv nina, ummistunud nina
- suurenenud süljeeritus, põletav kõrvetised, tuimus ümber suu higistamine
- higistaminenahalööve nahalöövekülmavärinad külm külmavärinad, palavik
- lihasetõmbused, liigete turse, lihasjäikus, valu sealhulgas lihasvalu, valu kaelas
- valu rinnus raske
- või koos valulik urineerimine, inkontinentsus
- nõrkus, janu, pigistav tunne rinnal rind
- muutused veres -- maksatestide tulemused maksatestitulemused tõustõus alates kreatiinfosfokinaas,alaniinaminotransferaas ja aspartaat-aminotransferaas veres ,vähenemine alandamine arv trombotsüütide veres , puudus, valgete vereliblede valge vererakud et ise välja sisse suurenenud tundlikkus infektsioonide vastu (neutropeenia), rohkem kreatiniini veres, vähem kaaliumi veres)
- ülitundlikkus, paistes nägu, sügelus, nahalööve koos tugeva sügelusega ja moodustumine külmude
- ( nõgestõbi),ninaeritis ,ninaverejooks ,köha köha, norskamine
- valulikud menstruatsioonid
- külmad käed ja jalad

Kõrvaltoimed mis harva, vähem kui 1 inimesel 1 000-st inimesest ,esinevad ebanormaalne

- haistmismeel haistmismeel, liikumine alates nägemine niipea kui see pea liigutatakse ,muutus muutus
- kogemus kogemus sügavus ,sädelused säravadnägemise kaotus kaotus nägemine
- laiendama alates pupillid, kõõrdi vaatama
- külm higi, hingamisraskus kurgus, paistes keel põletik
- põletik kõhunääre probleemid
- probleemid neelamine neelama

- aeglane või vähenenud liikumine keha keha
- probleemid kirjutamisega kirjutamine
- vedelikupeetus (alumine)kõht
- vedelikupeetus kopsudes krambid
- /krambidkrambid (krambid)
- muutused EKG-s (elektrokardiogramm) mis vastavad häiretele südamerütmis südamelihase kahjustus
- spontaanne
- eritamine
- rindadest eritised rindadest , ebanormaalne, ebanormaalne rindade kasv, rindade moodustumine meestel meestel
- menstruatsioonitsükli häired menstruatsioonimuster ebaregulaarsedmenstruatsioonid menstruatsioonidvähenenud
- funktsioon teie neerud ( neerupuudulikkus ),vähenenud), vähenenud eritamine uriini, mitte
- saada urineerida (uriinipeetus)
- vähenemine valgeliblede arv valged vererakud
- sobimatu käitumine, enesetapakäitumine, enesetapumõtted
- allergiline reaktsioonid, sealhulgas võimalik: raskused hingamisega , põletikulised silmad(keratiit) ja tõsised reaktsioonid nahal koos reaktsioonid alates nahk koos kui tunnused: punakas, mitte-tõusnud, ketaskujuline või rõngakujuline laigud kehatüvel, sageli koos villidega keskel sellest, naha koorumine, haavandid sisse ja ümber suu , kurk,nina või genitaalidel ja silmadel suguelundid see raskenahalöövve võib olla võimalik saab võimalik eelnenud poolt palavik ja gripilaadsed sümptomid (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs ).kollatõbi
- ( nahaja naha ja silmad silmad)
- parkinsonism, et on kaebused mis on Parkinsoni tõbi sarnased ,nagu värisemine ,raskused on liikumisega ( bradükineesia (bradükineesia) ja jäigad lihased

Kõrvaltoimed mis väga harva, vähem kui 1 inimesel 10 000-st esinevad maksapuudulikkushepatiit ( maksapõletik

- ).
- Poleteada).

Ei tuntud: sagedus võib koos olemasolevate andmetega ei saa määrata

- Sõltuvus võib Lyrica ('ravimisõltuvus').

Te peate teadma et on juures u teatud kõrvaltoimed, nn võõrutusnähud, võivad ilmned pärast ravi lõpetamist koos lühiajalise - võipikaajalise raviga Lyrica'ga ( vt„Kui te lõpetab koos kasutamisega kasutamine selle ravimi ravim“).

Te peate kohe meditsiinilist nõu küsima kui te tähele et teie keel või nägu algab peal kui paisuma või kui teie nahk punaseks muutub ja tekib villide teke või ketendus algab peal kui toimuma.

Teatud kõrvaltoimed nagu unisus võivad sagedamini esinevad, kuna patsiendid seljaajukahjustusega

teisi ravimeid võivad kasutada näiteks valu leevendamiseks valu of spastilisus ravida ravida. Need ravimid omavad samasuguseid kõrvaltoimeid nagu pregabaliin ja de tõsidus van nende kõrvaltoimete võib suurenenud on juures samaaegne kasutamine.

Järgmine kõrvaltoime on teatatud pärast selle ravimi turule toomist : raskused koos : raskused hingamine, pindmine hingamine.

Teatamine kõrvaltoimetest alates kõrvaltoimetest

Kas teil esineb kõrvaltoimeid , võtke ühendust oma arstiga või apteekriga . Seekehtib ka kõigi jaoks võimalikud kõrvaltoimed mis ei selles selles infolehes seisavad. Te võite kõrvaltoimeid ka otse teatada riikliku teavitussüsteemi kaudu nagu mainitud selles lisa V. Läbi kõrvaltoimed te teatades, saate te meid aidata rohkem teavet saada selle ohutuse kohta selle ravimi ravim.

#### 5. Kuidas säilitada te seda ravimit?

Hoida nähtavuse ja kättesaamatus laste eest ..

kasutage seda ravimit enam pärast na de viimane kõlblikkusaeg. See leiate te karbilt karp või pudel pärast EXP. Seal on kuu jaanuar ja aasta . Viimanepäev päev päev kuu kuu on aegumiskuupäev aegumiskuupäev.

Enne seda ravimit ei ole mingeid erilisi säilitustingimusi säilitamistingimused. ravimeid mitte valage kraanikaussi kanalisatsiooni või WC-sse ja visake neid mitte prügikasti prügikast. Küsige oma apteekrilt mida teha ravimitega peate tegema mida te enam ei kasuta. Kui te ravimid peal õige viis kõrvaldab saavad nad ühe vastutustundlik viis hävitatud ja jõuavad nad mitte keskkonda sattuda.

#### 6. Sisu kohta pakend ja muu teave

Millised ained sisaldab see ravim ?Toimeaine

toimeaine on selles ravimis on pregabaliin . Iga pregabaliiniga kõva kapsel sisaldab 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg või 300 mg pregabaliin.

See muud ained selles ravimis on :: laktoosmonohüdraatmaisitärklis , talk, želatiin,titaandioksiid titaandioksiid (E171), naatriumlaurüülsulfaat, veevaba kolloidne ränioksiid, must tint (mis šelak, raudoksiid must (E172), propüleenglükool ja kaaliumhüdroksiid sisaldab) en vesi.

De 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg en 300 mg kapslid sisaldavad samuti punane raudoksiid (E172).

#### Kuidas näeb Lyrica välja ja kui palju on ühes pakendis?

**25 mg kapslid** Valge kõva kapslid, koos trükiga "VTRS" ülemisel osal ja "PGN 25" alumisel osal kapslist 50 mg kapslid Valge

**kõva** kapslid, koos trükiga "VTRS" ülemisel osal ja "PGN 50" alumisel osa ja "PGN 50" kapsli alumine osa . Kapsli alumine osa on kapsel on märgistatud musta ühe must triibuga

<b>75 mg kapslid</b>	Valge-oranž kõva kapslid, millel on trükk "VTRS" peal ülemine osa ja "PGN 75" peal alumine osa kapsli
<b>100 mg kapslid</b>	Oranž kõva kapslid, millel on trükk "VTRS" peal ülemine osa ja "PGN 100" peal alumine osa kapsli
<b>150 mg kapslid</b>	Valged kõvad kapslid, millel on trükk "VTRS" peal ülemine osa ja "PGN 150" peal alumine osa kapsli
<b>200 mg kapslid</b>	Hele oranž kõvad kapslid, millel on trükk "VTRS" ülaosas ülemine osa ja "PGN 200" alaosas alumine osa kapsli
<b>225 mg kapslid</b>	Valge-helekollane oranž kõvad kapslid, millel on trükk "VTRS" ülaosas ülemine osa ja "PGN 225" kapsli alumine osa kapsli
<b>300 mg kapslid</b>	Valge-oranž kõva kapslid, millel on trükk "VTRS" kapsli ülemine osa ja "PGN 300" kapsli alumine osa kapsli

Lyrice on saadaval sisse kaheksa pakendi suurused valmistatud välja PVC-ga alumiiniumfoolium juures

tagakülge :: pakend 14 kapsliga, 1 blisterpakend blisterribaüks pakend 21 kapsliga, 21 kapslit sisaldav 1 blisterriba, üks pakend 56 kapsliga, mis sisaldab 4 blisterriba, üks pakend 70 kapsliga, mis sisaldab 5 blisterriba, üks pakend 84 kapsliga, mis sisaldab 4 blisterriba, üks pakend 100 kapslit 10 blisterribad, üks pakend 112 kapslit 8 blisterribad ja üks perforeeritud üksikblisterpakend 100 x 1 kapslit.

Lyrice on samuti saadaval sisse üks HDPE pudel 200 kapsliga jaoks de 25 mg, 75 mg, 150 mg ja 300 mg tugevused.

Mitte kõik nimetatud pakendisuurused on turule viidud ..

müügiluba luba turustamiseks jaoks turule viimine tooma ja tootja

Omanik alates luba jaoks turule viimine tooma:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Holland.

Tootja:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Mooswaldallee 1, 79108 Freiburg im Breisgau, Saksamaa.

või

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom 2900, Ungari.

või

MEDIS INTERNATIONAL a.s., tootmine tehas Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Tšehhi.

Võtke kõigi andmete saamiseks selle ravimi kohta ühendust kohaliku esindajaga omanik hoidja alates luba jaoks selles kaubandus toomine:

Belgia/Belgique/Belgien  
Viatrix  
Tel/Tel: +32 (0)2 658 61 00

Leedu  
Viatrix UAB  
Tel: +370 52051288

Bulgaaria  
Mylan EOOD  
Тел.: +359 2 44 55 400

Luksemburg  
Viatrix  
Tél/Tel: +32 (0)2 658 61 00  
(Belgia/Belgia)

Tšehhi vabariik  
Viatrix CZ s.r.o.  
Tel: +420 222 004 400

Ungari  
Viatrix Healthcare Kft.  
Tel.: + 36 1 465 2100

Taani  
Viatrix ApS  
Tlf: +45 28 11 69 32

Malta  
V.J. Salomone Pharma Limited  
Tel: (+356) 21 220 174

Deutschland  
Viatrix Healthcare GmbH  
Tel: +49 (0)800 0700 800

Nederland  
Mylan Healthcare BV  
Tel: +31 (0)20 426 3300

Eesti  
Viatrix OÜ  
Tel: +372 6363 052

Norge  
Viatrix AS

Tlf: +47 66 75 33 00

Ελλάδα

Viatrix Hellas Ltd

Τηλ: +30 2100 100 002

Österreich

Viatrix Austria GmbH

Tel: +43 1 86390

España

Viatrix Pharmaceuticals, S.L.

Tel: +34 900 102 712

Polska

Viatrix Healthcare Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 546 64 00

Prantsusmaa

Viatrix Tervis

Tel: +33 (0)4 37 25 75 00

Portugal

Viatrix Tervishoid, Lda.

Tel: +351 21 412 72 00

Horvaatia

Viatrix Horvaatia d.o.o.

Tel: + 385 1 23 50 599

Rumeenia

BGP Products SRL

Tel: +40 372 579 000

Iirimaa

Viatrix Limited

Tel: +353 1 8711600

Sloveenia

Viatrix d.o.o.

Tel: +386 1 236 31 80

Island

Icepharma hf.

Telefon: +354 540 8000

Slovakkia vabariik

Viatrix Slovakia s.r.o.  
Tel: +421 2 32 199 100

Itaalia  
Viatrix Pharma S.r.l.  
Tel: +39 02 612 46921  
Soome/Soome

Viatrix Oy  
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος  
GPA Pharmaceuticals Ltd  
Τηλ: +357 22863100

Rootsi  
Viatrix AB  
Tel: +46 (0)8 630 19 00

Läti  
Viatrix SIA  
Tel: +371 676 055 80

Ühendkuningriik (Põhja-lirimaa)  
Mylan IRE Healthcare Limited  
Tel: +353 18711600

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud {KK/AAAA}. Rohkem teavet

selle ravimi kohta on kättesaadav veebilehel ravim amet Euroopa  
Ravimiamet: <http://www.ema.europa.eu>.