

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle de käyttäjälle

Lyrice 25 mg kova kapselit,  
Lyrice 50 mg kova kapselit,  
Lyrice 75 mg kova kapselit,  
Lyrice 100 mg kova kapselit,  
Lyrice 150 mg kova kapselit,  
Lyrice 200 mg kova kapselit,  
Lyrice 225 mg kova kapselit,  
Lyrice 300 mg kova kapselit  
pregabaliini

Lue huolellisesti koko pakkausseloste ennen kuin käytät tätä lääkettä aiot käyttää sillä on tärkeää tietoa siinä sinulle. Säilytä

- tämä pakkausseloste .. tarvitset sitä myöhemmin uudelleen . Onko.
- kysymyksiä ? vielä kysymyksiä? Ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin.
- Älä anna tätä lääkettä ei eteenpäin muille , koska se onvain sinulle määrätty . Sinullemäärätty voi haitallinen olla muille ,vaikka heillä olisi samat oireet kuin sinulla. Jos sinulle tulee
- jokin seuraavista haittavaikutuksista jotka on mainittu tässä kohta 4 on? Tai saatteko te sivuvaikutuksen joka ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu ? Ota sitten yhteyttäteidän lääkäriin tai apteekkiin ..

Sisältö alkaen tämän pakkausselosteen

1. Mikä on Lyrice ja mihin sitä tätä lääkettä käytetään?
2. Milloin et saa tätä lääkettä ei käyttää tai täytyy olla erityisen varovainen mukana olla?
3. Kuinka käytetään te tätä lääkettä?
4. Mahdolliset sivuvaikutukset
5. Kuinka säilytätte te tätä lääkettä?
6. Sisältö pakkauksen pakkaus ja muut tiedot

1. Mikä on Lyrice ja mihin tätä lääkettä käytetään ?Lyrice

kuuluu ryhmään lääkkeitä jotka käytetään hoitamaan sairauksia kuten de hoito alkaen epilepsia, neuropaattinen kipu ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö (GAD) aikuisilla aikuiset.

ja keskeinen neuropaattinen kipu : Lyrice: Lyrice käytetään hoidossa pitkäaikaisia kipuja jotka aiheutuvat hermovaurioista . Erilaiset sairaudet kuten diabetes tai vyöruusu vauriot ei voida hermot. Moninaiset sairaudet kuten diabetes tai vyöruusu (vyöruusu) voida perifeerinen neuropaattinen kipu aiheuttaa. Kipuaistimukset voivat olla kuvattu kuin kuuma, polttava, jyskyttävä, ampuva, pistävä, terävä, kramppi, kivulias, kihelmöivä, tunnottomuus, puutuminen. Perifeerinen ja keskeinen neuropaattinen kipu voi myös yhdessä kulkea kanssa mielialanvaihtelut, unihäiriöt, väsymys ja voi vaikuttaa olla fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaan ja se de kokonaislaatu alkaen elämä.

Epilepsia: Lyrice käytetään hoidossa tietyissä de epilepsian alkaen muodoissa muodot aikuisilla epilepsia epilepsia

aikuisilla (osittaiset kohtaukset kanssa tai ilman toissijaisia yleistyneitä kohtauksia). Lääkärisi määrää sinulle Lyricaa tueksi hoitoon epilepsiasi hoidossa ei käännettävää sisältöä hoitoon alkaen sinun epilepsiaasi, jos sinun nykyiset lääkkeet sinun tila ei hallinnassa pidä . Sinuntäytyy Lyrica lisäksi sinun nykyinen hoito ottaa . Lyrica on. Lyrica on ei tarkoitettu käytettäväksi yksin käytettäväksi tulee käyttää, vaan tulee aina käyttää yhdessä yhdessä yhdistelmänä muiden antiepileptisten lääkkeidenkanssa (lääkkeet käytetään epilepsian hoidossa).

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö: Lyrica käytetään yleistyneen ahdistuneisuushäiriön de hoitoon alkaen yleistyneen ahdistuneisuushäiriön (GAD). Oireet GAD:ssä ovat pitkäkestoisia en liiallinen ahdistus ja huolestuneisuus joka vaikeasti hallittavissa ovat. GAD voi myös levottomuutta tai tunne jännityksestä tai ärtyneisyys aiheuttaa , tai, tai voi aiheuttaa että tunnet itsesi nopeasti väsyneeksi , sinunon vaikea keskittyä keskittyäet muista mitään tai olet ärtyisiä herkkä olet, tai voi lihaskireys tai unihäiriöt aiheuttaa. Tämä ei mitään tehdä stressin kanssa ja jännitys päivittäisessä elämässä ..

2. voitko tätä tämä lääke ei käyttää tai täytyy olla erityisen varovainen sen kanssa olla?

Milloin et saa tätä lääkettä ei käyttää?

Olet allerginen jollekin yksi aineista aineet tässä tässä lääkkeessä. Nämä aineet voit löytää löytää kohdasta kohta 6.

Milloin pitää olla erityisen varovainen olla kanssa tämä lääke?

Ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin ennen kuin otat tämä lääke ..

potilailla jotka käyttävät Lyricaa Lyrica käyttää, ovat oireita raportoitu jotka viittaavat allergiseen reaktioon allerginen reaktio. Nämä oireet sisältävät turvotusta kasvojen alueella, huulet, kieli en kurkku mutta myös levinnyt ihottuma. Sinun täytyy välittömästi ottaa yhteyttä ottaa yhteyttä lääkärisi lääkärisi jos jos yksi näistä näistä reaktioista esiintyy u ilmenee.

In yhteydessä käytön kanssa pregabaliinin on raportoitu vakavista ihoreaktioista ( ihoreaktioista iholla ), (sivuvaikutukset päällä iho), kuten se Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi. Lopeta käyttö alkaen pregabaliinia ja hakeudu välittömästi lääketieteelliseen apuun sisään jos sinä yksi osassa kohta 4 kuvattuja oireita yhteydessä kanssa tähän nämä vakavat ihoreaktiot huomaa.

- Lyricaa käytettäessä on esiintynyt huimausta ja uneliaisuus ilmaantunut, minkä vuoksi se ilmaantuminen onnettomuuksien ( kaatumiset)vanhemmilla potilailla voi lisääntyä . Ole siksivarovainen kunnes varovainen kunnes u tottunut olet saanut vaikutukseen joka tämä lääke voisi aiheuttaa ..
- voi hämartyntynyt näkö tai menetys näkökyvyn menetys näkökyky of muita muutoksia of näkökenttä aiheuttaa, joista de useimmat tilapäisiä ovat. Sinun täytyy se välittömästi kertoa sinun lääkäriille kertoa jos sinä muutoksia alkaen sinun näkökyky huomaat.
- Tietyillä diabetespotilailla jotka paino lisääntyvät hoidon aikana de pregabaliinilla kanssa voi olla yksi muutos alkaen heidän diabeteslääkitys tarpeellinen olla.
- Tietyt sivuvaikutukset kuten uneliaisuus voivat useammin esiintyä, koska potilaat selkäydinvamma selkäydinvamma muut lääkkeet voivat käyttää om esimerkiksi kipu tai spastisuus hoitaa hoitamaan. Nämä lääkkeet ovat samat sivuvaikutukset kuin pregabaliini

ja de Vakavuus tämän haittavaikutuksen voi olla lisääntynyt samanaikaisessa käytössä samanaikaisesti On.

- potilailla käytön aikana havaittu näitä haittavaikutuksia käytön aikana Lyrica ilmoituksia ollut alkaen sydämen vajaatoiminta; useimmiten olivat nämä vanhemmat potilaat sydän- ja verisuonisairaudet. Ennen kuin te aloitatte kanssa ottamisen -sta tätä lääkettä täytyy sinun sinun lääkäri kertoa jos olet aiemmin kärsinyt vaivaa on ollut ollut -sta yksi sydänsairaus.
- On on mehiläisen joillakin potilailla aikana se käyttö Lyrica ilmoituksia ollut alkaen munuaisten vajaatoiminta. Jos aikana se käyttö Lyrica huomaat että sinulla on vähemmän virtsaa, täytyy sinun kertoa lääkärillesi lääkäri koska tämä voi parantua lopettamalla lääkkeen käytön . Jotkut.
- jotka potilaat kuolema käsitelty tulevat anti-epileptit kuten Lyrica, ovat ajatuksia olleet itsetuhoisuudesta tai itsemurhasta tai ovat itsemurhakäyttäytymistä osoittaneet . Jos sinulla onjossain vaiheessa hetki sellaisia ajatuksia on tai sellaista käyttäytymistä esiintyy, ota heti yhteyttä lääkäriisi. Kun
- Lyrica otetaan yhdessä muiden lääkkeiden jotka ummetus voivat ummetus voida aiheuttaa (kuten jotkut tyypit kipulääkkeet), on mahdollista että maha-suolikanavan ongelmia esiintyy (esim. ummetus, tukkeutunut tai halvaantunut suoli). Kerro se lääkärillesi jos sinulla on ummetus ,varsinkin jos olet herkkä tälle ongelmalle . Kerro se
- lääkärillesi se sinun lääkäri ennen sinä aloitat tämän käyttö tämän tämän lääkkeen jos sinä koskaan väärinkäyttö olet tehnyt tai riippuvainen olet ollut alkoholista, lääkkeet päällä määräys tai laittomat huumeet; tämä voi tarkoittaa että te suurempi riski olla riippuvainen tulla riippuvaiseksi olla tulla van Lyrica.
- Er zijn gevallen van toevallen/stuipen (convulsies) gemeld tijdens het gebruik van Lyrica tai lyhyesti jälkeen het lopettaa Lyrica. Ota heti yhteyttä lääkäriisi jos ilmenee a sinulla esiintyy kohtausta kohtausta ..
- tapauksia heikentyneestä aivotoiminnasta ( enkefalopatia aivotoiminta (enkefalopatia) raportoitu joillakin potilailla määrä potilaita jotka käyttivät Lyricaa käyttivät. Nämä potilaat olivat myös muita sairauksia. Kerro siitä lääkärillesi lääkäri jos sinä menneisytydessä kärsinyt olet ollut vakavista vakavista sairauksista, kuten esimerkiksi maksa- tai munuaissairaudet.
- On ollut raportteja olemassa alkaen hengitysvaikeudet. Jos sinulla on on alkaen
- hermostosairaudet, hengityselinsairaudet, munuaisten toimintahäiriö tai jos olet yli 65 vuotta, voi lääkäri määrätä sinulle yksi toinen annostusohjelma määrätä. Ota yhteyttä sinun lääkäriin jos sinä vaikeus hengittää hengittää tai yksi pinnallinen hengitys on.

## Riippuvuus

Jotkut ihmiset voida Lyrica riippuvaiseksi tulla (yksi tarve käyttää lääke jatkaa ottamista ).

Hevoivat vieroitusoireita saada kun he lopettavat lääkkeen kanssa käyttö Lyrica (katso kohta 3, "Kuinka käytät tätä lääkettä ?" ja "Jos lopetat käytön tämän lääkkeen "). Jos sinä tätä lääkettä"). Jos sinä er huolia yli tekee että te Lyrica riippuvainen voitte tulla, on se tärkeää että te teidän lääkäri konsultoida.

Jos te yksi näistä seuraava oireet huomaat aikana se ottaa Lyricaa, voi tämä olla merkki olla että olet riippuvainen tullut riippuvaiseksi:

- Sinun täytyy lääke lääke pidempään ottaa kuin suositeltu mukaan teidän määrääjä
- Te olette lääke tunne että te enemmän täytyy ottaa kuin suositeltu annos
- Sinä käyttö sen lääke varten muut syyt kuin määrätty

- Sinä olet toistuvat, epäonnistuneet yritykset tehnyt varten lopettaa lopettaa kanssa tai kontrolli saada saada yli käyttö lääkkeen lääke
- Kun lopetat lopetat lääkkeen ottamisen lääkkeen lääke tunnet itsesi itsesi et hyvältä, ja te tuntee itsensä paremmaksi heti kun otatte lääkkeen uudelleen sisään

Jos yksi näistä oireista huomaatte , ottakaa yhteyttäteidän lääkäriin keskustellaksenne lääkäri hoitamaan paras hoitopolku varten teille keskustella kanssa, mukaan lukien milloin se sopiva hetki on lopettaa ja miten te tämän tehdä yhdessä sopivasti turvallinen tapa täytyy tehdä.

Lapset ja nuoret alle 18 vuotta

Turvallisuus ja tehokkuus lapsilla ja nuorilla (alle ikä vuoteen asti 18 vuotta) ovat ei määritetty. Lyrica ei saa siksi ei käyttää tällä ikäryhmällä . Käytättekö.

muita lääkkeitä vielä muu lääkkeet?

Käytättekö te lisäksi Lyrica vielä muita lääkkeitä, oletteko te sen äskettäin tehneet tai onko se mahdollista että että sinä lähitulevaisuudessa käytät muita lääkkeitä aiot käyttää? Kerro se sitten lääkäriillesi tai apteekkarillesi . Tämäkoskee myös niitä lääkkeitä joita missä u ei resepti tarvitaan ei ole.

Lyrica ja tietyt muut lääkkeet voivat vaikuttaa toisiinsa (interaktio). Kun nauttiminen kanssa tiettyjä muita lääkkeitä jotka ovat rauhoittavia vaikutuksia omaavat (mukaan lukien opioidit), voi Lyrica näitä vaikutuksia voimistaa, mikä voi johtaa asti hengityspysähdys, kooma ja kuolema. Huimaus, uneliaisuus ja keskittymiskyvyn heikkeneminen voivat pahentua jos Lyrica yhdessä lääkkeiden kanssa annetaan annettu die:

- oxycodon (käytetään kipulääkkeenä kipulääkeloratsepaami (
- käytetäänahdistuksen hoidossa) tai alkoholia sisältävät ahdistuksesta) tai
- Lyrica voi.

kanssa voi samanaikaisesti kanssa oraalinen ehkäisyvalmisteet käytetään käytetty.

Mihin täytyy sinun kiinnittää huomiota ruoan, juomien ja alkoholin kanssa?

Lyrica-kapselit voidaan ruoan kanssa tai ilman ruokaa ottaa otettuna.

On suositeltavaa olla ei alkoholia juoda käytön aikana Lyrica. Raskaus ja

imetys Lyrica ei saa

käyttää raskauden aikana de raskaus of imetyksen aikana de imetys voidaan käyttää, ellei lääkärisi toisin määritä . Hetkäyttö van pregabaliini imetyksen aikana de ensimmäiset 3 3 kuukautta ei voida käyttää raskauden voi synnynnäisiä epämuodostumia aiheuttaa kohdalla se syntymättömään lapseen johon tarvitaan lääketieteellinen hoito tarvitaan . Tutkimuksesta yksi tutkimus jossa tiedot arvioitiin naisten alkaen naiset ulos Pohjois-Euroopan maista jotka raskauden ensimmäisen kolmen 3 kuukauden aikana pregabaliinia käyttäneet olivat otettu, kalpea että 6:sta 100 vauvasta tällaisia synnynnäisiä epämuodostumia esiintyi. Naisilla jotka kuolema aikana se tutkimuksen eivät kanssa pregabaliinia tulevat hoidettu, olivat että 4 sadasta vauvaa. Epänormaalisuudet kasvojen alueella (halkio huuli, leuka jaai kitalaki), silmät , silmäthermosto hermostojärjestelmä (mukaan lukien de aivot), munuaiset ja sukupuolielimet ilmoitettiin ..

jotka voivat tulla raskaaksi voivat tulla raskaaksi, täytyy käyttää tehokasta ehkäisyä. Oletteko raskaana, ajatteletteko olevanne raskaana tai olettekotulossa raskaaksi tai imetättekö lasta? Ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin ennen kuin lääkäri farmaseutti ennen u tämä lääke käytetään.

Ajokyky ja se käyttö koneiden

Käyttö käyttö Lyrica voi johtaa huimaukseen huimausuneliaisuuteen ja ja vähentynyt keskittyminen. Sinun ei pidä ajaa ajoneuvoja , käyttää koneita, käyttää tai muita riskialttiita toimintoja suorittaa, kunnes on selvää onko tämä lääke sinun kyky tehdä edellä mainitut tehtävät pois tehdä suorittaa, joko ei vaikuttaa.

Lyrica sisältää laktoosimonohydraattia

Kysy sinun lääkäriltä ennen kuin tätä lääke ottaa, jos sinun lääkäri on kertonut on että sinä tiettyjä sokereita et voi sietää.

Lyrica sisältää natriumia

Tämä aine sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kova kapseli, mikä tarkoittaa että se on käytännössä 'natriumvapaa'.

### 3. Kuinka käytät tätä lääkettä ??

Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen kuten sinun lääkäri tai apteekkari sinulle sen on kertonut. Epäiletkö sinä oikeaa käyttöä ? Ota sitten yhteyttä? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäri tai apteekkari. Ota ei enempää lääkkeestä kuin on sinulle määrätty määrätty.

lääkäri päättää mikä annos on sinulle sopiva u sopiva on.

Lyrica on ainoastaan tarkoitettu suun kautta tapahtuvaan.

Perifeerinen ja keskushermoston neuropaattinen kipu, epilepsia tai yleistynyt ahdistuneisuushäiriö:

- Ota määrä kapsleita joka lääkärisi on määrännyt määrätty.
- on säädetty sinulle ja sairauskuvaasi sopivaksi ja lääkärisi ohjeiden mukaan tulee yleisesti yleensä olla välillä 150 ja 600 mg per päivä.
- Teidän lääkäri tulee teille kertoa että te joko kaksi kertaa tai kolmesti per päivä Lyrica täytyy ottaa. Kahdesti kaksi kertaa per päivä otat Lyrica kerran aamulla ja kerran illalla 's iltaisin sisään, joka päivä noin samaan aikaan päivittäin. kolme kertaa päivässä ottaa Lyrica kerran aamulla , kerraniltapäivällä , kerran illalla en kerran 's illalla sisään, joka päivä noin samaan aikaan ..

vaikutelma että että vaikutus Lyrica on liian heikko vahva tai heikko on, kevyt kuin sinun lääkäri tai apteekkari sisään. Jos olet

vanhempi potilas ( yli 65vuotta ), vuosi), täytyy sinun ottaa Lyrica tavallisessa annoksessa sisään ottaa, paitsi jos sinulla on ongelmia kanssa munuaistesi kanssa ..

mahdollista että sinun sinä lääkäri yksi toinen annostusohjelma jaai muut annostus määrää jos teillä munuaisongelmia on.

Ota kapseli sen kokonaisena veden kanssa.

Ota Lyrica kunnes teidän lääkäri kertoo että te voitte lopettaa.

Onko te liian paljon tätä lääkettä käyttänyt? Ota yhteyttä teidän lääkäriin tai mene lääkäriin lähimpään tai lähimpään Ensi Apu Päivystykseen sairaalan sairaalan. Ota sinun laatikko tai pullo Lyrica-kapseleita mukaan. Sinä voit tuntea uneliaisuus, sekava, huolestunut tai levoton tunne jälkeen, jos te liikaa Lyrica on ottanut. Epileptiset kohtaukset ja tajuttomuus (kooma) on myös raportoitu.

Oletko unohtanut tätä lääkettä käyttää? On tärkeää ottaa Lyrica-kapselit joka päivä säännöllisesti samaan aikaan. sama aika sisään te ottaa. Jos olet unohtanut yhden annoksen sisään ottaa, teetämä sitten niin pian kuin mahdollista kun sinä muistat, paitsi kun se kuten se aika on seuraavaan sinun seuraava annos. Jos siinä tapauksessa ota sinä yksinkertaisesti seuraava annos sisään. Ota ei kaksinkertainen annos jotta klo yksi unohtaa annos in ottaa kiinni.

Jos lopetat käytön tämän lääkkeen kanssa tämä lääke Älä lopeta äkkiä tämän ottamista Lyrica. Jos haluat lopettaa lääkkeen ottaminen Lyrica, keskustele tästä ensin lääkärisi kanssa. Lääkäri tai hän kertoo sinulle miten sinun tulee tehdä tämä. Jos. Jos teidän hoito lopetetaan, täytyy tämä tapahtua vähitellen tapahtua yli yhden jakson vähintään 1 viikon. Sinun täytyy tietää että on kun on u tetyt sivuvaikutukset, niin sanotut vieroitusoireet, voivat ilmaantua kun lopetetaan käyttö lyhyen tai pitkäaikaisen hoidon Lyrica-lääkkeellä. Nämä sivuvaikutukset haittavaikutukset koostua ulos: unettomuus, päänsärky, pahoinvointi, tunne ahdistusta, ripuli, flunssan kaltaiset oireet, kohtaukset //kouristukset (kouristukset), hermostuneisuus, masennus, ajatukset itse vahingoittamisesta tai itsemurhasta, kipu, hikoilu ja huimaus. Nämä sivuvaikutukset voivat useammin esiintyä tai vakavammiksi muuttua jos käytät Lyricaa pidempään kuin pidemmän ajan olet käyttänyt. Jos saat vieroitusoireita, täytyy ottaa yhteyttä yhteyttä kanssa sinun lääkäriin.

Onko sinulla vielä muita kysymyksiä koskien käyttöä tästä tästä lääkkeestä? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekki.

#### 4. Mahdolliset sivuvaikutukset

Kuten jokainen lääke voi myös tämä lääke sivuvaikutuksia olla, vaikka ei kaikki saa niitä kohdata ..

Haittavaikutukset jotka hyvin usein, yli 10:stä henkilöstä, esiintyvät

- huimaus, uneliaisuus, päänsärky

Haittavaikutukset jotka usein, alle 10:stä vähemmän kuin 1:llä henkilöä, esiintyy

- lisääntynyt ruokahalu
- tunne alkaen riemua, sekavuus, suunnattomuus (desorientaatio), vähentynyt seksuaalinen
- kiinnostus, ärtyneisyys

- huomion häiriöt, kömpelyys, muistihäiriö, muistinmenetys, kontrolloimaton vapina tai värinä, puhehäiriöt, kihelmöivä tunne, tunnottomuus, uneliaisuus/ uneliaisuus (sedaatio), uneliaisuus (letargia), unettomuus, väsymys, u tunnet itsesi epänormaaliksi
- sumea näkö, kaksois näkö
- huimaus, ongelmat tasapainon kanssa, kaatuminen
- kuiva suu, ummetus, oksentelu, ilmavaivat, ripuli, pahoinvointi, turvonnut vatsa
- erektio-ongelmat
- turvotus kehon sisältäen raajat juopunut tunne
- olla , epänormaali tapa, epänormaali tapa alkaen kävely
- painonnousu
- lihaskrampit, kipu sisällä nivelessä, selkäkipu, kipu sisään raajoissa (käsivarret jaat jalat)
- kipeä kurkku

Haittavaikutukset jotka joskus, alle alle 1:stä 100:sta henkilöstä, esiintyvät

- ruokahaluttomuus ja ruokahaluttomuus, painonlasku, verensokerin lasku, verensokerin nousu
- muuttunut itsetietoisuus, levottomuus, masennus, kiihtyneisyys, mielialan muutokset, vaikea löytää sanoja voida tulla, hallusinaatiot, epänormaali unet, paniikkikohtaukset, välinpitämättömyys, aggressio, liiallinen iloisuus, henkinen heikkeneminen, ongelmat ajattelussa ,lisääntynyt lisääntynyt seksuaalinen kiinnostus, ongelmat seksuaalisen toiminnan kanssa mukaan lukien vaikeus saavuttaa seksuaalinen huippu, viivästynyt siemensyöksy ( ejakulaatio ) •ejakulaatio)
- muutokset näkökyvyssä näkökyky, epätavalliset silmänliikkeet, muutokset näkökyvyssä mukaan lukien putkinäkö putkinäkö rajoitettunäköalue ),valonvälähdykset valonvälähdyksetspastiset liikkeet liikkeet, vähentynyt refleksit, yliaktiivisuus, huimaus tulla seisomaan nousu, herkkä iho, makuaistin menetys, polttava tunne, värinät purema liikkua, vähentynyt tajunta, menetys tajunnasta ,pyörtyminen pyörtyminenlisääntynyt herkkyys äänelle , eihyvin vointi ei maukasta tuntea
- kuivat silmät, turvonnut silmät, silmänsärky, heikot silmät, vetiset silmät, ärtyneet silmät
- rytmihäiriöt, nopeutunut syke, matala verenpaine, korkea verenpaine, muutokset sydämen syke, heikentynyt toiminta sydämessä
- punoitus, kuumat aallot
- hengitysvaikeudet, kuiva nenä, tukkoinen nenä
- lisääntynyt syljeneritys, polttava närästys, tunnottomuus ympäri suun hikoilu
- hikoillaihoittuma ihottumakylmä kylmä vilunväristykset, kuume
- lihaskouristukset, nivelturvotukset, lihaskrampit, kipu mukaan lukien lihaskipu, kipu niskassa
- kipu rintakehässä vaikea
- tai of kivulias virtsata, inkontinenssi
- heikkous, jano, puristava tunne rintaan rinta
- muutokset veressä -- maksatestitulokset maksatestitulokset lisääntymisenlisääntyminen alkaen kreatiinifosfokinaasi, alaniiniaminotransferaasi ja aspartaatti-aminotransferaasi veressä ,vähentynyt alentaminen määrä verihiutaleita veressä , puute, valkosoluista päällä valkoinen verisolut että itsensä ulos sisään lisääntynyt herkkyys infektioille ( neutropenia),enemmän kreatiniinia veressä , vähemmän kaliumiaveressä )yliherkkyys
- yliherkkyysturvonnut turvonnut kasvot, kutina, ihottuma ja voimakas kutina ja muodostuminen kyhmyjen

- ( nokkosihottuma),vuotava nenä ,verenvuoto nenästä ,yskä yskä, kuorsaus
- kivuliaat kuukautiset
- kylmät kädet ja jalat

Haittavaikutukset jotka harvoin, alle 1:stä 1.000:sta henkilöstä, esiintyvät

- epänormaali hajuaisti, liike ei näkö heti kun se pää liikkuu ,muutos muutos
- syvyyden kokemus kokemuksessa ,häikäisy välähdyksetnäön menetys menetys näkökyky
- laajentaa ei käännettävää sisältöä pupillit, karsastus katsoa
- kylmä hiki, ahdistava tunne kurkussa, turvonnut kieli tulehdus
- tulehdus haima ongelmat
- ongelmat nieleminen niellä
- hidas tai vähentynyt liike kehon keho
- ongelmat kanssa kirjoittaminen
- nesteen kertyminen (ala)vatsa
- nesteen kertyminen keuhkoihin kohtaukset
- /kouristuksetkouristukset (kouristukset)
- muutokset EKG:ssä (elektrokardiogrammi) jotka vastaavat häiriöitä sydämen rytmissä
- sydänlihaksen
- vaurio
- spontaani erityis rintojen de kohdalla, epänormaali rintojen kasvu, rintojen muodostuminen miehillä häiriintynyt
- kuukautiskierto kuukautiskierto epäsäännöllisetkuukautiset kuukautisetheikentynyt
- toiminta munuaisten ( munuaisten vajaatoiminta ), heikentynytmunuaisten vajaatoiminta), vähentynyt erittyminen virtsan, ei
- voida virtsata (virtsaretentio)
- väheneminen valkosolujen määrä valkoiset verisolut
- sopimaton käytös, itsetuhoinen käytös, itsemurha-ajatukset
- allerginen reaktiot, mukaan lukien mahdollisesti: vaikeus hengittää , tulehtuneet silmät(keratiitti) ja voimakkaat reaktiot ihon kanssa reaktiot ei ole mitään käännettävää iho kanssa kuten ominaisuudet: punertava, ei-kohonnut, levymäinen tai ympyränmuotoinen laikut vartalolla, usein jossa rakkuloita keskellä sitä, ihon hilseily, haavaumat sisään ja ympäri de suun, kurkun, nenän tai sukupuolielinten de alueella ja silmät; tämä vakava ihottuma voi olla edeltänyt kautta kuume ja flunssan kaltaiset oireet (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi ).keltaisuus
- ( ihonja ihon ja silmät silmät)
- parkinsonismi, jotka ovat oireita jotka muistuttavat Parkinsonin tautia muistuttavat, kuten vapina, vaikeuksia olla liikkua ( bradykinesiabradykinesia) ja jäykät lihakset

Haittavaikutukset jotka hyvin harvoin, alle 1:stä 10 000:sta henkilöstä, esiintyvät

- maksavaurio
- hepatiitti (maksatulehdus).

Ei tunnettu: frekvenssi voi kanssa saatavilla tiedoilla ei voida määrittää

- Riippuen voidaan Lyrica ('lääkeriippuvuus').

Sinun täytyy tietää että on jos u tietyt sivuvaikutukset, niin kutsutut vieroitusoireet, voivat ilmetä lopettamisen jälkeen lopettaminen kanssa lyhyt - taipitkääikaishoito Lyrica-lääkkeellä ( katso ”Jos sinä Jos te lopettaa kanssa käyttö käyttö tästä lääkkeestä ”).Sinun

täytyy välittömästi hakea lääketieteellistä neuvoa jos huomaat että kielesi tai on turvonnut kasvot alkaa päällä turvota tai jos iho punaiseksi muuttuu ja siihen ilmestyy rakkuloita tai kuoriutuu alkaa alkaa esiintyä tee esiintyä.

Tietyt sivuvaikutukset kuten uneliaisuus voivat esiintyä useammin, koska potilaat joilla on selkäydinvamma muut lääkkeet voivat käyttää esimerkiksi esimerkiksi kipu of spastisuus hoitaa hoitaa. Nämä lääkkeet ovat samat sivuvaikutukset kuin pregabaliini ja de vakavuus van nämä sivuvaikutukset voi lisääntyä ovat yhteydessä samanaikainen käyttö.

Seuraava seuraava haittavaikutus on raportoitu sen jälkeen tämä lääke markkinoille on tuotu :: kanssa kanssa hengittää, pinnallinen hengitys.

Ilmoittaminen haittavaikutuksista alkaen Haittavaikutukset

Jos sinulla on haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi. Tämä koskee myös varten mahdollisia sivuvaikutuksia jotka eivät tässä tiedotteessa ole . Voit ilmoittaa sivuvaikutuksista myös suoraan ilmoittaa kansallisen järjestelmän kautta kuten mainittu tässä sisään liite V. Kautta haittavaikutukset ilmoittaa raportoimalla, voit auttaa meitä saamaan lisätietoa ilmoittaa saada koskien turvallisuus tästä tästä lääkkeestä lääke.

#### 5. Kuinka säilytätte te tätä lääkettä?

Pidettävä näkyvyyden ja ulottumattomissa alkaen lasten saatavilla.

Älä käytä tätä lääkettä enää lisää jälkeen de viimeinen viimeinen käyttöpäivä. Se löytyy pakkauksesta laatikko tai pullo EXP:n jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi . Viimeinen päivä javuosi . Viimeinen päivä kuukauden kuukausi on viimeinen viimeinen käyttöpäivä.

Ennen tätä lääkettä ei ole ei erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä huuhtelee lääkkeitä ei viemäriin viemäriin tai WC:hen ja heitä niitä ei roskakoriin roskakoriin.

Kysy apteekkariltasi mitä sinun pitäisi tehdä lääkkeillä jotka sinun ei enää käytä . Jos etkäytä lääkkeet päällä oikealla tavalla hävität tulevat ne vastuullisella tavalla tuhotuksi ja eivät pääse ne ympäristöön ympäristössä Sisältö.

#### 6. Sisältö ei ole mitään käännettävää sisältöä pakkaus ja muut tiedot

Mitkä aineet sisältyvät tähän valmisteeseen ?Vaikuttava

aine tässä valmisteessa on pregabaliini . Jokainen pregabaliini Jokainen kova kapseli sisältää 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg tai 300 mg pregabaliinia.

Tämä muut aineet tässä lääkkeessä ovat :: laktoosimonohydraattimaissitärkkelys , talkki, gelatiini,titaanidioksidi titaanidioksidi (E171), natriumlauryylisulfaatti, vedetön kolloidinen

piidioksidi, musta muste (joka sellakka, rautaoksidi musta (E172), propeeniglykoli ja kaliumhydroksidi sisältää) en vesi.

75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg en 300 mg kapselit sisältävät myös punainen rautaoksidi (E172).

### Miltä näyttää Lyrica ja kuinka paljon on yhdessä pakkauksessa ??

<b>25 mg kapselit</b>	Valkoinen kova kapseli, jossa merkintä "VTRS" yläosassa ylempi osa ja "PGN 25" alaosassa alempi osa kapselin
<b>50 mg kapselit</b>	Valkoinen kova kapseli, jossa merkintä "VTRS" yläosassa ylempi osa ja "PGN 50" kapselin alaosa osa kapselin. Alaosa osa kapselin on merkitty mustalla yhdellä mustalla nauhalla
<b>75 mg kapselit</b>	Valko-oranssi kova kapselit, joissa painatus "VTRS" yläosassa yläosa osa ja "PGN 75" alaosassa alaosa osa kapselin
<b>100 mg kapselit</b>	Oranssi kova kapselit, joissa painatus "VTRS" yläosassa yläosa osa ja "PGN 100" alaosassa alaosa osa kapselin
<b>150 mg kapselit</b>	Valkoinen kova kapselit, joissa merkintä "VTRS" yläosassa osa ja "PGN 150" alaosassa osa kapselin
<b>200 mg kapselit</b>	Vaalean oranssi kova kapselit, joissa painatus "VTRS" yläosassa ylempi osa ja "PGN 200" alaosassa alempi osa kapselin
<b>225 mg kapselit</b> ylempi	Valkoinen-vaalea oranssi kova kapselit, joissa painatus "VTRS" yläosassa osa ja "PGN 225" kapselin alaosa osa kapselin
<b>300 mg kapselit</b>	Valko-oranssi kova kapselit, joissa on merkintä "VTRS" kapselin yläosa osa ja "PGN 300" kapselin alaosa osa kapselin

Lyrica on saatavilla in kahdeksan pakkauskoot valmistettu ulos PVC:stä alumiinifoliolla vastaan takapuoli :: pakkaus 14 kapselia, jossa 1 läpipainopakkaus läpipainopakkausyksi pakkaus 21 kapselia, jossa 21 kapselia, joissa on 1 läpipainopakkaus, yksi pakkaus 56 kapselia, joissa on 4 läpipainopakkausta, yksi pakkaus 70 kapselia, joissa on 5 läpipainopakkausta, yksi pakkaus 84 kapselia, joissa on 4 läpipainopakkausta, yksi pakkaus 100 kapselin pakkaus 10 läpipainopakkausta, yksi pakkaus 112 kapselin pakkaus 8 läpipainopakkausta ja yksi perforoitu yksikköläpipainopakkaus 100 x 1 kapselia.

Lyrica on myös saatavilla sisään yksi HDPE-pullo, jossa on 200 kapselia saatavilla de 25 mg, 75 mg, 150 mg ja 300 mg vahvuudet.

Ei kaikki mainitut pakkauskoot tuoda markkinoille kauppa tuodaan.

Luvan haltija myyntiluvan saamiseksi markkinoille kauppa tuoda ja valmistaja

Haltija ei voida kääntää ilman kontekstia lupa varten se kauppa tuoda:  
Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Alankomaat.

Valmistaja:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Mooswaldallee 1, 79108 Freiburg im Breisgau, Saksa.

tai

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom 2900, Unkari.

tai

MEDIS INTERNATIONAL a.s., výrobní tehdas Bolatice, Teollisuuskatu 961/16, 747 23 Bolatice, Tšekki.

Ota kaikki tiedot tietoa tästä tästä lääkkeestä yhteyttä paikalliseen edustajaan haltijan haltija myöntämisestä lupa varten markkinoille tuonti saattaminen:

BelgiaBelgiqueBelgien  
Viatrix  
PuhTel: +32 (0)2 658 61 00

Liettua  
Viatrix UAB  
Puh: +370 52051288

Bulgaria  
Mylan EOOD  
Puh.: +359 2 44 55 400

Luxemburg  
Viatrix  
Puh/Puh: +32 (0)2 658 61 00  
(Belgia/Belgia)

Tšekki tasavalta  
Viatrix CZ s.r.o.  
Puh: +420 222 004 400

Unkari  
Viatrix Healthcare Kft.  
Puh.: +36 1 465 2100

Tanska  
Viatrix ApS  
Puh: +45 28 11 69 32

Malta  
V.J. Salomone Pharma Limited  
Puh: (+356) 21 220 174

Saksa  
Viatrix Healthcare GmbH  
Puh: +49 (0)800 0700 800

Alankomaat  
Mylan Healthcare BV  
Puh: +31 (0)20 426 3300

Viro  
Viatri OÜ  
Puh: +372 6363 052

Norja  
Viatri AS  
Tlf: +47 66 75 33 00

Ελλάδα  
Viatri Hellas Ltd  
Τηλ: +30 2100 100 002

Österreich  
Viatri Austria GmbH  
Tel: +43 1 86390

España  
Viatri Pharmaceuticals, S.L.  
Tel: +34 900 102 712

Polska  
Viatri Healthcare Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 546 64 00

Ranska  
Viatri Terveys  
Puh: +33 (0)4 37 25 75 00

Portugali  
Viatri Healthcare, Lda.  
Puh: +351 21 412 72 00

Kroatia  
Viatri Hrvatska d.o.o.  
Puh: + 385 1 23 50 599

Romania  
BGP Products SRL  
Puh: +40 372 579 000

Irlanti  
Viatri Limited

Tel: +353 1 8711600

Slovenija  
Viatrix d.o.o.  
Tel: +386 1 236 31 80

Ísland  
Icepharma hf.  
Sími: +354 540 8000

Slovenská republika  
Viatrix Slovakia s.r.o.  
Tel: +421 2 32 199 100

Italia  
Viatrix Pharma S.r.l.  
Tel: +39 02 612 46921  
Suomi/Finland

Viatrix Oy  
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος  
GPA Pharmaceuticals Ltd  
Τηλ: +357 22863100

Sverige  
Viatrix AB  
Tel: +46 (0)8 630 19 00

Latvija  
Viatrix SIA  
Tel: +371 676 055 80

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)  
Mylan IRE Healthcare Limited  
Tel: +353 18711600

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty {KK/VVVV}. Lisää tietoa

tästä lääkkeestä on saatavilla verkkosivustolla tämän lääkevalmisteen valmistajan Eurooppalainen  
Lääkevirasto: <http://www.ema.europa.eu>.