

Notice: information pour l'utilisateur

Lyrica 25 mg gélules dures,  
Lyrica 50 mg gélules dures,  
Lyrica 75 mg gélules dures,  
Lyrica 100 mg gélules dures,  
Lyrica 150 mg gélules gélules,  
Lyrica 200 mg dures gélules,  
Lyrica 225 mg dures gélules,  
Lyrica 300 mg dures gélules  
prégabaline

Lisez attentivement toute la notice avant de prendre ce médicament utiliser car il contient importantes informations pour vous. Conservez

- cette notice .. aurez vous besoin de lui plus tard ..
- vous vous encore questions? Contactez votre médecin ou pharmacien.
- Ne donnez ce médicament pas à d'autres , car il est seulement prescrit à vous prescritLe peut être nuisible pour les autres ,même si ils ont les mêmes symptômes que vous. Ressentez
- -vous des effets indésirables mentionnés dans meurt dans rubrique 4 figurent? Ou obtenez vous un effet secondaire qui n'est pas cette notice figure? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

Contenu de ce notice

1. Qu'est-ce que Lyrica et pourquoi ce médicament est utilisé?
2. Quand ne devez-vous ce médicament pas utiliser ou devez vous faire attention prudemment avec être?
3. Comment utilisez vous ce médicament?
4. Effets indésirables
5. Comment conservez vous ce médicament?
6. Contenu de la emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Lyrica et pourquoi est ce médicament utilisé?

Lyrica appartient au groupe de médicaments utilisés pour de traitement de l'épilepsie, douleur neuropathique et trouble anxieux généralisé (TAG) chez.

. Douleur neuropathique périphérique et centrale: Lyrica est utilisé pour le traitement de douleurs chroniques qui sont causées par des lésions des nerfs. Diverses maladies comme le diabète ou zona (zona) pouvoir périphérique neuropathique douleur causer. Les perceptions de la douleur peuvent être décrites comme chaud, brûlant, pulsant, fulgurant, piquant, aigu, crampe, douloureux, picotement, engourdi, endormi. Périphérique et centrale neuropathique douleur peut aussi accompagné aller avec des sautes d'humeur, des troubles du sommeil, de la fatigue et peut avoir une influence sur le fonctionnement physique et social et le en de totale qualité de vie.

Épilepsie: Lyrica est utilisé dans le traitement de certaines formes d' épilepsie chez

les adultes (partielles crises avec ou sans secondaire généralisées crises). Votre médecin vous prescrira Lyrica prescrire pour soutenir le traitement de votre épilepsie, si vos actuels médicaments votre état ne sous contrôle tenir. Vous devez Lyrica en plus de votre traitement actuel prendre. Lyrica est non destiné à seulement être utilisé , maisdoit toujours être utilisé en combinaison avec d'autres anti- épileptiques( médicamentsmédicaments utilisé pour épilepsie).

Généralisé trouble anxieux: Lyrica est utilisé pour le traitement de trouble anxieux généralisé (TAG). Les symptômes du TAG sont persistants prolongés en excessive anxiété et inquiétude qui difficile à contrôler sont. TAG peut aussi agitation ou un sentiment de tension ou irritation provoquer, ou peut assurer que vous vous vous sentez vite fatigué, vous avez du mal à vous concentrer, vous ne pouvez plus vous souvenir ou irritable êtes, ou peut tension musculaire ou troubles du sommeil provoquer. Cela n'a rien à voir avec le stress et la tension dans la vie quotidienne.

## 2. Quand pouvez-vous ceci médicament ne pas utiliser ou devez vous en prudent avec être?

Quand ne devez-vous pas ce médicament ne pas utiliser?

Vous êtes allergique à un de la substances dans ce médicament. Ces substances pouvez vous trouver dans rubrique 6.

Quand devez vous faire attention être avec ce médicament?

Contactez votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament ..

un certain nombre de patients qui utilisent Lyrica utilisent utiliser, sont symptômes signalés qui indiquent une une réaction allergique. Ces symptômes comprennent gonflement du visage, lèvres, langue en gorge mais aussi éruption cutanée . Vousdevez immédiatement contacter prendre avec votre médecin si un de ces réactions chez chez u survient.

Dans le cadre de l' utilisation de prégabaline , il a été rapporté des effets indésirables cutanés graves (effets indésirables sur la peau), comme le syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique. Arrêtez l' utilisation de prégabaline et appelez immédiatement une aide médicale si vous un des dans rubrique 4 décrits symptômes en rapport avec ces graves réactions cutanées remarquez.

- Lors de l' utilisation de Lyrica sont vertiges et somnolence survenu, provoquant le survenue de accidents (chutes) chez les patients âgés peutaugmenter . Soyez donc prudent vous habitué êtes à l'effet que ce médicament pourrait avoir ..
- peut vision floue ou perte de la vue vision de autre changements de la vision causer, dont le plus temporaire sont. Vous devez le immédiatement à votre médecin informer si vous changements de votre vision remarquez.
- Chez certains patients diabétiques qui prennent du poids pendant le traitement avec prégabaline peut peut un ajustement de leur médication pour le diabète nécessaire être.
- Certaines effets secondaires comme somnolence peuvent plus souvent survenir, parce que patients avec lésion de la moelle épinière autres médicaments peuvent utiliser pour par exemple douleur ou spasticité traiter traiter. Ces médicaments ont les mêmes effets secondaires que prégabaline et de Gravité de ces effets secondaires peut être augmentée chez l'utilisation concomitante ..

- y a chez certains patients pendant l' utilisation utilisation de Lyrica rapports été de insuffisance cardiaque; souvent étaient ce patients âgés avec des maladies cardiaques et vasculaires affections vasculaires. de commencer à prendre le médicament de ce médicament devez vous le votre médecin informer si vous avez passé souffert avez eu de une maladie cardiaque.
- Il y a chez certains patients pendant l' utilisation de Lyrica signalements ont été de insuffisance rénale. Si vous pendant l' utilisation de Lyrica remarquez que vous urinez moins urine, devez le signaler à votre médecin informer car cela peut s'améliorer en arrêtant le médicament à prendre.
- Certains patients qui traités étaient avec des anti-épileptiques comme Lyrica, ont eu des pensées sur l' auto-mutilation ou le suicide ou ont manifesté un comportement suicidaire . Si vous àun moment donné de tels pensées a ou tel comportement présente, contactez immédiatement votre médecin.
- Lorsque Lyrica est pris avec d'autres médicaments qui constipation peuvent causer (comme certains types d'analgésiques), il est possible que des problèmes gastro-intestinaux surviennent (par ex. constipation, obstruction ou paralysie intestinale). Dites le votre médecin si vous constipation avez, surtout si vous sensible à ce problème êtes.
- Dites le votre médecin avant vous commencez à utiliser l'utilisation de ce médicament si vous avez abusé avez fait ou dépendant avez été d'alcool, médicaments sur ordonnance ou drogues illégales; cela peut signifier que vous un plus grand risque courez de dépendant devenir devenir de Lyrica.
- Il y a eu des de crises/convulsions (convulsions) signalées pendant l' utilisation de Lyrica ou peu après l' arrêter avec Lyrica. Contactez immédiatement votre médecin si il chez vous une convulsion se produit.
- Il y a des cas de fonction cérébrale réduite fonction cérébrale encéphalopathieencéphalopathie) signalé chez un nombre de patients qui utilisaient Lyrica utilisaient. Ces patients avaient également d'autres affections. Informez votre médecin médecin si vous dans le passé souffert avez eu de graves affections, telles que par exemple maladies du foie ou des reins.
- Il y a eu des rapports de difficultés respiratoires. Si vous souffrez de troubles - du système nerveux, troubles du système respiratoire, insuffisance rénale ou si vous avez plus de 65 ans, votre médecin peut vous prescrire un autre schéma posologique prescrire. Contactez votre médecin si vous avez des difficultés à respirer ou une respiration superficielle avez.

## Dépendance

Certaines personnes peuvent de Lyrica dépendants devenir (un besoin de prendre le médicament de continuer à prendre). Ils peuvent symptômes de sevrage avoir lorsqu' ils arrêtent de le utilisation de Lyrica (voir rubrique 3, « Comment utilisez -vous ce médicament? » et « Si vous arrêtez de utiliser ce médicament »). Si vousvous sentez er inquiétudes sur faites que vous de Lyrica dépendant pouvez devenir, il est important que vous votre médecin consultiez.

Si vous un des suivant symptômes remarquez pendant le prendre de Lyrica, peut ce un signe être que vous dépendant êtes devenu:

- Vous devez le médicament plus longtemps prendre que recommandé par votre prescripteur
- Vous avez le sentiment que vous devez prendre plus que la dose recommandée dose

- U utilisation le médicament pour autres raisons que prescrit
- U a répétées, tentatives échouées fait pour arrêter d'arrêter avec ou contrôle à obtenir sur le utilisation du médicament
- Quand vous arrêtez de prendre le médicament vous sentez vous ne pas bien bien, en vous sentez vous mieux dès que vous prenez de nouveau le médicament de nouveau prenez

Si vous un de ces symptômes , contactezvotre médecin pour le meilleur parcours de traitement pour vous à discuter, y compris quand il un moment approprié pour arrêter et comment vous cela de manière appropriée un sûre manière doit faire.

Enfants et adolescents jusqu'à 18 ans

La sécurité et efficacité chez les enfants et les adolescents (jusqu'à l' âge de 18 ans) sont pas établi. Lyrica ne doit donc pas être utilisé chez ce groupe d'âge.

Utilisez -vous d'autres médicaments médicaments?

Utilisez vous en plus de Lyrica encore d'autres médicaments, avez vous cela récemment fait ou existe la possibilité que cela vous dans le proche avenir d'autres médicaments allez utiliser?

Informez en votre médecin ou pharmacien . Celas'applique également aux médicaments dont où u aucun ordonnance pour nécessaire a.

Lyrica et certains autres médicaments peuvent s'influencer influencer interaction). Lors de prise avec avec certains autres médicaments qui un effet sédatif ont ( y compris opioïdes ), peut Lyrica ces effets renforcer , ce qui peut conduire souffrir à arrêt respiratoire, coma et décès.

Vertiges, somnolence et diminution de la concentration peuvent s'aggraver si Lyrica est administré avec des médicaments . qui :

- oxycodone (utilisé comme analgésique)
- lorazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété) ou
- alcool contenir.

Lyrica peut simultanément avec orale contraceptifs sont utilisés.

À quoi devez -vous faire attention avec la nourriture, boissons et alcool ?

Les capsules de Lyrica peuvent être prises avec ou sans nourriture être prises.

Il est recommandé de ne pas consommer d'alcool pendant la prise de Lyrica. Grossesse et

allaitement Lyrica ne doit pas

être utilisé pendant la grossesse grossesse de pendant le allaitement être utilisé, sauf si votre médecin en décide autrement. L' utilisation de prégabaline pendant le premier 3 mois de la grossesse peut malformations congénitales provoquer chez le fœtus enfant pour lequel un traitement médical nécessaire est. D'après une étude impliquant dans laquelle données ont été évaluées de femmes de Nord-Européens pays qui pendant les premiers 3 mois de la grossesse prégabaline avaient pris, pêle que 6 sur les 100 bébés de telles malformations congénitales présentaient. Chez les femmes qui pendant l' étude n'étaient pas de la prégabaline étaient traitées, étaient que 4 sur 100 bébés. Malformations du visage (fente labiale, mâchoire et palais), les yeux, le système nerveux (y compris le cerveau), reins et organes génitaux ont été signalés.

Les femmes qui peuvent être enceintes doivent utiliser une contraception efficace .  
contraception utiliser. Êtes-vous enceinte, pensez vous enceinte être , souhaitez-vous enceinte  
devenir ou allaitez vous allaitez ? Prenez contact avec votre médecin ou pharmacien avant  
avant u ce médicament utilisé.

Aptitude à conduire et le utilisation de machines

L' utilisation de Lyrica peut entraîner des vertiges, somnolence et réduite concentration. Vous ne  
devez pas véhicules conduire, machines manipuler ou d'autres activités à risque effectuer,  
jusqu'à ce que clairement il soit clair si ce médicament votre capacité à susmentionné tâches  
exécuter de réaliser, que ce soit non affecte.

Lyrica contient lactose monohydraté

Consultez votre médecin avant que vous ce médicament prend, si votre médecin vous a dit a que  
vous certains sucres ne pouvez pas tolérer ..

contient sodium Ce

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par gélule dure, ce qui veut dire  
que il est en fait 'sans sodium'.

### 3. Comment utilisez -vous ce médicament?

Utilisez ce médicament toujours exactement comme votre médecin ou pharmacien vous l'a  
indiqué .. sur l' utilisation correcte ? Contactez alors votre médecin ou pharmacien. Prenez pas  
plus du médicament que vous a prescrit prescrit.

médecin déterminera quelle dose est appropriée pour u approprié est.

Lyrica est exclusivement destiné à l'usage oral.

Périphérique et centrale neuropathique douleur, épilepsie ou anxiété généralisée:

- Prenez le nombre de capsules qui par votre médecin a été prescrit.
- Le dosage est adapté à vous et votre pathologie et sera dans le général se situer entre 150  
et 600 mg par jour.
- Votre médecin vous dira que vous ou bien deux fois ou trois fois par jour Lyrica doit  
prendre. Pour deux fois par jour prenez Lyrica une fois le matin et une fois le soir dans,  
chaque jour à environ le même moment. Pour trois fois par jour prenez Lyrica une fois le  
matin, une fois l' après-midi en une fois le soir dans, chaque jour à environ le même  
moment.

Si vous avez l' impression que l' efficacité de Lyrica est trop fort ou à faible est, léger que votre  
médecin ou pharmacien dans.

Si vous un patient âgé êtes ( plus âgé que 65 ans ),, doit vous Lyrica dans le habituelle posologie  
en prendre, sauf si vous problèmes avec vos reins avez.

Il est possible que votre médecin vous un autre schéma posologique etou autre posologie  
prescrit si vous problèmes rénaux avez.

Prenez la capsule entière avec de l'eau. Prenez Lyrica

jusqu'à ce que votre médecin vous dit que vous pouvez arrêter.

Avez-vous trop de ce médicament utilisé ? Contactez votre médecin ou allez dans le plus proche Premiers Secours de un hôpital. Apportez votre boîte ou flacon de capsules de Lyrica avec vous. Vous pouvez vous sentir somnolent, confus, inquiet ou agité ressentir après vous trop Lyrica avez pris. Épileptiques crises et inconscience (coma) ont également été signalés.

Avez-vous oublié ce médicament à utiliser?

Il est important de prendre vos capsules de Lyrica chaque jour régulièrement à la même heure chaque jour .. Si vous avez oublié une dose de prendre , faites cela dès que possible possible que vous y pensez ,sauf si il le temps est pour votre prochaine dose. Dans ce cas prenez vous simplement la prochaine dose . Ne prenez pas de double dose pour un oublié dose dans rattraper ..

arrêtez de utiliser ce médicament N'arrêtez pas

brusquement de prendre Lyrica. Si vous souhaitez arrêter de Lyrica. Si vous souhaitez arrêter avec le prendre de Lyrica, discutez cela d'abord avec votre médecin. Il ou elle vous dira comment vous devez le faire. Si votre traitement est arrêté, doit cela progressivement se produire sur une période de au moins 1 semaine. Vous devez savoir que il y a u certaines effets secondaires, appelés symptômes de sevrage, peuvent survenir après l' arrêt d' un court- ou long traitement avec Lyrica. Ces effets secondaires exister de: insomnie, maux de tête, nausée, se sentir anxieux, diarrhée, symptômes grippaux, convulsions/convulsions (convulsions), nervosité, dépression, pensées de automutilation ou suicide, douleur, transpiration et vertiges. Ces effets secondaires peuvent se produire plus souvent ou devenir plus graves si vous prenez Lyrica pendant une période prolongée . Si vous utilisé, symptômes de sevrage obtient, doit vous contacter prendre avec votre médecin.

Avez -vous encore d'autres questions sur l' utilisation de ce médicament? Contactez votre médecin ou pharmacien.

#### 4. Effets indésirables

Comme tout médicament peut aussi ce médicament avoir des effets indésirables, bien que tout le monde ne soit pas concerné par.

Effets secondaires qui très souvent, chez plus de 1 sur 10 personnes, surviennent

- vertiges, somnolence, maux de tête

Effets secondaires qui souvent, chez moins de 1 sur 10 personnes, surviennent

- augmentation appétit
- sensation de ravissement, confusion, désorientation (désorientation), diminution sexuelle
- intérêt, irritabilité

- troubles de l'attention, maladresse, trouble de la mémoire, perte de mémoire, incontrôlé tremblements ou secousses, troubles de la parole, sensation de picotement, engourdissement, engourdissement, somnolence/ somnolence (sédation), léthargie (léthargie), insomnie, fatigue, vous sentez vous anormalement
- vision floue voir, double vision
- vertiges, problèmes avec équilibre, chutes
- bouche sèche, constipation, vomissements, flatulences, flatulences, diarrhée, diarrhée, nausée, ballonné ventre
- problèmes d'érection
- gonflement du corps y compris les membres
- un sentiment d'ivresse avoir, anormale manière de marcher
- prise de poids
- crampe musculaire, douleur dans les articulations, douleur dorsale, douleur dans les membres (bras et jambes)
- douloureux gorge

Effets secondaires qui parfois, chez moins de 1 sur 100 personnes, surviennent

- perte d'appétit, perte de poids, hypoglycémie, hyperglycémie
- changé conscience de soi, agitation, dépression, agitation, changements d'humeur, difficile à trouver les mots, hallucinations, anormale rêves, attaques de panique, indifférence, agression, excitation excessive, déclin mental, problèmes de réflexion, augmenté sexuelle intérêt, problèmes avec le sexuel fonctionnement y compris le difficile atteindre d'une une sexuelle climax, éjaculation retardée (éjaculation)
- changements dans la vision, mouvements oculaires inhabituels, changements dans la vision y compris vision en tunnel (champ visuel limité), éclairs lumineux éclairs lumineux mouvements spastiques
- mouvements, diminué réflexes, hyperactivité, étourdi devenir en se levant, peau sensible, perte de goût, sensation de brûlure, tremblements chez bouger, réduit conscience, perte de conscience, évanouissement, sensibilité au bruit, se pas bien délicieux ressentir
- secs yeux, gonflés yeux, douleur oculaire, faibles yeux, larmoyants yeux, irrités yeux
- arythmies cardiaques, accéléré fréquence cardiaque, basse pression artérielle, haute pression artérielle, changements dans la fréquence cardiaque, fonctionnement réduit du cœur rougeur
- bouffées de chaleur difficultés respiratoires
- difficultés respiratoires, sèche nez, congestionné nez
- augmentation de la production de salive, brûlures d'estomac, engourdi autour de la bouche
- transpiration, éruption cutanée, froid frissons, fièvre
- contractions musculaires, gonflements articulaires, raideur musculaire, douleur y compris myalgie, douleur dans le cou
- douleur dans la poitrine
- difficile ou douloureux uriner, incontinence
- faiblesse, soif, oppressé sensation sur la poitrine
- changements dans sang- et résultats des tests hépatiques (augmentation de créatine phosphokinase, alanine aminotransférase et aspartate-aminotransférase dans le sang, diminution du nombre de plaquettes dans le sang, déficit en globules blancs que se dans

dans sensibilité accrue pour les infections (neutropénie), plus de créatinine dans le sang, moins de potassium dans le sang)

- hypersensibilité, gonflé visage, démangeaisons, éruption cutanée avec démangeaisons intenses et formation de bosses
- (urticaire), nez qui coule, saignement de nez, toux, tousser, ronflement
- douloureuses menstruations
- mains froides et pieds

Effets secondaires qui rarement, chez moins de 1 sur 1.000 personnes, se produisent

- odorat anormal, mouvement de la vue dès que la tête est mouvée, changement dans perception de profondeur, éblouissements, perte de vision
- dilater de pupilles, loucher regarder
- froid sueur, sensation dans la gorge, langue gonflée inflammation
- du pancréas problèmes
- avec avaler avaler
- lente ou diminué mouvement du corps
- problèmes avec écrire
- rétention d'eau dans le (bas)abdomen
- rétention d'eau dans les poumons
- convulsions/crises (convulsions)
- changements dans l'ECG (électrocardiogramme) qui correspondent à des perturbations du
- rythme cardiaque
- lésion musculaire
- sécrétion spontanée des seins, anormale anormal croissance mammaire, développement mammaire chez les hommes
- troubles du cycle menstruel (menstruations irrégulières)
- diminution de la fonction de vos reins (insuffisance rénale), diminution excrétion d'urine, ne pas
- pouvoir uriner (rétention urinaire)
- diminution du nombre de globules blancs
- comportement inapproprié, comportement suicidaire, pensées suicidaires
- allergique réactions, y compris possiblement: difficulté à respirer, yeux enflammés (kératite) et réactions sévères de la peau avec peau avec si caractéristiques: rougeâtre, non surélevé, en forme de disque ou circulaire taches sur le tronc, souvent avec vésicules au centre de celles-ci, desquamation, ulcères dans et autour de la bouche, gorge, nez ou sur les organes génitaux et yeux; cette grave éruption cutanée est potentiellement précédé par fièvre et symptômes grippaux (syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique).
- jaunisse (jaunissement de la peau et des yeux)
- parkinsonisme, que sont symptômes qui ressemblent à la maladie de Parkinson semblent, comme trembler, avoir des mouvements (bradykinésie/bradykinésie) en raides muscles

Effets secondaires qui très rarement, chez moins de 1 sur 10 000 personnes, surviennent

- insuffisance hépatique
- hépatite (inflammation du foie).

Inconnu non: fréquence peut avec les disponibles données pas être déterminée

- Dépendance être de Lyrica ('dépendance médicamenteuse').

Vous devez savoir que il chez u certaines effets secondaires, appelés symptômes de sevrage, peuvent survenir après l'arrêt d'un traitement court ou long terme avec Lyrica (voir « Si vous arrête de l'utilisation de ce médicament »).

Vous devez immédiatement consulter un médecin si vous remarquez que votre langue ou visage commence à se gonfler ou si votre peau rouge devient et il y a des cloques ou desquamation commence à se produire.

Certains effets secondaires comme somnolence peuvent se produire plus souvent, parce que les patients avec lésion de la moelle épinière d'autres médicaments peuvent utiliser pour par exemple douleur de spasticité à traiter. Ces médicaments ont les mêmes effets secondaires que prégabaline et la gravité de ces effets secondaires peut augmenté sont chez simultanément utilisation.

Le suivant effet secondaire a été signalé après ce médicament sur le marché a été introduit: difficulté à respirer, superficielle respiration.

Le signaler des effets secondaires

Avez-vous des effets secondaires, contactez alors votre médecin ou pharmacien. Cela s'applique également pour possibles effets secondaires qui ne dans cette notice sont indiqués. Vous pouvez les effets secondaires également directement signaler via le système de notification national comme mentionné annexe V. Par effets secondaires à signaler, vous pouvez nous aider à obtenir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament . ce médicament.

#### 5. Comment conservez -vous ce médicament?

Hors de la vue et portée des enfants garder.

N'utilisez ce médicament plus après n/a de ultime date de péremption. Celle-ci trouvez vous sur la boîte ou la bouteille après EXP. Là indique un mois et une année. Le dernier jour de ce mois est la date limite de péremption.

Pour ce médicament il n'y a pas de conditions spéciales.

. Ne jetez pas les médicaments dans l'évier ou les toilettes et jetez les pas dans la poubelle.

Demandez votre pharmacien ce que vous devez faire avec médicaments devez faire que vous ne plus utilisez. Si vous médicaments sur le bon moyen élimine sont ils de une manière responsable moyen détruits et n'entrent pas pas dans l'environnement atteignent.

#### 6. Contenu de la emballage et autres informations

Quelles substances contiennent dans ce médicament?

La substance active dans ce médicament est prégabaline . Chaque. Chaque dure capsule contient 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg ou 300 mg prégabaline.

Les autres substances dans ce médicament sont: lactose monohydraté, amidon de maïs, talc, gélatine, dioxyde de titane (E171), laurylsulfate de sodium, anhydre colloïdal dioxyde de silicium, encre noire (qui gomme-laque, oxyde de fer noir (E172), propylène glycol et hydroxyde de potassium contient) en eau.

De 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg en capsules de 300 mg contiennent également rouge oxyde de fer (E172).

### À quoi ressemble Lyrica et combien y a-t-il dans un emballage ??

<b>25 mg capsules</b>	Blancs durs capsules, avec impression « VTRS » sur la partie supérieure partie et « PGN 25 » sur la partie inférieure partie de la capsule
<b>50 mg capsules</b>	Blancs durs capsules, avec impression « VTRS » sur la partie supérieure partie et « PGN 50 » sur le inférieure partie de la capsule. La inférieure partie de la capsule est marquée avec une bande noire
<b>Capsules de 75 mg</b>	Blanc-orange dures capsules, avec impression « VTRS » sur le supérieur partie et « PGN 75 » sur le inférieur partie de la capsule
<b>100 mg capsules</b>	Orange gélules dures, avec impression « VTRS » sur le supérieur partie et « PGN 100 » sur le inférieur partie de la capsule
<b>150 mg capsules</b>	Blanches dures capsules, avec impression « VTRS » sur la partie supérieure partie et « PGN 150 » sur la partie inférieure partie de la capsule
<b>200 mg capsules</b>	Légèrement orange dures capsules, avec impression « VTRS » sur le supérieur partie et « PGN 200 » sur le inférieur partie de la capsule
<b>225 mg gélules</b>	Blanc-clair orange dure gélules, avec impression « VTRS » sur le supérieur partie et « PGN 225 » sur la partie inférieure de la capsule
<b>capsules de 300 mg</b>	Blanc-orange dures capsules, avec inscription « VTRS » sur la partie supérieure et « PGN 300 » sur la partie inférieure de la capsule Lyrica est

disponible disponible dans huit tailles d'emballage fabriqué de PVC avec feuille d'aluminium sur le dos: un emballage de 14 capsules avec 1 plaquette, un emballage de 21 capsules avec 1 plaquette thermoformée, un emballage de 56 capsules avec 4 plaquettes thermoformées, un emballage de 70 capsules avec 5 plaquettes thermoformées, un emballage de 84 capsules avec 4 plaquettes thermoformées, un emballage de 100 capsules avec 10 plaquettes thermoformées, un emballage de 112 capsules avec 8 plaquettes thermoformées et un blister unitaire perforé de 100 x 1 capsules. Lyrica est

également disponible dans un flacon HDPE de 200 capsules pour pour de 25 mg, 75 mg, 150 mg en 300 mg dosages.

Pas tous les tailles d'emballage sont sur le marché disponibles.

Titulaire de l' autorisation de mise sur le marché apporter et fabricant

Titulaire de la autorisation pour la mise sur le marché apporter:  
Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle sur le IJssel, Pays-Bas.

Fabricant:  
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Mooswaldallee 1, 79108 Freiburg im Breisgau,  
Allemagne.

ou

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom 2900, Hongrie.

ou

MEDIS INTERNATIONAL a.s., výrobní závod Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice,  
Tchéquie.

Prenez pour toutes les informations sur ce médicament contactez le représentant local du  
titulaire de la autorisation pour la mise sur le marché ::

/Belgique/Belgien Viatris  
Tél  
/Tel: +32 (0)2 658 61 00 Lituanie

Viatris  
UAB Tel: +370 52051288  
Bulgarie

Mylan  
EOOD SARL  
Тел.: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg  
Viatris  
Тél/Tel: +32 (0)2 658 61 00  
(Belgique/Belgien)

Česká republika  
Viatris CZ s.r.o.  
Tel: +420 222 004 400

Magyarország  
Viatris Healthcare Kft.  
Tel.: + 36 1 465 2100

Danmark

Viatrix ApS  
Tlf: +45 28 11 69 32

Malte  
V.J. Salomone Pharma Limited  
Tél : (+356) 21 220 174

Allemagne  
Viatrix Healthcare GmbH  
Tél : +49 (0)800 0700 800

Pays-Bas  
Mylan Healthcare BV  
Tél : +31 (0)20 426 3300

Estonie  
Viatrix OÜ  
Tél : +372 6363 052

Norvège  
Viatrix AS  
Tlf: +47 66 75 33 00

Grèce  
Viatrix Hellas Ltd  
Tél: +30 2100 100 002

Autriche  
Viatrix Austria GmbH  
Tél : +43 1 86390

Espagne  
Viatrix Pharmaceuticals, S.L.  
Tél : +34 900 102 712

Pologne  
Viatrix Healthcare Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 546 64 00

France  
Viatrix Santé  
Tél: +33 (0)4 37 25 75 00

Portugal  
Viatrix Healthcare, Lda.  
Tel: +351 21 412 72 00

Hrvatska  
Viatri Hrvatska d.o.o.  
Tel: + 385 1 23 50 599

Roumanie  
BGP Products SRL  
Tel: +40 372 579 000

Irlande  
Viatri Limited  
Tel: +353 1 8711600

Slovénie  
Viatri d.o.o.  
Tel: +386 1 236 31 80

Islande  
Icepharma hf.  
Téléphone: +354 540 8000

République slovaque république  
Viatri Slovaquie s.r.o.  
Tel: +421 2 32 199 100

Italie  
Viatri Pharma S.r.l.  
Tel: +39 02 612 46921  
Suomi/Finlande

Viatri Oy  
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος  
GPA Pharmaceuticals Ltd  
Τηλ: +357 22863100

Suède  
Viatri AB  
Tel: +46 (0)8 630 19 00

Lettonie  
Viatri SIA  
Tel: +371 676 055 80

Royaume-Uni (Irlande du Nord)  
Mylan IRE Healthcare Limited  
Tel: +353 18711600

Cette notice est pour la dernière approuvée en {MM/JJJJ}.

Plus d'informations sur ce médicament est disponible sur le site web de l' Européen  
Agence européenne des médicaments: <http://www.ema.europa.eu>.

Transtoyou