

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui de vartotojui

Lyrica 25 mg kietos kapsulės,
Lyrica 50 mg kietos kapsulės,
Lyrica 75 mg kietos kapsulės,
Lyrica 100 mg kietos kapsulės,
Lyrica 150 mg kietos kapsulės,
Lyrica 200 mg kietos kapsulės,
Lyrica 225 mg kietos kapsulės,
Lyrica 300 mg kietos kapsulės
pregabalinas

Perskaitykite atidžiai visą pakuotės lapelį prieš vartodami šį vaistą pradėsite naudoti nes yra nurodyta svarbi informacija joje jums. u.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Galbūt jums jo prireiks vėliau vėl reikės.
- Ar jums dar klausimai? Tada susisiekite su jūsų gydytoju arba vaistininku.
- Neduokite šio vaisto ne kitiems žmonėms, nes jis yra tik jums paskirtas. Jis. Tai gali kenksmingas būti kitiems, net jei turi jie tuos pačius simptomus kaip jūs. Jei
- jums pasireiškia vienas iš šalutinių poveikių kurie yra mirti skyrius 4 nurodyta? Ar gaunate jūs šalutinį poveikį kuris nėra šiame lapelyje nurodytas? Susisiekite su savo gydytoju arba vaistininku ..

Turinys iš šio pakuotės lapelio

1. Kas yra Lyrica ir kam šis vaistas naudojamas? Kada
2. negalite šio vaisto vartoti arba turite būti papildomai atsargūs jūs papildomai atsargiai su būti?
3. Kaip naudoti jūs šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti jūs šį vaistą?
6. Turinys iš pakuotės ir kita informacija

1. Kas yra Lyrica ir kam šis vaistas naudojamas? Lyrica

priklauso grupei vaistų grupės vaistų naudojamų vaistų naudojamas de gydymas nuo epilepsijos, neuropatinis skausmas ir generalizuotas nerimo sutrikimas (GAD) suaugusiems suaugusieji.

ir centrinis neuropatinis skausmas : Lyrica: Lyrica yra naudojamas prie de gydymo nuo ilgalaikio skausmo kurie sukelia yra dėl pažeidimų nervų sistemai. Įvairios ligos tokios kaip diabetas ar juostinė pūslelinė (zona) gali periferinė neuropatinis skausmas sukelti. Skausmo pojūčiai gali būti apibūdinami kaip karštas, degantis, pulsuojantis, šaudantis, duriantis, aštrus, spazmas, skausmingas, dilgčiojantis, nejautrus, miegantis. Periferinis ir centrinis neuropatinis skausmas gali taip pat lydymas eina su nuotaikos svyravimais, miego sutrikimais, nuovargiu ir gali paveikti turėti fizinį fizinį ir socialinį funkcionavimą ir socialinį bendras kokybę gyvenimo gyvenimas.

Epilepsija: Lyrica naudojamas gydyti esant tam tikroms gydymui esant tam tikroms formoms epilepsijos epilepsijos suaugusiems

suaugusiems (daliniai priepuoliai su arba be antrinių generalizuotų priepuolių). Jūsų gydytojas Jums Lyrica išrašys kaip pagalbą gydymui Jūsų epilepsijos epilepsija, jei jūsų dabartiniai vaistai jūsų būklės ne kontroliuoja po kontrole. Jūs turite Lyrica papildomai jūsų dabartinį gydymą vartoti. Lyrica yra ne skirtas tik vienas būti naudojamas, bet turi visada būti naudojamas kartu su kitais anti- epilepsiniais vaistais(vaistaivaistai naudojami prieš epilepsijos).

Generalizuotas nerimo sutrikimas: Lyrica yra naudojamas prieš gydymo generalizuoto nerimo sutrikimo (GAD). simptomai GAD yra ilgalaikiai ilgalaikis en pernelyg didelis nerimas en susirūpinimas kurį sunku kontroliuoti yra. GAD gali taip pat neramumas arba jausmas įtampos ar dirglumas sukelti, arba, arba gali užtikrinti kad jūs jaučiatės greitai pavargęs, jumssunku susikaupti, jūsnieko nebegalite prisiminti arba esate irzlus jautrus arba, gali raumenų įtampa arba miego sutrikimai sukelti. Tai neturi nieko bendro su stresu ir įtampa kasdieniame gyvenime.

2. Kada galite tai vaistas ne vartoti arba turite būti papildomai atsargūs su juo būti?

Kada negalite šio vaisto ne vartoti?

Esate alergiškas šiam viena iš medžiagų šiame šiame vaistiniame preparate. Šias medžiagas galite rasti rasti skyriuje 6. 6.

turite būti ypač atsargūs būti atsargūs su šiuo vaistu?

Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką prieš vartodami šį vaistą ..

kuriems pacientams kurie vartoja Lyrica pasireiškia šalutinis poveikis, yra simptomai pranešta kurie rodo apie alerginę reakciją .. simptomai apima patinimą veido veido, lūpų, liežuvio, liežuvis en gerklė bet taip pat išplitusi odos bėrimas. Jūs turite nedelsiant susisiekti su savo gydytoju jei viena iš šių reakcijų pasireiškia jums u pasireiškia.

In ryšys su vartojimu nuo pregabalino yra pranešta apie nuo rimtas odines nepageidaujamas reakcijas (nepageidaujamos reakcijos ant odos), kaip tas sindromas Stevenso-Džonsono ir toksinė epiderminė nekrolizė. Nutraukite vartojimą iš pregabalino ir kreipkitės nedelsiant medicininės pagalbos į jei jūs vienas iš skyriaus 4 aprašytų simptomų susijusių su šiomis rimtomis odos reakcijomis pastebite ..

- Lyrica pasireiškė galvos svaigimas ir apsvaigimas ir mieguistumas atsiradęs, dėl ko tai atsiradimas nuo nelaimingų atsitikimų (kritimai) tarp vyresnio amžiaus pacientų gali padidėti. Todėl būkite atsargūs kol kol u pripratęs esate prie poveikio kurį šis vaistas galėtų turėti ..
- gali neryškus matymas arba praradimas regėjimo gebėjimo matyti iš kiti pokyčiai iš regėjimo lauko sukelti, kurie dauguma laikinai yra . Jūsturite tai nedelsiant pranešti savo gydytojui pasakyti pasakoti jei jūs pokyčius jūsų jūsų regėjimo pastebite.
- Kai tam tikriems cukrinio diabeto pacientams kurie svorį padidėja gydymo metu su gydymu pregabalinu gali būti vienas pritaikymas iš jų cukrinio diabeto vaistų būtinas būti.
- Tam tikri šalutiniai poveikiai tokie kaip mieguistumas gali dažniau pasireikšti, nes pacientai su nugaros smegenų pažeidimu kiti vaistai gali naudoti kad pavyzdžiui skausmą ar spastiškumą gydyti .. vaistai turi tas pačias šalutines reakcijas kaip pregabalinas ir ir de Sunkumas šalutinių šio poveikių gali padidėti būti vartojant kartu ..
- kai kurie kai kurie pacientams vartojimo metu vartojimo iš Lyrica pranešimai buvo apie širdies nepakankamumą;

dažniausiai buvo tai vyresni pacientai su širdies- ir kraujagyslių ligomis. Prieš jūs pradėdote vartoti vaistą iš šio vaisto turite jūs jūsų gydytojui pasakyti jei jūs praeityje turėjote problemų su širdimi dėl kokios širdies ligos.

- Yra yra prie kai kuriems pacientams vartojimo metu vartojimas Lyrica pranešimai buvo apie inkstų nepakankamumą. Jei jūs vartojimo metu vartojimas Lyrica pastebite kad jūs mažiau plast, turite pasakyti savo gydytojui kadangi tai gali pagerėti nutraukus vaisto vartojimą vaistas Kai kurie pacientai.
- Kai kurie pacientai mirti gydyti buvo su anti-epileptikais tokiais kaip Lyrica, turėjo minčių apie savęs žalimą ar savižudybę ar turėjo savižudišką elgesį parodė . Jei jūs bet kuriuolaiku turite minčių tokio mintys turi arba toks elgesys rodo, nedelsdami susisieki su jūsų gydytoju.
- Kai Lyrica vartojamas su kitais vaistais kurie vidurių užkietėjimą gali sukelti (kaip kai kurie tipai skausmą malšinančių vaistų), yra galima kad virškinimo trakto problemos atsiranda (pvz. vidurių užkietėjimas, užblokuota arba paralyžuota žarna). Pasakykite tai savo gydytojui jei jūs vidurių užkietėjimą turite, ypač jei jūs jaučiate šiam problemai esate. Pasakykite
- Pasakyk tai jūsų gydytojas prieš jūs pradėdote vartoti vartojimą šio šio vaisto jei jūs kada nors piktnaudžiavote turėjote padarėte ar priklausomybę buvote buvote nuo alkoholio, vaistai ant recepto arba nelegalūs narkotikai; tai gali reikšti kad jūs didesnė rizika patiriate tapti priklausomas būti nuo tapti iš Lyrica.
- Yra atvejų priepuolių iš traukuliai/spazmai (konvulsijos) pranešta vartojant vaistą Lyrica arba trumpai po vaisto tai nutraukti su Lyrica. Nedelsdami susisieki su jūsų gydytoju jei pasireiškia jums u priepuolis atsiranda ..
- atvejų yra sumažėjusios smegenų funkcijos sumažėjęs encefalopatija)encefalopatija) pranešta pas tam tikrą skaičių pacientų kurie vartojo Lyrica .. Šie pacientai turėjo taip pat kitų sutrikimų. Pasakykite tai savo gydytojui jei jūs praeityje kentėjote nuo turėjote nuo sunkios ligos, tokios kaip pavyzdžiui kepenų ar inkstų ligos.
- Buvo yra pranešimų buvo apie kvėpavimo sunkumai. Jei jaučiate turite dėl
- nervų sistemos sutrikimų, kvėpavimo sistemos sutrikimų, inkstų funkcijos sutrikimą arba jei jūs vyresnis esate nei 65 metų, gali jūsų gydytojas jums vaistą kitas dozavimo schema išrašyti. Susisieki su jūsų gydytoju jei jūs sunkumai su kvėpavimu ar paviršutiniškas kvėpavimas turite ..

Kai kurie

žmonės žmonės gali nuo Lyrica priklausomi tapti (tam poreikis vartoti vaistą toliau likti vartoti). Jie gali nutraukimo simptomus patirti kai jie nustoja vartoti vartojimas Lyrica (žr. skyrių 3, „Kaip vartoti jūs šį vaistą?“ ir „Jei jūs nutraukiate šio vartojimą šio šio vaisto“). Jei jūs jaučiatės er rūpesčiai dėl kelia kad jūs nuo Lyrica priklausomas galite tapti, svarbu svarbu kad jūs jūsų gydytoją pasikonsultuotumėte.

Jei jūs vienas iš toliau skundai pastebite per tas vartojant Lyrica, gali tai būti ženklas kad jūs priklausomas esate tapęs ::

- turite turi vaistas vaistas ilgiau vartoti nei rekomenduojama jūsų jūsų gydytojas
- Jūs jaučiate vaistą jausmas kad jūs daugiau turite vartoti nei rekomenduojama dozė
- Jūs naudokite vaistą vaistas dėl kitų priežasčių nei nurodyta
- Jūs turite pakartotinius, nesėkmingus bandymus padarėte dėl nutraukti vartojimą su arba kontrolė gauti kontrolę dėl vartojimo vaisto vaisto

- Kai jūs nustojate vartoti vaistą jaučiatės ne gerai, jūs ir jaučiatės geriau kai tik jūs vaistą vėl vartojate. Jei jūs

vieną iš šių simptomų pastebite, susisieki su savo gydytoju, kad gydytojas dėl to gerbiamas gydymo eiga už jus aptarti, tarp jų kada tai vienas tinkamas momentas sustoti ir kaip jūs tai ant vienas ant vienas saugus būdas turi daryti.

Vaikai ir jaunuoliai iki 18 metų

Saugumas ir veiksmingumas vaikams ir jaunuoliams (iki amžiaus (iki amžius nuo 18 metų) nėra nustatyta

. Lyrica negalima naudoti šioje amžiaus grupėje. Vartojate jį.

kitus vaistus dar kitas vaistai?

Naudojate jį be Lyrica dar kitus vaistus, ar jį neseniai padarėte arba yra galimybė kad galimybė kad jį artimoje ateityje kitus vaistus pradėsite vartoti. Pasakykite tai savo gydytojui ar vaistininkui. Taitaikoma taip pat ir vaistams kuriuos kur u nėra recepto reikia neturi ..

ir tam tikri kiti vaistai gali vienas kitą paveikti (pvz. sąveika). Vartojant vartojimas su su tam tikri kiti vaistai kurie turi raminantį poveikį turi (įskaitant opioidus), gali

Lyrica šiuos poveikius sustiprinti, kas gali sukelti iki kvėpavimo sustojimas, koma ir mirtis.

Galvos svaigimas, mieguistumas ir sumažėjusi koncentracija gali sustiprėti jei Lyrica kartu su vaistais yra skiriamas kurie:

- oxycodon (vartojamas kaip skausmą malšinantis vaistas)
- lorazepamas (vartojamas nuo nerimo gydymo nerimo) ar
- alkoholis turi.

Lyrica gali vienu metu su oralinis kontraceptikai naudojami naudoti.

Į ką reikia jums atkreipti dėmesį su maistu, gėrimais ir alkoholiu?

Lyrica kapsulės gali su arba be maisto būti vartojamos.

Rekomenduojama ne vartoti alkoholio vartojant Lyrica. Nėštumas ir žindymas Lyrica negalima vartoti

nėštumo metu ir

žindymo laikotarpiu. Nėštumo metu Lyrica iš nėštumo metu de žindymo būti naudojamas, nebent jūsų gydytojas nusprendžia kitaip. Vartojimas naudojimas pregabalino nėštumo metu per pirmuosius pirmas 3 mėnesiai iš nėštumo gali gimimo defektus sukelti pas negimusį vaiką kuriam reikalingas medicininis gydymas būtinas yra. Iš tyrimo kuris buvo kuris duomenys buvo įvertinti iš moterų iš Šiaurės-Europos šalių kurios nėštumo metu pirmuosius 3 mėnesius nėštumo nėštumo pregabalino buvo vartojusios, blyškus kad 6 iš 100 kūdikių tokias gimimo defektus parodė. Pas moteris kurios nėštumo metu tyrimo nebuvo su pregabalino buvo gydomos „ buvo kad 4 iš 100 kūdikių. Deformacijos veido veido (skeltos lūpos, žandikaulis ir/arba gomurys), akys akys, nervų sistema (įskaitant de smegenis), inkstus ir lytinius organus buvo pranešta.

Moterys kurios gali pastoti gali tapti, turi naudoti veiksmingą kontracepciją. Ar esate nėščia, manote jį nėščia būti, noritenėščia tapti ar žindote jį krūtimi? Susisieki su savo gydytoju arba vaistininku prieš u šis vaistas naudojamas.

Vairavimo gebėjimas ir mašinų naudojimas naudojimas

Lyrice naudojimas gali sukelti galvos svaigimą, mieguistumą ir apsvaigimą ir sumažėjusi koncentracija. Jūs neturėtumėte vairuoti transporto priemonių, valdytinašinas arba kitą rizikingą veiklą vykdyti, kol aišku ar šis vaistas jūsų paveikia gebėjimas atlikti minėtas užduotis iš vykdyti, ar nene paveikia ..

turi laktozės monohidratą Pasitarkite

su gydytoju prieš jūs šį vaistą vartojate, jei jūsų gydytojas jums pasakė yra kad jūs tam tikrus cukrus negalite toleruoti ..

turi natrio Šis

Tai vaistas turi mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg) per kietą kapsulę, tai reiškia kad jis iš esmės 'be natrio' yra. Kaip

3. naudoti jūs šį vaistą ??

Naudokite šį vaistą visada tiksliai kaip jūsų gydytojas arba vaistininkas jums tai pasakė .. dėl teisingo naudojimo ? Kreipkitės į? Tada susisieki su jūsų gydytojas arba vaistininkas. Vartokite ne daugiau vaisto nei jums buvo paskirta paskirtas.

gydytojas nustatys kokią dozę jums tinka skirti u tinkamas yra.

Lyrice yra tik skirtas oraliniam vartojimui ..

ir centrinis neuropatinis skausmas ,epilepsija arba generalizuotas nerimo sutrikimas nerimo sutrikimas:

- Vartokite kiekį kapsulių kurį jūsų gydytojas paskyrė paskirtas.
- yra pritaikyta jums ir jūsų ligos būklę ir jūsų ligos vaizdą bus į apskritai gulėti tarp 150 ir 600 mg per dieną.
- Jūsų gydytojas bus jums pasakys kad jūs arba du kartus arba tris kartus per dieną Lyrice turite vartoti. Dėl du kartus per dieną vartokite Lyrice vieną kartą ryte ir vieną kartą vakare 's vakare į, kiekvieną dieną apie tą patį laiką .Tris kartus per dieną vartokite Lyrice vieną kartą ryte ,vieną kartą per pietus viduriavimas en vieną kartą 's vakare į, kiekvieną dieną apie tą pačią valandą ..

atrodo kad turi veikimas Lyrice per Lyrice silpnas stiprus arba per silpnas yra, lengvas nei jūsų gydytojas arba vaistininkas viduje.

Jei jūs esate vyresnio paciento esate (vyresnis nei 65 metų), turi jūs Lyrice į įprastą dozę į vartoti, išskyrus jei jūs problemų su jūsų inkstais turi.

Gali būti galimas kad jūsų gydytojas vieną kitą dozavimo schema ir/ar kitą dozę paskiria jei jūs inkstų problemų turite.

Nurykite kapsulę visą su vandeniu. Vartokite Lyrice

kol kol jūsų gydytojas jums pasakys kad jūs galite nutraukti.

Ar jūs per daug šio vaisto vartojote? Susisiekite su jūsų gydytoju arba eikite ga menas į artimiausią ligoninę Pirmoji Pagalbos Tarnyba ligoninės skyrių. Pasiimkite savo dėžutę arba buteliuką su Lyrica kapsulėmis. Jūs galite jaustis mieguistas, sutrikęs, susirūpinęs ar neramus jausti po to jūs per daug Lyrica turite išgėrėte. Epilepsijos priepuoliai ir sąmonės netekimas (koma) buvo taip pat pranešta.

Ar jūs pamiršote šį vaistą naudoti? Svarbu savo Lyrica kapsules kiekvieną dieną reguliariai tuo pačiu laiku vartoti . tas pats laikas į te vartoti. Jei pamiršote pavartoti dozę dozė laiku , padarykietai kuo greičiau galima , kai prisimenate , išskyrus jei tai kaip tai laikas yra kitai jūsų kitai dozei. Tokiu atveju atveju vartokite jūs paprastai kitą dozę dozę . Nevartokite ne dvigubos dozės kad vieną pamirštą dozę į kompensuoti ..

nutraukiate vartojimą šio vaisto Nustokite ne staiga vartoti Lyrica. Jei norite staiga su vartoti iš Lyrica. Jei norite nutraukti su vartojimą Lyrica, aptarkite tai pirmiausia su savo gydytoju. Jis arba ji jums pasakys kaip tai padaryti . Jei turi daryti. Jei jūsų gydymas yra nutrauktas, turi tai palaipsniui vykti per vieną laikotarpį iš mažiausiai 1 savaitę. Jūs turite žinoti kad yra prie u tam tikri šalutiniai poveikiai, vadinamieji nutraukimo simptomai, gali pasireikšti po gydymo nutraukimo su trumpalaikiu - ar bailgalaikiu gydymu su Lyrica. Šie šalutiniai poveikiai šalutinis poveikis egzistuoti iš: nemiga, galvos skausmas, pykinimas, jaustis nerimastingai , viduriavimas , gripo simptomai , traukuliai //traukuliai (konvulsijos), nervingumas, depresija, mintys apie savęs žalojimą ar savižudybę, skausmas, prakaitavimas ir galvos svaigimas. Šie šalutiniai poveikiai gali dažniau pasireikšti arba būti sunkesni tapti jei vartojate Lyrica ilgą laiką laikotarpiui laiką naudojote . Jei jūs nutraukimo simptomus patiriate ,, turite susisiekti su savo gydytoju. Ar

turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą ? Tada susisiekite? Tada susisiekite su savo gydytoju ar vaistininkas.

4. Galimos šalutinės reakcijos

Kaip ir kiekvienas vaistas gali taip pat šis vaistas šalutines reakcijas turėti, nors ne visi patiria jas susiduria su jomis.

Šalutinis poveikis kuris labai dažnai, daugiau nei 1 iš 10 žmonių , pasireiškia galvos svaigimas

- galvos svaigimas mieguistumas mieguistumas galvos skausmas Šalutinis poveikis

kuris dažnai ,, prie mažiau nei 1 iš 10 asmenų, pasireiškia

- padidėjęs apetitas
- jausmas ekstazės džiaugsmo, sumišimas, dezorientacija (dezorientacija), sumažėjęs seksualinis
- interesus, dirglumas
- dėmesio sutrikimai, nevikrumas, atminties sutrikimas, atminties praradimas, nekontroliuojamas drebulys arba virpesiai, kalbos sutrikimai, dilgčiojimo pojūtis, nejautrumas, dusulys/ mieguistumas (sedacija), mieguistumas (letargija), nemiga, nuovargis, jūs jaučiatės nejprastai neryškus

- matymas matyti, dvejopas matymas
- svaigulys, problemų su pusiausvyra, kritimai
- sausa burna, vidurių užkietėjimas, vėmimas, vidurių pūtimas, viduriavimas, pykinimas, išsipūtęs pilvas
- erekcijos problemos
- patinimas kūno kūno įskaitant galūnes galūnes
- jausmas apsvaigęs jausmas ,nenormalus būdas būdas nuo vaikščioti
- svorio padidėjimas
- raumenų mėšlungis, skausmas sąnariuose sąnariai, nugaros skausmas, skausmas galūnėse galūnės (rankos ir/arba kojos)
- skausmingas gerklė

Šalutinis poveikis kurie kartais, pasitaiko mažiau nei 1 iš 100 asmenų, pasireiškia

- apetito praradimas ,svorio netekimas svorio netekimasgliukozės kiekio kraujyje sumažėjimas cukraus kiekio kraujyje mažinimasgliukozės kiekio kraujyje padidėjimas padidėjęs cukraus kiekis kraujyje
- pasikeitęs sąmoningumas, neramumas, depresija, agitacija, nuotaikos pokyčiai, sunku rasti žodžius galėti ateiti, haliucinacijos, nenormalūs sapnai, panikos priepuoliai, abejingumas, agresija, perdėtas pakilumas, protinis regresas, problemų su mąstymu, padidėjęs seksualinis interesas, problemų su seksualine funkcija įskaitant sunkumą pasiekti orgazmą, uždelstą ejakuliaciją (ejakuliacija) • (ejakuliacija)
- pokyčiai regėjime regėjime, neįprasti akių judesiai, pokyčiai regėjime įskaitant tunelinį matymą tunelinis matymas susiaurėjęsregėjimo laukas),šviesos blyksniai šviesos blyksniaispazminiai judesiai judesiai, sumažėjęs refleksai, hiperaktyvumas, galvos svaigimas būti kai atsistojama, jautri oda, skonio praradimas, deginantį pojūtis, drebulys prie judėti, sumažėjęs sąmoningumas, praradimas sąmonės ,nualpimas nualpimaspadidėjęs jautrumas garsui , jaučiasine gerai ne skanu jausti
- sausos akys, patinusios akys, akių skausmas, silpnos akys, ašarojančios akys, sudirgintos akys
- širdies ritmo sutrikimai, pagreitėjęs širdies ritmas, žemas kraujospūdis, aukštas kraujospūdis, pokyčiai širdies ritme, sumažėjusi širdies funkcija
- paraudimas, karščio bangos
- kvėpavimo sunkumai, sausas nosis, užsikimšusi nosis
- padidėjusi seilių gamyba, rėmuo ,tirpimas aplink burną prakaitavimas ,
- odos bėrimas, šaltis, šaltis šaltkrėtis, karščiavimas
- raumenų trūkčiojimai, sąnarių patinimas, raumenų standumas, skausmas įskaitant raumenų skausmą, skausmas kakle
- skausmas krūtinėje sunku
- arba iš skausmingas šlapinimasis, šlapimo nelaikymas
- silpnumas, troškulys, spaudimas pojūtis ant krūtinės
- pokyčiai kraujo tyrimų- ir kepenų tyrimų rezultatai (padidėjimas iš kreatinkinazės, alaninaminotransferazės ir aspartato-aminotransferazės kraujyje ,sumažėjimas trombocitų skaičiaus kraujyje trombocitai trūkumas baltųjųkraujo kūnelių prie baltos kraujo kūneliai kad savaime pasireiškia į padidėjęs jautrumas infekcijoms (neutropenija),daugiau kreatinino kraujyje , mažiau kalio kraujyje)padidėjęs jautrumas ,patinimas
- padidėjęs jautrumas, patinęs veidas, niežulys, odos bėrimas su stipriu niežuliu ir susidarymu iš

- gumbelių (dilgėlinė), sloga, kraujavimas iš nosies, kosulys, knarkimas
- skausmingos menstruacijos
- šaltos rankos ir kojos

Šalutinis poveikis kuris retai, mažiau nei 1 iš 1.000 asmenų ,pasireiškia nenormalus

- uoslės pojūtis uoslė, judėjimas iš regėjimo kai tik galva yra judinama ,pokyti suvokime
- gylio , spindesiai ,regėjimo praradimas, praradimas nuo regėjimas
- išplėsti iš vyzdžius, žvairas žiūrėjimas
- šaltas prakaitas, dusulys gerklėje, patinęs liežuvis uždegimas
- uždegimas kasos problemų
- su rijimu nuryti
- lėtas arba sumažėjęs judėjimas kūno kūno
- problemų su rašymu
- skysčių kaupimasis (apatinėje) pilvo
- skysčių kaupimasis į plaučiuose
- traukuliai/konvulsijos (traukuliai)
- pokyčiai EKG (elektrokardiograma) kurie atitinka su sutrikimais širdies
- ritmo
- raumenų pažeidimas
- spontaniškas sekrecija iš krūtų ,nenormalus nenormalus krūtų augimas, krūtų formavimasis vyrams sutrikęs
- menstruacijų ciklas menstruacijų modelis nereguliarios menstruacijos menstruacijų sumažėjusi
- inkstų funkcija jūsų inkstų (inkstų nepakankamumas), sumažėjusi sumažėjęs išskyrimas iš šlapimo, negalėjimas
- šlapintis (šlapimo susilaikymas šlapimo susilaikymas sumažėjimas
- baltųjų kraujo ląstelių skaičiaus netinkamas
- elgesys ,savižudiškas elgesys savižudiškos mintys alerginė
- alerginė reakcijos, tarp jų galimai: sunkumas kvėpuoti , uždegusios akys(keratitas) ir stiprios reakcijos odos su reakcijos iš oda su kaip savybės: raudonai, nepakilę, diskinės arba apskritos dėmės ant liemens, dažnai su pūslelėmis centre jos, odos pleiskanojimas, opos in ir aplink de burną, gerklę, nosį arba ant de lytinių organų ir akių; ši sunkus odos bėrimas gali būti galimas prieš per karščiavimas ir gripo simptomai (Stevenso-Johnsono sindromas, toksinė epiderminė nekrolizė).gelta
- (geltonumageltonos spalvos oda ir akys akys)
- parkinsonizmas, tai yra simptomai kurie panašūs į ligą Parkinsono primena, tokie kaip drebulys, sunkumai turėti su judėjimu (bradikinezija) ir standūs raumenys

Šalutinis poveikis kuris labai retai, mažiau nei 1 iš 10 000 asmenų ,pasitaiko kepenų nepakankamumas

- hepatitas (
- kepenų uždegimas).Nežinoma

žinoma žinomas: dažnis gali su turimais duomenimis ne būti nustatytas

- Priklausomai būti nuo Lyrica ('vaistų priklausomybė').

Jūs turite žinoti kad yra prie u tam tikros šalutiniai poveikiai, vadinamieji nutraukimo simptomai, gali pasireikšti po nutraukimo gydymo su trumpalaikiu ar bailgalaikiu gydymu su Lyrica (žr. „Jei jūs nustokite vartoti šį vaistą „ šis vaistas“.

Jūs turite nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos jei pastebite, kad jūsų liežuvis ar liežuvio of veidas pradeda ant būti tinti arba jei jūsų oda raudona tampa ir atsiranda pūslių arba lupimasis pradeda ant būti vykti.

Tam tikri šalutiniai poveikiai tokie kaip mieguistumas gali dažniau pasireikšti, nes pacientai su nugaros smegenų pažeidimu kitus vaistus gali vartoti pavyzdžiui skausmui malšinti iš spastiškumo gydyti gydyti. Šie vaistai turi tokį patį šalutinį poveikį kaip pregabalinas ir šio sunkumas šio šio šalutinio poveikio gali padidėti yra prie vienu metu naudojimas.

Šis sekantis šalutinis poveikis buvo praneštas po to, kai šis vaistas į rinką buvo pateiktas: sunkumas su kvėpuoti, paviršutiniškas kvėpavimas.

Pranešti apie šalutinius poveikius

Jei jums pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taikoma taip pat ir galimos šalutiniai poveikiai kurie ne šiame šiame pakuotės lapelyje nurodyti. Jūs galite šalutinius poveikius taip pat tiesiogiai pranešti per nacionalinę pranešimų sistemą kaip nurodyta šiame priedas V. Pranešdami šalutinį poveikį apie pranešti, galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio saugumą vaisto šio vaisto vaistas.

5. Kaip laikote jūs šį vaistą?

Laikyti nepasiekiamoje ir neprieinamoje vaikams vietoje ..

šio vaisto po galiojimo pabaigos datos de galiojimo data. Ją rasite ant dėžutės arba butelio po EXP. Ten nurodytas mėnuo ir metai . Paskutinė diena. paskutinis diena iš mėnesio yra galiojimo data.

Šiam vaistui nėra jokių specialių laikymo sąlygų laikymo sąlygos. vaistų per kriauklę arba kanalizaciją arba tualetą ir išmeskite juos ne į šiukšliadėžę. Klauskite savo vaistininko ką daryti su vaistais turite daryti kurie ne be naudojami. Jei vaistai ant teisingas būdas šalina yra jie atsakingas būdas sunaikinami ir nepatenka jie ne į aplinką patenka ..

6. Iš iš pakuotė ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra pregabalinas pregabalinasKiekviena kieta kapsulė sudėtyje yra 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg arba 300 mg pregabalino.

Kitos medžiagos šiame preparate yra : laktozės monohidratas: kukurūzų krakmolos, talkas, želatina, titano dioksidas, talkas, želatina, titano dioksidas (E171), natrio laurilsulfatas, bevandenis

koloidinis silicio dioksidas, juodas rašalas (kuris šelakas, geležies oksidas juodas (E172), propilenglikolis ir kalio hidroksidas turi) en vanduo.

75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg en 300 mg kapsulės turi taip pat raudoną geležies oksidą (E172).

Kaip atrodo Lyrica ir kiek yra vienoje pakuotėje ??

25 mg kapsulės	Baltos kietos kapsulės, su užrašu „VTRS“ ant viršutinės dalis ir „PGN 25“ ant apatinės dalis kapsulės
50 mg kapsulės	Baltos kietos kapsulės, su užrašu „VTRS“ ant viršutinės dalis ir „PGN 50“ ant apatinės dalis kapsulės. Apatinė dalis kapsulės yra pažymėta su juoda juosta
oranžinė	kietakapsulės, su kietas kapsulės, su užrašas „VTRS“ ant viršutinės dalis ir „PGN 75“ ant apatinės dalis kapsulės
100 mg kapsulės	Oranžinės kietos kapsulės, su užrašas „VTRS“ ant viršutinės dalis ir „PGN 100“ ant apatinės dalis kapsulės
150 mg kapsulės	Balta kieta kapsulės, su užrašu „VTRS“ ant viršutinės dalis ir „PGN 150“ ant apatinės dalis kapsulės
200 mg kapsulės	Šviesiai oranžinė kieta kapsulės, su užrašas „VTRS“ ant viršutinės dalis ir „PGN 200“ ant apatinės dalis kapsulės
225 mg kapsulės	Balta-šviesiai oranžinė kieta kapsulės, su užrašas „VTRS“ ant viršutinės dalis ir „PGN 225“ ant apatinės dalis kapsulės
300 mg kapsulės	Balta-oranžinė kietos kapsulės, su užrašu „VTRS“ ant viršutinės dalis ir „PGN 300“ ant apatinės dalis kapsulės

Lyrica yra prieinama in aštuoni pakuotės dydžiai pagamintas iš PVC su aliuminio folija prie nugaros pusės :: pakuotė iš 14 kapsulių su 1 lizdine plokštele lizdinė plokštelėviena pakuotė iš 21 kapsulės su 21 kapsulių su 1 lizdinė plokštelė, pakuotė pakuotė iš 56 kapsulių su 4 lizdinės plokštelės, pakuotė pakuotė iš 70 kapsulių su 5 lizdinės plokštelės, pakuotė pakuotė iš 84 kapsulių su 4 lizdinės plokštelės, pakuotė pakuotė iš 100 kapsulių su 10 lizdinių plokštelių, viena pakuotė iš 112 kapsulių su 8 lizdinių plokštelių ir viena perforuota vienetų lizdinė pakuotė iš 100 x 1 kapsulių.

Lyrica taip pat yra prieinama in vienoje HDPE buteliuke su 200 kapsulių skirta 25 mg, 75 mg, 150 mg en 300 mg stiprumai.

Ne visi paminėti pakuočių dydžiai yra prekyboje pateikiami ..

leidimo leidimo prekybai dėl prekyboje pateikimo pateikimas ir gamintojas

Turėtojas iš leidimo dėl pateikimo į rinką pateikimas:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle prie den IJssel, Nyderlandai.

Gamintojas:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Mooswaldallee 1, 79108 Freiburg im Breisgau, Vokietija.

arba

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom 2900, Vengrija.

arba

MEDIS INTERNATIONAL a.s., výrobní gomyklą Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Āekija.

Kreipkitės dėl visos informacijos apie šį vaistą susisiekiite su vietinį atstovą turėtojo laikiklis iš leidimo dėl pateikimo į rinką ::

/Belgique/BelgienViatriis

Tel

/Tel: +32 (0)2 658 61 00Lietuva

Viatriis

UAB Tel: +370 52051288

Bulgarija

Mylan

EOD UAB

Tel.: +359 2 44 55 400

Liuksemburgas

Viatriis

Tel/Tel: +32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Āekijos respublika

Viatriis CZ s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Vengrija

Viatriis Healthcare Kft.

Tel.: + 36 1 465 2100

Danija

Viatriis ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Limited

Tel: (+356) 21 220 174

Vokietija

Viatriis Healthcare GmbH

Tel: +49 (0)800 0700 800

Nyderlandai
Mylan Healthcare BV
Tel: +31 (0)20 426 3300

Estija
Viatriis OÜ
Tel: +372 6363 052

Norvegija
Viatriis AS
Tlf: +47 66 75 33 00

Ελλάδα
Viatriis Hellas Ltd
Τηλ: +30 2100 100 002

Österreich
Viatriis Austria GmbH
Tel: +43 1 86390

España
Viatriis Pharmaceuticals, S.L.
Tel: +34 900 102 712

Polska
Viatriis Healthcare Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 546 64 00

Prancūzija
Viatriis Sveikata
Tel: +33 (0)4 37 25 75 00

Portugalija
Viatriis Sveikatos priežiūra, Lda.
Tel: +351 21 412 72 00

Kroatija
Viatriis Kroatija d.o.o.
Tel: + 385 1 23 50 599

Rumunija
BGP Products SRL
Tel: +40 372 579 000

Airija
Viatriis Limited
Tel: +353 1 8711600

Slovėnija
Viatrix d.o.o.
Tel: +386 1 236 31 80

Islandija
Icepharma hf.
Sími: +354 540 8000

Slovakijos respublika
Viatrix Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 32 199 100

Italija
Viatrix Pharma S.r.l.
Tel: +39 02 612 46921
Suomi/Finland

Viatrix Oy
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος
GPA Pharmaceuticals Ltd
Τηλ: +357 22863100

Sverige
Viatrix AB
Tel: +46 (0)8 630 19 00

Latvija
Viatrix SIA
Tel: +371 676 055 80

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)
Mylan IRE Healthcare Limited
Tel: +353 18711600

Šis pakuotės lapelis yra paskutinį kartą patvirtintas {MM/JJJJ}. Daugiau informacijos

apie šį vaistą yra prieinama interneto svetainėje prieinamas svetainėje Europos
Vaistų agentūra: <http://www.ema.europa.eu>.