

Pakningsvedlegg: informasjon for brukeren brukeren

Lyrice 25 mg harde kapsler,
Lyrice 50 mg harde kapsler,
Lyrice 75 mg harde kapsler,
Lyrice 100 mg harde kapsler,
Lyrice 150 mg harde kapsler,
Lyrice 200 mg harde kapsler,
Lyrice 225 mg harde kapsler,
Lyrice 300 mg harde kapsler
pregabalin

Les godt hele pakningsvedlegget før du dette legemidlet skal bruke for det står viktig informasjon i for deg.

- Oppbevar denne pakningsvedlegget. Kanskje trenger du det senere igjen ..
- du du enda spørsmål? Ta kontakt med din lege eller apotek.
- Gi denne medisinen ikke videre til andre, fordi det er kun til deg foreskrevet. Det kan skadelig være for andre, selv om har de samme symptomer som deg.
- Får du problemer med en av de bivirkningene som er nevnt i rubrikk 4 står? Eller får du en bivirkning som ikke i denne pakningsvedlegget står? Ta da kontakt med din lege eller apotek.

Innhold av denne pakningsvedlegg

1. Hva er Lyrice og hva brukes dette legemidlet til?
2. Når bør du dette legemidlet ikke bruke eller må du være ekstra forsiktig med være?
3. Hvordan bruker du dette legemidlet?
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?
6. Innhold av emballasje og annen informasjon

1. Hva er Lyrice og hva brukes dette legemidlet til?

Lyrice tilhører gruppen av legemidler brukt for for de behandling av epilepsi, nevropatisk smerte og generalisert angstlidelse (GAD) hos voksne.

Perifer og sentral nevropatisk smerte: Lyrice blir brukt ved de behandling av langvarige smerter som forårsakes blir av skader av nervene. Ulike sykdommer som diabetes eller helvetesild (helvetesild) kunne perifere nevropatiske smerte forårsake. Smerteopplevelser kan bli beskrevet som varm, brennende, bankende, skytende, stikkende, skarp, krampe, smertefull, prikkende, nummen, sovende. Perifer og sentral nevropatisk smerte kan også ledsaget gå med humørsvingninger, søvnforstyrrelser, utmattelse og kan påvirke ha på fysiske og sosiale fungering og den totale kvalitet av liv.

Epilepsi: Lyrice blir brukt ved behandlingen av visse former av epilepsi hos voksne voksne (partielle anfall med eller uten sekundære generaliserte anfall). Din lege vil foreskrive Lyrice til deg for støtte av behandlingen av din epilepsi, hvis dine nåværende legemidler din tilstand ikke under kontroll . Dumå Lyrice i tillegg til din nåværende behandling ta . Lyrice er. Lyrice

er ikke beregnet for alene å bli brukt, men må alltid bli brukt i kombinasjon med andre anti-epileptika (legemidler brukt ved epilepsi).

Generalisert angstlidelse: Lyrica blir brukt ved den behandlingen av generalisert angstlidelse (GAD). De symptomene av GAD er langvarige og overdreven angst og bekymring som vanskelig kontrollerbar er. GAD kan også rastløshet eller en følelse av spenning eller irritasjon forårsake, eller kan føre til at du føler deg raskt sliten, du har vanskelig for å konsentrere deg, du ikke kan huske eller bøyde, eller kan muskelspenning eller søvnforstyrrelser forårsake. Dette har ingenting å gjøre med stresset og spenningen i dagliglivet ..

2. kan du dette middel ikke bruke eller må du være ekstra forsiktig med være?

Når kan du dette middel ikke bruke?

Du er allergisk mot en av stoffene i dette legemidlet. Disse stoffene kan du finne i avsnitt 6.

Når må du være ekstra forsiktig med med dette middelet?

Kontakt din lege eller apotek før du dette middelet tar.

Hos en antall pasienter som bruker Lyrica bruker, er symptomer rapportert som indikerer en allergisk reaksjon. Disse symptomene inkluderer hevelse i ansiktet, lepper, tunge en svelg men også utbredt hudutslett. Du må umiddelbart kontakt ta med din lege hvis en av disse reaksjonene hos u oppstår.

I forbindelse med bruk av pregabalin er det rapportert om alvorlige kutan bivirkninger bivirkninger bivirkninger på huden),), som det syndrom av Stevens-Johnson og toksisk epidermal nekrolyse. Stopp med bruk av pregabalin og søk umiddelbart medisinsk hjelp hvis du en av de i rubrikk 4 beskrevet symptomer i forbindelse med disse alvorlige hudreaksjoner legger merke til.

- Ved bruk av bruk av Lyrica er svimmelhet og døsighet oppstått, som medfører det oppstå av ulykker (fall) hos eldre pasienter kan øke. Vær derfor forsiktig inntil du vant er til effekten som dette legemidlet kan ha ..
- kan uklart syn eller tap av synet synsevne av andre endringer av synsfeltet forårsake, hvorav de fleste midlertidige er. Du må det umiddelbart til din lege fortelle hvis du endringer av ditt syn merker.
- Hos visse diabetespasienter som vekt øker under behandlingen med pregabalin kan kan en justering av deres diabetesmedisin nødvendig være.
- Visse bivirkninger som døsighet kan oftere forekomme, fordi pasienter med ryggmargsskade andre legemidler kan bruke om for eksempel smerte eller spastisitet å behandle. Disse legemidlene har samme bivirkninger som pregabalin og de Alvorlighetsgraden av disse bivirkningene kan økt være ved samtidig bruk.
- Det er hos noen pasienter under bruken av av Lyrica meldinger vært av hjertesvikt; vanligvis var dette eldre pasienter med hjerte- og karsykdommer. Før du begynner med å ta av dette legemidlet må du din lege fortelle hvis du tidligere har hatt problemer med en hjertesykdom hjertesykdom.
- er er ved noen pasienter under bruk av Lyrica rapportert vært av nyresvikt. Hvis du under bruk av Lyrica merker at du mindre plast, må du fortelle legen din siden dette kan forbedres ved å stoppe med legemidlet legemiddel Noen pasienter.

- Noen pasienter dør behandlet bli med anti-epileptika slik som Lyrica, har tanker hatt om selvskading eller selvmord eller har selvmordsatferd vist. Hvis du på noe tidspunkt slike tanker har eller slik atferd viser, ta umiddelbart kontakt med din lege.
- Når Lyrica tas sammen med andre legemidler som forstoppelse kan kan forårsake (slik som noen typer smertestillende), er det mulig at mage-tarmproblemer oppstår (f.eks. forstoppelse, blokkert eller lammet tarm). Fortell det din lege hvis du forstoppelse har, spesielt hvis du følsom for dette problemet er.
- Fortell det din lege før du begynner med å bruke av dette legemidlet hvis du noen gang misbrukt har gjort eller avhengig har vært av alkohol, legemidler på resept eller ulovlige narkotika; dette kan bety at du en større risiko har for avhengig å bli av Lyrica.
- Er er tilfeller av anfall/kramper (konvulsjoner) rapportert under bruk av Lyrica eller kort etter bruk det stoppe med Lyrica. Ta umiddelbart kontakt med din lege hvis det hos deg en krampeanfall oppstår.
- Det er tilfeller av redusert hjernefunksjon (encefalopati) rapportert hos en antall pasienter som brukte Lyrica brukte. Disse pasientene hadde også andre tilstander. Fortell det legen din hvis du i fortiden har hatt problemer med alvorlige sykdommer, som for eksempel lever- eller nyresykdommer.
- Det har vært rapporter om pustevansker. Hvis du har har av
 - nervesystemlidelser, luftveislidelser, nyrefunksjonsforstyrrelse eller hvis du eldre er enn 65 år, kan din lege gi deg en annen doseringsskjema foreskrive. Ta kontakt med din lege hvis du vansker med å puste eller en overfladisk pust har.

Avhengighet

Noen mennesker kan av Lyrica avhengig bli (et behov for å legemiddel fortsette å ta). De kan abstinenssymptomer få når de stopper med å ta bruk av Lyrica (se avsnitt 3, "Hvordan bruker du dette legemidlet?" og "Hvis du stopper med bruk av dette legemidlet"). Hvis du føler er bekymringer over gjør at du av Lyrica avhengig kan bli, er det viktig at du din lege konsulterer.

Hvis du en av de neste plager merker under det inntak av Lyrica, kan dette et tegn være at du avhengig har blitt blitt:

- Du må det legemiddel lenger ta enn anbefalt av din forskriver
- Du har det følelse at du må ta mer enn den anbefalte dose
- Du bruk det legemidlet for andre grunner enn foreskrevet
- Du har gjentatte, mislykkede forsøk gjort for å slutte med eller kontroll å få over bruk av legemidlet
- Når du stopper med å ta av legemidlet føler du deg ikke bra, og du føler deg bedre så snart du tar legemidlet igjen inntar

Hvis du en av disse symptomene , ta kontakt med din lege for å lege om det beste behandlingsforløp for deg å diskutere, inkludert når det en passende tidspunkt er for å slutte og hvordan du dette på en sikker måte må gjøre.

Barn og ungdom til 18 år

Sikkerheten og effektiviteten hos barn og ungdom (opp til alder alder av 18 år) er ikke fastslått. Lyrica skal derfor ikke brukes hos denne aldersgruppen aldersgruppe.

du andre legemidler andre legemidler?

Bruker du i tillegg til Lyrica andre legemidler legemidlerhar du det kort siden gjort eller er det mulighet for at du i nærmeste fremtid andre legemidler skal bruke? Fortell det da legen din eller apoteket . Detgjelder også for legemidler hvor u ingen resept for nødvendig har.

Lyrica og visse andre legemidler kan påvirke hverandre (interaksjon). Ved inntak med bestemte andre legemidler som en beroligende virkning har (inkludert opioider), kan Lyrica disse effektene forsterke, som kan føre til åndedrettsstans, koma og død. Svimmelhet, døsighet og konsentrasjonsnedsettelse kan forverres hvis Lyrica sammen med legemidler blir administrert som:

- oxykodon (brukt som smertestillende)
- lorazepam (brukt ved behandlingen av angst) eller alkohol
- inneholder ..

kan samtidig med med orale prevensjonsmidler blir brukt.

Hva må du være oppmerksom på med mat, drikke og alkohol?
Lyrica kapsler kan med eller uten mat tas inntas.

Det anbefales å ikke alkohol drikke under bruk av Lyrica. Graviditet

og amming Lyrica skal

ikke brukes under graviditet graviditet av under den amming bli brukt, med mindre legen din vurderer annerledes . Brukenav pregabalin under de første 3 første 3 måneder av svangerskapet kan fødselsskader forårsake hos det ufødte barnet hvorfor en medisinsk behandling nødvendig er. Fra en studie hvor data ble vurdert fra kvinner fra Nord-Europeiske land som under de første 3 månedene av svangerskapet pregabalin hadde tatt, blek at 6 av de 100 babyer slike fødselsskader viste. Hos kvinner som under studien ikke med pregabalin ble behandlet ,, var at 4 av 100 babyer. Misdannelser av ansiktet (kløft leppe, kjeve og/eller gane), øyne, nervesystemet (inkludert de hjernen), nyrene og kjønnsorganene ble rapportert.

Kvinner som kan bli gravide bør ,må effektiv prevensjon bruke bruke. Er du gravid, tror du gravid å være, ønsker du å bli gravid eller gir du amming ? Ta kontakt meddin lege eller apotek før før du dette legemiddel brukes.

Kjøreevne og det bruk av maskiner

Bruk av Lyrica kan føre til svimmelhet svimmelhetdøsighet og og redusert konsentrasjon. Du må ikke kjøretøy kjøre, maskiner betjene eller andre risikofylte aktiviteter utføre, før det er klart om dette legemidlet din evne til ovennevnte oppgaver utføre å utføre, enten ikke påvirker.

Lyrica inneholder laktosemonohydrat

Rådfør deg med din lege før du dette legemiddel inntar, hvis din lege har fortalt har at du visse sukkerarter ikke kan tåle.

Lyrica inneholder natrium

Dette middel inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per harde kapsel, det vil si at det i hovedsak 'natriumfritt' er.

3. Hvordan bruker du dette legemidlet?

Bruk dette legemidlet alltid nøyaktig slik som legen din eller apoteket har fortalt deg .. riktig bruk ? Ta kontakt med bruk? Ta kontakt med din lege eller apotek. Ta ikke mer av legemidlet enn foreskrevet til deg foreskrevet.

Din lege vil bestemme hvilken dose for u egnet er.

Lyrice er utelukkende beregnet for oralt bruk.

Perifer og sentral nevropatisk smerte, epilepsi eller generalisert angstlidelse:

- Ta antall kapsler som av legen din foreskrevet foreskrevet.
- er tilpasset til deg og din sykdomstilstand og sykdomsbilde og vil i det generelle ligge mellom 150 og 600 mg per dag.
- Din lege vil deg fortelle at du enten to ganger eller tre ganger per dag Lyrice må tas. For to ganger per dag tar du Lyrice én gang om morgenen og én gang om kvelden i, hver dag på omtrent samme tidspunkt. For tre ganger per dag tar du Lyrice én gang om morgenen, én gang om ettermiddagen en én gang 's kvelden inn, hver dag på omtrent samme tidspunkt.

Hvis du har inntrykk av at effekten av Lyrice er for sterk eller til svak er, lett enn din lege eller apotek inn.

Hvis du en eldre pasient er (eldre enn 65 år), må du ta Lyrice i den vanlige dosen i ta, unntatt hvis du har problemer med dine nyrer ..

mulig at dine din lege en annen doseringsskjema og/eller annen dosering foreskriver hvis du nyreproblemer har.

Ta kapselen i hel med vann.

Ta Lyrice inntil din lege forteller at du kan stoppe.

Har du for mye av dette middelet brukt?

Kontakt din lege eller gå til de nærmeste Første Hjelpetjeneste for en sykehus. Ta din eske av hetteglass med Lyrice kapsler med. Du kan seg søvnløse, forvirret, bekymret av rastløs føle etter du for mye Lyrice har inntatt. Epileptiske anfall og bevisstløshet (koma) er også rapportert.

Har du glemt dette middelet å bruke?

Det er viktig å ta Lyrice kapsler hver dag regelmessig på samme tidspunkt for å ta. Hvis du har glemt en dose å ta , gjørdette så snart som mulig når du tenker på det ,unntatt hvis det det tid er for din neste dose. I det tilfellet tar du bare den neste dosen inn. Ta ikke dobbel dose for en glemt dose i å ta igjen.

Hvis du stopper med å bruke dette legemidlet Stopp

ikke plutselig med å ta Lyrice. Hvis du ønsker av Lyrice. Hvis du ønsker stoppe med å ta Lyrice, diskuter dette da først med legen din. Han eller hun vil fortelle deg hvordan du dette skal gjøre. Hvis din behandling blir avsluttet, må dette skje gradvis over en periode på minst 1 uke. Du må vite at det ved u bestemte bivirkninger, såkalte abstinenssymptomer, kan oppstå etter å stoppe

med en kort- eller langtidsbehandling med Lyrica. Disse bivirkningene består av: søvnløshet, hodepine, kvalme, føle engstelig, diaré, influensalignende symptomer, anfall //kramper (kramper), nervøsitet, depresjon, tanker om selvskading eller selvmord, smerte, svette og svimmelhet. Disse bivirkningene kan oftere forekomme eller alvorligere bli hvis du bruker Lyrica for en lengre tid har brukt. Hvis du abstinenssymptomer får, må du kontakte ta kontakt med din lege.

Har du andre spørsmål om bruken av dette legemidlet? Ta da kontakt med din lege eller av apotek.

4. Mulige bivirkninger

Som hvert legemiddel kan også dette legemidlet bivirkninger ha, selv om får ikke alle det å gjøre.

Bivirkninger som svært ofte, hos mer enn 1 av 10 personer, forekommer

- svimmelhet, døsighet, hodepine

Bivirkninger som ofte, ved mindre enn 1 av 10 personer, forekomme

- økt appetitt
- følelse av eufori, forvirring, ustøhet (desorientering), nedsatt seksuell
- interesse, irritabilitet
- oppmerksomhetsforstyrrelser, klossethet, hukommelsesforstyrrelse, hukommelsestap, ukontrollerte skjelvninger eller risting, taleforstyrrelser, prikkende følelse, nummenhet, tørrhet/ døsighet (sedasjon), søvnløshet (letargi), søvnløshet, utmattelse, du føler deg unormalt
- tåkete syn, dobbel syn
- svimmelhet, problemer med balanse, fall
- tørr munn, forstoppelse, oppkast, luft i magen, diaré, kvalme, oppblåst mage
- erektil dysfunksjon
- hevelse av kroppen inkludert de lemmer
- en beruset følelse ha, unormal måte av gå
- vektøkning
- muskelkrampe, smerte i ledd, ryggmerter, smerte i lemmer (armer og/ ben)
- vondt hals

Bivirkninger som noen ganger, hos mindre enn 1 av 100 personer, forekommer

- tap av appetitt, vekttap, blodsukkersenkning, blodsukkerøkning
- endret selvbevissthet, rastløshet, depresjon, agitasjon, humørsvingninger, vanskelig å finne ord, hallusinasjoner, hallusinasjoner, unormale drømmer, panikkanfall, likegyldighet, aggresjon, overdreven opprømt, mental forverring, problemer med tenkning, økt seksuell interesse, problemer med seksuell funksjon inkludert det vanskelig å oppnå en seksuell klimaks, forsinket utløsning (ejakulasjon)
- endringer i synet, uvanlige øyebevegelser, endringer i synet inkludert tunnelsyn (begrenset synsfelt), lysglimt, spastiske bevegelser, redusert reflekser, hyperaktivitet, svimmel bli ved oppstand, følsom hud, tap av smak, brennende følelse, skjelvninger ved bevegelse, nedsatt bevissthet, tap av bevissthet, besvimelse, økt følsomhet for lyd, føler ikke bra føle
- tørre øyne, hovne øyne, øyesmerter, svake øyne, vannete øyne, irriterte øyne

- hjerterytmeforstyrrelser, raskere hjerterefrekvens, lav blodtrykk, høyt blodtrykk, endringer i hjerterefrekvens, nedsatt funksjon av hjertet
- rødming, hetetokter
- pustevansker, tørr nese, tett nese
- økt spyttproduksjon, halsbrann, nummen rundt munnen, svette,
- hudutslett, kald, kulde frysninger, feber
- muskelrykninger, leddsmerter, muskelstivhet, smerte inkludert muskelsmerter, smerte i nakken
- smerte i brystet
- vanskelig eller smertefull urinere, inkontinens
- svakhet, tørst, klem følelse på brystet
- endringer i blod- og leverprøveresultater (økning av kreatininfosfokinase, alaninaminotransferase og aspartat-aminotransferase i blodet, reduksjon av antall blodplater i blodet, mangel på hvite blodlegemer, det seg ut i økt følsomhet for infeksjoner (nøytropeni), mer kreatinin i blodet, mindre kalium i blodet)
- overfølsomhet, hovent ansikt, kløe, hudutslett med alvorlig kløe og dannelse av
- kuler (elveblest), rennende nese, neseblod, hoste, snorking
- smertefulle menstruasjoner
- kalde hender og føtter

Bivirkninger som sjelden, hos mindre enn 1 av 1.000 personer, forekommer

- unormal luktesans, bevegelse av synet så snart hodet blir beveget, endring endring
- opplevelse av dybde, glitring, glitringertap av synsevne, synsevne
- utvide av pupillene, skjele se
- kald svette, trykkende følelse i halsen, hovent tunge, betennelse
- i bukspyttkjertelen problemer
- med svelging svelge
- sakte av redusert bevegelse av kroppen, kroppen
- problemer med skriving
- væskeansamling i (under)magen
- væskeansamling i lungene
- anfall/kramper (kramper)
- endringer i EKG (elektrokardiogram) som samsvarer med forstyrrelser av
- hjerterytme
- muskelskade
- spontan utflod fra brystene, unormal unormal brystvekst, brystdannelse hos menn
- forstyrret menstruasjonsmønster (uregelmessige menstruasjoner)
- nedsatt funksjon av dine nyrer (nyresvikt), nedsatt utskillelse av urin, ikke
- kunne late vannet (urinretensjon)
- reduksjon av antall hvite blodceller
- upassende oppførsel, selvmordsatferd, selvmordstanker
- allergiske reaksjoner, inkludert muligens: vanskeligheter med å puste, betente øyne (keratitt) og alvorlige reaksjoner fra huden med hud som kjennetegn: rødaktige, ikke-hevede, skiveformede eller sirkulære flekker på overkroppen, ofte med blemmer i midten derav, hudavskalling, sår i og rundt munnen, hals, nese eller på kjønnsorganene og øyne; denne alvorlige hudutslett kan muligens bli mulig forutgått av feber og influensalignende symptomer (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse). gulsott

- (gulfarging av hud og øyne øyne)
- parkinsonisme, som er symptomer som ved sykdommen Parkinson ligner, slik som skjelving, vanskeligheter med å bevege seg (bradykinesibradykinesi) og stive muskler

Bivirkninger som svært sjelden, hos mindre enn 1 av 10.000 personer, forekommer

- leversvikt
- hepatitt (leverbetennelse).

Ukjent kjent: frekvens kan med de tilgjengelige data ikke bli bestemt

- Avhengig bli av Lyrica ('legemiddelavhengighet').

Du må vite at det ved u bestemte bivirkninger, såkalte abstinenssymptomer, kan oppstå etter det å stoppe med en kort- eller langtidsbehandling med Lyrica (se "Hvis du stopper med bruken av dette legemidlet ").Du

må umiddelbart søke medisinsk råd hvis du merker at tungen din eller tunge av ansikt begynner på å hovne eller hvis din hud rød blir og det blemmedannelse eller avskalling begynner på å oppstå.

Visse bivirkninger som døsighet kan oftere forekomme, fordi pasienter med ryggmargsskade andre legemidler kan bruke for eksempel smerte av spastisitet å behandle. Disse legemidlene har de samme bivirkningene som pregabalin og de alvorlighetsgraden av disse bivirkningene kan økes er ved samtidig bruk.

De følgende bivirkning er rapportert etter dette legemidlet på markedet er brakt: vanskeligheter med puste, overfladisk pust.

Det rapportere av bivirkninger

Får du bivirkninger , ta kontakt med din lege eller apotek . Dette gjelder også for mulige bivirkninger som ikke i denne pakningsvedlegget står. Du kan bivirkninger også direkte rapportere via det nasjonale rapporteringssystemet som nevnt i vedlegg V. Ved bivirkninger å rapportere, kan du hjelpe oss med å få mer informasjon om sikkerheten til dette legemidlet . dette legemiddel.

5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?

Utenfor syn og rekkevidde av barn holde.

Bruk dette legemidlet ikke mer etter de siste holdbarhetsdato. Den finner du på esken eller flasken etter EXP. Der står en måned og et år. Den siste dag av den måned er siste holdbarhetsdato.

For dette legemidlet er det ingen spesielle lagringsbetingelser.

Skyll legemidler ikke i vasken eller toalettet og kast dem ikke i søppelbøtta. Spør din apotek hva du skal gjøre med legemidler må gjøre som du ikke lenger bruker. Hvis du legemidler på riktig måte avhender blir de på en ansvarlig måte destruert og kommer de ikke i miljøet til.

6. Innhold av emballasje og annen informasjon

Hvilke stoffer er det i dette legemidlet?

Det virkestoffet i dette legemidlet er pregabalin . HverHver harde kapsel inneholder 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg eller 300 mg pregabalin.

De andre stoffer i dette legemidlet er: laktosemonohydrat, maisstivelse, talkum, gelatin, titandioksid (E171), natriumlaurylsulfat, vannfri kolloidal silisiumdioksid, svart blekk (som skjellakk, jernoksid svart (E172), propylenglykol og kaliumhydroksid inneholder) en vann.

De 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg en 300 mg kapsler inneholder også rød jernoksid (E172).

Hvordan ser Lyrica ut og hvor mye er det i en pakning?

25 mg kapsler	Hvite harde kapsler, med påtrykk "VTRS" på den øvre delen og "PGN 25" på den nedre delen av kapselen
50 mg kapsler	Hvite harde kapsler, med påtrykk "VTRS" på den øvre del og "PGN 50" på nedre del av kapselen. Den nedre del av kapselen er merket med en svart stripe
75 mg kapsler	Hvit-oransje harde kapsler, med påtrykk "VTRS" på den øvre delen og "PGN 75" på den nedre delen av kapselen
100 mg kapsler	Oransje harde kapsler, med påtrykk "VTRS" på den øvre delen og "PGN 100" på den nedre del av kapselen
150 mg kapsler	Hvite harde kapsler, med påskrift "VTRS" på den øvre del og "PGN 150" på den nedre del av kapselen
200 mg kapsler	Lys oransje harde kapsler, med påtrykk "VTRS" på den øvre delen og "PGN 200" på den nedre delen av kapselen
225 mg kapsler	Hvit-lys oransje harde kapsler, med påtrykk "VTRS" på den øvre delen og "PGN 225" på den nedre delen av kapselen
300 mg kapsler	Hvit-oransje harde kapsler, med påtrykk "VTRS" på den øvre delen og "PGN 300" på den nedre delen av kapselen

Lyrica er tilgjengelig i åtte pakningsstørrelser fremstilt av PVC med aluminiumsfolie på baksiden :: pakning med 14 kapsler med 1 blisterpakning blisterpakningen pakning med 21 kapsler med av 21 kapsler med 1 blisterpakning, en pakke av 56 kapsler med 4 blisterpakninger, en pakke av 70 kapsler med 5 blisterpakninger, en pakke av 84 kapsler med 4 blisterpakninger, en pakke av 100 kapsler med 10 blisterstrimler, en pakning av 112 kapsler med 8 blisterstrimler og en perforert enhetsblisterpakning av 100 x 1 kapsler.

Lyrica er også tilgjengelig i en HDPE-flaske med 200 kapsler for de 25 mg, 75 mg, 150 mg i 300 mg styrker.

Ikke alle nevnte pakningsstørrelser blir i handel brakt.

Innehaver av tillatelsen for markedsføring handel bringe og produsent

Innehaver av tillatelsen for markedsføring av bringe:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle ved elven IJssel, Nederland.

Produsent:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Mooswaldallee 1, 79108 Freiburg im Breisgau, Tyskland.

eller

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom 2900, Ungarn.

eller

MEDIS INTERNATIONAL a.s., produksjon fabrikk Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Tsjekkia.

Ta for all informasjon om dette legemidlet kontakt med den lokale representanten til innehaveren av tillatelse for i handel bringe:

Belgia/Belgique/Belgia

Viatrix

Tlf/Tlf: +32 (0)2 658 61 00

Litauen

Viatrix UAB

Tlf: +370 52051288

Bulgaria

Mylan EOOD

Тел.: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Viatrix

Tél/Tel: +32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Viatrix CZ s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Ungarn

Viatrix Healthcare Kft.

Tel.: + 36 1 465 2100

Danmark

Viatrix ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Limited
Tel: (+356) 21 220 174

Tyskland
Viatri Healthcare GmbH
Tel: +49 (0)800 0700 800

Nederland
Mylan Healthcare BV
Tel: +31 (0)20 426 3300

Estland
Viatri OÜ
Tel: +372 6363 052

Norge
Viatri AS
Tlf: +47 66 75 33 00

Hellas
Viatri Hellas Ltd
Tlf: +30 2100 100 002

Østerrike
Viatri Austria GmbH
Tlf: +43 1 86390

Spania
Viatri Pharmaceuticals, S.L.
Tlf: +34 900 102 712

Polen
Viatri Healthcare Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 546 64 00

Frankrike
Viatri Helse
Tlf: +33 (0)4 37 25 75 00

Portugal
Viatri Healthcare, Lda.
Tlf: +351 21 412 72 00

Kroatia
Viatri Croatia d.o.o.
Tlf: + 385 1 23 50 599

Romania
BGP Products SRL
Tlf: +40 372 579 000

Irland
Viatriis Limited
Tel: +353 1 8711600

Slovenia
Viatriis d.o.o.
Tel: +386 1 236 31 80

Island
Icepharma hf.
Telefon: +354 540 8000

Slovakisk republikk
Viatriis Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 32 199 100

Italia
Viatriis Pharma S.r.l.
Tel: +39 02 612 46921
Suomi/Finland

Viatriis Oy
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος
GPA Pharmaceuticals Ltd
Τηλ: +357 22863100

Sverige
Viatriis AB
Tel: +46 (0)8 630 19 00

Latvija
Viatriis SIA
Tel: +371 676 055 80

Storbritannia (Nord-Irland)
Mylan IRE Healthcare Limited
Tel: +353 18711600

Denne pakningsvedlegget er for den sist godkjent i {MM/JJJJ}.

Mer informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Europeisk

Legemiddelbyrå: <http://www.ema.europa.eu>.

Transtoyou