

Ulotka: informacja dla użytkownika Lyrica 25 mg  
twarde kapsułki, Lyrica 50 mg  
twarde kapsułki, Lyrica 75 mg  
twarde kapsułki, Lyrica 100 mg  
twarde kapsułki, Lyrica 150 mg  
twarde kapsułki kapsułki,  
Lyrica 200 mg twarde kapsułki,  
Lyrica 225 mg twarde kapsułki,  
Lyrica 300 mg twarde kapsułki  
pregabalina

Przeczytaj dokładnie całą ulotkę zanim użyjesz tego leku . używać ponieważ zawiera ważne informacje dla ciebie. Zachowaj

- tę ulotkę .. będziesz jej później potrzebować . Czy.
- pytania ? jeszcze pytania? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.
- Nie podawaj tego leku nie innym osobom , ponieważ jest onprzeznaczony tylko dla Ciebie przepisany. Lek może szkodliwy być dla innych, nawet jeśli mają oni te same dolegliwości co ty.
- Jeśli odczuwasz jedną z działań niepożądanych wymienionych w rubryka 4 występuje? Lub otrzymujesz Pan/Pani działanie niepożądane które nie w tej ulotce występuje ? Skontaktuj się wtedy zswoim lekarzem lub farmaceutą ..

Zawartość van tego ulotki

1. Co to jest Lyrica i do czego jest ten lek stosowany?
  2. Kiedy nie wolno tego leku nie stosować lub należy zachować szczególną ostrożnie mee być?
  3. Jak używać Pan/Pani ten lek?
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Jak przechowywać Pan/Pani ten lek?
  6. Zawartość opakowania opakowanie i inne informacje
1. Co to jest Lyrica i do czego jest ten lek stosowany?

Lyrica należy do grupy leków stosowanych do leczenia de leczenie z padaczki, neuropatyczny ból i uogólnione zaburzenie lękowe (GAD) u dorosłych.

Obwodowy i centralny ból neuropatyczny : Lyrica: Lyrica jest stosowany w leczeniu przewlekłego bólu spowodowanego uszkodzeniami nerwów wywołanymi przez choroby takie jak cukrzyca lubpółpasiec . Różne choroby takie jak cukrzyca lub (półpasiec) mogą obwodowe neuropatyczny ból powodować. Odczyty bólu mogą być opisywane jako gorący, palący, pulsujący, strzelający, kłujący, ostry, skurcz, bolesny, mrowiący, zdrętwiały, śpiący. Obwodowy i centralny ból neuropatyczny może może też w parze iść z zmianami nastroju, zaburzeniami snu, zmęczeniem i może wpływać na funkcjonowanie fizyczne i społeczne funkcjonowanie i na całkowita jakość życia życie.

Padaczka: Lyrica jest stosowany w leczeniu leczenie z pewnych form z padaczki u

dorośli (częściowe napady z lub bez wtórnie uogólnionych napadów). Twój lekarz przepisze ci Lyrica w celu wsparcia leczenia twojej epilepsji twojej padaczki, jeśli twoje obecne leki twojego stanu nie pod kontrolą. Musisz przyjmować Lyrica oprócz twojej obecnej terapii przyjmować. Lyrica jest. Lyrica jest nie przeznaczony do samodzielnego być stosowany, ale musi zawsze być stosowany w połączeniu z innymi przeciw- padaczkowymi (leki używany przy padaczce).

Uogólnione zaburzenie lękowe: Lyrica jest używany przy de leczeniu z uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD). Objawy GAD to długotrwałe en nadmierny lęk en zmartwienie które trudno kontrolować są. GAD może również niepokój lub uczucie napięcia lub irytację powodować, lub, lub może sprawić że czujesz się szybko zmęczony, masz trudności z koncentracją koncentrować nie pamiętasz nic lub jesteś drażliwy drażliwy jesteś, lub może napięcie mięśniowe lub zaburzenia snu powodować. To ma nic wspólnego z stresem ze stresem napięciem w codziennym życiu ..

2. możesz to to środek nie używać lub musisz być dodatkowo ostrożny z tym być?

Kiedy nie możesz tego środka nie używać?

Jesteś uczulony na jeden z substancji w tym leku. Te substancje można znaleźć w sekcji 6. 6.

należy zachować szczególną ostrożność są z tym lekiem?

Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem tego leku ..

niektórych pacjentów stosujących Lyrica występują którzy używają Lyrica stosują, są objawy zgłoszone które wskazują na reakcję alergiczną .. objawy obejmują obrzęk twarzy, warg, języka, język en gardło ale też rozsiana wysypka skórna. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli twój lekarz jeśli jeden z tych reakcji u u występuje. W związku z używaniem z pregabaliny zgłoszono przypadki z poważnych skórnych działań niepożądanych (działań niepożądanych na skórę), takie jak to zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna epidermalna martwica. Przerwij stosowanie z pregabaliny i wezwij natychmiast pomoc medyczną w jeśli u jeden z w rubryce 4 opisane objawy w związku z tym poważne reakcje skórne zauważa.

- Podczas stosowania Lyrica są zawroty głowy i senność wystąpiło, powodując to wystąpienie wypadków (upadki) u starszych pacjentów może zwiększyć. Bądź ostrożny dopóki aż u przyzwyczajony jesteś do efektu który ten lek mógłby mieć ..
- może zamglone widzenie lub utrata wzroku widzenia wzrok z inne zmiany pola widzenia powodować, z których większość jest tymczasowa. Należy powiadomić to natychmiast swojemu lekarzowi twój lekarz powiedziec jeśli pan zmiany w twoim wzroku zauważy.
- U niektórych pacjentów z cukrzycą którzy przybierają na wadze podczas leczenia pregabaliną może być możliwe jeden dostosowanie z ich leków przeciwcukrzycowych konieczne być.
- Pewne działania niepożądane takie jak senność mogą częściej występować, ponieważ pacjenci z urazem rdzenia kręgowego inne leki mogą używać aby na przykład ból lub spastyczność leczyć .. leki mają takie same działania niepożądane jak pregabalina pregabalina w de Poważne tych działaniach niepożądanych może być zwiększone przy jednoczesnym stosowaniu.

- U niektórych pacjentów podczas stosowania leku wystąpiły działania Lyrica zgłoszenia były z niewydolności serca; zazwyczaj byli to starsi pacjenci z chorobami serca i naczyń. Zanim zaczniesz przyjmować z met lek z tego leku musisz poinformować swojego lekarza powiedzieć jeśli miałeś w przeszłości problemy miałeś z z jakąś chorobą serca.
- Istnieją są przy niektórzy pacjenci podczas stosowania leku Lyrica zgłoszenia były niewydolności nerek. Jeśli podczas stosowania leku Lyrica zauważysz że oddajesz mniej plast, moet u het aan uw lekarzowi powiedzieć ponieważ to może poprawić się przez przerwanie leku stosowania ..
- pacjenci którzy umrzeć leczony być z anty-epileptykami takimi jak Lyrica, mieli myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie lub mieli zachowania samobójcze wykazywali . Jeśli w jakimkolwiek momencie moment takie myśli ma lub takie zachowanie wykazuje, skontaktuj się natychmiast z swoim lekarzem.
- Kiedy Lyrica jest przyjmowana z innymi lekami które zaparcia mogą powodować (takie jak niektóre rodzaje środków przeciwbólowych), jest możliwe że problemy żołądkowo-jelitowe wystąpią (np. zaparcia, zablokowane lub porażone jelito). Powiedz to swojemu lekarzowi jeśli masz zaparcia ,zwłaszcza jeśli jesteś wrażliwy na ten problem . Powiedz to to twój lekarz zanim ty zaczniesz z używaniem tego tego leku jeśli ty kiedykolwiek nadużywałeś masz zrobione lub zależny byłeś byłeś z alkoholu, leki na receptę lub nielegalne narkotyki; to może oznaczać że jesteś bardziej narażony na ryzyko uzależnienia od stać się zależnym van Lyrica.
- Er zijn gevallen van toevallen/stuipen (convulsies) gemeld tijdens het gebruik van Lyrica of kort na het przerwać Lyrica. Skontaktuj się natychmiast z twoim lekarzem jeśli wystąpi u ciebie napad drgawkowy ..
- przypadki obniżonej funkcji mózgu (encefalopatia funkcja mózgu (encefalopatia) zgłoszono u pewnej liczby pacjentów którzy stosowali Lyrica .. Ci pacjenci mieli również inne schorzenia. Powiedz to swojemu lekarzowi jeśli masz w przeszłości problemy miałeś z powodu poważnych chorób, takich jak na przykład choroby wątroby lub nerek.
- Były są zgłoszenia dotyczące z trudności w oddychaniu. Jeśli masz problemy z - chorobami układu nerwowego, chorobami układu oddechowego, niewydolnością nerek lub jeśli jesteś starszy niż 65 lat, może twój lekarz ci przepisać inny schemat dawkowania przepisać. Skontaktuj się z twoim lekarzem jeśli masz trudności z oddychaniem lub płytki oddech masz ..

### Niektórzy

ludzie ludzie mogą Lyrica zależni się (potrzeba przyjmowania leku leku kontynuować przyjmowanie ). Mogą doświadczyć objawów odstawienia gdy przestaną przyjmować lek zaprzestaną przyjmowania użycie Lyrica (patrz rubryka 3, „Jak używać tego leku ?” i „Jeśli przestaniesz stosować użycie tego leku ”). Jeśli się leku ”. Jeśli er martwić się o robi że z Lyrica zależny możesz stać się, jest to ważne że ty twój lekarz skonsultuj się.

Jeśli ty jeden z następujące dolegliwości zauważysz podczas przy przyjmowaniu Lyrica, może to być oznaka że jesteś uzależniony stałeś się uzależniony ::

- zostać musisz lek lek dłużej przyjmować niż zalecane przez twojego lekarza
- Ty masz lek uczucie że ty więcej musisz przyjmować niż zalecane dawka
- U używaj leku leku w celu inne powody niż przepisane

- U zrobiłeś powtarzające się, nieudane próby podjąłeś aby przestać przestać z kontrola do uzyskać nad używaniem leku leku
- Kiedy Pan/Pani przestaje przyjmować przyjmowanie leku leku czuje się Pan/Pani nie dobrze, i pan czuje się lepiej gdy tylko pan lek lek ponownie przyjmuje

Jeśli pan jeden z tych objawów zauważy, proszę skontaktować się z swoim lekarzem, aby najlepsze plan leczenia dla ciebie omówić omówić, w tym kiedy to odpowiedni moment, aby przestać i jak to w odpowiedni sposób odpowiedni bezpieczna sposób musi robić.

Dzieci i młodzież do 18 lat

Bezpieczeństwo i skuteczność skuteczność dzieci i młodzieży (do wieku wiek od 18 lat) są nie ustalone. Lyrica nie może dlatego być stosowana u tej grupy wiekowej grupa wiekowa.

używasz jeszcze inne leki leki?

Używał Pan/Pani oprócz Lyrica jeszcze inne leki, czy Pan/Pani to niedawno robił lub istnieje możliwość taka że że w bliskiej przyszłości inne leki będziesz używać? Powiedz to wtedy swojemu lekarzowi lub farmaceutce. To dotyczy również leków które gdzie u brak recepta na potrzebny jest.

Lyrica i niektóre inne leki mogą nawzajem wpływać (interakcja). Przy spożyciu z określone inne leki które mają uspokajające działanie mają (w tym opioidy), może

Lyrica te efekty wzmocnić, co może prowadzić do zatrzymanie oddechu, śpiączka i śmierć.

Zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji mogą nasilenie jeśli Lyrica razem z lekami jest podawany die:

- oxycodon (używany jako środek przeciwbólowy)
- lorazepam (używany w leczeniu lęku) lub alkohol
- zawierają ..

może jednocześnie jednocześnie z doustne antykoncepcyjne są używane.

Na co należy zwracać uwagę przy jedzeniu, piciu i alkoholu?

Kapsułki Lyrica mogą być przyjmowane z lub bez jedzenia ..

Zaleca się nie spożywać alkoholu podczas stosowania Lyrica. Ciąża i karmienie piersią

Lyrica nie powinna być

stosowana w czasie ciąży ciąży of podczas de karmienia piersią być używany, chyba że twój lekarz inaczej uzna. Het stosowanie van pregabaliny podczas de pierwszych 3 miesiące z ciąży może wady wrodzone powodować u nienarodzonego dziecka dla którego jest medyczne leczenie potrzebne . Z badania wynika które dane zostały ocenione od kobiet z Północnej-Europejskich krajów które podczas pierwszych 3 3 ciąży pregabaline przyjmowały pregabalina mieli przyjęte, błady że 6 na 100 dzieci takie wady wrodzone wykazywało. U kobiet które podczas badania nie były pregabalina były leczone ,, były że 4 na 100 niemowląt. Wady twarzy twarzy (rozszczepiona warga, szczęka i/of podniebienie), oczy , oczuukład nerwowy układ nerwowy (w tym de mózg), nerki i narządy płciowe zostały zgłoszone.

Kobiety które mogą zajść w ciążę powinny stosować, skuteczną antykoncepcję używać używać. Czy jesteś w ciąży, myślisz że jesteś w ciąży lub chceszzajść w ciążę lub karmisz piersią ?

Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą przed użyciem tego leku, zanim u ten lek używany.

Zdolność prowadzenia pojazdów i użycie maszyn

Użycie Lyrica może prowadzić do zawrotów głowy, zawroty głowy, senność, zmniejszona koncentracja. Nie wolno prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, lub inne ryzykowne czynności wykonywać, dopóki nie będzie jasne, czy ten lek wpływa na zdolność do wymienionych powyżej zadań wykonywać by przeprowadzić, czy nie wpływa.

Lyrica zawiera laktozę jednowodną

Skonsultuj się ze swoim lekarzem zanim użyjesz tego leku, jeśli twój lekarz ci powiedział ma że ty pewnie cukry nie możesz tolerować.

Lyrica zawiera sól

To środek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na twarda kapsułka, co oznacza że jest w istocie ' bez sodu'. Jak

### 3. stosować Pan/Pani ten lek ??

Stosowanie tego leku zawsze dokładnie tak jak Twój lekarz lub farmaceuta Ci to powiedział .. co do prawidłowego stosowania ? Skontaktuj się z? Skontaktuj się z twój lekarz lub farmaceuta. Przyjmuj nie więcej leku niż przepisano ci zostało przepisane.

Twój lekarz określi jaką dawkę jest dla u odpowiedni jest.

Lyrica jest wyłącznie przeznaczony do doustnego stosowania.

Obwodowy i centralny ból neuropatyczny ból, padaczka lub uogólnione zaburzenie lękowe:

- Weź liczbę kapsułek która przez twojego lekarza została przepisana.
- Dawkowanie jest dostosowane do ciebie i twojego stanu chorobowego obraz kliniczny w będzie w ogólnie leżeć pomiędzy 150 a 600 mg na dzień.
- Twój lekarz będzie ci powie że ty albo dwa razy albo trzy razy na dzień Lyrica należy przyjmować. Dla dwa razy na dzień przyjmujesz Lyrica raz rano i raz wieczorem 's wieczorem w, każdy dzień o mniej więcej tej samej porze. Dla trzy razy na dzień przyjmuj Lyrica raz rano ,raz w południe popołudnia en raz 's wieczorem w, każdego dnia o mniej więcej tej samej porze.

Jeśli masz wrażenie że że działanie leku Lyrica jest silny lub do słaby jest, lekki niż twój lekarz lub farmaceuta w.

Jeśli jesteś starszym pacjentem ( starszy niż 65 lat ), należy Lyrica w zwykłej dawce w przyjmować, chyba że jeśli masz problemy z twoimi nerkami ..

możliwe że twoje twój lekarz ci jeden inny schemat dawkowania i/ inne dawkowanie przepisze jeśli ci problemy z nerkami ma.

Weź kapsułkę w jej całości z wodą.

Weź Lyrica aż do twój lekarz ci powie że możesz przestać stosować.

Czy zażyłeś zbyt dużo tego leku ? Skontaktuj się ztwoim lekarzem lub udaj się do szpitala do najbliższego oddziału ratunkowego Pierwsza Pomoc w szpitalu .. swoje pudełko pudełko czuć się senny , zdezorientowany, zaniepokojony lub zaniepokojenie z niespokojny czuć po u zbyt dużo Lyrica zażył przyjął. Epileptyczne napady i utrata przytomności (śpiączka) są również zgłaszane.

Czy zapomniałeś zapomniałeś ten lek używać stosować?

Jest ważne aby swoje kapsułki Lyrica każdego dnia regularnie o tej samej porze aby przyjmować przyjmować. Jeśli zapomniałeś przyjąć dawki leku , zrób to jaknajszybciej to możliwe , gdy sobie przypomnisz , chyba że jest już czas na następną czas jest na twoją następną dawkę. W takim przypadku przyjmij po prostu następną dawkę . Nie przyjmuj podwójnej dawki aby nadrobić pominiętą dawkę jeden zapomniana dawka w nadrobić ..

przestaniesz stosować używanie tego leku Nie nagle przerywaj przyjmowania Lyrica. Jeśli chcesz z przyjmować Lyrica. Jeśli chcesz przestać przyjmować Lyrica, omów to najpierw z swoim lekarzem. On lub ona powie ci jak to zrobić . Jeśli to musi zrobić. Jeśli twój leczenie zostaje przerwane, musi to stopniowo nastąpić w ciągu jednego okresu co najmniej 1 tygodnia. Musisz wiedzieć że istnieje ryzyko przy tym u określone działania niepożądane, tak zwane objawy odstawienia, mogą wystąpić po zakończeniu stosowania krótko- lub długoterminowego leczenia Lyrica. Te działania niepożądane działania niepożądane istnieć z: bezsenność, ból głowy, nudności, czuć się niespokojny ,biegunka ,objawy grypopodobne ,napady 2F/drgawki (konwulsje), nerwowość, depresja, myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, ból, pocenie się i zawroty głowy. Te działania niepożądane mogą częściej występować lub być poważniejsze stać się jeśli stosujesz Lyrica przez dłuższy okres czasu używałeś . Jeśli objawy odstawienia wystąpią ,, musi się skontaktować z z swoim lekarzem.

Czy masz inne pytania dotyczące stosowania tego leku ? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub lekarzem specjalistą farmaceuta.

#### 4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek może również ten lek działania niepożądane mieć, choć nie każdy ich doświadcza . robić.

Działania niepożądane które bardzo często, u więcej niż 1 na 10 osób, występują

- zawroty głowy, senność, ból głowy

Działania niepożądane które często, przy mniej niż 1 na 10 osób, występuje

- zwiększony apetyt
- uczucie zachwyty ,dezorientacja ,niezborność brak sterowności (dezorientacja),zmniejszone zainteresowanie seksualne
- , podrażnienie

- zaburzenia uwagi, niezdarność, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, niekontrolowane drżenia lub drgawki, zaburzenia mowy, mrowienie, drętwienie drętwienie, senność/senność (sedacja), letarg (letargia), bezsenność, zmęczenie, u czujesz się nienormalnie
- niewyraźne widzenie, podwójne widzenie
- zawroty głowy, problemy z równowagą, upadki
- suchość ust, zaparcia, wymioty, wzdęcia, biegunka, nudności, wzdęcie brzucha
- problemy z erekcją
- obrzęk ciała w tym kończyn uczucie pijanego
- posiadanie , nieprawidłowy sposób, nieprawidłowe sposób z chodzić
- przyrost masy ciała
- skurcz mięśni, ból w stawach, ból pleców, ból w kończynach (ramionach ilub nogach)
- bolesny gardło

Działania niepożądane które czasami, u mniej niż 1 na 100 osób, występują

- utrata apetytu ,utrata masy ciała utrata masy ciałaobniżenie poziomu cukru we krwi obniżenie poziomu cukru we krwi podwyższenie poziomu cukru we krwi podwyższenie poziomu cukru we krwi
- zmieniony samoświadomość, niepokój, depresja, pobudzenie, zmiany nastroju, trudności z wyrażaniem słów ,halucynacje halucynacje, abnormalne sny, ataki paniki, obojętność, agresja, nadmierna wesołość, pogorszenie umysłowe, problemy z myśleniem, zwiększone seksualne zainteresowanie, problemy z seksualnym funkcjonowaniem w tym trudności w osiągnięciu orgazmu, opóźniony wytrysk ( ejakulacja ) • (ejakulacja)
- zmiany w widzeniu, nietypowe ruchy oczu, zmiany w widzeniu w tym widzenie tunelowe (ograniczone pole widzenia), błyski światła, spastyczne ruchy, zmniejszone odruchy, nadpobudliwość, zawroty głowy występują przy wstawaniu, wrażliwa skóra, utrata smaku, uczucie pieczenia ,drżenia drgania przy ruchu, zmniejszona świadomość, utrata przytomności ,omdlenie omdleniezmniejszona wrażliwość na dźwięk ,czuć się źle smaczny czuć
  - suche oczy, spuchnięte oczy, ból oczu, słabe oczy, łzawiące oczy, podrażnione oczy
  - arytmie, przyspieszone tętno, niskie ciśnienie krwi, wysokie ciśnienie krwi, zmiany w tętnie, zmniejszona wydolność serca
  - zaczerwienienie, uderzenia gorąca
  - trudności w oddychaniu, suchość nos, zatkany nos
  - zwiększone wydzielanie śliny, zgaga ,drętwienie wokół ust pocenie się ,
  - wysypka, zimno, zimno dreszcze, gorączka
  - drgawki mięśniowe, obrzęki stawów, sztywność mięśni, ból w tym ból mięśni, ból w szyi
  - ból w klatce piersiowej
  - trudności lub bolesny oddawanie moczu, nietrzymanie moczu
  - osłabienie, pragnienie, ucisk uczucie na klatce piersiowej
  - zmiany w krwi- i wyniki testów wątroby (zwiększenie z kinaza kreatynowa, aminotransferaza alaninowa i asparaginianowa-aminotransferaza we krwi, obniżenie liczby płytek krwi we krwi ,niedobór białych krwinek biały krwinki że się w w zwiększona wrażliwość na infekcje (neutropenia), więcej kreatyniny we krwi, mniej potasu we krwi)
  - nadwrażliwość, spuchnięty twarz, swędzenie, wysypka z silnym swędzeniem i tworzeniem się
  - guzków (pokrzywka), katar, krwawienie z nosa, kaszel, chrapanie
  - bolesne miesiączki

- zimne ręce i stopy

Działania niepożądane które rzadko, u mniej niż 1 na 1.000 osób, występują

- nieprawidłowy zmysł węchu, ruch z widzenia gdy tylko głowa jest poruszona ,zmiana zmiana
- doświadczeniu głębi , olśnienia, utrata wzroku utrata z wzrok
- rozszerzenie źrenic, zezowate patrzenie
- zimny pot, duszność w gardle, spuchnięty język zapalenie
- trzustki trzustki problemy
- z połykaniem połykać
- powolne lub zmniejszone ruch ciała ciała
- problemy z pisaniem
- obrzęk w (pod)brzuchu
- obrzęk w płucach
- napady 2 Fdrgawki (drgawki)
- zmiany w EKG (elektrokardiogram) które odpowiadają zaburzeniom rytmu serca
- uszkodzenie mięśnia
- spontaniczne
- wydzielanie wydzielina piersi , nieprawidłowe, nieprawidłowe wzrost piersi, formowanie piersi u mężczyzn
- zaburzony cykl menstruacyjny (nieregularne miesiączki)
- zmniejszona funkcja nerek ( niewydolność nerek ),zmniejszona), zmniejszona wydalanie moczu, nie
- móc oddawać mocz (zatrzymanie moczu)
- spadek liczby białych krwinek niewłaściwe
- zachowanie ,zachowania samobójcze zachowania samobójczy samobójcze alergiczne
- alergiczne reakcje, w tym możliwe: trudności z oddychaniem , zapalenie oczu (zapalenie rogówki) i silne reakcje skórne z skóry z z jako cechy: czerwona, niepodniesiona, talerzowata lub okrągła plamy na tułowiu, często z pęcherzami w środku nich, łuszczenie się skóry, wrzody w i wokół ust gardła, nosa, nosa lub na narządach płciowych i oczach; ta ciężka wysypka skórna jest możliwa poprzedzony przez gorączkę i grypopodobne objawy (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna epidermalna martwica).
- żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu)
- parkinsonizm, które są objawy przypominające chorobę Parkinsona przypominają, takie jak drżenie, trudności w poruszaniu się ( bradykineziabradycinezja) w sztywne mięśnie

Działania niepożądane które bardzo rzadko, u mniej niż 1 na 10 000 osób, występują

- niewydolność wątroby
- zapalenie wątroby (zapalenie wątroby).

Nie znane: częstotliwość może z dostępnych danych nie zostać określona

- W zależności od Lyrica (' uzależnienie od leku').Powinieneś

wiedzieć że istnieje przy użyciu Lyrica u określone działania niepożądane, tak zwane objawy odstawienia, mogą wystąpić po zakończeniu przyjmowania leku krótkoterminowego

lub długoterminowego leczenia Lyrica ( patrz „Jeśli u przestaje z używaniem tego leku ”.

Należą natychmiast

zasięgnąć porady medycznej jeśli zauważysz że twój język lub marka że twój język lub twarz zaczyna na puchnąć lub jeśli Twoja skóra czerwona staje się i pojawia się pęcherze lub łuszczenie zaczyna na występować te występować.

Pewne działania niepożądane takie jak senność mogą częściej występować, ponieważ pacjenci z urazem rdzenia kręgowego inne leki mogą stosować na przykład ból of spastyczność leczyć leczyć. Te leki mają te same działania niepożądane jak pregabalina i de nasilenie van tych działań niepożądanych może zwiększone są przy jednoczesne stosowanie.

De następujące działanie niepożądane zostało zgłoszone po ten lek na rynek został wprowadzony: trudności z oddychać, płytki oddech.

Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią

działania niepożądane , skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą . To dotyczy również dla też dla możliwe działania niepożądane które nie w tej ulotce są wymienione. Możesz działania niepożądane również bezpośrednio zgłaszać przez krajowy system zgłaszania jak wskazano w w załącznik V. Przez działania niepożądane zgłaszać ,możesz nam pomóc uzyskać więcej informacji o bezpieczeństwie tego leku . z to lekarstwo.

#### 5. Jak przechowywać ten lek ?Poza

zasięgiem i dostępem dzieci trzymać . Nie używać.

leku po upływie terminu ważności na de ostateczna data ważności. Tę znajdziesz na pudełku lub na butelce po EXP. Tam znajduje się miesiąc i rok . Ostatni dzień miesiąca i rok z tego miesiąca jest ostateczny termin ważności.

Dla tego leku nie ma żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Nie wylewaj leków do zlewu zlew lub do WC i wyrzuć je nie do kosza na śmieci. Zapytaj swojego farmaceutę co zrobić z lekami należy zrobić które nie już używasz. Jeśli leki na właściwy sposób usuwane są one w odpowiedzialny sposób niszczone i nie trafiają do środowiska w środowisku Zawartość.

#### 6. Zawartość z opakowanie i inne informacje

Jakie substancje są w tym leku ?Substancja

czynna w tym leku to pregabalina . Każda pregabalina. Każda twarda kapsułka zawiera 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg lub 300 mg pregabaliny.

Substancje pomocnicze w tym leku to :: laktoza jednowodnaskrobia kukurydziana , talk, żelatyna, dwutlenek tytanu dwutlenek tytanu (E171), laurylosiarczan sodu, bezwodny koloidalny dwutlenek krzemu, czarny atrament (który szelak, tlenek żelaza czarny (E172), glikol propylenowy i wodorotlenek potasu zawiera) en woda.

75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg en 300 mg kapsułki zawierają również czerwony tlenek żelaza (E172).

### **Jak wygląda Lyrica i ile znajduje się w jednym opakowaniu ??**

<b>25 mg kapsułki</b>	Białe twarde kapsułki, z napisem „VTRS” na górnej części i „PGN 25” na dolnej części kapsułki
<b>50 mg kapsułki</b>	Białe twarde kapsułki, z napisem „VTRS” na górnej części i „PGN 50” na dolnej części kapsułki. Dolna część kapsułki jest oznaczona czarnym paskiem
<b>75 mg kapsułki</b>	Biało-pomarańczowe twarde kapsułki, z nadruk „VTRS” na górnej części i „PGN 75” na dolnej części kapsułki
<b>100 mg kapsułki</b>	Pomarańczowe twarde kapsułki, z nadrukiem „VTRS” na górnej części i „PGN 100” na dolnej części kapsułki
<b>150 mg kapsułki</b>	Białe twarde kapsułki, z nadrukiem „VTRS” na górnej części i „PGN 150” na dolnej części kapsułki
<b>200 mg kapsułki</b>	Jasno pomarańczowe twarde kapsułki, z nadruk „VTRS” na górnej części i „PGN 200” na dolnej części kapsułki
<b>225 mg kapsułki</b>	Biało-jasno pomarańczowe twarde kapsułki, z nadrukiem „VTRS” na górnej części i „PGN 225” na dolnej części kapsułki
<b>300 mg kapsułki</b>	Biało-pomarańczowe twarde kapsułki, z napisem „VTRS” na górnej części i „PGN 300” na dolnej części kapsułki

Lyrica jest dostępna w osiem rozmiary opakowań wyprodukowany z PVC z folią aluminiową do tyłu :: opakowanie z 14 kapsułkami z 1 blisterem pasek blistrowy jedno opakowanie z 21 kapsułkami z 21 kapsułkami z 1 blisterstrip, jedno opakowanie 56 kapsułek z 4 blisterstripy, jedno opakowanie 70 kapsułek z 5 blisterstripy, jedno opakowanie 84 kapsułki z 4 blisterstripy, jedno opakowanie z 100 kapsułek z 10 blisterów, jedno opakowanie z 112 kapsułek z 8 blisterów i jedno perforowane opakowanie jednostkowe z 100 x 1 kapsułek.

Lyrica jest również dostępna w jednej butelce HDPE z 200 kapsułkami do de 25 mg, 75 mg, 150 mg en 300 mg mocach.

Nie wszystkie wymienione wielkości opakowań są w handlu dostępne.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu handel wprowadzenie i producent

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w prowadzenie:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle nad rzeką IJssel, Holandia.

Producent:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Mooswaldallee 1, 79108 Freiburg im Breisgau, Niemcy.

lub

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom 2900, Węgry.

lub

MEDIS INTERNATIONAL a.s., produkcia závod Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Czechy.

Skontaktuj się z wszelkimi informacjami o tym leku skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem posiadacza zezwolenia z zezwolenie na w obrót wprowadzenie:

BelgiaBelgiqueBelgien  
Viatrix  
Tel/Tel: +32 (0)2 658 61 00

Litwa  
Viatrix UAB  
Tel: +370 52051288

Bułgaria  
Mylan EOOD  
Tel.: +359 2 44 55 400

Luksemburg  
Viatrix  
Tel/Tel: +32 (0)2 658 61 00  
(Belgia/Belgia)

Czeska republika  
Viatrix CZ s.r.o.  
Tel: +420 222 004 400

Węgry  
Viatrix Healthcare Kft.  
Tel.: +36 1 465 2100

Dania  
Viatrix ApS  
Tlf: +45 28 11 69 32

Malta  
V.J. Salomone Pharma Limited  
Tel: (+356) 21 220 174

Deutschland  
Viatrix Healthcare GmbH  
Tel: +49 (0)800 0700 800

Nederland  
Mylan Healthcare BV

Tel: +31 (0)20 426 3300

Eesti  
Viatri OÜ  
Tel: +372 6363 052

Norge  
Viatri AS  
Tlf: +47 66 75 33 00

Ελλάδα  
Viatri Hellas Ltd  
Τηλ: +30 2100 100 002

Österreich  
Viatri Austria GmbH  
Tel: +43 1 86390

España  
Viatri Pharmaceuticals, S.L.  
Tel: +34 900 102 712

Polska  
Viatri Healthcare Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 546 64 00

Francja  
Viatri Zdrowie  
Tel: +33 (0)4 37 25 75 00

Portugalia  
Viatri Opieka zdrowotna, Lda.  
Tel: +351 21 412 72 00

Chorwacja  
Viatri Viatri Hrvatska d.o.o.  
Tel: + 385 1 23 50 599

Rumunia  
BGP Products SRL  
Tel: +40 372 579 000

Irlandia  
Viatri Limited  
Tel: +353 1 8711600

Słowenia

Viatris d.o.o.  
Tel: +386 1 236 31 80

Islandia  
Icepharma hf.  
Sími: +354 540 8000

Republika Słowacka Viatris  
Słowacja s.r.o. Tel: +421 2 32 199 100  
Włochy

Viatris  
Viatris Pharma S.r.l.  
Tel: +39 02 612 46921  
Suomi/Finland

Viatris Oy  
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος  
GPA Pharmaceuticals Ltd  
Τηλ: +357 22863100

Sverige  
Viatris AB  
Tel: +46 (0)8 630 19 00

Latvija  
Viatris SIA  
Tel: +371 676 055 80

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)  
Mylan IRE Healthcare Limited  
Tel: +353 18711600

Ta ulotka jest dla tego ostatnio zatwierdzona w {MM/JJJJ}.

Więcej informacji o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Europejski  
Agencja Leków: <http://www.ema.europa.eu>.