

Folheto: informação para o utilizador

Lyrica 25 mg cápsulas duras,  
Lyrica 50 mg cápsulas duras,  
Lyrica 75 mg cápsulas duras,  
Lyrica 100 mg cápsulas duras,  
Lyrica 150 mg cápsulas duras,  
Lyrica 200 mg duras cápsulas,  
Lyrica 225 mg duras cápsulas,  
Lyrica 300 mg duras cápsulas  
pregabalina

Leia cuidadosamente todo o folheto informativo antes de você este medicamento usar pois há está importante informação em para você.

- Guarde este folheto. Talvez tenha você ele mais tarde novamente necessário.
- Tem você ainda perguntas? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.
- Não dê este medicamento a outras pessoas , pois é apenas para você prescrito . O O pode prejudicial ser para outros, mesmo que tenham os mesmos sintomas que você. Se
- você sentir um dos efeitos colaterais que estão em morrer em rubrica 4 constar? Ou tem você um efeito colateral que não neste este folheto informativo consta? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

Conteúdo de este folheto informativo

1. O que é Lyrica e para que é este medicamento usado?
  2. Quando não deve este medicamento ser usado ou deve ter cuidado cautelosamente com ser?
  3. Como usa você este medicamento?
  4. Possíveis efeitos colaterais
  5. Como armazena você este medicamento?
  6. Conteúdo do embalagem e outras informações
1. O que é Lyrica e para que é este medicamento usado?

Lyrica pertence ao grupo de medicamentos usados para de tratamento de epilepsia, neuropática dor e generalizada transtorno de ansiedade (GAD) em adultos.

Periférica e central neuropática dor: Lyrica é usado no o tratamento de dores prolongadas que são causadas por danos nos nervos. Diversas doenças como diabetes ou herpes-zóster (zona) podem periférica neuropática dor causar. Percepções de dor podem ser descritas como quente, ardente, latejante, aguda, agudo, afiado, cãibra, doloroso, formigante, dormente, adormecido. Periférica e central neuropática dor pode também acompanhado ir com alterações de humor, distúrbios do sono, fadiga e pode influenciar o funcionamento físico e social funcionar o de total qualidade de vida.

Epilepsia: Lyrica é usado no tratamento de certas formas de epilepsia em adultos

adultos (parciais crises com ou sem secundárias generalizadas crises). Seu médico prescreverá Lyrica para auxiliar no tratamento da sua epilepsia, se seus atuais medicamentos sua condição não sob controle. Você deve tomar Lyrica além de seu atual tratamento. Lyrica é não destinado a somente ser usado, mas deve sempre ser usado em combinação com outros anti-epilépticos (medicamentos usados em epilepsia).

Generalizado transtorno de ansiedade: Lyrica é usado em o tratamento de transtorno de ansiedade generalizada (TAG). Os sintomas de TAG são prolongados em excessiva ansiedade e preocupação que são difíceis de controlar. TAG pode também inquietação ou uma sensação de tensão ou irritação causar, ou pode assegurar que você se sinta rapidamente cansado, você tenha dificuldade em concentrar-se, você não consiga lembrar-se de ou irritável dobrado, ou pode tensão muscular ou distúrbios do sono causar. Isto tem nada a ver com o estresse e a tensão no cotidiano vida.

## 2. Quando pode você isto medicamento não usar ou deve ter cuidado especial com isso?

Quando não pode este medicamento não usar?

Você é alérgico a um de substâncias no este medicamento. Estas substâncias pode encontrar em seção 6.6.

deve ter cuidado extra cuidado ser com este medicamento?

Entre em contato com seu médico ou farmacêutico antes de você este medicamento tomar.

Em um número pacientes que usam Lyrica utilizam, são sintomas relatados que indicam uma reação alérgica. Esses sintomas incluem inchaço do rosto, lábios, língua em garganta mas também erupção cutânea disseminada. Você deve imediatamente contato entrar em com seu médico se um de estas reações em em u ocorre.

Em relação com o uso de pregabalina foi relatado ocorrido de graves cutâneas reações adversas (reações adversas na pele), como o síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica. Pare com o uso de pregabalina e procure imediatamente ajuda médica se você u um dos na seção 4 descritos sintomas em relação com estes graves reações cutâneas notar.

- Durante o uso de Lyrica são tontura e sonolência ocorrido, causando o ocorrência de acidentes (quedas) em pacientes idosos pode aumentar. Seja portanto cauteloso até que u acostumado está a o efeito que este medicamento poderia ter ..
- pode visão turva ou perda da visão de outros alterações do campo visual causar, dos quais a maioria temporário são. Você deve o imediatamente a seu médico informar se você mudanças de seu visão notar.
- Em certos pacientes com diabetes que ganham peso durante o tratamento com pregabalina pode um ajuste de seu medicamento para diabetes necessário ser.
- Certos efeitos colaterais como sonolência podem ocorrer com mais frequência, porque pacientes com lesão medular outros medicamentos podem usar para por exemplo dor ou espasticidade tratar. Estes medicamentos têm os mesmos efeitos colaterais como pregabalina e de Ernst de estes efeitos colaterais pode aumentada ser com uso simultâneo ..
- são em alguns pacientes durante o uso de Lyrica relatos ocorrido de insuficiência cardíaca;

geralmente foram estes pacientes idosos com doenças cardíacas e vasculares. Antes de começar a tomar de este medicamento deve você o seu médico informar se você no passado teve problemas de uma doença cardíaca.

- Há são em alguns pacientes durante o uso de Lyrica relatos houve de insuficiência renal. Se você durante o uso de Lyrica perceber que urina menos urina, deve informar ao seu médico dizer pois isso pode melhorar ao parar com o medicamento medicamento Alguns pacientes.
- Alguns pacientes morrer tratados foram com anti-epilépticos como Lyrica, tiveram pensamentos tiveram sobre autoagressão ou suicídio ou tiveram comportamento suicida apresentado. Se você em algum momento tais pensamentos tem ou tal comportamento apresenta, entre em contato imediatamente com seu médico.
- Quando Lyrica é tomado com outros medicamentos que constipação podem causar (como alguns tipos analgésicos), é possível que problemas gastrointestinais ocorram (por ex. constipação, bloqueio ou paralisia intestinal). Diga o seu médico se você constipação tem, especialmente se você sensível a este problema é.
- Diga o seu médico antes de você começar a usar uso de este medicamento se você alguma vez abuso tenha feito ou dependente tenha sido de álcool, medicamentos em prescrição ou drogas ilegais; isto pode significar que você um maior risco corre de dependente se tornar de Lyrica.
- Há são casos de convulsões/espasmos (convulsões) relatados durante o uso de Lyrica ou logo após o parar com Lyrica. Entre em contato imediatamente com seu médico se houver em você uma convulsão ocorrer.
- Há casos de função cerebral reduzida reduzida encefalopatia (encefalopatia) relatado em um número pacientes que Lyrica usaram. Estes pacientes tinham também outras condições. Informe o seu médico se você no passado teve problemas com doenças graves condições, como por exemplo doenças hepáticas ou renais.
- Houve relatos de ocorrências de dificuldades respiratórias. Se você tiver problemas com - doenças do sistema nervoso, doenças do sistema respiratório, insuficiência renal ou se você for maior de 65 anos, pode seu médico lhe um outro esquema de dosagem prescrever. Entre em contato com seu médico se você dificuldade em respirar ou uma respiração superficial tem.

## Dependência

Algumas pessoas podem de Lyrica dependentes tornar-se (uma necessidade de continuar a medicação a tomar ). Eles podem sintomas de abstinência apresentar quando eles pararem com a medicação uso de Lyrica (ver seção 3, "Como usar você este medicamento?" e "Se você parar de usar este medicamento "). Se você sentir er preocupações sobre faz que você de Lyrica dependente pode tornar-se, é importante que você seu médico consulte.

Se você um dos seguinte sintomas nota durante o tomar de Lyrica, pode isso um sinal ser que você dependente se tornou:

- Você deve o medicamento mais tempo tomar do que recomendado pelo seu prescritor
- Você tem a sensação que você deve tomar mais do que o recomendado dose
- U uso o medicamento para outras razões que prescrito
- U tem repetidas, falhadas tentativas feitas para parar com ou controle a obter sobre o uso do medicamento

- Quando você para de tomar o medicamento sente você se não bem, e você se sente melhor assim que você tomar o medicamento novamente ingere

Se você um de estes sintomas , entre em contato com seu médico para o melhor plano de tratamento para você discutir, incluindo quando o um momento adequado para parar e como você isso de uma segura maneira deve fazer.

Crianças e adolescentes até 18 anos

A segurança e eficácia em crianças e adolescentes (até a idade de 18 anos) são não estabelecidos. Lyrica não deve portanto ser administrado nesta faixa etária . Usa.

outros medicamentos ? outro medicamentos?

Usa você além de Lyrica ainda outros medicamentos, fez você isso recentemente fez ou existe a possibilidade de que você no próximo futuro outros medicamentos vai usar? Informe isso ao seu médico ou farmacêutico. Isso aplica-se também a medicamentos que u nenhum prescrição para necessário tem.

Lyrica e certos outros medicamentos podem se influenciar (interação). Ao consumo com determinados outros medicamentos que um calmante efeito têm (incluindo opioides), pode Lyrica estes efeitos potencializar, o que pode levar até parada respiratória, coma e morte. Tontura, sonolência e diminuição da concentração podem agravar-se se Lyrica for administrado com medicamentos administrado que:

- oxycodon (usado como analgésico)
- lorazepam (usado no tratamento da ansiedade) ou
- álcool conter.

Lyrica pode simultaneamente com oral contraceptivos são usados.

Em que deve você prestar atenção com comida, bebidas e álcool?

Cápsulas de Lyrica podem com ou sem alimentos ser tomadas.

É recomendado não consumir álcool ao beber durante o uso de Lyrica.

Gravidez e amamentação

Lyrica não deve ser durante a gravidez de durante o amamentação ser usado, a menos que seu médico decida diferente. O uso de pregabalina durante o primeiros 3 meses do gravidez pode defeitos congênitos causar em o não nascido criança para o qual um tratamento médico necessário é. De um estudo em que onde dados foram avaliados de mulheres de Norte-Europeus países que durante a primeiros 3 meses da gravidez pregabalina tinham tomado, pálido que 6 em cada 100 bebês tais defeitos congênitos apresentaram. Em mulheres que durante o estudo não com pregabalina foram tratadas, eram que 4 em cada 100 bebês. Malformações do rosto (lábio leporino, maxilar eou palato), os olhos, o sistema nervoso (incluindo o cérebro), rins e órgãos genitais foram relatados.

Mulheres que podem engravidar ,devem usar contracepção eficaz usar. Está grávida, acha que está grávida de estar, quer engravidar ou amamenta ? Então entre em contato com seu médico ou farmacêutico antes artes de farmacêutico antes de u este medicamento usado.

Habilidade para dirigir e o uso de máquinas

O uso de Lyrica pode causar tontura tonturasonolência sonolência em reduzida concentração. Você não deve nenhum veículos conduzir, máquinas operar ou outras atividades de risco realizar ,até que claro esteja se este medicamento sua seu capacidade de acima mencionado tarefas de executar , querou não afeta ..

contém lactose monohidratada Consulte

seu médico antes de usar este medicamento toma, se seu médico lhe disse que você certos açúcares não pode tolerar ..

contém sódio Este

Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por dura cápsula, isso quer dizer que é em essência 'isento de sódio'.

### 3. Como usa você este medicamento?

Uso este medicamento sempre exatamente como seu médico ou farmacêutico lhe isso disse .. sobre o uso correto ? Entre em contato com? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico. Tome não mais do medicamento do que foi prescrito para você.

Seu médico irá determinar qual dose é u adequado é.

Lyrica é exclusivamente destinado para oral uso.

Periférica e central neuropática dor, epilepsia ou generalizada transtorno de ansiedade:

- Tome o número cápsulas que pelo seu médico foi prescrito.
- A dosagem é ajustada para você e seu quadro clínico e será no geral situar-se entre 150 e 600 mg por dia.
- O médico irá lhe dizer que você ou duas vezes ou três vezes por dia Lyrica deve tomar. Para duas vezes por dia tome Lyrica uma vez de manhã e uma vez à noite em, cada dia às aproximadamente o mesmo horário. Para três vezes por dia tome Lyrica uma vez de manhã, uma vez à tarde em uma vez à noite em, cada dia por volta do mesmo horário ..

impressão de que o efeito do Lyrica é muito forte ou para fraco é, leve então seu médico ou farmacêutico em.

Se você um idoso paciente é (mais velho que 65 anos), deve o Lyrica na habitual dosagem em tomar, exceto se você problemas com seus rins tem.

É possível que seu médico um outro esquema de dosagem e/ou outra dosagem prescrever se você problemas renais tem.

Tome a cápsula inteira com água. Tome Lyrica

até até seu médico o informa que você pode parar.

Usou você demasiado muito deste medicamento ? Entre em contato com seu

médico ou vá seu artes de ga para o mais próximo Primeiros Socorros do um hospital. Leve sua caixa ou frasco com cápsulas de Lyrica. Você pode se sonolento, confuso, inquieto ou inquieto sentir depois você demais Lyrica tomou ingerido. Epilepsia convulsões e inconsciência (coma) foram também relatados.

Esqueceu-se de este medicamento usar utilizar?

É importante para seu cápsulas de Lyrica cada dia regularmente no mesmo horário em tomar consumir. Se você esqueceu uma dose de tomar , façaisso assim rapidamente possível como você se lembrar ,exceto se for o tempo é para seu próxima dose. Em esse caso tome você simplesmente a próxima dose normalmente. Não tome nenhuma dose dupla para para um esquecer dose em compensar ..

parar de usar uso de este medicamento Não

pare repentinamente de tomar Lyrica. Se você quiser ingerir de Lyrica. Se você quiser parar com o uso de Lyrica, discuta isso primeiro com o seu médico. Ele ou ela irá lhe dizer como fazer isso . Se. Se sua tratamento é interrompido, deve isso gradualmente acontecer durante um período de pelo menos 1 semana. Você deve saber que há em u determinadas efeitos colaterais, chamados sintomas de abstinência, podem ocorrer após a interrupção de um curto- ou tratamento a longo prazo com Lyrica. Esses efeitos colaterais consistir em: insônia, dor de cabeça, náusea, sentir-se ansioso ,diarreia ,sintomas semelhantes àgripe ,convulsõesconvulsões (convulsões), nervosismo, depressão, pensamentos de autoagressão ou suicídio, dor, sudorese e tontura. Estas reações adversas podem ocorrer mais frequentemente ou tornar-se mais graves se você usar Lyrica por um período mais longo . Se você tivertsintomas de abstinência sintomas de abstinência recebe, deve contatar entrar em contato com seu médico.

Tem você ainda outras perguntas sobre o uso de este medicamento? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

#### 4. Possíveis efeitos colaterais

Como qualquer medicamento pode também este medicamento efeitos colaterais ter, embora não todos tenham com isso a ver.

Efeitos colaterais que muito frequentemente, em mais de 1 em cada 10 pessoas, ocorrem

- tontura, sonolência, dor de cabeça

Efeitos colaterais que frequentemente, em menos de 1 em 10 pessoas, ocorrer

- aumento do apetite
- sensação de êxtase, confusão, desorientação (desorientação), diminuição do interesse
- sexual, irritabilidade
- transtornos de atenção, desajeitamento, transtorno de memória, perda de memória, incontrolado tremores ou tremores, transtornos da fala, sensação de formigamento ,dormência dormência, sonolência/ sonolência (sedação), letargia (letargia), insônia, fadiga, você sente se anormal
- visão turva, duplo visão
- tontura, problemas com equilíbrio, quedas
- boca seca, obstipação, vômito, flatulência, diarreia, náusea, inchaço abdominal

- problemas de ereção
- inchaço do corpo incluindo os membros
- uma sensação de embriaguez ter, maneira anormal de caminhar
- ganho de peso
- câibra muscular, dor na articulações, dor nas costas, dor nos membros (braços e pernas)
- dolorido garganta

Efeitos colaterais que às vezes, em menos de 1 em 100 pessoas, ocorrem

- perda de apetite, perda de peso, redução do açúcar no sangue, aumento do açúcar no sangue
- alterado autoconsciência, inquietação, depressão, agitação, alterações de humor, difícil de palavras poder encontrar, alucinações, anormal sonhos, ataques de pânico, indiferença, agressão, excessiva euforia, declínio mental, problemas com pensamento, aumentado sexual interesse, problemas com o sexual funcionamento incluindo o difícil alcançar de um sexual clímax, ejaculação retardada (ejaculação)
- alterações na visão, movimentos oculares incomuns alterações alterações na visão incluindo visão em túnel( campo visual limitado ), flashes de luz , movimentos, diminuído reflexos, hiperatividade, tontura ficar ao levantar-se, pele sensível, perda de paladar, sensação de queimação, tremores em movimentar, diminuição consciência, perda de consciência, desmaio, aumento sensibilidade a som, sentir-se não bem sentir
  - secos olhos, inchados olhos, dor nos olhos , fracos olhos , lacrimejantes olhos irritados
  - olhos arritmias cardíacas , frequência cardíaca, baixa pressão arterial, alta pressão arterial, alterações na frequência cardíaca, função reduzida do coração
  - rubor, ondas de calor
  - dificuldades respiratórias, seca nariz, entupido nariz
  - aumentada produção de saliva, azia , dormente ao redor da boca transpirar
  - transpirar erupção cutânea erupção cutânea frio frio calafrios, febre
  - espasmos musculares, inchaço nas articulações, rigidez muscular, dor incluindo mialgia, dor no pescoço
  - dor no peito
  - difícil ou doloroso urinar, incontinência
  - fraqueza, sede, aperto sensação no peito
  - alterações no sangue- e resultados dos testes hepáticos (aumento de creatinina fosfoquinase, alanina aminotransferase em aspartato-aminotransferase no sangue, redução do número plaquetas no início sangue, deficiência em branco glóbulos sanguíneos que se em em aumentada sensibilidade para infecções (neutropenia), mais creatinina no sangue, menos potássio no sangue)
  - hipersensibilidade, inchado rosto, coceira, erupção cutânea com intensa coceira e formação de
  - caroços (urticária), coriza, sangramento nasal, tosse, roncar
  - doloroso menstruações
  - mãos frias e pés

Efeitos colaterais que raramente, em menos de 1 em 1.000 pessoas, ocorrem

- olfato anormal, movimento do visão assim que a cabeça é movida, mudança
- na percepção de profundidade, brilhos, perda de visão
- dilatação do pupilas, estrabismo olhar

- suor frio, sensação na garganta, língua inchada inflamação
- do pâncreas problemas
- com deglutição engolir
- lenta de reduzida movimento do corpo
- problemas com escrever
- acúmulo de líquido no (baixo)abdômen
- acúmulo de líquido nos pulmões
- convulsões/espasmos (convulsões)
- alterações no ECG (eletrocardiograma) que correspondem a perturbações do
- batimento cardíaco
- lesão muscular
- secreção espontânea dos seios ,anormal anormal crescimento das mamas, formação das mamas em homens
- padrão menstrual perturbado padrão menstrual menstruaçõesirregulares menstruaçõesfunção
- reduzida dos seus rins ( insuficiência renal),função reduzida excreção de urina, não
- poder urinar (retenção urinária)
- diminuição do número glóbulos brancos
- comportamento inapropriado, comportamento suicida, ideação suicida
- alérgico reações, incluindo possivelmente: dificuldade em respirar , olhosinflamados (ceratite) e reações graves da pele com pele com como características: avermelhadas, não elevadas, em forma de disco ou circulares manchas no tronco, frequentemente com bolhas no centro delas, descamação da pele, úlceras em e ao redor da boca, garganta, nariz ou nos de genitais e olhos; esta grave erupção cutânea pode ser possivelmente precedido por febre e sintomas gripais (síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica).
- icterícia (coloração amarelada da pele e olhos)
- parkinsonismo, que são sintomas que se assemelham à doença de Parkinson parecem, como tremores, dificuldade em movimentar-se ( bradicinesiabradicinesia) em rígidos músculos

Efeitos colaterais que muito raramente, em menos de 1 em 10.000 pessoas, ocorrem

- insuficiência hepática
- hepatite (inflamação do fígado).

Desconhecido desconhecido: frequência pode com os disponíveis dados não ser determinada

- Dependente ser de Lyrica ('dependência de medicamentos').

Você deve saber que há em u determinadas efeitos colaterais, chamados sintomas de abstinência, podem ocorrer após a interrupção de um curto- ou tratamento a longo prazo com Lyrica (ver "Se você pare de usar o uso deste medicamento).

Você deve imediatamente buscar conselho médico se você notar que sua língua ou rosto começa a inchar ou se sua pele ficar vermelha e houver formação de bolhas ou descamação começar a ocorrer chá ocorrer.

Certos efeitos colaterais como sonolência podem ocorrer mais frequentemente, porque pacientes com lesão medular outros medicamentos podem usar para por exemplo dor de espasticidade para tratar. Estes medicamentos têm os mesmos efeitos colaterais que pregabalina e a gravidade destes efeitos colaterais pode ser aumentada são em simultâneo uso.

O seguinte efeito colateral foi relatado após este medicamento no mercado ter sido introduzido: dificuldade com respirar, superficial respiração.

O relatar de efeitos colaterais

Se você tiver efeitos colaterais, entre em contato com seu médico ou farmacêutico. Isso também se aplica a para possíveis efeitos colaterais que não neste este folheto informativo constam. Você pode efeitos colaterais também diretamente relatar através do nacional sistema de notificação como mencionado no anexo V. Por efeitos secundários a relatar, pode nos ajudar a obter mais informações sobre a segurança deste medicamento . este medicamento.

#### 5. Como armazenar você este medicamento?

Fora da vista e alcance de crianças manter.

Não use este medicamento mais após em de última data de validade. Isso encontra você na caixa ou a garrafa após EXP. Lá está um mês e um ano. O último dia de mês é a data de validade final.

Para este medicamento não há nenhuma condição especial.

. Não jogue medicamentos no esgoto ou o WC e jogue eles não no lixo. Pergunte seu farmacêutico o que fazer com medicamentos deve fazer que você não mais usa. Se você medicamentos op de certa maneira descarta serão eles de uma responsável maneira destruídos e não eles não no meio ambiente acabam.

#### 6. Conteúdo de embalagem e outras informações

Quais substâncias estão neste medicamento ?A

substância ativa no medicamento é pregabalina . Cada é pregabalina. Cada dura cápsula contém 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg ou 300 mg pregabalina.

O outros componentes neste medicamento são :: lactose monoidratadoamido de milho , talco, gelatina, dióxido de titânio dióxido de titânio (E171), laurilsulfato de sódio, anidro coloidal dióxido de silício, tinta preta (que goma-laca, óxido de ferro preto (E172), propilenoglicol e hidróxido de potássio contém) em água.

De 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg em 300 mg cápsulas contém também óxido de ferro (E172).

#### Como parece Lyrica e como muito está em uma embalagem?

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>25 mg cápsulas</b> | Branças duras cápsulas, com inscrição "VTRS" na parte superior da cápsula "PGN 25" na parte inferior da cápsula |
| <b>50 mg cápsulas</b> | Branças duras cápsulas, com inscrição "VTRS" na parte superior parte e  |

	"PGN 50" no inferior parte da cápsula. A inferior parte da cápsula é marcada com uma faixa preta
<b>75 mg cápsulas</b>	Branco-laranja duras cápsulas, com impressão "VTRS" na parte superior parte e "PGN 75" na parte inferior parte da cápsula
<b>cápsulas de 100 mg</b>	Laranja cápsulas duras cápsulas, com impressão "VTRS" na parte superior parte e
	"PGN 100" na parte inferior parte da cápsula
<b>150 mg cápsulas</b>	Branças duras cápsulas, com impressão "VTRS" na parte superior parte e "PGN 150" na parte inferior parte da cápsula
<b>200 mg cápsulas</b>	Laranja claro duras cápsulas, com impressão "VTRS" na parte superior da e "PGN 200" na parte inferior da cápsula
<b>225 mg cápsulas</b>	Branco-laranja claro cápsulas duras , com impressão "VTRS" na parte superior da "PGN 225" na parte inferior da cápsula
<b>300 mg cápsulas</b>	Branco-laranja duras cápsulas, com impressão "VTRS" na parte superior da e "PGN 300" na parte inferior da cápsula

Lyrice está disponível em oito tamanhos de embalagem fabricado de PVC com folha de alumínio no

lado traseiro:: embalagem de 14 cápsulas com 1 blister tira de blister uma embalagem de 21 cápsulas com de 21 cápsulas com 1 blisterstrip, uma embalagem de 56 cápsulas com 4 blisterstrips, uma embalagem de 70 cápsulas com 5 blisterstrips, uma embalagem de 84 cápsulas com 4 blisterstrips, uma embalagem de 100 cápsulas com 10 blisterstrips, uma embalagem de 112 cápsulas com 8 blisterstrips e uma perfurada embalagem blister unitária de 100 x 1 cápsulas.

Lyrice é também disponível em um frasco HDPE com 200 cápsulas para de 25 mg, 75 mg, 150 mg em 300 mg concentrações.

Nem todas mencionadas tamanhos de embalagem são no comércio colocados.

Titular da autorização para a comercialização comercialização trazer e fabricante

Titular da autorização para a comercialização trazer:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Países Baixos.

Fabricante:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Mooswaldallee 1, 79108 Freiburg im Breisgau, Alemanha.

ou

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom 2900, Hungria.

ou

MEDIS INTERNATIONAL a.s., výrobní závod Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, República Tcheca.

Tome para todas as informações sobre este medicamento entre em contato com o representante local do titular de autorização para a introdução no mercado ::

/Belgique/BelgienViatriis

Tel

/Tel: +32 (0)2 658 61 00Lituânia

Viatriis

UAB Tel: +370 52051288

Bulgária

Mylan

EOOD LDA

Тел.: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Viatriis

Tél/Tel: +32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Viatriis CZ s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Viatriis Healthcare Kft.

Tel.: + 36 1 465 2100

Danmark

Viatriis ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Limited

Tel: (+356) 21 220 174

Deutschland

Viatriis Healthcare GmbH

Tel: +49 (0)800 0700 800

Nederland

Mylan Healthcare BV

Tel: +31 (0)20 426 3300

Eesti

Viatriis OÜ

Tel: +372 6363 052

Norge  
Viatris AS  
Tlf: +47 66 75 33 00

Gréciaα  
Viatris Hellas Ltd  
Tel: +30 2100 100 002

Áustria  
Viatris Austria GmbH  
Tel: +43 1 86390

Espanha  
Viatris Pharmaceuticals, S.L.  
Tel: +34 900 102 712

Polônia  
Viatris Healthcare Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 546 64 00

França  
Viatris Saúde  
Tél: +33 (0)4 37 25 75 00

Portugal  
Viatris Healthcare, Lda.  
Tel: +351 21 412 72 00

Croácia  
Viatris Hrvatska d.o.o.  
Tel: + 385 1 23 50 599

Romênia  
BGP Products SRL  
Tel: +40 372 579 000

Irlanda  
Viatris Limited  
Tel: +353 1 8711600

Eslovênia  
Viatris d.o.o.  
Tel: +386 1 236 31 80

Islândia  
Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

República Eslovaca republika  
Viatri Eslováquia s.r.o.  
Tel: +421 2 32 199 100

Itália  
Viatri Pharma S.r.l.  
Tel: +39 02 612 46921  
Suomi/Finlândia

Viatri Oy  
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος  
GPA Pharmaceuticals Ltd  
Τηλ: +357 22863100

Suécia  
Viatri AB  
Tel: +46 (0)8 630 19 00

Letônia  
Viatri SIA  
Tel: +371 676 055 80

Reino Unido (Irlanda do Norte)  
Mylan IRE Healthcare Limited  
Tel: +353 18711600

Este folheto é para o última aprovado em {MM/AAAA}.

Mais informações sobre este medicamento é disponível no site do Europeu  
Agência de Medicamentos: <http://www.ema.europa.eu>.