

Prospect: informații pentru utilizator Lyrica 25 mg
capsule tari, Lyrica 50 mg
capsule tari, Lyrica 75 mg
capsule tari, Lyrica 100 mg
capsule tari, Lyrica 150 mg
capsule tari capsule,
Lyrica 200 mg tari capsule,
Lyrica 225 mg tari capsule,
Lyrica 300 mg tari capsule
pregabalină

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a acest medicament utiliza utilizați deoarece există se află importantă informații în pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. Poate aveți nevoie de el mai târziu din nou ..
- dumneavoastră tu încă întrebări? Luați legătura cu medicul dumneavoastră sau farmacistul.
- Nu dați acest medicament nu mai departe altora , deoarece estedoar pentru dumneavoastră prescris prescris Acest poate dăunător fi pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră. Dacă
- aveți probleme cu unul dintre efectele secundare menționate în moarte în rubrică 4 sunt? Sau aveți dumneavoastră un efect secundar care nu în acest prospect este? Contactați atunci medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Conținut de acest prospect

1. Ce este Lyrica și pentru ce se acest medicament utilizat?
2. Când nu trebuie să acest medicament nu utilizați sau trebuie să aveți grijă atenție cu fiți?
3. Cum utilizați dumneavoastră acest medicament?
4. Posibile efecte secundare
5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?
6. Conținutul al ambalaj și alte informații

1. Ce este Lyrica și pentru ce se acest medicament utilizat?

Lyrica face parte din grupul de medicamente utilizate pentru de tratamentul al epilepsiei, neuropatiei durere și tulburare anxioasă generalizată (GAD) la adulți.

Periferică și centrală neuropatie durere: Lyrica este utilizat în de tratamentul al durerilor persistente care sunt cauzate de leziuni ale nervilor. Diverse boli precum diabetul sau zona zoster (zona) pot periferice neuropatice durere provoca. Percepțiile durerii pot fi descrise ca fierbinte, arzător, palpitant, fulgerător, înțepător, ascuțit, crampe, durere, furnicături, amorțit, adormit. Periferică și centrală neuropatică durere poate de asemenea însoțit merge cu schimbări de dispoziție, tulburări de somn, oboseală și poate influența avea asupra funcționării fizice și sociale și a totală calitate a vieții.

Epilepsie: Lyrica este utilizat în tratamentul anumitor forme de epilepsie la adulți (

adulți (parțiale crize cu sau fără secundare generalizate crize). Medicul dumneavoastră vă va prescrie Lyrica pentru susținerea tratamentului epilepsiei dumneavoastră epilepsiei epilepsie, dacă dumneavoastră actuale medicamente dumneavoastră stare nu sub control țin. Trebuie să Lyrica pe lângă dumneavoastră actual tratament luați. Lyrica este nu destinat să doar a fi utilizat , darta trebuie întotdeauna a fi utilizat în combinație cu alte anti-epileptice(medicament medicamente utilizat în epilepsie).

Generalizată tulburare de anxietate: Lyrica este utilizat în tratamentul tulburării de anxietate generalizată (GAD). Simptomele tulburării de GAD sunt de lungă durată en excesivă anxietate și îngrijorare care sunt greu de controlat . GAD poate de asemenea neliniște sau un sentiment de tensiune sau iritabilitate cauza , sau, sau poate asigura că te tu te simți obosit , te concentrezi cu greu poți concentra, te amintești nimic nu poți aminti sau iritabil sunteți, sau poate tensiune musculară sau tulburări de somn cauza. Acest lucru nu are nimic de a face cu stresul și tensiunea din viața cotidiană.

2. Când puteți acest lucru medicament nu utilizați sau trebuie să fiți extra precaut cu fiți?

Când nu trebuie să acest medicament nu utilizați?

Sunteți alergic la un dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe puteți să găsiți în rubrica 6.

Când trebuie să fiți precaut fiți cu acest medicament?

Contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul înainte de a lua acest medicament ..

un număr de pacienți care utilizează Lyrica utilizează utilizare, sunt simptome raportate care indică o o alergică reacție. Aceste simptome includ umflarea feței feței, buzelor, limbii en gât dar de asemenea erupție cutanată răspândită . Dvs. trebuie imediat contact luați cu medicul dumneavoastră dacă una dintre aceste reacții la dvs. u apare.

În legătură cu utilizarea a pregabalinei s-a raportat despre de reacții cutanate grave (reacții adverse la piele), cum acesta sindromul Stevens-Johnson și necroliza epidermică toxică. Opriti utilizarea de pregabalin și solicitați imediat ajutor medical dacă ca tu un dintre cele din rubrica 4 descrise simptome în legătură cu aceste grave reacții cutanate observați.

- În timpul utilizării de Lyrica sunt amețeli și somnolență apărut, ceea ce poate apariția accidentelor (căderi) la pacienții vârstnici poate crește . Fiți de aceea precauți până când până când u obișnuit sunteți cu efectul pe care acest medicament ar putea avea.
- Lyrica poate vedere neclară sau pierderea vederii vizuale de alte schimbări ale câmpului vizual cauza, dintre care cele mai multe temporare sunt. Trebuie să îl imediat la medicul dumneavoastră spuneți dacă dumneavoastră schimbări ale dumneavoastră vederii observați.
- La anumite pacienți cu diabet care greutate cresc în timpul tratamentului cu pregabalin poate fi un ajustare a lor medicația pentru diabet necesară fi.
- Anumite efecte secundare precum somnolență pot mai frecvent apărea, deoarece pacienții cu leziuni ale măduvei spinării alte medicamente pot utiliza om de exemplu durere sau spasticitate a trata. Aceste medicamente au aceleași efecte secundare ca pregabalin și de Gravitatea acestor efecte secundare poate fi crescută în cazul utilizării simultane.

- Există la unii pacienți în timpul utilizării medicamentului utilizării de Lyrica raportări au fost de insuficiență cardiacă; de obicei au fost acestea pacienți vârstnici cu boli de inimă și afecțiuni vasculare afecțiuni oculare. dumneavoastră începeți să luați medicamentul de acest medicament trebuie să dumneavoastră medic informați dacă ați avut în trecut probleme ați avut cu o afecțiune cardiacă.
- Există sunt la unii pacienți în timpul utilizării utilizării de Lyrica au fost raportate cazuri de insuficiență renală. Dacă observați în timpul utilizării utilizării de Lyrica observați că urinați mai puțin urinare, trebuie să informați medicul dumneavoastră despre deoarece acest lucru poate îmbunătăți prin oprirea medicamentului . opri.
- Unii pacienți care tratat au fost cu anti-epileptice precum Lyrica, au avut gânduri despre auto-vătămare sau sinucidere sau au manifestat comportament suicidar . Dacă la vreunmoment enig moment asemenea gânduri are sau un astfel de comportament manifestă, contactați imediat medicul dumneavoastră. medic.
- Când Lyrica este administrat cu alte medicamente care constipație pot cauza (cum ar fi unele tipuri de analgezice), este posibil ca probleme gastrointestinale să apară (de ex.. constipație, blocaj sau paralizie intestinală). Spuneți al medicului dumneavoastră dacă aveți constipație are, mai ales dacă sunteți sensibil la această problemă .
- Spuneți al dumneavoastră medicul înainte de dumneavoastră începeți cu utilizarea acestui acest medicament dacă dumneavoastră vreodată abuz ați făcut sau dependent ați fost de alcool, medicamente pe prescripție sau ilegale droguri; acest poate însemna că dumneavoastră un risc mai mare aveți să dependenți deveniți a fi de Lyrica.
- Au fost cazuri de convulsii /crize(convulsii)raportate în timpul utilizării Lyrica sau curând după utilizarea na al opriți cu Lyrica. Contactați imediat medicul dumneavoastră dacă apare o convulsie . Au fost raportate cazuri.
- funcție cerebrală redusă (encefalopatie scăzută funcția creierului (encefalopatie) raportat la un număr de pacienți care au utilizat Lyrica utilizau. Acești pacienți aveau de asemenea alte afecțiuni. Informați pe medicul dumneavoastră dacă dumneavoastră în trecut ați avut probleme cu de afecțiuni grave, cum ar fi de exemplu boli de ficat sau rinichi.
- Au fost raportări despre de dificultăți de respirație. Dacă aveți aveți de
- afecțiuni ale sistemului nervos, afecțiuni ale sistemului respirator, insuficiență renală sau dacă dumneavoastră mai în vârstă sunteți mai în vârstă de 65 ani, poate medicul dumneavoastră medicul dumneavoastră un altul schema de dozare prescrie. Luați legătura cu dumneavoastră medicul dacă aveți dificultăți cu respirația sau o respirație superficială aveți.

Dependență

Unii oameni pot de Lyrica dependent deveni (un nevoie de a medicamentul continua să ia). Ei pot simptome de sevraj avea când ei opresc medicamentul utilizarea Lyrica (vezi rubrica 3, „Cum utilizați dumneavoastră acest medicament?” și „Dacă opriți utilizarea utilizarea acestui acest medicament”). Dacă vă er îngrijorări cu privire la faceți că de Lyrica dependent puteți deveni, este important că dumneavoastră medicul dumneavoastră consultați.

Dacă un dintre următorul simptome observați în timpul al administrării de Lyrica, poate acesta un semn fi că dumneavoastră dependent ați devenit:

- Trebuie să medicamentul medicament mai mult timp a lua decât recomandat de dumneavoastră prescriptor

- Aveți senzația că simțiți că trebuie mai mult să luați decât doza recomandată doză
- U utilizați al medicamentul pentru alte motive decât prescris
- U ați repetate, nereușite încercări de a renunța la cu sau control a obține asupra utilizarea medicamentului medicament
- Când dumneavoastră opriți administrarea medicamentului vă simțiți nu bine nu bine bine, în dumneavoastră vă simțiți mai bine de îndată ce luați din nou medicamentul din nou luați

Dacă unul dintre aceste simptome observați, contactați medicul dumneavoastră pentru a cel mai bun plan de tratament pentru dumneavoastră a discuta, inclusiv când este un moment potrivit pentru a opri și cum să faceți acest lucru pe un mod sigură mod trebuie face.

Copii și tineri până la 18 ani

Siguranța siguranța și eficacitatea la copii și tineri (până la vârsta de 18 ani) nu sunt nu stabilite. Lyrica nu trebuie de aceea să fie administrat la acest grup de vârstă grupă de vârstă.

dumneavoastră alte medicamente sau produse farmaceutice?

Folosiți dumneavoastră pe lângă Lyrica încă alte medicamente, ați dumneavoastră asta recent făcut sau există posibilitatea de posibilitate asta în apropiatul viitor alte medicamente veți utiliza? Informați pe atunci medicul dumneavoastră sau farmacistul. Acest lucru se aplică de asemenea pentru medicamente la care u niciun prescripție pentru necesar are.

Lyrica și anumite alte medicamente pot influența reciproc (interacțiune). La administrare cu anumite alte medicamente care un efect sedativ au (inclusiv opioide), poate Lyrica aceste efecte amplifică, ceea ce poate duce până la stop respirator, comă și deces. Amețeli, somnolență și scăderea concentrării pot să se agraveze dacă Lyrica este administrat împreună cu medicamente administrat care:

- oxycodon (utilizat ca analgezic)
- lorazepam (utilizat în tratamentul anxietății) sau alcool
- conțin ..

poate simultan cu cu orale contraceptive sunt utilizate.

La ce trebuie să fiți atenți cu mâncare, băuturi și alcool?

Capsulele Lyrica pot cu sau fără alimente fi administrate.

Se recomandă să nu consumați alcool în timpul utilizării medicamentului Lyrica. Sarcina

și alăptarea Lyrica nu trebuie

utilizat în timpul sarcinii sarcină de în timpul al alăptării fie utilizat, decât dacă medicul dumneavoastră consideră altfel . Utilizarepregabalinei în timpul primelor pregabalina luni de sarcină 3 luni de sarcină poate defecte congenitale cauza la copilul nenăscut pentru care un tratament medical necesar este. Din un studiu în care datele au fost evaluate de la femeii din Nord-Europene țări care în timpul primelor 3 3 de sarcină au luat pregabalin au luat, părea că 6 din 100 de bebeluși asemenea malformații congenitale prezentau. La femeile care în timpul studiului nu au fost tratate cu pregabalin au fost tratate, erau că 4 din 100 bebeluși. Malformații ale feței (buză despicată , maxilar și/de palat), ochii, sistemul nervos (inclusiv de creierul), rinichii și organele genitale au fost raportate.

Femeile care pot rămâne gravide ,trebuie să utilizeze contracepție eficientă utilizare. Sunteți însărcinată, credeți că sunteți însărcinată să fiți, doriți să rămâneți însărcinată sau alăptați ? Luați legătura cu mediculdumnevoastră sau cu farmacistul înainte de a farmacist înainte de u acest medicament utilizat.

Aptitudinea de a conduce și utilizarea utilizarea de utilaje

Utilizarea utilizarea Lyrica poate duce la amețelă, somnolență și scăzută concentrație. Nu trebuie să vehicule conduceți, mașini operați sau alte activități riscante efectuați, până când este clar dacă acest medicament vă capacitatea de menționate mai sus sarcini a efectua , fienu afectează ..

conține lactoză monohidrat Consultați

dumnevoastră medicul înainte să acest acest medicament administrați, dacă medicul dumnevoastră v-a spus a că nu anumite zaharuri nu puteți tolera.

Lyrica conține sodiu

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per capsulă tare, ceea ce înseamnă că este în esență ' fără sodiu' este.Cum

3. utilizați dumnevoastră acest medicament ??

Utilizați acest medicament întotdeauna exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul dumnevoastră v-a spus .. îndoieli cu privire la utilizarea corectă ? Contactați medicul dumnevoastră dumnevoastră medicul sau farmacistul. Luați nu mai mult din medicament decât v-a fost prescris prescris.

dumnevoastră va determina care doză este pentru u adecvat este.

Lyrica este exclusiv destinat pentru oral utilizare.

Periferică și centrală neuropatică durere, epilepsie sau generalizată tulburare de anxietate:

- Luați numărul de capsule care de medicul dumnevoastră a fost prescris.
- Doza este ajustată pentru dumnevoastră și afecțiunea dumnevoastră și boala dumnevoastră și va în general fi între 150 și 600 mg pe zi.
- Medicul dumnevoastră va vă spune că dumnevoastră fie de două ori fie de trei ori pe zi Lyrica trebuie să luați. Pentru de două ori pe zi luați Lyrica o dată dimineața și o dată seara 's seara în, fiecare zi la aproximativ aceeași oră. Pentru de trei ori pe zi luați Lyrica o dată dimineața ,o dată la prânz prânzuri în o dată 's seara în, fiecare zi la aproximativ aceeași oră.

Dacă aveți impresia că efectul medicamentului Lyrica este prea puternic sau a slab este, ușor decât dumnevoastră medic sau farmacist în.

Dacă sunteți un vârstnic pacient sunteți (mai în vârstă de 65 ani), trebuie să luați Lyrica în obișnuita doză în luați, cu excepția dacă aveți probleme cu rinichii dumnevoastră ..

posibil că dumnevoastră dumnevoastră medicul un alt schema de dozare și/sau altă dozare prescrie dacă aveți probleme renale ..

Întreagă cu apă. Luați Lyrica până când

Luați Lyrica până când dumneavoastră medicul dumneavoastră vă spune că puteți opri tratamentul.

Ați utilizat prea mult din acest medicament ? Contactați medicul dumneavoastră sau mergeți la cea mai apropiată Primul Serviciu de Urgență al unui spital. Luați cutia cutie puteți simți somnoros ,confuz ,neliniștit sau de neliniștit simți după ce u prea mult Lyrica ați luat. Epileptice convulsii și inconștiență (comă) sunt de asemenea raportate.

Ați uitat acest medicament a utiliza?

Este important să vă capsulele Lyrica fiecare zi regulat la aceeași oră în a lua. Dacă ați uitat o doză să luați , faceți acest lucru cât mai curând posibil când vă amintiți , cu excepția cazului în care este al timp este pentru dumneavoastră următoarea doză. În acel caz luați dumneavoastră pur și simplu următoarea doză în. Luați nu dublă doză pentru a un uitat doză în a recupera.

Dacă opriți utilizarea medicamentului utilizarea acestui medicament
Nu opriți brusc administrarea Lyrica. Dacă doriți de Lyrica. Dacă doriți opriți cu administrarea de Lyrica, discutați acest lucru mai întâi cu medicul dumneavoastră. El sau ea vă va spune cum să faceți acest lucru. Dacă a face. Dacă tratamentul dumneavoastră este întrerupt, trebuie să se facă pe o perioadă de cel puțin 1 săptămână. Trebuie să știți că există la u anumite efecte secundare, așa-numitele simptome de sevraj, pot apărea după oprirea tratamentului cu un scurt- sau tratament pe termen lung cu Lyrica. Aceste efecte secundare consta din: insomnie, dureri de cap, greață, a se simți anxios, diaree, simptome asemănătoare gripei ,convulsii convulsii (convulsii), nervozitate, depresie, gânduri de auto-vătămare sau sinucidere, durere, transpirație și amețeală. Aceste efecte secundare pot apărea mai frecvent sau mai severe deveni dacă ați luat Lyrica pentru o perioadă mai lungă de timp .Dacă aveți simptome de sevraj ,, trebuie să contactați medicul dumneavoastră. Aveți alte

Întrebări despre utilizarea acestui medicament ? Contactați medicul dumneavoastră sau un specialist pentru informații suplimentare. farmacist.

4. Posibile efecte secundare

Ca orice medicament poate de asemenea acest medicament efecte secundare avea, deși nu toată lumea se confruntă cu acestea ..

Efecte secundare care foarte frecvent, la mai mult de 1 din 10 persoane, apar

- amețeli, somnolență, dureri de cap

Efecte secundare care frecvent, la mai puțin de 1 din 10 persoane, apare

- apetit crescut
- senzație de euforie, confuzie, dezorientare (dezorientare), scăderea interesului
- sexual, iritabilitate
- tulburări de atenție, stângăcie, tulburări de memorie, pierdere de memorie, necontrolate tremurături sau tremur, tulburări de vorbire, senzație de furnicături ,amorțeală amorțeală,

- oboseală/ somnolență (sedare), letargie (letargie), insomnie, oboseală, te simți anormal vedere
- neclară vedere, dublu vedere
- amețeață, probleme cu echilibrul, căderi
- gură uscată ,constipație ,vărsături ,flatulență flatulențădiaree diaree, greață, balonat abdomen
- probleme de erecție
- umflare a corpului inclusiv a membre
- un senzație de amețeață a avea ,mod anormal de de la mers
- creștere în greutate
- crampe musculare, durere în articulații, dureri de spate, durere în membre (brațe și/sau picioare)
- dureroase gât

Efecte secundare care uneori, la mai puțin de 1 din 100 persoane, apar

- pierderea apetitului ,scădere în greutate pierdere în greutate scăderea glicemiei scăderea glicemiei creșterea glicemiei creșterea glicemiei
- schimbat conștientizare de sine, neliniște, depresie, agitație, schimbări de dispoziție, dificil de cuvinte a putea găsi, halucinații, anormale vise, atacuri de panică, indiferență, agresivitate, euforie veselie declin mental declin probleme cu gândirea ,crescută crescut sexuală interes, probleme cu sexual funcționarea inclusiv la dificultatea de a atinge o climax sexuală , ejaculare întârziată (ejaculare)
- schimbări în vedere, mișcări oculare neobișnuite, schimbări în vedere inclusiv vedere de tunel (câmp vizual limitat), flash-uri de lumină fulgere luminoase mișcări spastice
- mișcări, scăzut reflexe, hiperactivitate, amețit a deveni la ridicare, piele sensibilă ,pierderea gustului pierdere a gustului senzație de arsură , tremurături, tremurături la mișcare, scăderea conștientiei, pierdere a conștientiei, leșin, sensibilitate crescută la zgomot, nu se simte bine simți
- uscate ochi, umflați ochi, durere oculară, slabi ochi, apoși ochi, iritați ochi
- aritmii cardiace, accelerat puls, scăzută tensiune arterială, ridicată tensiune arterială, modificări în puls, funcționare redusă a inimii înroșire
- ,bufeuri dificilăți de respirație
- dificultăți de respirație, uscat nas, înfundat nas
- creșterea producției de salivă, arsuri stomacale, amorțeață în jurul gurii transpirație
- transpirație erupție cutanată erupție cutanată rece rece frisoane, febră
- spasme musculare, umflături articulare, rigiditate musculară, durere inclusiv dureri musculare, durere în gât
- durere în piept
- dificil sau durere urinare, incontinență
- slăbiciune, sete, senzație de apăsare pe piept
- modificări în sânge- și rezultatele testelor hepatice (creștere de creatin fosfokinază, alanin aminotransferază în aspartat-aminotransferază în sânge, reducere de la număr trombocite în sânge, deficit la alb corpusculi sanguini care se manifestă în sensibilitate crescută la infecții (neutropenie), mai mult creatinină în sânge, mai puțin potasiu în sânge)
- hipersensibilitate, umflat față, mâncărime, erupție cutanată cu mâncărime intensă și formare de umflături
- (urticarie), rinoree ,epistaxis ,tuse tuse, sforăit

- dureroase menstruații
- mâini reci și picioare

Efecte secundare care rareori, la mai puțin de 1 din 1.000 persoane, apar

- simț olfactiv anormal, mișcare a vederii de îndată ce capul este mișcat ,schimbare în
- percepția adâncimii , străluciri, pierdere a vederii pierdere de la vedere
- dilatarea a pupilelor, strabism privire
- transpirație rece, senzație în gât, limbă umflată inflamație
- a pancreasului probleme
- cu înghițirea înghițire
- lent sau scăzut mișcare corpului corp
- probleme cu scriere
- retenție de lichide în (sub)abdomen
- retenție de lichide în plămâni
- convulsii/spasme (convulsii)
- modificări în ECG (electrocardiogramă) care corespund cu perturbări ale
- ritmului cardiac
- deteriorarea mușchiului
- secreție spontană din sân ,anormală anormal creșterea sânilor, formarea sânilor la bărbați
- model menstrual perturbat model de menstruație menstruații neregulate menstruații funcționare redusă
- scăzută rinichilor dumneavoastră (insuficiență renală),funcționare redusă), scăzută excreție de urină, nu
- a putea urina (retenție urinară scădere
- a numărului de globule albe comportament
- inadecvat ,comportament suicidar comportament suicidar gânduri suicidare alergic
- alergic reacții, inclusiv posibil: dificultate de respirație a ,ochi inflamați (keratită) și reacții severe ale pielii cu ca caracteristici: roșiatic, ne-elevat, în formă de disc sau circular pete pe trunchi, adesea cu vezicule în mijlocul acestora, descumare, ulcere în și în jurul de gură, gât, nas sau pe de organele genitale și ochi; acestea erupții cutanate severe sunt posibil posibil precedat de febră și simptome asemănătoare gripei (sindromul Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică).
- icter (îngălbenirea pielii și ochilor ochi)
- parkinsonism, care sunt simptome care seamănă cu boala Parkinson seamănă, cum ar fi tremurat, dificultate a avea cu mișcare (bradikinezie) în rigide mușchi

Efecte secundare care foarte rar, la mai puțin de 1 din 10.000 persoane, apare

- insuficiență hepatică
- hepatită (inflamație a ficatului).

Necunoscut cunoscut: frecvență poate cu disponibile date nu poate fi determinată

- În funcție de Lyrica ('dependență de medicament').

Trebuie să știți că există la u anumite efecte secundare, așa-numitele simptome de sevraj, pot apărea după întreruperea tratamentului cu un scurt- sau tratament pe termen lung cu Lyrica (vezi „Dacă opriți cu utilizarea acestui medicament”). Trebuie să

căutați imediat sfat medical dacă observați că limba dumneavoastră sau gura se umflă față începe să se umfle sau dacă pielea devine roșie devine și apar bășici sau descumare începe să apară a apărea.

Anumite efecte secundare cum ar fi somnolența pot apărea mai frecvent, deoarece pacienții cu leziuni ale măduvei spinării alte medicamente pot utiliza pentru de exemplu durere de spasticitate a trata. Aceste medicamente au aceleași efecte secundare ca pregabalin și gravitatea gravitatea acestor aceste efecte secundare poate crescută sunt la simultan utilizare.

Următoarea reacție adversă a fost raportată după acest medicament pe piață a fost introdus :: la cu respirație, superficială respirație.

Raportarea efectelor adverse Dacă

aveți efecte adverse, contactați medicul sau farmacistul. Acest lucru se aplică și pentru posibile efecte secundare care nu în acest prospect sunt. Puteți raporta efectele secundare de asemenea direct prin sistemul național de raportare așa cum este menționat anexă V. Prin efecte secundare a raporta, puteți să ne ajutați să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament . acest medicament.

5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?

A se păstra vederea și accesul al copiilor ferit.

Nu utilizați acest medicament după data de de ultimă data de expirare. Aceasta găsiți pe cutie sau pe sticlă după EXP. Acolo este o lună și un an. Ultima zi a din lună este data de expirare.

Pentru acest medicament nu există condiții speciale de păstrare.

Nu aruncați medicamentele în chiuvetă chiuvetă sau în toaletă și aruncați le nu în coșul de gunoi. Întrebați farmacistul dumneavoastră ce să faceți cu medicamentele trebuie să faceți pe care nu mai utilizați. Dacă medicamente pe corectă mod eliminați sunt ele în un responsabilă mod distruse și ajung ele nu în mediu ..

6. al de la ambalaj și alte informații

Ce substanțe sunt în acest medicament?

Substanța activă în acest medicament este pregabalină pregabalină Fiecare capsulă tare conține 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg sau 300 mg pregabalină.

Cele alte substanțe din acest medicament sunt: lactoză monohidrat, amidon de porumb, talc, gelatină, dioxid de titan (E171), lauril sulfat de sodiu, anhidru coloidal dioxid de siliciu, negru cerneală (care șelac, oxid de fier negru (E172), propilenglicol și hidroxid de potasiu conține) en apă.

De 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg en 300 mg capsule conțin de asemenea roșu oxid de fier (E172).

Cum arată Lyrica și cât este în un ambalaj ??

- capsule de 25 mg** Albe dure capsule, cu inscripție „VTRS” pe partea superioară a și „PGN 25” pe partea inferioară a capsulei
- capsule de 50 mg** Albe dure capsule, cu inscripție „VTRS” pe partea superioară parte și „PGN 50” pe inferior parte a capsulei. Partea inferior parte a capsulei este marcată cu un neagră bandă
- 75 mg capsule** Alb-portocaliu dure capsule, cu inscripție „VTRS” pe partea superioară a și „PGN 75” pe partea inferioară a capsulei
- capsule de 100 mg** Portocaliu capsule tari , cu inscripție „VTRS” pe partea superioară a și „PGN 100” pe partea inferioară parte a capsulei
- 150 mg capsule** Alb dure capsule, cu inscripție „VTRS” pe partea superioară parte și „PGN 150” pe partea inferioară parte a capsulei
- 200 mg capsule** Ușor portocaliu dure capsule, cu inscripție „VTRS” pe partea superioară a și „PGN 200” pe partea inferioară a capsulei
- capsule de 225 mg** Alb-portocaliu deschis capsule dure , cu inscripție „VTRS” pe partea superioară a „PGN 225” pe partea inferioară a capsulei
- capsule de 300 mg** Alb-portocaliu capsule tari , cu inscripție „VTRS” pe partea superioară a și „PGN 300” pe partea inferioară a capsulei

Lyrica este disponibil în opt dimensiuni de ambalaj fabricat din PVC cu folie de aluminiu pe partea dorsală: ambalaj de 14 capsule cu 1 blister bandă blisterun ambalaj de 21 capsule cu 21 capsule cu 1 blister, un ambalaj de 56 capsule cu 4 blistere, un ambalaj de 70 capsule cu 5 blistere, un ambalaj de 84 capsule cu 4 blistere, un ambalaj de 100 capsule cu 10 benzi blister, un ambalaj de 112 capsule cu 8 benzi blister și un blister perforat ambalaj unitar de 100 x 1 capsule.

Lyrica este de asemenea disponibil în un flacon HDPE cu 200 capsule pentru de 25 mg, 75 mg, 150 mg în 300 mg concentrații.

Nu toate menționate dimensiuni de ambalaj sunt pe piață disponibile.

Deținător al autorizației pentru punerea pe piață aducere și producător

Deținător al autorizației pentru punerea pe piață aducere:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle pe râul IJssel, Olanda.

Producător:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Mooswaldallee 1, 79108 Freiburg im Breisgau, Germania.

sau

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom 2900, Ungaria.

sau

MEDIS INTERNATIONAL a.s., výrobní závod Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Cehia.

Luați pentru toate informațiile despre acest medicament contactați reprezentantul local al deținătorului de la autorizație pentru introducerea pe piață ::

/Belgia/Belgia Viatris

Tel

/Tel: +32 (0)2 658 61 00 Lituania

Viatris

UAB Tel: +370 52051288

Bulgaria

Mylan

EOOD SRL

Тел.: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Viatris

Tél/Tel: +32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Viatris CZ s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Viatris Healthcare Kft.

Tel.: + 36 1 465 2100

Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Limited

Tel: (+356) 21 220 174

Deutschland

Viatris Healthcare GmbH

Tel: +49 (0)800 0700 800

Nederland

Mylan Healthcare BV

Tel: +31 (0)20 426 3300

Eesti

Viatris OÜ

Tel: +372 6363 052

Norge

Viatri AS

Tlf: +47 66 75 33 00

Ελλάδα

Viatri Hellas Ltd

Τηλ: +30 2100 100 002

Österreich

Viatri Austria GmbH

Tel: +43 1 86390

España

Viatri Pharmaceuticals, S.L.

Tel: +34 900 102 712

Polska

Viatri Healthcare Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 546 64 00

Franța

Viatri Sănătate

Tél: +33 (0)4 37 25 75 00

Portugalia

Viatri Healthcare, Lda.

Tel: +351 21 412 72 00

Croația

Viatri Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL

Tel: +40 372 579 000

Irlanda

Viatri Limited

Tel: +353 1 8711600

Slovenija

Viatri d.o.o.

Tel: +386 1 236 31 80

Ísland

Icepharma hf.
Sími: +354 540 8000

Slovenská republika
Viatrix Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 32 199 100

Italia
Viatrix Pharma S.r.l.
Tel: +39 02 612 46921
Suomi/Finland

Viatrix Oy
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος
GPA Pharmaceuticals Ltd
Τηλ: +357 22863100

Sverige
Viatrix AB
Tel: +46 (0)8 630 19 00

Latvija
Viatrix SIA
Tel: +371 676 055 80

Regatul Unit (Irlanda de Nord)
Mylan IRE Healthcare Limited
Tel: +353 18711600

Acest prospect este pentru ultima dată aprobat în {LL/AAAA}.

Mai multe informații despre acest medicament este disponibilă pe site-ul web al European Agenția Europeană pentru Medicamente: <http://www.ema.europa.eu>.