

Bipacksedel: information för användaren Lyrica 25 mg
hårda kapslar, Lyrica 50 mg
hårda kapslar, Lyrica 75 mg
hårda kapslar, Lyrica 100 mg
hårda kapslar, Lyrica 150 mg
hårda hårda kapslar,
Lyrica 200 mg hårda kapslar,
Lyrica 225 mg hårda kapslar,
Lyrica 300 mg hårda kapslar
pregabalin

Läs noggrant hela bipacksedeln innan du detta läkemedel tar använda för det står viktig information i för dig.

- Spara denna bipacksedel. Kanske behöver du den senare igen behövs.
- Har du ännu frågor? Kontakta då din läkare eller apotekare.
- Ge detta läkemedel inte vidare till andra, eftersom det är endast till dig förskrivet. Det kan skadligt vara för andra, även om de har samma besvär som du.
- Får du besvär av en av de biverkningar som i rubrik 4 står? Eller får du en biverkning som inte i denna bipacksedel står? Kontakta då din läkare eller apotekare.

Innehåll av denna bipacksedel

1. Vad är Lyrica och vad används detta läkemedel för?
2. När får du detta läkemedel inte använda eller måste du vara extra försiktig med vara?
3. Hur använder du detta läkemedel?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar du detta läkemedel?
6. Innehåll av förpackning och övrig information

1. Vad är Lyrica och vad används denna medicin för?

Lyrica tillhör gruppen av läkemedel används för för de behandling av epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom (GAD) hos vuxna.

Perifer och central neuropatisk smärta: Lyrica används vid behandling av långvariga smärtor som orsakas av skador på nerverna . Olika sjukdomar somdiabetes eller bältros som diabetes eller bältros (bältros) kan perifera neuropatiska smärta orsaka. Smärtupplevelser kan bli beskrivna som het, brännande, pulserande, skjutande, stickande, skarp, kramp, smärtsam, pirrande, domnad, sovande. Perifer och central neuropatisk smärta kan också förenad gå med humörsvängningar, sömnstörningar, trötthet och kan påverka den fysiska och sociala funktionen och den de totala kvalitet av livet.

Epilepsi: Lyrica används vid behandling av vissa former av epilepsi hos vuxna (vuxna (partiella anfall med eller utan sekundär generaliserade anfall). Din läkare kommer att förskriva Lyrica till dig som stöd för behandling av din epilepsi, om din nuvarande läkemedel din tillstånd inte under kontroll hålla. Du måste Lyrica utöver din nuvarande behandling ta. Lyrica är

inte avsedd för endast att användas , men måste alltid användas i kombination med andra anti-epileptika (läkemedel (läkemedel används vid epilepsi).

Generaliserat ångestsyndrom: Lyrica används vid behandling av generaliserat ångestsyndrom (GAD). Symtomen på GAD är långvariga är långvarig och överdriven ångest och oro som svårt kontrollerbar är. GAD kan också rastlöshet eller en känsla av spänning eller irritation orsaka, eller kan orsaka att du känner dig du snabbt trött , du har svårt att koncentrera dig , du intelängre kan komma ihåg eller lättirriterad av lättretlig böjd, eller kan muskelspänning eller sömnstörningar orsaka. Detta har inget att göra med stressen och spänningen i det dagliga livet.

2. När får du detta medel inte använda eller måste du vara extra försiktig med vara?

När får du detta medel inte använda?

Du är allergisk mot en av ämnena i detta läkemedel. Dessa ämnen kan du hitta i avsnitt 6.

När bör du vara extra försiktig är med detta läkemedel?

Kontakta din läkare eller apotekare innan du detta läkemedel tar.

Hos ett antal patienter som använder Lyrica använder, är symtom rapporterade som indikerar en allergisk reaktion. Dessa symtom omfattar svullnad i ansiktet, läppar, tunga en hals men också spridd hudutslag. Du måste omedelbart kontakt ta med din läkare om en av dessa reaktioner hos u inträffar.

I samband med användning av pregabalin har rapporterats om från allvarliga kutana biverkningar (biverkningar på huden), såsom det syndromet Stevens-Johnsons och toxisk epidermal nekrolys. Sluta med användning av pregabalin och sök omedelbart medicinsk hjälp om du en av de i avsnitt 4 beskrivna symtom i samband med dessa allvarliga hudreaktioner märker.

- Vid användning av Lyrica är yrsel och sömnlighet inträffat, vilket det inträffande av olyckor (fall) hos äldre patienter kan öka. Var därför försiktig tills du van är vid effekten som detta läkemedel skulle kunna ha.
- Lyrica kan suddig syn eller förlust av synförmågan av andra förändringar av synfältet orsaka, varav de flesta tillfälliga är. Du måste det omedelbart till din läkare berätta om du förändringar av ditt syn märker.
- Hos vissa diabetespatienter som vikt ökar under behandlingen med pregabalin kan en anpassning av deras diabetesmedicinering nödvändig vara.
- Vissa biverkningar som dåsighet kan oftare förekomma, eftersom patienter med ryggmärgsskada andra läkemedel kan använda om till exempel smärta eller spasticitet att behandla. Dessa läkemedel har samma biverkningar som pregabalin och de Allvarligheten av dessa biverkningar kan vara ökad vid samtidig användning ..
- finns hos vissa patienter under användning av läkemedlet av Lyrica rapporter varit av hjärtsvikt; vanligtvis var detta äldre patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Innan du börjar med att ta av detta läkemedel måste du din läkare informera om du tidigare har haft besvär med en hjärtsjukdom . Det.
- Det är vid vissa patienter under användning av Lyrica rapporter funnits av njursvikt. Om du under användning av Lyrica märker att du mindre plast, måste du till din läkare berätta eftersom detta kan förbättras genom att sluta med läkemedlet att sluta.

- Vissa patienter som behandlad werden med anti-epileptika såsom Lyrica, har tankar haft om självskada eller självmord eller har självmordsbeteende visat. Om du vid någon tidpunkt sådana tankar har eller sådant beteende uppvisar, kontakta omedelbart din läkare.
- När Lyrica tas tillsammans med andra läkemedel som förstoppning kan orsaka (såsom vissa typer smärtstillande), är det möjligt att mag-tarmproblem uppstår (t.ex.. förstoppningblockerad eller förlamad tarm tarm). Berätta det din läkare om du förstoppning har, särskilt om du känslig för detta problem är.
- Berätta det din läkare innan du börjar med att använda av detta läkemedel om du någonsin missbrukat har gjort eller beroende har varit av alkohol, läkemedel på recept eller illegala droger; detta kan betyda att du en större risk löper att bli beroende av bli av Lyrica.
- Det finns fall av anfall/kramper (konvulsioner) rapporterade under användning av Lyrica eller kort efter användning det stoppa med Lyrica. Kontakta omedelbart din läkare om det hos dig en krampanfall inträffar.
- Det finns fall av nedsatt hjärnfunktion (encefalopati) rapporterats hos ett antal patienter som använde Lyrica använde. Dessa patienter hade också andra tillstånd. Berätta det din läkare om du i det förflutna haft problem med allvarliga sjukdomar sjukdomarsåsom till exempel lever- eller njursjukdomar njursjukdomar.
- har funnits rapporter om av andningssvårigheter. Om du har problem med
- nervsystemsjukdomar, andningssystemsjukdomar, njurfunktionstörning eller om du är äldre än 65 år, kan din läkare ge dig en andra doseringsschema förskriva. Kontakta din läkare om du har svårt att andas eller en ytlig andning har.

Beroende

Vissa människor kan av Lyrica beroende bli (en behov att fortsätta ta läkemedlet att fortsätta ta). De kan abstinenssymtom få när de slutar med användning av Lyrica (se avsnitt 3, "Hur använder du denna medicin?" och "Om du slutar med att använda denna medicin"). Om dukänner dig är oro över gör att du av Lyrica beroende kan bli, är det viktigt att du din läkare rådgör.

Om du en av de nästa besvär märker under det intag av Lyrica, kan detta ett tecken vara att du beroende har blivit:

- Du måste läkemedlet läkemedel längre ta än rekommenderat av din förskrivare
- Du har läkemedlet känsla att du mer behöver ta än den rekommenderade dos
- Du använd det läkemedlet för andra anledningar än föreskrivet
- Du har upprepade, misslyckade försök gjort för att sluta stoppa med eller kontroll att få över användning av läkemedlet
- När du slutar med att ta av läkemedlet känner du dig inte bra, en u känner dig bättre så snart du tar läkemedlet igen intar

Om du en av dessa symtom märker, kontakta din läkare för att bästa behandlingsplan för dig att diskutera, inklusive när det en lämplig tidpunkt är att sluta och hur du detta på ett lämpligt säker sätt måste göra.

Barn och ungdomar upp till 18 år

Säkerheten och effektiviteten hos barn och ungdomar (upp till ålder ålder av 18 år) är inte fastställd. Lyrica får därför inte användas hos denna åldersgrupp åldersgrupp.

du andra läkemedel ännu andra?

Använder du förutom Lyrica andra läkemedel läkemedel har du det nyligen gjort eller finns det möjlighet att i nära framtid andra läkemedel kommer använda? Berätta det då din läkare eller apotekare. Det gäller också för läkemedel där du inte har recept för nödvändig har.

Lyrica och vissa andra läkemedel kan påverka varandra (interaktion). Vid intag med vissa andra läkemedel som en lugnande verkan har (inklusive opioider), kan

Lyrica dessa effekter förstärka, vilket kan leda till andningsstillestånd, koma och död.

Yrsel, dåsighet och minskad koncentration kan förvärras om Lyrica tillsammans med läkemedel ges till die:

- oxykodon (används som smärtstillande)
- lorazepam (används vid behandlingen av ångest) eller alkohol
- innehåller ..

kan samtidigt med med orala preventivmedel används används.

Vad bör du tänka på med mat, dryck och alkohol?

Lyrica kapslar kan med eller utan mat tas tas.

Det rekommenderas att inte alkohol dricka under användning av Lyrica. Graviditet

och amning Lyrica ska

inte användas under graviditeten graviditet av under den amning användas användas, om inte din läkare annars bedömer. Användning av pregabalin under den första 3 3 månader av graviditeten kan födelsedefekter orsaka hos det ofödda barnet för vilket en medicinsk behandling nödvändig är. Från en studie där data blev utvärderade av kvinnor från Nord-Europeiska länder som under de första 3 månaderna av graviditeten pregabalin hade tagit, blek att 6 av de 100 barn sådana födelsedefekter visade. Hos kvinnor som under studien inte med pregabalin blev behandlade ,, var att 4 av 100 bebisar. Missbildningar av ansiktet (kluven läpp, käke och/ gom), ögonen ,nervsystemet nervsystemet (inklusive de hjärnan), njurarna och könsorganen rapporterades ..

som kan bli gravida bör använda ,effektiv preventivmedel använda effektiv preventivmedel. Är du gravid, tror du gravid att vara, vill du bli gravid eller ammar du bröstmjölk ? Kontakta då din läkare eller apotekare innan innan du detta läkemedel används.

Körförmåga och den användning av maskiner

Användning av Lyrica kan leda till yrsel yrseldåsighet och och minskad koncentration. Du får inte fordon köra, maskiner använda eller andra riskfyllda aktiviteter utföra, förrän klart är om denna medicin din förmåga att ovan nämnda uppgifter utföra att utföra, oavsett inte påverkar.

Lyrica innehåller laktosmonohydrat

Rådfråga din läkare innan du detta läkemedel tar, om din läkare har sagt har att du vissa sockerarter inte kan tolerera.

Lyrica innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per hård kapsel, det betyder att det i princip 'natriumfritt' är.Hur

3. använder du detta läkemedel ??

Användning detta läkemedel alltid exakt som din läkare eller apotekare du det har sagt. Tvivlar du på den korrekta användningen? Kontakta då din läkare eller apotekare. Ta inte mer av läkemedlet än som du har fått förskrivet.

Din läkare kommer att bestämma vilken dos som u lämplig är.

Lyrica är uteslutande avsedd för oralt bruk.

Perifer och central neuropatisk smärta, epilepsi eller generaliserat ångestsyndrom:

- Ta antalet kapslar som av din läkare har ordinerats.
- Dosen är anpassad till dig och din sjukdomsbild och ska i allmänhet ligga mellan 150 150 600 mg per dag ..
- läkare ska berätta för dig att du antingen två gånger eller antingen tre gånger per dag Lyrica måste ta. För två gånger per dag tar du Lyrica en gång på morgonen och en gång på kvällen in, varje dag på ungefär samma tidpunkt. För tre gånger per dag tar du Lyrica en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen en en gång 's kväll in, varje dag på ungefär samma tidpunkt.

Om du har intrycket att att effekten av Lyrica är för stark eller att svag är, lätt än din läkare eller apotekare i.

Om du en äldre patient är (äldre än 65 år), måste du ta Lyrica i den vanliga dosen i ta, förutom om du har problem med dina njurar ..

möjligt att dina din läkare du en annan doseringsschema och/ andra dosering föreskriver om du njurproblem har.

Ta kapseln i sin helhet med vatten.

Ta Lyrica tills din läkare berättar att du kan sluta.

Har du för mycket av denna medicin använt?

Kontakta din läkare eller gå till den närmaste Första Hjälpn på ett sjukhus. Ta med din ask eller flaska med Lyrica kapslar. Du kan känna dig sömnig, förvirrad, orolig eller rastlös känna efter du för mycket Lyrica har tagit. Epileptiska anfall och medvetslöshet (koma) har också rapporterats.

Har du glömt detta läkemedel att använda?

Det är viktigt att din Lyrica kapslar varje dag regelbundet vid samma tidpunkt att ta .. Om du har glömt en dos att ta , gör detta så snart som möjligt när du kommer ihåg , förutomom det som det tid är för din nästa dos. I det fallet tar du bara nästa dos som vanligt. Ta ingen dubbel dos för att kompensera en glömt dos i att ta igen.

Om du slutar med att använda av detta läkemedel

Sluta inte plötsligt med att ta Lyrica. Om du vill sluta med att ta Lyrica, diskutera detta då först med din läkare. Han eller hon kommer att berätta hur du detta ska göra. Om din behandling

avslutas ,måste detta ske gradvis över över en period av minst 1 vecka. Du måste veta att det kan u vissa biverkningar, så kallade abstinenssymtom, kan uppstå efter att sluta med en kort- eller långtidsbehandling med Lyrica. Dessa biverkningar består av: sömnlöshet, huvudvärk, illamående, känna sig orolig, diarré, influensaliknande symptom, anfall2Fkramper (konvulsioner), nervositet, depression, tankar på självskada eller självmord, smärta, svettning och yrsel. Dessa biverkningar kan oftare förekomma eller allvarigare bli om du tar Lyrica under en längre tid har använt. Om du abstinenssymtom får, måste du kontakta ta kontakt med din läkare.

Har du andra frågor om användningen av denna medicin ? Kontakta dådin läkare eller av apotekare.

4. Möjliga biverkningar

Precis som varje läkemedel kan också detta läkemedel biverkningar ha, även om får inte alla med att göra.

Biverkningar som mycket ofta, hos mer än 1 av 10 personer, förekommer

- yrsel, sömnhighet, huvudvärk

Biverkningar som ofta, vid mindre än 1 av 10 personer, förekommer

- ökad aptit
- känsla av eufori, förvirring, desorientering (desorientering), minskad sexuell
- intresse, irritabilitet
- uppmärksamhetsstörningar, klumpighet, minnesstörning, minnesförlust, okontrollerade skakningar eller darrningar, talsvårigheter, stickande känsla, domningar, trötthet/ dåsighet (sedering), letargi (letargi), sömnlöshet, utmattning, du känner dig onormalt
- suddig syn, dubbelseende seende
- yrsel, problem med balans, fall
- torr mun, förstoppning, kräkningar, gasbildning, diarré, illamående, uppblåst mage
- erektil dysfunktion
- svullnad av kroppen inklusive de extremiteter
- en berusad känsla ha, onormalt sätt av gå
- viktökning
- muskelkramp, smärta i leder, ryggsmärta, smärta i extremiteter (armar ochöver ben)
- öm hals

Biverkningar som ibland, hos färre än 1 av 100 personer, förekommer

- förlust av aptit, viktnedgång, blodsockersänkning, blodsockerhöjning
- förändrad självmedvetenhet, rastlöshet, depression, agitation, humörförändringar, svårt att hitta ord ,hallucinationer hallucinationer, abnormala drömmar, panikattacker, likgiltighet, aggression, överdriven upprymdhet, mental försämring, problem med tänkande, ökad sexuell intresse, problem med sexuell funktion inklusive svårighet att uppnå en sexuell klimax, fördröjd utlösning (ejakulation)•
- förändringar i synen, ovanliga ögonrörelser, förändringar i synen inklusive tunnelsyn (begränsat synfält), ljusblixtar, spastiska

rörelser, minskad reflexer, hyperaktivitet, yrsel vid uppresning, känslig hud, smakförlust, smakförlustbrännande känsla, darrningar, vibrationer vid rörelse, minskat medvetande, förlust av medvetande, svimning, ökad känslighet för ljud, känner inte bra känna

- torra ögon, svullna ögon, ögonsmärta, svaga ögon, vattniga ögon, irriterade ögon
- hjärtrytmrubbningar, snabb hjärtslag, låg blodtryck, hög blodtryck, förändringar i hjärtslag, minskad funktion av hjärtat
- rodnad, vallningar
- andningssvårigheter, torr näsa, täppt näsa
- ökad salivproduktion, halsbränna, domningar runt munnen, svettas,
- hudutslag, kall, kall frossa, feber
- muskelyckningar, ledsvallnader, muskelstelhet, smärta inklusive muskelvärk, smärta i nacken
- smärta i bröstet
- svårt eller smärtsam urinera, inkontinens
- svaghet, törst, klämd känsla på bröstet
- förändringar i blod- och leverprovsresultat (ökning av kreatinfosfokinas, alaninaminotransferas och aspartat-aminotransferas i det blod, sänkning av antalet blodplättar, blodplättar i blodet, brist på vita blodkroppar, blodkroppar som sig ut i ökad känslighet för infektioner (neutropeni), mer kreatinin i blodet, mindre kalium i blodet)
- överkänslighet, svullen ansikte, klåda, hudutslag med svår klåda och bildning av
- knölar (nässelutslag), rinnande näsa, näsblod, hosta, snarkning
- smärtsamma menstruationer
- kalla händer och fötter

Biverkningar som sällan, hos färre än 1 av 1.000 personer, förekommer

- onormal luktsinne, rörelse av syn så snart huvudet rörs blir röd, förändring
- i upplevelse av djup, bländningar, förlust av synförmåga
- utvidga av pupillerna, skel se
- kall svett, andnöd i halsen, svullen tunga inflammation
- av bukspottkörteln problem
- med svälja svälja
- långsam eller minskad rörelse av kroppen
- problem med skrivning
- vätskeansamling i (under)buken
- vätskeansamling i lungorna
- anfall/kramper (kramper)
- förändringar i EKG (elektrokardiogram) som överensstämmer med störningar av
- hjärtslag
- muskelskada
- spontan utsöndring från bröstet, onormal abnormala brösttillväxt, bröstbildning hos män
- störd menstruationscykel (oregelbundna menstruationer)
- nedsatt funktion av dina njurar (njursvikt), nedsatt utsöndring av urin, inte
- kunna kissa (urinretention)
- minskning av antalet vita blodkroppar olämpligt
- beteende, självmordsbeteende, självmordsbeteendesjälvmordstankar allergisk
- allergiska reaktioner, inklusive möjligtvis: svårighet att andas, inflammatoriska ögon (keratit) och allvarliga reaktioner av huden med hud som kännetecken: rödaktiga, icke-

förhöjda, skivformade eller cirkelformade fläckar på bålen, ofta med blåsor i mitten därav, hudfjällning, sår i och runt munnen, hals, näsa eller på könsorganen och ögon; denna allvarliga hudutslag kan vara möjlig föregås av feber och influensaliknande symtom (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

- (gulning av hud och ögon)
- parkinsonism, som är symtom som vid sjukdomen Parkinsons liknar, såsom skakningar, svårigheter med rörelse (bradykinesibradykinesi) och stela muskler

Biverkningar som mycket sällan, hos färre än 1 av 10 000 personer, förekommer

- leversvikt
- hepatit (leverinflammation).

Okänd/okänd: frekvens kan med de tillgängliga uppgifterna inte fastställas/bestämmas

- Beroende av Lyrica ('läkemedelsberoende').

Du måste veta att det vid vissa biverkningar, så kallade abstinenssymtom, kan uppstå efter att sluta med en kort- eller långtidsbehandling med Lyrica (se "Om du slutar med användningen av detta läkemedel"). Du

måste omedelbart söka medicinsk rådgivning om du märker att din tunga eller tunga av ansikte börjar på att svullna eller om din hud röd blir och det blåsbildning eller fjällning börjar på att uppstå.

Vissa biverkningar såsom dåsighet kan oftare förekomma, eftersom patienter med ryggmärgsskada andra läkemedel kan använda för till exempel smärta av spasticitet att behandla. Dessa läkemedel har samma biverkningar som pregabalin och de allvarlighetsgrad av dessa biverkningar kan ökas är vid samtidig användning.

Den följande biverkning har rapporterats efter denna medicin på marknaden har släppts: svårighet med andas, ytlig andning.

Det rapportera av biverkningar

Får du besvär av biverkningar, kontakta då din läkare eller apotekare. Detta gäller också för möjliga biverkningar som inte i denna bipacksedel står. Du kan biverkningar också direkt rapportera via det nationella rapporteringssystemet såsom anges i bilaga V. Genom biverkningar att rapportera, kan du hjälpa oss få information om säkerheten för detta läkemedel. läkemedel.

5. Hur förvarar du detta läkemedel?

Förvara utom synhåll och räckhåll för barn ..

detta läkemedel inte efter mer än de sista hållbarhetsdatum. Den hittar du på lådan eller flaskan efter EXP. Där står en månad och ett år. Den sista dagen av den månad är sista utgångsdatum.

För detta läkemedel finns det inga speciella förvaringsförhållanden.

Spola läkemedel inte ner i avloppet eller toaletten och kasta dem inte i soptunnan. Fråga din apotekare vad du ska göra med läkemedel ska göra som du inte längre använder. Om du läkemedel på rätt sätt bortskaffar blir de på ett ansvarsfullt sätt förstörda och kommer de inte i miljön hamnar.

6. Innehåll av förpackning och övrig information

Vilka ämnen finns det i denna medicin?

Den aktiva substansen i denna medicin är pregabalin. Varje hård kapsel innehåller 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg eller 300 mg pregabalin.

De andra ämnena i denna medicin är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, talk, gelatin, titandioxid (E171), natriumlaurylsulfat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, svart bläck (som shellack, järnoxid svart (E172), propylenglykol och kaliumhydroxid innehåller) en vatten.

De 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg en 300 mg kapslar innehåller också röd järnoxid (E172).

Hur ser Lyrica ut och hur många finns det i en förpackning?

25 mg kapslar	Vita hårda kapslar, med tryck "VTRS" på den övre delen och "PGN 25" på den nedre delen av kapseln
50 mg kapslar	Vita hårda kapslar, med tryck "VTRS" på den övre del och "PGN 50" på nedre del av kapseln. Den nedre del av kapseln är märkt med en svart band
75 mg kapslar	Vit-orange hårda kapslar, med tryck "VTRS" på den övre delen och "PGN 75" på den nedre delen av kapseln
100 mg kapslar	Orange hårda kapslar, med tryck "VTRS" på den övre delen och "PGN 100" på den nedre del av kapseln
150 mg kapslar	Vita hårda kapslar, med tryck "VTRS" på den övre delen och "PGN 150" på den nedre delen av kapseln
200 mg kapslar	Ljus orange hårda kapslar, med tryck "VTRS" på den övre delen och "PGN 200" på den nedre delen av kapseln
225 mg kapslar	Vit-ljus orange hårda kapslar, med tryck "VTRS" på den övre delen och "PGN 225" på den nedre delen av kapseln
300 mg kapslar	Vit-orange hårda kapslar, med tryck "VTRS" på den övre delen och "PGN 300" på den nedre delen av kapseln

Lyrica är tillgänglig i åtta förpackningsstorlekar tillverkad av PVC med aluminiumfolie på baksidan :: förpackning med 14 kapslar med 1 blisterremsa blisterremsaen förpackning med 21 kapslar med av 21 kapslar med 1 blisterförpackning, en förpackning av 56 kapslar med 4 blisterförpackningar, en förpackning av 70 kapslar med 5 blisterförpackningar, en förpackning av 84 kapslar med 4 blisterförpackningar, en förpackning av 100 kapslar med 10 blisterremsor, en förpackning av 112 kapslar med 8 blisterremsor och en perforerad enhetsblisterförpackning av 100 x 1 kapslar.

Lyrica är också tillgänglig i en HDPE-flaska med 200 kapslar för de 25 mg, 75 mg, 150 mg i 300 mg styrkor.

Inte alla nämnda förpackningsstorlekar säljs i handeln ..

av tillståndet för att sälja i handeln föra och tillverkare

Innehavare av tillstånd för att släppa ut på marknaden föra:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Nederländerna.

Tillverkare:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Mooswaldallee 1, 79108 Freiburg im Breisgau, Tyskland.

eller

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom 2900, Ungern.

eller

MEDIS INTERNATIONAL a.s., výrobní závod Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Tjeckien.

Ta för all information om denna läkemedel kontakta lokala representanten för innehavaren av tillstånd för i handel sätta:

BelgienBelgiqueBelgien

Viatis

Tel/Tel: +32 (0)2 658 61 00

Litauen

Viatis UAB

Tel: +370 52051288

Bulgarien

Mylan EOOD

Tel.: +359 2 44 55 400

Luxemburg

Viatis

Tél/Tel: +32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Tjeckien republiken

Viatis CZ s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Ungern

Viatis Healthcare Kft.

Tel.: +36 1 465 2100

Danmark
Viatriis ApS
Tlf: +45 28 11 69 32

Malta
V.J. Salomone Pharma Limited
Tel: (+356) 21 220 174

Tyskland
Viatriis Healthcare GmbH
Tel: +49 (0)800 0700 800

Nederländerna
Mylan Healthcare BV
Tel: +31 (0)20 426 3300

Estland
Viatriis OÜ
Tel: +372 6363 052

Norge
Viatriis AS
Tlf: +47 66 75 33 00

Ελλάδα
Viatriis Hellas Ltd
Τηλ: +30 2100 100 002

Österreich
Viatriis Austria GmbH
Tel: +43 1 86390

España
Viatriis Pharmaceuticals, S.L.
Tel: +34 900 102 712

Polska
Viatriis Healthcare Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 546 64 00

Frankrike
Viatriis Hälsa
Tel: +33 (0)4 37 25 75 00

Portugal
Viatriis Healthcare, Lda.
Tel: +351 21 412 72 00

Kroatien
Viatri Hrvatska d.o.o.
Tel: + 385 1 23 50 599

Rumänien
BGP Products SRL
Tel: +40 372 579 000

Irland
Viatri Limited
Tel: +353 1 8711600

Slovenien
Viatri d.o.o.
Tel: +386 1 236 31 80

Island
Icepharma hf.
Telefon: +354 540 8000

Slovakien republiken
Viatri Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 32 199 100

Italien
Viatri Pharma S.r.l.
Tel: +39 02 612 46921
Suomi/Finland

Viatri Oy
Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος
GPA Pharmaceuticals Ltd
Τηλ: +357 22863100

Sverige
Viatri AB
Tel: +46 (0)8 630 19 00

Latvija
Viatri SIA
Tel: +371 676 055 80

Storbritannien (Nordirland)
Mylan IRE Healthcare Limited

Tel: +353 18711600

Denna bipacksedel är för den senast godkänd i {MM/JJJJ}.

Mer information om denna läkemedel är tillgänglig på webbplatsen för Europeiska Läkemedelsverket: <http://www.ema.europa.eu>.

Transtoyou