

Beipackzettel: Information für den Anwender
Marvelon, Tabletten
Desogestrel, Ethinylestradiol

Wichtige Dinge die Sie wissen müssen über kombinierte hormonelle Kontrazeptiva Mittel:

- Diese Mittel bilden eine der zuverlässigsten umkehrbaren Verhütungsmethoden Empfängnisverhütungsmethodensofern korrekt angewendet ..
- bieten eine etwas etwas höheres Risiko auf das Entstehen von einem Blutgerinnsel (Thrombose) in den Venen und Arterien, besonders im ersten Jahr dass Sie ein kombiniertes hormonales Verhütungsmittel verwendet oder wenn Sie nach einer Unterbrechung von 4 Wochen oder länger wieder beginnen mit der Anwendung von ein kombiniertes hormonales Kontrazeptivum.
- Achten Sie auf und kontaktieren Sie Ihren Arzt wenn Sie denken dass Sie möglicherweise Symptome von einem Blutgerinnsel hat (siehe Abschnitt 2 'Blutgerinnsel (Thrombose)').

Lesen sorgfältig die gesamte Packungsbeilage bevor Sie dieses Medikament einnehmen werden denn es steht wichtige Informationen in für Sie.

- Bewahren diese Packungsbeilage. Vielleicht benötigen Sie ihn später wieder ..
- Sie noch noch Fragen? Nehmen Sie dann Kontakt auf mit Ihrem Arzt oder Apotheker.
- Geben dieses Medikament nicht weiter an andere, da es nur für Sie verschrieben. Es kann schädlich sind für andere, auch auch haben sie dieselben Beschwerden wie Sie.
- Bekommen Sie Beschwerden von einer der Nebenwirkungen die in Abschnitt 4 stehen? Oder bekommen Sie eine Nebenwirkung die nicht in dieser Packungsbeilage steht? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

Inhalt von diese Packungsbeilage

1. Was ist Marvelon und wofür wird dieses Medikament verwendet?
2. Wann dürfen Sie dieses Medikament nicht verwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig mit sind?
3. Wie nehmen Sie dieses Medikament ein?
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie bewahren Sie dieses Medikament?
6. Inhalt der Verpackung en andere Informationen

1. Was ist Marvelon und wofür wird dieses Medikament verwendet?

Zusammensetzung und Typ Pille

Marvelon ist eine kombinierte orale Antibabypille (die 'Kombinationspille'). Jede Tablette enthält eine kleine Menge von zwei verschiedenen weiblichen Hormonen, nämlich Desogestrel (ein Hormon mit progesteronähnlicher Wirkung) und Ethinylestradiol (ein Hormon mit östrogener Wirkung). Aufgrund der geringen Menge Hormone, wird Marvelon als betrachtet ein niedrig dosiert Kontrazeptivum. Weil beide Hormone in allen Tabletten im Blister in derselben Menge kombiniert sind, wird es ein Einphasen-- Kombinationspille genannt.

Wofür wird dieses Medikament verwendet?

Marvelon wird verwendet um Schwangerschaft zu verhindern.

Wenn Marvelon korrekt eingenommen wird (ohne dass Tabletten vergessen) ist die Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden sehr gering. Wann.

2. dieses Medikament nicht verwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig damit sein?

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie bevor Sie beginnen mit der Anwendung von Marvelon die Informationen über Blutgerinnsel (Thrombose) in Rubrik 2. Es ist besonders wichtig dass Sie lesen was die Symptome sind von einem Blutgerinnsel – siehe Rubrik 2 'Blutgerinnsel (Thrombose)'.

In dieser Packungsbeilage werden einige Situationen beschrieben in denen Sie aufhören mit der Anwendung der Pille oder von worin die Zuverlässigkeit der Pille verringert sein kann. In solchen Situationen müssen Sie sich enthalten von sexuellen Beziehungen oder ein ergänzendes Verhütungsmittel ohne Hormone verwenden, zum Beispiel ein Kondom oder anderes Barriereverhütungsmittel. Verwenden keine Methode der Kalender- oder Temperaturmethode. Diese Methoden können unzuverlässig sein weil die Pille Einfluss hat auf die normalen Veränderungen des Körpertemperatur und das Gebärmutter Schleimhaut während der Menstruationszyklus.

Marvelon bietet net wie andere hormonelle Verhütungsmittel keinen Schutz gegen eine HIV-Infektion (AIDS) oder andere sexuell übertragbare Erkrankungen (STIs).

Wann dürfen Sie dieses Mittel nicht verwenden?

Sie dürfen dieses Medikament nicht verwenden wenn Sie eine der unten genannten Erkrankungen haben. Wenn Sie eine der unten genannten Erkrankungen haben, sagen dies dann Ihrem Arzt. Ihr Arzt wird mit Ihnen besprechen welche andere Form von Verhütung geeigneter ist für Sie. Siehe auch den Abschnitt 'Wann müssen Sie zusätzlich vorsichtig sein mit diesem Medikament?'.

- Sie haben ein Blutgerinnsel in einem Blutgefäß der Beine (tiefe Venenthrombose, DVT), die, TVT), die Lungen (Lungenembolie) oder ein anderes Organ, oder Sie haben dies in der Vergangenheit gehabt.
- Sie wissen dass Sie eine Störung hat von Ihrer Blutgerinnung – zum Beispiel Protein C-Mangel, Protein S- Mangel, Antithrombin-III-Mangel, Faktor V-Leiden oder Antikörper gegen Phospholipide.
- U müssen werden operiert oder Sie sind während langer Zeit nicht auf den Beinen (siehe Abschnitt 'Blutgerinnsel (Thrombose)').
- U hat jemals einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall gehabt.
- Sie haben Angina pectoris (eine Erkrankung die starke Schmerzen in der Brust verursacht en ein erstes Symptom von einem Herzinfarkt kann sein) oder einem 'transitorische ischämische Attacke' (TIA: vorübergehende Symptome eines Schlaganfalls) oder Sie) oder Sie hat dies jemals gehabt.
- Sie haben eine von den folgenden Krankheiten, die das Risiko für ein Blutgerinnsel in Ihren Arterien erhöhen erhöhen:
 - schwere Diabetes mit Schädigung von Blutgefäßen
 - schwer erhöhter Blutdruck
 - ein schwer erhöhter Fettgehalt in Ihrem Blut (Cholesterin von Triglyceride)

- eine Erkrankung die Hyperhomocysteinämie genannt wird.
- Sie haben eine Migräneart die 'Migräne mit Aura' genannt wird (oder hat dies jemals gehabt).
- Sie haben Pankreatitis (eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse) oder haben dies gehabt, kombiniert mit einem hoch Fettgehalt in Ihrem Blut.
- Sie haben Gelbsucht (gelbe Verfärbung der Haut oder Augen) oder eine schwere Lebererkrankung von hat dies gehabt, und die Ergebnisse von Leberfunktionstests sind noch nicht normal.
- Sie haben eine Form von Krebs oder hat dies gehabt die empfindlich kann sein für Geschlechtshormone (wie Brustkrebs oder Krebs der Geschlechtsorgane).
- Sie hat Leberkrebs oder hat dies gehabt.
- Sie haben ungewöhnliche Blutungen aus der Vagina deren die Ursache nicht ist festgestellt.
- U haben eine abnormale Verdickung des Endometriums.
- Sie sind allergisch gegen eine der Substanzen in diesem Medikament. Diese Substanzen können Sie finden in Rubrik 6 dieser Packungsbeilage ..

eine der genannten Situationen auftreten während Sie Marvelon bereits verwenden , dann müssen muss u sofort abbrechen mit der Anwendung und Kontakt aufnehmen mit Ihrem Arzt. Verwenden in der Zwischenzeit ein anderes, nicht- hormonelles Methode von Empfängnisverhütung. Siehe auch 'Allgemeine Hinweise' am Anfang von Abschnitt 2.

Verwenden Marvelon nicht wenn Sie Hepatitis C haben en hierfür Medikamente mit Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir und Dasabuvir oder Glecaprevir/Pibrentasvir verwendet (siehe auch Abschnitt 2 'Verwendet u noch andere Medikamente?').

Wann müssen Sie extra vorsichtig sein mit diesem Medikament?

Wann müssen Sie Kontakt aufnehmen mit Ihrem Arzt?

Rufen Notfall- medizinische Hilfe an

- wenn Sie mögliche Beschwerden oder Symptome eines Blutgerinnsels bemerken , die bedeuten können dass das u leiden an einem Blutgerinnsel in Ihrem Bein (d.h. tiefe Venenthrombose),ein Blutgerinnsel in Ihrer Lunge (d.h.d.h.. Lungenembolie), ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall (siehe unten den Abschnitt 'Blutgerinnsel (Thrombose)').

Gehen zu ein Beschreibung der Beschwerden oder Symptome dieser schweren Nebenwirkungen nach 'Wie erkennen Sie ein Blutgerinnsel ?'.Sagen

Sie es Ihrem Ihr Arzt, wenn ein der folgenden Situationen auf Sie zutrifft .

Wenn die Erkrankung auftritt oder sich verschlimmert, während Sie Marvelon einnehmen, müssen u dies auch an Ihren Arzt erzählen.

- Sie rauchen.
- Sie haben Diabetes.
- Sie sind sehr über gewichtig.
- Sie haben einen erhöhten Blutdruck.

- Sie haben eine Erkrankung der Herzklappen oder eine bestimmte Herzrhythmusstörung.
 - Sie haben eine Entzündung in den Venen nahe unter der Haut (oberflächliche Thrombophlebitis).
 - Sie haben Krampfadern.
 - Jemand in Ihrer unmittelbaren Familie hat jemals Thrombose, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall gehabt.
 - Sie haben Migräne.
 - Sie haben Epilepsie.
 - Sie haben erhöhte Fettwerte in Ihrem Blut (Hypertriglyceridämie), oder diese Erkrankung tritt in Ihrer Familie auf oder ist in Ihrer Familie aufgetreten. Hypertriglyceridämie ist in Verbindung gebracht mit einem höheren Risiko eine Pankreatitis (eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse) zu bekommen.
 - Sie müssen werden operiert oder Sie sind während langer Zeit nicht auf den Beinen (siehe 'Blutgerinnsel (Thrombose)' in Abschnitt 2).
 - Wenn Sie kürzlich entbunden haben, haben u ein erhöhtes Risiko auf das Erhalten von Blutgerinnseln. Fragen Ihren Arzt, wie schnell nach der Entbindung Sie können beginnen mit dem Gebrauch von Marvelon.
 - Sie haben jemanden in Ihrer direkten Familie der Brustkrebs hatte ..
 - haben eine Erkrankung der Leber oder der Gallenblase Gallenblase.
 - U haben die Krankheit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa (chronische Darmerkrankung).
 - U haben systemischen Lupus erythematodes (SLE - eine Krankheit die Ihr natürliche Immunsystem beeinträchtigt).
 - Sie haben hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS - eine Störung der Blutgerinnung die Nierenversagen verursacht).
 - Sie haben Sichelzellenanämie (ein erblich Krankheit der roten Blutzellen).
 - Sie haben eine Erkrankung die zum ersten Mal auftrat oder sich verschlechterte während einer Schwangerschaft von bei früher Anwendung von Geschlechtshormonen, zum Beispiel Hörverlust, Porphyrie (eine Bluterkrankung), Herpes gestationis (Hautausschlag mit Bläschen während der Schwangerschaft) oder Sydenham-Chorea (eine Nervenkrankheit bei der plötzliche Bewegungen des Körpers auftreten).
-
- Sie bekommen Symptome von Angio-ödem wie Schwellung von Ihrem Gesicht, Zunge undoder Rachen undoder Schwierigkeiten beim Schlucken oder Nesselsucht möglich mit Atembeschwerden . Nehmen Sie indiesem Fall Fall direkten Kontakt mit Ihrem Arzt. Produkte mit Östrogenen können die Symptome von erblichem und erworbenem Angio-ödem verursachen oder verschlimmern.
 - Sie hat Chloasma oder Sie hat jemals Chloasma gehabt (gelb-braune Pigmentflecken, sogenannte 'Schwangerschaftsflecken', vor allem im Gesicht); wenn dies das Fall ist, ist es klug zu direkte Exposition gegenüber Sonnenlicht oder ultraviolettem Licht zu vermeiden.

Die Pille und Blutgerinnsel (Thrombose)

BLUTGERINNSEL (THROMBOSE)

Wenn Sie ein kombiniertes hormonelles Verhütungsmittel wie Marvelon verwenden, haben Sie ein höheres Risiko ein Blutgerinnsel zu bekommen als wenn Sie kein kombiniertes hormonelles Kontrazeptivum verwenden. In seltenen Fällen kann ein Blutgerinnsel ein Blutgefäß verstopfen und ernste Probleme verursachen. Blutgerinnsel können entstehen

- in Venen (dies wird 'venöse Thrombose', 'venöse Thromboembolie' oder VTE genannt)
- in Arterien (dies wird 'arterielle Thrombose', 'arterielle Thromboembolie' oder ATE genannt).

Man erholt nicht immer vollständig von Blutgerinnseln. In seltenen Fällen können auftreten langanhaltende schwere Effekte sein, oder in sehr seltenen Fällen können Blutgerinnsel tödlich sein tödlich sind.

Es ist wichtig dass Sie wissen dass das allgemeine Risiko für ein schädliches Blutgerinnsel durch Marvelon gering ist.

WIE ERKENNEN SIE EIN BLUTGERINNSEL?

Schalten Notfall medizinische Hilfe ein wenn Sie ein der folgenden Beschwerden oder Symptome bemerken.

Bekommen Sie eine dieser Beschwerden oder Symptome?	Wo können Sie an leiden?
Schwellung eines Beins oder entlang einer Vene in einem Bein oder Fuß, insbesondere wenn dies einhergeht mit: Fuß, insbesondere wenn dies einhergeht mit: Schmerz oder Empfindlichkeit des Beins, die Sie möglicherweise nur beim Stehen oder Gehen spüren erhöhte Temperatur im betroffenen Bein Verfärbung der Haut des die Haut von das Bein, zum Beispiel blass, rot oder blau werden	Tiefe venöse Thrombose
plötzliche unerklärte Atemnot oder schnelle Atmung plötzlich Husten ohne offensichtliche Ursache, wobei Sie Blut husten können scharfe Schmerz in der Brust, die schlimmer werden kann wenn Sie tief einatmen ernsthaft leichtes Gefühl im Kopf oder Schwindel Schwindel schnelle oder unregelmäßiger Herzschlag starke Schmerzen in Ihrem Magen Wenn Sie zweifeln, nehmen Sie Kontakt auf mit einem Arzt, denn einige dieser Symptome, wie Husten oder Kurzatmigkeit, können fälschlicherweise	Lungenembolie

fälschlicherweise werden als für eine leichtere Erkrankung, wie eine Atemwegsinfektion (zum Beispiel Erkältung).	
Symptome treten meistens in einem Auge auf: sofort Verlust von dem Sehvermögen, oder schmerzloses verschwommenes Sehen, was sich entwickeln kann zu Verlust von dem	Venenthrombose in der Netzhaut (Blutgerinnsel in dem Auge)
Haben Sie eines dieser Beschwerden oder Symptome?	Woran können Sie leiden?
Sehvermögen	
Schmerzen, Unbehagen, Druck oder ein schweres, beengendes oder volles Gefühl in der Brust, Arm oder unter dem Brustbein Völlegefühl, Verdauungsstörungen oder Atemnot Unbehagen im Oberkörper, das in den Rücken, Kiefer, Hals, Arm und Magen ausstrahlt Schwitzen, Übelkeit, Erbrechen oder Schwindel Extreme Schwäche, Angst oder Kurzatmigkeit Schneller oder unregelmäßiger Herzschlag	Herzinfarkt
Plötzliche Schwäche oder Taubheitsgefühl im Gesicht, Arm oder Bein, besonders auf einer Körperseite Plötzliche Verwirrung, Schwierigkeiten beim Sprechen oder Verstehen Plötzliche Sehstörungen in einem oder beiden Augen Plötzliche Schwierigkeiten beim Gehen, Schwindel, Verlust des Gleichgewichts oder der Koordination Plötzliche, starke oder langanhaltende Kopfschmerzen ohne bekannte Ursache Bewusstseinsverminderung oder Ohnmacht mit oder ohne epileptischen Anfall Die Symptome eines Schlaganfalls können manchmal nur kurz dauern und sich fast sofort und vollständig erholen. Dennoch sollten Sie dringend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, da Sie Gefahr laufen, einen weiteren Schlaganfall zu erleiden.	Schlaganfall
Schwellung und leichte Blaufärbung eines Arms oder Beins starke Schmerzen in Ihrem Bauch (akuter Bauch)	Blutgerinnsel, das andere Blutgefäße verstopft

BLUTGERINNSEL IN EINER VENE

Was kann es passieren wenn es ein Blutgerinnsel gebildet wird in einer Vene?

- Der Gebrauch von kombinierte hormonelle Kontrazeptiva ist in Verbindung gebracht mit einem höheren Risiko für Blutgerinnsel in einer Vene (venöse

Thrombose). Diese Nebenwirkungen kommen jedoch selten vor. Meistens treten sie im ersten Jahr auf ein kombiniertes hormonelles Kontrazeptivum verwendet wird.

- Wenn ein Blutgerinnsel wird gebildet in einer Vene in einem Bein oder Fuß, kann es eine tiefe Venenthrombose (DVT) verursachen.
- Wenn ein Blutgerinnsel aus dem Bein mitgeführt wird und in die Lunge gelangt, kann es eine Lungenembolie verursachen.
- Es tritt sehr selten für dass ein Blutgerinnsel wird gebildet in einer Vene in einem anderen Organ, wie das Auge (venös Thrombose in dem Netzhaut).

Wann ist das Risiko für ein Blutgerinnsel in einer Vene am höchsten?

Das Risiko für ein Blutgerinnsel in einer Vene zu bekommen ist das höchste im ersten Jahr dass eine Frau zum ersten Mal ein kombiniertes hormonales Antikonzeptivum verwendet. Das Risiko kann auch erhöht sein wenn Sie nach einer Unterbrechung von 4 Wochen oder länger wieder beginnen mit dem Gebrauch von einem kombinierten hormonalen Kontrazeptivum (dasselbe Produkt, oder ein anderes Produkt als zuvor).

Nach dem ersten Jahr wird das Risiko kleiner, aber bleibt etwas höher als wenn Sie kein kombiniertes hormonales Kontrazeptivum verwenden.

Wenn Sie aufhören mit Marvelon, ist Ihr Risiko für ein Blutgerinnsel innerhalb einiger Wochen wieder normal.

Wie hoch ist das Risiko für ein Blutgerinnsel?

Das Risiko hängt ab von Ihr natürlich Risiko auf VTE, und von der Art kombiniert hormonell Kontrazeptivum das Sie verwenden.

Das allgemeine Risiko auf ein Blutgerinnsel in ein Bein oder Lunge (tiefe venöse Thrombose oder Lungenembolie) mit Marvelon ist gering.

- Von jeweils 10.000 Frauen die kein einziges kombiniertes hormonelles Antikonzeptivum verwenden und nicht schwanger sein, bekommen etwa 2 in einem Zeitraum von einem Jahr ein Blutgerinnsel.
- Von jede 10.000 Frauen die ein kombiniertes hormonales Kontrazeptivum verwenden das Levonorgestrel, Norethisteron oder Norgestimat enthält, bekommen etwa ungefähr 5-7 von ein Jahr ein Blutgerinnsel.
- Von je 10.000 Frauen die ein kombiniertes hormonales Kontrazeptivum verwenden das Desogestrel enthält, wie Marvelon, bekommen etwa ungefähr zwischen den 9 und 12 in einem Jahr ein Blutgerinnsel.
- Das Risiko ein ein Blutgerinnsel zu bekommen ist abhängig von Ihrer persönlichen medizinischen Vorgeschichte (siehe die Abschnitte 'Faktoren die Ihr Risiko für ein Blutgerinnsel in ein Vene2FArterie erhöhen' unten).

	Risiko um in ein Jahr ein Blutgerinnsel zu bekommen
Frauen die kein kombiniertes hormonelles Pille/Pflaster/Ring verwenden und nicht schwanger sind	Ungefähr 2 von je 10.000 Frauen
Frauen die eine Kombinationspille verwenden die Levonorgestrel, Norethisteron oder Norgestimat enthält	Ungefähr 5-7 von je 10.000 Frauen
Frauen die Marvelon verwenden	Ungefähr 9-12 von jeweils

10.000 Frauen

Faktoren die Ihr Risiko auf ein Blutgerinnsel in einer Vene erhöhen

Das Risiko auf ein Blutgerinnsel mit Marvelon ist gering, aber es gibt bestimmte Umstände die das Risiko erhöhen. Ihr Risiko ist höher:

- wenn Sie schwerwiegend Übergewicht haben (BMI [Body-Mass-Index] höher als 30 kg/m²)
- wenn ein von Ihnen nahen Familienmitgliedern in jungen Jahren (zum Beispiel vor dem 50. Lebensjahr) ein Blutgerinnsel hatte gehabt in einem Bein, Lunge oder anderem Organ. In diesem Fall können Sie eine erbliche Blutgerinnungsstörung haben.
- wenn Sie eine Operation müssen unterziehen, oder wenn Sie lange Zeit nicht auf den Beinen sind aufgrund einer Verletzung oder Krankheit, oder wenn Ihr Bein im Gips ist. Es kann notwendig sein um vor einer Operation, oder wenn Sie weniger mobil sind, einige Wochen zu stoppen mit der Anwendung von Marvelon. Wenn Sie müssen stoppen mit Marvelon, fragen Sie Ihren Arzt wann Sie wieder können beginnen mit der Anwendung.
- wenn Sie älter werden (insbesondere besonders über ungefähr 35 Jahre)
- wenn Sie in den vergangenen paar Wochen entbunden haben.

Das Risiko auf ein Blutgerinnsel steigt je mehr von diesen Bedingungen auf Sie zutreffen . Eine Reise mit dem.

Eine Reise per länger als 4 (länger dann 4 Stunde) kann Ihr Risiko auf ein Blutgerinnsel vorübergehend erhöhen, insbesondere wenn es noch einige andere der genannten Umstände auf Sie zutrifft anwendbar sind.

Es ist wichtig dass Sie es Ihrem Arzt sagen wenn eine oder mehrere von diesen Bedingungen auf Sie zutrifft anwendbar sind, sogar wenn Sie darüber zweifeln. Ihr Arzt kann entscheiden dass Sie müssen aufhören mit der Anwendung von Marvelon.

Wenn ein von den oben genannten Umständen ändert während Sie Marvelon verwenden, zum Beispiel wenn ein nahes Familienmitglied ein Blutgerinnsel (Thrombose) bekommt ohne bekannte Ursache, oder wenn Sie viel an Gewicht zunehmen, sagen dies dann Ihrem Arzt.

BLUTGERINNSEL IN EINER ARTERIE

Was

Was kann es passieren wenn es ein Blutgerinnsel gebildet wird in einer Arterie?

Genau wie ein Blutgerinnsel in einer Vene, kann ein Blutgerinnsel in einer Arterie ernsthafte Probleme verursachen. Es kann zum Beispiel einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall verursachen.

Faktoren die Ihr Risiko auf ein Blutgerinnsel in einer Arterie erhöhen

Es ist wichtig dass Sie wissen dass das Risiko auf ein Herzinfarkt oder Schlaganfall durch die Anwendung von Marvelon sehr gering ist, aber größer werden kann:

- mit zunehmendem Alter (über ungefähr 35 Jahre)

- wenn Sie rauchen. Wenn Sie ein kombiniertes hormonelles Kontrazeptivum wie Marvelon verwenden, wird empfohlen dass Sie aufhören mit Rauchen. Wenn Sie nicht können aufhören mit Rauchen und älter sind als 35 Jahre, kann Ihr Arzt Ihnen empfehlen zu einem anderen Typ Verhütungsmittel zu verwenden.
- wenn Sie Übergewicht haben
- wenn Sie hohen Blutdruck haben
- wenn ein Mitglied Ihrer Ihrer engsten Familie auf jungen Alter (vor dem 50. Lebensjahr) einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatte . Indiesem Fall können Sie auch auch ein erhöhtes Risiko haben um einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen.
- wenn Sie, oder ein Mitglied Ihrer Ihrer engsten Familie, ein erhöhter Fettgehalt im Blut hat (Cholesterin oder Triglyceride)
- wenn Sie an Migräne leiden, insbesondere Migräne mit Aura
- wenn Sie ein Herzerkrankung hat (Herzklappenerkrankung, oder eine Herzrhythmusstörung die Vorhofflimmern genannt wird)
- wenn Sie Zuckerkrankheit (Diabetes) haben.

Wenn mehr dann ein von diesen Umständen auf Sie von zutreffend ist, oder wenn ein von diesen Erkrankungen besonders schwerwiegend ist, kann das Risiko auf das bekommen von ein Blutgerinnsel sogar noch weiter erhöht sein.

Wenn ein von den oben genannten Umständen ändert während Sie Marvelon verwenden, zum Beispiel wenn Sie anfangen zu rauchen oder wenn ein naher Verwandter ein Blutgerinnsel (Thrombose) bekommt ohne bekannte Ursache, oder wenn Sie viel an Gewicht zunehmen, sagen dies dann Ihrem Arzt. Die

Pille und Krebs Bei

Bei Frauen die die Pille verwenden wird etwas häufiger Brustkrebs diagnostiziert als bei Nicht-Pillenanwenderinnen im gleichen Alter. Zehn Jahre nach dem Absetzen mit der Pille gibt es kein Unterschied mehr. Es ist nicht bekannt ob dieser Unterschied verursacht wird durch die Pille. Es kann auch kommen weil Pillenanwenderinnen gründlicher und häufiger untersucht ,sodass die Brustkrebs früher entdeckt wird ..

selteneren Fällen sind bei bei Pillenanwenderinnen gutartige Lebertumoren gefunden und in noch selteneren Fällen bösartige Lebertumoren. Manchmal haben diese Tumoren geführt zu einer lebensbedrohlichen inneren Blutung. Sollten Sie plötzlich Beschwerden bekommen von starken Bauchschmerzen, dann müssen Sie sofort Kontakt aufnehmen mit Ihrem Arzt.

Chronische Infektion mit dem humanen Papillomavirus ist der wichtigste Risikofaktor für den Erhalt von Gebärmutterhalskrebs. Bei Frauen die die Pille über längere Zeit verwenden kann die Wahrscheinlichkeit auf das Erhalten von Gebärmutterhalskrebs leicht erhöht sein. Es ist jedoch nicht klar ob dies wird verursacht durch die Pille, oder dass das zu machen hat mit sexuellem Verhalten und anderen Faktoren (wie bessere Kontrolle des Gebärmutterhalses).

Psychische Störungen

Einige Frauen die hormonelle Verhütungsmittel einschließlich Marvelon verwenden, haben Berichte erstattet über Depressionen oder Niedergeschlagenheit. Depressionen können schwerwiegend sind und kann manchmal bis Selbstmordgedanken führen. Wenn Sie Stimmungsschwankungen und Symptome von Depression erleben, nehmen Sie bitte so schnell wie möglich Kontakt mit Ihrem Arzt auf für weiter medizinisch Rat.

Verwenden Sie noch andere Medikamente?

Verwenden Sie neben Marvelon noch andere Medikamente oder Kräutermittel, haben Sie das kürzlich getan oder werden Sie es vielleicht bald tun? Sagen Sie das dann Ihrem Arzt, Apotheker oder Hebamme. Dies gilt auch für Mittel die Sie ohne Rezept erhalten .. auch jeden anderen Arzt oder andere Kunst der Zahnarzt (oder Apotheker) der Ihnen ein anderes Medikament verschreibt das Sie Marvelon verwenden. Sie können Ihnen dann sagen ob es notwendig ist ein extra nicht-hormonell Verhütungsmittel (zum Beispiel ein Kondom) zu verwenden und auch wie das dann müssen verwenden oder das das das Gebrauch von einem anderen Medikament das Sie benötigen haben, muss ändern.

Verwenden Marvelon nicht wenn Sie Hepatitis C haben en hierfür Medikamente mit Ombitasvir2FParitaprevir2FRitonavir und Dasabuvir oder Glecaprevir2FPibrentasvir verwendet, weil dies eine Erhöhung von ein Leberenzym (ALAT, ein Leberfunktionstest) kann verursachen. Ihr Arzt wird ein anderes Verhütungsmittel verschreiben bevor Sie beginnen mit diese Behandlung. Marvelon kann ungefähr 2 Wochen nach Ende von dieser Behandlung wieder gestartet werden. Siehe Abschnitt 2 'Wann dürfen Sie dieses Mittel nicht verwenden?').

Einige Medikamente

- können einen Einfluss haben auf die Blutspiegel von Marvelon
- können Marvelon weniger wirksam machen um Schwangerschaft zu verhindern
- können unerwartete Blutungen verursachen.

Dazu gehören unter anderen Medikamente zur Behandlung von: Epilepsie

- (zum Beispielzum Beispiel primidon, Phenytoin, Phenobarbital, carbamazepin, oxcarbazepin, Topiramamat, Felbamamat)
- Tuberkulose (zum Beispiel Rifampicin, Rifabutin)
- HIV-Infektion (zum Beispiel ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz)
- Hepatitis-C-Virusinfektion (zum Beispiel boceprevir, telaprevir)
- andere Infektionen (zum Beispiel Griseofulvin)
- hoher Blutdruck in den Blutgefäßen der Lungen (Bosentan)
- depressiv Stimmung (das Kräutermittel Johanniskraut).

Wenn Sie Medikamente oder Kräutermittel verwenden die Marvelon weniger wirksam machen ,müssen Sie auch ein ein Barrieremethode zur Empfängnisverhütung verwenden. Weil die Wirkung von einem anderen Medikament auf Marvelon bis zu 28 Tage nach dem Absetzen von diesem Medikament andauern kann, muss Sie die zusätzliche Barriere-Verhütungsmethode während die Zeit weiterhin verwenden.

Marvelon kann die Wirkung von anderen Medikamenten beeinflussen, zum Beispiel:

- Medikamente die Ciclosporin enthalten
- das anti-epileptische Mittel Lamotrigin (dies kann führen zu einer erhöhten Anzahl von Anfällen).

Laboruntersuchungen

Wenn Blutuntersuchung bei u müssen werden getan, sagen dann Ihren Arzt oder das Laborpersonal dass Sie die Pille verwenden. Hormonelle Verhütungsmittel können nämlich die Ergebnisse von einigen Untersuchungen beeinflussen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Wenn Sie schwanger sind, oder glauben dass Sie schwanger sein könnten sind dürfen Sie Marvelon nicht verwenden. Wenn Sie vermuten dass Sie schwanger sind während Sie Marvelon einnehmen, wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren Arzt. Stillen

Das

Das Gebrauch von Marvelon wird im Allgemeinen nicht empfohlen solange eine Frau stillt . Wenn Sie diePille dennoch möchten verwenden während Sie noch noch Stillen gibt, können Sie am besten Kontakt aufnehmen mit Ihrem Arzt.

Fahrtüchtigkeit und der Verwendung von Maschinen

Es gibt keine Hinweise dass die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit Maschinen zu benutzen beeinflusst werden.

Marvelon enthält Laktose

Wenn Ihr Arzt Ihnen gesagt hat dass Sie bestimmte Zucker nicht vertragen, wenden Sie sich an Ihren Arzt bevor Sie dieses Medikament einnehmen.

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Es gibt keine klinische Informationen über die Wirksamkeit und Sicherheit bei Jugendlichen unter den 18 Jahren.

Wann sollten Sie zum Arzt während die Verwendung von diesem Medikament?

3. Wie nehmen Sie dieses Medikament ein?

Nehmen dieses Medikament immer genau wie Ihr Arzt Arzt oder Apotheker Sie das hat gesagt. Zweifeln Sie an der richtigen Anwendung? Kontaktieren Sie dann Ihren Arzt oder Apotheker.

Wann und wie nehmen u die Tabletten ein?

Der Streifen enthält 21 Tabletten. Bei jeder Tablette steht angegeben an welchem Tag diese eingenommen werden soll. Nehmen Sie die Tabletten jeden Tag ungefähr um dieselbe Zeit ein, falls nötig mit etwas Wasser. Folgen Sie der Richtung des Pfeils der auf dem Streifen angegeben ist bis Sie alle 21 Tabletten eingenommen haben eingenommen. Danach nehmen Sie 7 Tage keine

Tablette. Im Laufe von diesen 7 Tagen sollte eine Blutung beginnen (die sogenannte Abbruchblutung). Diese beginnt gewöhnlich am 2. oder 3. Tag nach der letzten Marvelon-Tablette. Beginnen Sie am 8. Tag mit dem nächsten Blister, unabhängig davon, ob die Blutung dann schon vorbei ist oder nicht. Dies bedeutet dass Sie immer am gleichen Tag der Woche mit einem nächsten Blisterpackung beginnen, und auch dass die Abbruchblutung jeden Monat ungefähr auf denselben Tagen fällt.

Wann zu beginnen mit dem ersten Blister

Sie haben den letzten Monat keine Antibabypille verwendet.

Beginnen Sie mit Marvelon am ersten Tag der Zyklus (der ersten Tag Ihrer Menstruation).

Marvelon wirkt in diesem Fall sofort und Sie müssen braucht kein extra Verhütungsmittel zu verwenden.

Sie dürfen auch am Tag 2-5 des Zyklus beginnen aber dann müssen Sie in den ersten 7 Tagen jedoch ein extra Verhütungsmittel (zum Beispiel ein Kondom) verwenden.

Wechsel von einer anderen Kombinationspille, vaginalen Ring oder Verhütungspflaster

Sie können mit Marvelon beginnen am Tag nachdem Sie die letzte Tablette von Ihrem vorherigen Pille eingenommen haben (also ohne Pause). Wenn es bei Ihr vorherige Pille auch nicht-wirksame Tabletten in der Blisterpackung sind, müssen Sie sofort fortfahren nach der letzten wirksamen Tablette von Ihrer vorherigen Pille (wenn Sie nicht wissen welche das ist, fragen Sie dann Ihren Arzt oder Apotheker). Sie dürfen auch später beginnen, aber niemals später als am, aber niemals später als am Tag nach Ende der tablettenfreien Periode Ihrer vorherigen Pille (oder nach der letzten nicht-wirksamen Tablette Ihrer vorherigen Pille). Pille).

Wenn Sie wechseln von einem vaginalen Ring oder Verhütungspflaster können Sie mit Marvelon beginnen am Tag der Entfernung des Rings oder des letzten Pflasters. Sie dürfen auch später beginnen, aber Sie müssen am spätestens sieben Tage nach dem Entfernen des Rings oder des letzten Pflasters mit Marvelon beginnen ..

Sie die Pille Pille, Pflaster oder Ring vollständig gemäß der Vorschriften hat verwendet und Sie sind sicher von dass Sie nicht schwanger sind, können Sie außerdem aufhören mit dem Einnehmen der Pille oder den Ring oder Pflaster entfernen am jeden Tag des Ihres aktuellen Zyklus und sofort wechseln zu dem Gebrauch von Marvelon.

Wenn Sie diese Anweisungen befolgen ist es nicht nötig ein zusätzliches Verhütungsmittel (zum Beispiel ein Kondom) zu verwenden.

Umstellung von einer Gestagenpille (Minipille)

Sie können von der einen auf den anderen Tag umstellen auf Marvelon, aber Sie müssen die erste 7 Tage wohl ein extra Verhütungsmittel (zum Beispiel ein Kondom) verwenden.

Wechsel von der Dreimonatsspritze, ein Implantat oder ein hormonhaltig Spirale

Beginnen Sie mit Marvelon wenn Sie anders die nächste Injektion erhalten würden oder am Tag an dem das Implantat oder hormonhaltige Spirale wird entfernt. Sie müssen die ersten 7 Tage jedoch wohl ein zusätzliches Verhütungsmittel (zum Beispiel ein Kondom) verwenden.

Nach einer Entbindung

Wenn Sie gerade entbunden haben, wird Ihr Arzt Ihnen wahrscheinlich empfehlen zu warten bis Ihre erste spontane Menstruation, aber manchmal ist es möglich früher zu beginnen. Befolgen den Rat Ihres Arztes. Das gilt auch für den Fall dass Sie stillen Stillzeit gibt en de Pille möchten verwenden.

Nach einer Fehlgeburt oder Abtreibung
Befolgen den Rat Ihres Arztes .

Haben Sie zu viel von diesem Medikament eingenommen?

Es gibt keine Berichte von ernsthaften schädlichen Folgen der Einnahme von vielen Marvelon Tabletten gleichzeitig. Sollten Sie eine Anzahl Tabletten gleichzeitig eingenommen haben, dann können Sie möglicherweise Beschwerden bekommen von Übelkeit, Erbrechen oder vaginal Blutverlust. Sollten Sie entdecken dass ein Kind Marvelon eingenommen hat, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Was zu tun ...

...bei der Vergessen von Tabletten

Wenn Sie **weniger als 12 Stunden zu spät** sind mit der Einnahme von einer Tablette dann ist die Wirkung von der Pille nicht vermindert. Nehmen diese Tablette dann trotzdem ein, sobald Sie daran denken und nehmen Sie die nächsten Tabletten wieder zur gewohnten Zeit ein.

Wenn Sie **mehr als 12 Stunden zu spät** sind mit der Einnahme einer Tablette, kann die Wirkung der Pille vermindert sein. Je mehr Tabletten Sie hintereinander vergessen haben, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirkung von der Pille vermindert ist. Die Wahrscheinlichkeit auf unzureichenden Schutz gegen Schwangerschaft ist am größten, wenn Tabletten am Anfang oder am Ende des Blisters ausgelassen werden. Daher gelten die folgenden Regeln (siehe auch das Schema):

Mehr als 1 Tablette vergessen in einem Blister

Nehmen Sie Kontakt auf Ihr Arzt.

1 Tablette vergessen in Woche 1

Nehmen Sie die vergessene Tablette ein, sobald Sie daran denken, auch wenn dies bedeuten würde, dass Sie zwei Tabletten zur gleichen Zeitpunkt einnehmen müssen. Nehmen Sie die Tabletten wieder zur gewohnten Zeit ein in, aber Sie müssen zusätzlich 7 Tage lang ein zusätzliches Verhütungsmittel verwenden. Wenn Sie in der Woche vor dem Auslassen Geschlechtsverkehr hatten, besteht die Möglichkeit einer Schwangerschaft. Wenden Sie sich in diesem Fall sofort an Ihren Arzt.

1 Tablette vergessen in Woche 2

Nehmen Sie die vergessene Tablette ein, sobald Sie daran denken, auch wenn dies bedeutet, dass Sie zwei Tabletten zur gleichen Zeit einnehmen müssen. Nehmen Sie die Tabletten weiter wie gewohnt übliche Zeit in. Die Die Wirkung der Pille ist nicht vermindert, Sie müssen keine zusätzlichen Verhütungsmittel verwenden.

1 Tablette vergessen in Woche 3

Sie können wählen aus 2 Möglichkeiten ohne zusätzliche Verhütungsmittel zu müssen verwenden.

1. Nehmen Sie die vergessene Tablette ein sobald Sie daran denken, auch wenn dies bedeuten würde, dass Sie zwei Tabletten zur gleichen Zeit einnehmen müssen. Nehmen Sie die Tabletten weiterhin zur gewohnten Zeit ein.
Überspringen Sie außerdem die tablettenfreie Periode und fahren Sie sofort mit dem nächsten Blister fort. Höchstwahrscheinlich bekommen Sie erst am Ende des zweiten Blisters eine Periode haben echte Entzugsblutung, aber während des zweiten Blisters können Sie unter Spotting oder einer Durchbruchblutung leiden.
2. Sie können auch mit dem betreffenden Blister aufhören. Sie halten eine tablettenfreie Periode von 7 Tagen oder weniger ein an **(tel wohl immer den Tag mit an dem Sie die Tablette vergessen)**. Danach geht u einfach mit dem nächsten Blister fortfahren.

Wenn Sie diese Methode befolgen, können Sie immer an Ihrem festen Starttag mit dem neuen Blister beginnen.

Wenn Sie in einem Blister Tabletten vergessen haben und in der nächsten normalen tablettenfreien Periode keine Blutung auftritt, könnte das bedeuten, dass Sie schwanger sind. Sie sollten Ihren Arzt kontaktieren, bevor Sie mit dem nächsten Blister fortfahren.

... im Falle von Magen- und/oder Darmstörungen (zum Beispiel Erbrechen, schwere Durchfälle)

Wenn Sie erbrechen oder schweren Durchfall haben, besteht die Möglichkeit, dass die Wirkstoffe nicht vollständig vom Körper aufgenommen wurden. Wenn Sie innerhalb von 3-4 Stunden nach Einnahme einer Tablette erbrechen müssen, ist diese Situation vergleichbar mit dem Vergessen einer Tablette. Befolgen Sie daher im Falle von Erbrechen denselben Rat wie oben für das Vergessen von Tabletten angegeben. Bei schwerem Durchfall konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

... wenn Sie Ihre Menstruation einmal verschieben möchten

Es ist möglich, Ihre Menstruation zu verschieben, obwohl dies nicht empfohlen wird. In Ausnahmefällen können Sie Ihre Menstruation verschieben, indem Sie ohne tablettenfreie Periode mit einem neuen Blister Marvelon fortfahren. Sie können mit diesem Blister fortfahren, bis alle Tabletten aufgebraucht sind oder früher aufhören, wenn gewünscht. Während der Einnahme dieses zweiten Blisters können Durchbruchblutungen oder Schmierblutungen auftreten. Nach der üblichen tablettenfreien Periode von 7 Tagen beginnen Sie dann wieder mit dem nächsten Blister.

... wenn Sie den Beginn Ihrer Menstruation verschieben möchten

Wenn Sie Ihre Tabletten gemäß den Anweisungen einnehmen, beginnt Ihre Menstruation immer ungefähr am gleichen Tag. Wenn Sie diesen Tag ändern möchten, können Sie dies tun, indem Sie die normale tablettenefreie Periode zwischen zwei Blistern verkürzen (aber niemals verlängern). Zum Beispiel, wenn Ihre Menstruation normalerweise am Freitag beginnt und Sie möchten, dass sie in Zukunft auf Dienstag (3 Tage früher) verschoben wird, dann müssen Sie jetzt

3 Tage früher als üblich mit dem neuen Blister beginnen. Wenn Sie die tablettenefreie Periode sehr kurz machen (zum Beispiel 3 Tage oder weniger), kann es passieren, dass Sie während dieser tablettenefreien Periode keine Blutung haben. Sie können dann während des nächsten Blisters Durchbruchblutungen oder Schmierblutungen haben.

... bei unerwartetem Blutverlust

Mit allen Antibabypillen kann es in den ersten Monaten manchmal zu unerwartetem Blutverlust kommen (Schmierblutungen oder Durchbruchblutungen). Sie können dann möglicherweise nicht ohne Binde oder Tampon auskommen. Nehmen Sie in jedem Fall weiterhin Ihre Tabletten ein. Der unregelmäßige Blutverlust hört normalerweise auf, wenn sich Ihr Körper an die betreffende Pille gewöhnt hat (nach etwa 3 Blistern). Wenn es länger dauert, schlimmer wird oder erneut beginnt, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren.

... wenn die erwartete Blutung ausbleibt

Wenn Sie alle Tabletten korrekt eingenommen haben, nicht unter Erbrechen und/oder Durchfall gelitten haben und auch keine anderen Medikamente eingenommen haben, ist es höchst unwahrscheinlich, dass Sie schwanger sind. Sie können dann beruhigt mit dem nächsten Blister fortfahren.

Wenn die erwartete Blutung jedoch zweimal hintereinander ausbleibt, könnten Sie schwanger sein. Nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt auf. Fahren Sie nicht mit dem nächsten Blister Marvelon fort, bevor Ihr Arzt festgestellt hat, dass Sie nicht schwanger sind.

Wenn Sie aufhören mit dem einnehmen von diesem Medikament

Sie können mit Marvelon aufhören wann Sie möchten. Wenn Sie nicht schwanger werden möchten, fragen Sie Ihren Arzt um Rat mit Bezug auf andere zuverlässige Methoden der Empfängnisverhütung.

Wenn Sie aufhören weil Sie schwanger werden möchten, wird im Allgemeinen empfohlen um zu warten bis Sie eine natürliche Menstruation hatten bevor Sie versuchen schwanger zu werden . Sie können. S kannst dann einfacher berechnen wann die Entbindung wird stattfinden.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Wie jedes Medikament kann auch dieses Medikament Nebenwirkungen haben. Nicht jeder bekommt damit zu tun. Bekommen Sie eine Nebenwirkung, besonders wenn diese schwerwiegend von Art ist und lang anhält, oder tritt es eine Veränderung auf in Ihrer Gesundheitszustand von der Sie denken dass diese verursacht werden kann durch Marvelon? Kontaktieren Sie dann Ihren Arzt.

Alle Frauen die kombinierte hormonelle Kontrazeptiva verwenden haben ein höheres Risiko auf Blutgerinnsel in den Venen (venöse Thromboembolie [VTE]) oder Blutgerinnsel in den Arterien (arterielle Thrombo- Embolie [ATE]). Siehe für mehr Informationen über die verschiedenen Risiken der Anwendung von kombinierten hormone Antikonzeptiva Rubrik 2 'Wann dürfen Sie dieses Medikament nicht verwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig damit sein?'

Nehmen Sie sofort Kontakt auf mit Ihrem Arzt wenn Sie Symptome von Angio-ödem bekommen wie Schwellung von Ihrem Gesicht, Zunge und/oder Rachen und/oder Schwierigkeiten beim Schlucken schlucken von Nesselsucht möglich mit Atembeschwerden (siehe Abschnitt 2 'Wann müssen Sie besonders vorsichtig sein mit diesem Medikament?').

Wie bei alle Kombinationspillen, kann Ihr Menstruationsmuster verändern, besonders während der ersten Monate der Anwendung. Dieser Unterschied kann sitzen wie oft Sie ein Blutung bekommen (Ausbleiben der Blutung, weniger oft, häufiger oder kontinuierlich), wie stark die Blutung ist, oder wie lange die Blutung dauert.

Häufig (treten auf bei weniger als 1 von 10 Frauen)

- depressive Stimmungen, Stimmungsveränderungen
- Kopfschmerzen
- Übelkeit, Bauchschmerzen
- empfindliche Brüste, schmerzhaft Brüste
- Gewichtszunahme.

Manchmal (treten auf bei weniger als 1 von 100 Frauen)

- Wassereinlagerungen
- weniger Lust auf zu haben
- Migräne
- Erbrechen, Durchfall
- Hautausschlag, Quaddeln (Nesselsucht)
- Vergrößerung der Brüste.

Selten (treten auf bei weniger als 1 von 1000 Frauen)

- schädliche Blutgerinnsel in einer Vene oder Arterie, zum Beispiel:
 - o in einem Bein oder Fuß (zum Beispiel tiefe Venenthrombose))
 - o in ein Lunge (zum Beispiel Lungenembolie)
 - o Herzinfarkt
 - o Schlaganfall
 - o 'kleiner Schlaganfall' oder vorübergehende Erscheinungen wie bei einem Schlaganfall, bekannt als TIA (transitorische ischämische Attacke)
 - o Blutgerinnsel in der Leber, Magen/Darm, Nieren oder Augen. Die Wahrscheinlichkeit ein Blutgerinnsel zu bekommen ist größer größer wenn er andere Umstände auf Sie von zutreffen sind die dieses Risiko erhöhen (siehe Abschnitt 2 für mehr Informationen über die Umstände die das Risiko auf Blutgerinnsel erhöhen und die Symptome eines Blutgerinnsels).Überempfindlichkeitsreaktionen
- mehr
- Lust auf zu verkehren Reizung

- der Augen Augen bei dem Gebrauch von Kontaktlinsen
- schmerzhafte, blaurote Knoten in der Haut (Erythema nodosum), Hautausschlag mit unregelmäßigen roten Flecken oder Geschwüren (Erythema multiforme)
- Ausfluss aus der Brustwarze, Veränderung im Ausfluss aus der Vagina
- Gewichtsabnahme.

Das Melden von Nebenwirkungen

Bekommen Sie Nebenwirkungen, nehmen Sie Kontakt auf mit, wenden Sie sich bitte an Ihr Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen die nicht in dieser Packungsbeilage stehen. Sie können Nebenwirkungen auch melden über das Niederländisch Nebenwirkungen Zentrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Durch Nebenwirkungen zu melden, helfen Sie uns um mehr Informationen zu erhalten über die Sicherheit von diesem Medikament.

5. Wie bewahren Sie dieses Medikament?

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verwenden dieses Medikament nicht mehr nach dem Verfallsdatum Haltbarkeitsdatum. Das finden Sie auf der Schachtel und dem Blisterstreifen nach EXP. Dort steht ein Monat und ein Jahr. Das letzte Tag von diesem Monat ist das Verfallsdatum Haltbarkeitsdatum.

unter 30 °C. Nicht im Gefrierschrank aufbewahren ..

in der ursprünglichen Blisterpackung Blisterverpackung ter Schutz gegen Licht und Feuchtigkeit.

Nehmen dieses Medikament nicht ein wenn Sie zum Beispiel sehen dass die Tabletten verfärbt von zerbröckelt sind oder wenn Sie andere sichtbare Anzeichen von Verschlechterung in Qualität bemerken.

Spülen Medikamente nicht in den Abfluss oder die wc und werfen sie nicht in den Mülleimer.

Fragen Sie Ihren Apotheker was Sie mit Medikamenten machen sollen die Sie nicht mehr verwenden. Wenn Sie Medikamente auf die richtige Weise entsorgen werden sie auf eine richtige Weise vernichtet und gelangen sie nicht in die Umwelt gelangen.

6. Inhalt von der Verpackung und weitere Informationen

Welche Stoffe sind in diesem Medikament?

- Die wirksamen Stoffe in diesem Medikament sind Desogestrel (150 Mikrogramm) und Ethinylestradiol (30 Mikrogramm).
- Die anderen Stoffe in diesem Medikament sind wasserfreies kolloidales Siliciumdioxid, Lactosemonohydrat, Kartoffelstärke, Povidon, Stearinsäure, all-rac-alpha-Tocopherol.

Wie sieht Marvelon aus und was ist in einer Packung?

Die Packung enthält 1, 3 oder 6 Blisterstreifen mit 21 Tabletten.

Nicht alle genannten Packungsgrößen werden im Handel gebracht.

Die Tabletten sind weiß, rund, an beide Seiten konvex und haben einen Durchmesser von 6 mm. Auf der einen Seite steht 'TR' über '5' und auf der anderen Seite 'Organon' en ein fünfzackiger Stern.

Inhaber der Zulassung für das Inverkehrbringen und Hersteller N.V. Organon Kloosterstraat
N.V. Organon 5349 AB Oss 6
Tel.: 00800 66550123 (+32 2 2418100)
dpoc.benelux@organon.com
Tel.: 00800 66550123 (+32 2 2418100)
dpoc.benelux@organon.com

Im Register eingetragen unter: RVG 08859

Dieser Beipackzettel ist zuletzt im Mai 2025 genehmigt worden 2025

Transtoyou