

Prospecto: información para el usuario
Marvelon, comprimidos
desogestrel, etinilestradiol

Cosas importantes que usted debe saber sobre combinados hormonales anticonceptivos medios:

- Estos medios constituyen uno de los más fiables reversibles métodos anticonceptivos, siempre que se utilicen correctamente.
- Ellos proporcionan un ligeramente mayor riesgo de desarrollo de un coágulo de sangre (trombosis) en el y arterias ,especialmente en el primer año que usted u uno combinado hormonal anticonceptivo usado o si usted después de una interrupción de 4 semanas o más vuelve a empezar con el uso de uno combinado hormonal anticonceptivo.
- Tenga cuidado con y contacte con su médico si cree que usted posiblemente síntomas de un uno coágulo de sangre tiene (ver sección 2 'Coágulos de sangre (trombosis)').

Lea cuidadosamente todo el prospecto antes de que este medicamento vaya a tomar porque está importante información en para usted.

- Guarde este prospecto. Quizás necesite usted más tarde nuevamente necesitarlo.
- Tiene usted aún preguntas? Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.
- No dé este medicamento a otros , porque es solopara usted prescrito . El puede. El puede perjudicial son para otros, incluso aunque tengan ellos los mismos síntomas que usted.
- Si experimenta efectos secundarios uno de los efectos secundarios que en sección 4 figura? O recibe usted un efecto secundario que no en este prospecto figura? Entonces contacte a su médico o farmacéutico.

Contenido de este prospecto

1. Qué es Marvelon y para qué se este medicamento utiliza?
2. Cuándo no debe este medicamento usar o debe tener especial cuidado cautela mee son?
3. Cómo toma usted este medicamento ?
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo almacena usted este medicamento?
6. Contenido del empaque en otros información

1. ¿Qué es Marvelon y para qué se usa este medicamento?

Composición y tipo de píldora

Marvelon es una píldora anticonceptiva oral combinada (de 'píldora combinada'). Cada tableta contiene una pequeña cantidad de dos diferentes hormonas femeninas, a saber desogestrel (una hormona con acción similar a la progesterona funcionamiento) en etinilestradiol (un hormona con acción estrogénica). Debido a la pequeña cantidad de hormonas, se considera Marvelon como como uno baja dosis anticonceptivo. Porque ambos hormonas en todas tabletas en la tira en misma cantidad combinadas están, se un monofásico -- píldora combinada llamado.

Para qué se este medicamento utiliza?

Marvelon se utiliza para prevenir el embarazo.

Si Marvelon se toma correctamente se toma (sin que tabletas sean olvidadas) es la probabilidad de quedar embarazada muy pequeña ..

2. puede este medicamento no usar o debe tener especial cuidado con ser?

Generales comentarios

Lea antes de que comience con el uso de Marvelon la información sobre coágulos de sangre (trombosis) en sección 2. Es especialmente importante que usted lea cuáles son los síntomas de un coágulo de sangre coágulo de sangre ver sección 2 ' 2Coágulos de sangre (trombosis)'.

En este prospecto se describen algunas situaciones en las que debe dejar de usar la píldora o el uso de la en la que la fiabilidad de la píldora reducida puede estar. En tales situaciones debe abstenerse de tener relaciones sexuales comunidad usar un adicional anticonceptivo sin hormonas usar, por ejemplo un condón o otro método anticonceptivo de barrera. No utilice el método del calendario de la temperatura. Estas métodos pueden ser poco fiables porque la píldora afecta a la normales cambios de la temperatura corporal y el endometrio durante el ciclo menstrual la ciclo menstrual.

Marvelon ofrece net como otros hormonales anticonceptivos ninguna protección contra una VIH- infección (SIDA) o otras sexualmente transmisibles enfermedades (ETS).

Cuándo puede este medicamento no usar?

No debe este medicamento no usar si tiene una de las a continuación mencionadas enfermedades tiene. Si usted un de las a continuación mencionadas enfermedades tiene, informe esto entonces a su médico. Su médico discutirá con usted cuál otro método de anticoncepción es más adecuado para usted. Vea también la sección ' Cuándo necesitausted extra debe u extra cautela ser con este medicamento?'.

- Usted tiene un coágulo de sangre en un vaso sanguíneo de las piernas (trombosis venosa profunda, TVP), el pulmones (embolia pulmonar) de un otro órgano, o usted ha esto en el pasado tenido.
- Usted sabe que usted un trastorno tiene de su coagulación sanguínea – por ejemplo proteína C-deficiencia, proteína S- deficiencia, antitrombina-III-deficiencia, factor V-Leiden o anticuerpos contra fosfolípidos.
- U debe ser operado o está durante largo tiempo no de pie (ver sección 'Coágulos de sangre (trombosis)').
- U tiene alguna vez un ataque al corazón o un derrame cerebral ha tenido.
- Usted tiene angina de pecho (una enfermedad que intenso dolor en el pecho causa en un primer síntoma de un ataque al corazón puede ser) o un 'ataque isquémico transitorio' (AIT: síntomas transitorios de un accidente cerebrovascular) o usted ha esto alguna vez tenido.
- Usted ha una de las siguientes enfermedades, que aumentan el riesgo de un coágulo de sangre en sus aumentar:
 - grave diabetes con daño de vasos sanguíneos
 - grave aumentada presión arterial
 - un grave aumentado nivel de grasa en su sangre (colesterol de triglicéridos)
 - una enfermedad que hiperhomocisteinemia se llama.

- Usted tiene un tipo de migraña que 'migraña con aura' se llama (o tiene esto alguna vez tenido).
- Usted tiene pancreatitis (una inflamación del páncreas) o tiene esto tenido, combinado con un alto contenido de grasa en su sangre.
- U tiene ictericia (coloración amarilla de la piel o ojos) o una grave enfermedad hepática enfermedad hepática de tiene esto tenido, y el resultados de pruebas de función hepática son aún no normal.
- Usted tiene una forma de cáncer o ha esto tenido que sensible puede ser a hormonas sexuales (como cáncer de mama o cáncer de los órganos sexuales).
- Usted tiene cáncer de hígado o ha tenido esto antes.
- Usted tiene sangrados inusuales de la vagina cuya la causa no ha sido determinada.
- U tiene un engrosamiento anormal del endometrio.
- Usted es alérgico a uno de los componentes en este medicamento. Estos componentes puede usted encontrar en sección 6 de este prospecto.

Si una de las mencionadas situaciones ocurre mientras usted ya está usando Marvelon , entonces debe u inmediatamente detener con el uso y contactar con su médico. Use mientras tanto otro método , no- hormonal- hormonal método de anticoncepción. Consulte también 'Observaciones generales' al comienzo de sección 2.

No use Marvelon si tiene hepatitis C tiene tiene en para esto medicamentos con ombitasvirparitaprevirritonavir y dasabuvir o glecaprevirpibrentasvir usado (ver también sección 2 'Usado u todavía otros medicamentos?').

Cuándo debe u extra cauteloso ser con este medicamento?

Cuándo debe u contactar con su su médico?

Llame de emergencia médica ayuda en

- si usted posibles síntomas o signos de un coágulo de sangre nota, que pueden significar que u sufre de un coágulo de sangre en su pierna (es decir. trombosis venosa profunda), un coágulo de sangre en su pulmón (es decir. embolia pulmonar), un ataque al corazón o un derrame cerebral (ver abajo la sección 'Coágulos de sangre (trombosis)').

Vaya para un descripción de los síntomas o manifestaciones de estos graves efectos secundarios a '¿Cómo reconoce usted un coágulo de sangre?'

Dígale a su médico médico, si un de las siguientes situaciones se aplica a usted .

Si la enfermedad aparece o empeora, mientras usa Marvelon ,debe debe usted esto también a su médico decir.

- Usted fuma.
- Usted tiene diabetes.
- Usted está muy con sobrepeso.
- U tiene una presión arterial alta.
- U tiene una enfermedad de las válvulas cardíacas o una determinada arritmia.

- U tiene una inflamación en la venas cerca debajo de la piel (tromboflebitis superficial).
- Usted tiene varices.
- Alguien en su familia directa tiene alguna vez trombosis, un ataque al corazón o un derrame cerebral ha tenido.
- Usted tiene migraña.
- Usted tiene epilepsia.
- Usted tiene aumentados niveles de grasa en su sangre (hipertrigliceridemia), o esta afección ocurre en su familia o ha ocurrido en su familia anteriormente. Hipertrigliceridemia está en relación con un mayor riesgo de pancreatitis (una inflamación del páncreas) desarrollar ..
- debe ser operado o usted está durante largo tiempo no de pie (ver 'Coágulos de sangre (trombosis)' en sección 2).
- Si usted recientemente ha dado a luz , tiene u un aumentado riesgo de tener de coágulos de sangre. Pregunte su médico cómo pronto después de el parto usted puede comenzar con el uso de Marvelon.
- U tiene alguien en su familia directa que cáncer de mama ha tenido.
- U tiene una enfermedad del hígado o de la vesícula biliar.
- U tiene la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa (crónica intestinal).
- U tiene lupus eritematoso sistémico (LES - una enfermedad que su natural sistema inmunológico afecta).
- U tiene hemolítico-urémico síndrome (HUS - un trastorno de la coagulación sanguínea que insuficiencia renal causa).
- U tiene anemia de células falciformes (un hereditaria enfermedad de los glóbulos rojos).
- Usted tiene un trastorno que por primera vez apareció o empeoró durante un embarazo de en anterior uso de hormonas sexuales, por ejemplo pérdida de audición, porfiria (una enfermedad de la sangre), herpes gestationis (erupción cutánea con ampollas durante el embarazo) o corea de Sydenham (una enfermedad neurológica donde movimientos repentinos del cuerpo ocurren).
- Usted presenta síntomas de angio-edema como hinchazón de su cara, lengua y garganta y/o dificultades al tragar o urticaria posiblemente con problemas respiratorios . Consulte en este caso contacto directo con su médico. Productos con estrógenos pueden los síntomas de hereditario y adquirido angio-edema causar o empeorar.
- Usted tiene cloasma o usted tiene alguna vez cloasma ha tenido (manchas amarillentas de pigmentación, llamadas 'manchas del embarazo', especialmente en la cara); si esto el caso es, es prudente evitar exposición directa a luz solar o luz ultravioleta luz a evitar.

La píldora y coágulos de sangre (trombosis)

COÁGULOS DE SANGRE (TROMBOSIS)

Si usted un combinado hormonal anticonceptivo como Marvelon usa, tiene un mayor riesgo de un coágulo de sangre de tener recibir entonces si usted no combinado hormonal anticonceptivo usa. En raramente ocurrentes casos puede un coágulo de sangre un vaso sanguíneo obstruir y graves problemas causar. Coágulos de sangre pueden formarse

- en venas (esto se llama 'trombosis venosa', 'tromboembolismo venoso' o TEV llamado)
- en arterias (esto se 'trombosis arterial', 'tromboembolismo arterial' o ATE llamado).

No siempre se recupera completamente de coágulos de sangre. En raras ocasiones pueden haber efectos prolongados graves efectos ser, o en muy raras ocasiones pueden coágulos de sangre ser mortales letal son.

Es importante que usted sepa que el riesgo general de un coágulo dañino por Marvelon es pequeño . ¿CÓMO RECONOCER UN COÁGULO?

Llame

Interruptor urgente médica ayuda en si usted un de los siguientes síntomas o signos nota.

Tiene usted uno de estos síntomas de síntomas?	¿Dónde puede usted sufrir de?
<p>hinchazón de una pierna o a lo largo de una vena en una pierna o pie, especialmente si esto se acompaña de:</p> <ul style="list-style-type: none"> dolor o sensibilidad de la pierna, que usted posiblemente solo siente al estar de pie o caminar aumento de la temperatura en la pierna afectada cambio de color de la piel de el pierna, por ejemplo, pálida, roja o azul 	Profunda venosa trombosis
<p>repentina inexplicada dificultad respiratoria o respiración rápida</p> <p>tos repentina sin causa aparente, donde usted puede toser sangre</p> <p>agudo dolor en el pecho, que puede empeorar cuando respira profundamente</p> <p>profundo respira</p> <p>grave sensación de ligereza en la cabeza mareo</p> <p>rápido o irregular latido del corazón</p> <p>severo dolor en su estómago</p> <p>Si usted duda, póngase en contacto con un médico, porque deseo algunos de estos síntomas, como tos o dificultad para respirar, pueden erróneamente ser considerados como una afección más leve, como una infección respiratoria (por ejemplo, resfriado).</p>	Embolia pulmonar
<p>Síntomas aparecen generalmente en un ojo : inmediatamente pérdida de la visión, o</p>	Trombosis venosa en la

visión borrosa sin dolor, que puede desarrollarse hasta pérdida de la Trombosis venosa en la retina (coágulo de sangre)	retina la en el ojo)
¿Tiene alguno de estos síntomas o molestias?	¿De qué puede sufrir?
visión	
dolor, malestar, presión o una sensación pesada, apretada o llena en el pecho, brazo o debajo del esternón sensación de llenura, indigestión o dificultad para respirar malestar en la parte superior del cuerpo que se irradia hacia la espalda, mandíbula, garganta, brazo y estómago sudoración, náuseas, vómitos o mareos debilidad extrema, ansiedad o dificultad para respirar latidos cardíacos rápidos o irregulares	Ataque al corazón
debilidad repentina o entumecimiento de la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo confusión repentina, dificultad para hablar o entender dificultad repentina para ver en uno o ambos ojos dificultad repentina para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación dolor de cabeza repentino, severo o prolongado sin causa conocida disminución de la conciencia o desmayo con o sin convulsión Los síntomas de un derrame cerebral a veces pueden durar poco tiempo y recuperarse casi de inmediato y por completo. Sin embargo, aún debe buscar atención médica de emergencia, ya que puede tener riesgo de sufrir otro derrame cerebral.	Derrame cerebral
hinchazón y ligera coloración azulada de un brazo o pierna dolor severo en su abdomen (abdomen agudo)	Coágulo de sangre que obstruye otros vasos sanguíneos

COÁGULOS DE SANGRE EN UNA VENA

Wat kan er gebeuren als er een coágulo de sangre wordt gevormd in een vena?

- El uso de combinados hormonales anticonceptivos está en relación con un mayor riesgo de coágulos de sangre en una vena (trombosis venosa). Este Este efectos secundarios ocurren sin embargo raramente en. Generalmente aparecen en el primer año que un combinado hormonal anticonceptivo se utiliza.

- Si hay un coágulo de sangre se forma en una vena en una pierna o pie, puede causar una trombosis venosa profunda (TVP) provocar.
- Si un coágulo de sangre desde la pierna es transportado y en el pulmón llega, puede causar una embolia pulmonar provocar.
- Es muy frecuente raramente para que un coágulo de sangre se forma en una vena en otro órgano ,como el ojo (venosovenosa trombosis en el retina).

Cuándo es el riesgo de un coágulo de sangre en una vena el más alto?

El riesgo de un coágulo de sangre en una vena tener es el más alto en el primer año que una mujer por primera vez un anticonceptivo hormonal combinado anticonceptivo usado. El riesgo puede también aumentar estar si usted después de una interrupción de 4 semanas o más vuelve a empezar con el uso de un combinado hormonal anticonceptivo (mismo producto, o un otro producto que anteriormente).

Después del primer año se el riesgo más pequeño, pero permanece algo más alto que cuando usted no anticonceptivo hormonal combinado usa.

Si usted deja de Marvelon, su riesgo de en uno coágulo de sangre dentro algunas semanas de nuevo normal.

Cómo alto es el riesgo de un coágulo de sangre?

El riesgo depende de de su natural riesgo de TEV, y del tipo combinado hormonal anticonceptivo que usted usa.

El riesgo general de un coágulo de sangre en un pierna o pulmón (trombosis venosa profunda o embolia pulmonar) con Marvelon es pequeño.

- De cada 10.000 mujeres que no algún combinado hormonal anticonceptivo usar y no embarazada estar, obtener hay aproximadamente 2 en un período de un año un coágulo de sangre.
- De cada 10.000 mujeres que un combinado hormonal anticonceptivo usan que levonorgestrel, noretisterona o norgestimato contiene, obtienen aproximadamente 5-7 de cada 5-7 en uno año uno coágulo de sangre.
- De cada 10.000 mujeres que uno combinado hormonal anticonceptivo usan que desogestrel contiene, como Marvelon, obtener hay aproximadamente entre los 9 y 12 en un año un coágulo de sangre.
- El riesgo de un coágulo de sangre tener obtener es dependiente de su historial médico personal (ver las secciones 'Factores que su riesgo de un coágulo en uno vena2Farteria aumentar' a continuación).

	Riesgo de en un año tener un coágulo de sangre
Mujeres que no utilizan hormonal píldora/parche/anillo y no están embarazadas	Aproximadamente 2 de cada 10.000 mujeres
Mujeres que una píldora combinada usan que levonorgestrel, noretisterona o norgestimato contiene	Aproximadamente 5-7 de cada 10.000 mujeres
Mujeres que Marvelon usan	Aproximadamente 9-12 de cada 10.000 mujeres

Factores que su riesgo de un coágulo de sangre en una vena aumentar

El riesgo de un coágulo de sangre con Marvelon es pequeño, pero hay ciertas circunstancias que aumentan el riesgo .. riesgo es mayor más alto:

- si usted grave obesidad tiene (IMC [índice de masa corporal] mayor de 30 kg/m²)
- si uno de sus cercanos familiares a temprana edad (por ejemplo antes el 50° año) un coágulo de sangre ha tenido en una pierna, pulmón o otro órgano. En ese caso puede usted una hereditaria trastorno de coagulación tener.
- si usted una operación debe someterse, o si usted largo tiempo no está de pie debido a una lesión o enfermedad, o si su pierna en el yeso está. El puede ser necesario para antes de una cirugía , ocuando usted menos móvil está, algunos algunos semanas a dejar con el uso de Marvelon. Si necesita dejar de Marvelon, pregunte a su médico cuándo puede volver a empezar con el uso uso.
- si usted mayor se vuelve (en particular por encima aproximadamente 35 años)
- si usted en las últimas pocas semanas ha dado a luz .

El riesgo de un coágulo de sangre aumenta a medida que hay más de estas condiciones se aplican a usted . Un viaje en.

Un viaje por más de 4más largo dan 4 hora) puede su riesgo de un coágulo de sangre temporalmente aumentar, especialmente si hay algunas otras de las mencionadas circunstancias circunstancias en usted aplicable son.

Es importante que le su médico informe si una o más de estas condiciones en usted aplicable son, incluso si usted sobre esto duda. Su médico puede decidir que usted debe dejar de usar Marvelon.

Si uno de las mencionadas anteriormente circunstancias cambia mientras usa Marvelon ,por ejemplo si un pariente cercano tiene un coágulo de sangre (trombosis) recibe sin conocida causa, o si usted mucho en peso aumenta, informe esto entonces a su médico.

COÁGULO DE SANGRE EN UNA ARTERIA

Qué puede er ocurrir si er un coágulo de sangre se forma en una arteria?

Al igual que un coágulo de sangre en una vena, puede un coágulo de sangre en una arteria graves problemas causar. Puede por ejemplo un ataque al corazón o un derrame cerebral causar causar.

Factores que su riesgo de un coágulo de sangre en una arteria aumentan

Es importante que usted sepa que el riesgo de uno ataque al corazón o accidente cerebrovascular por el uso de Marvelon muy pequeño es, pero mayor puede volverse:

- con aumento de edad (por encima aproximadamente 35 años)
- si usted fuma. Si usted un combinado hormonal anticonceptivo como Marvelon usa, se recomienda que usted deje con fumar. Si usted no puede dejar de fumar y mayor es de 35 años, puede su médico le recomendar que un otro tipo anticonceptivo para usar.
- si usted sobrepeso tiene
- si usted alta presión arterial tiene

- si un miembro de su cercana familia en joven edad (antes de los 50 años) un ataque al corazón o derrame cerebral ha tenido. En ese caso puede usted también uno aumentado riesgo tener para un ataque al corazón o derrame cerebral obtener ..
- usted, o un miembro de su cercana familia ,, un aumento de grasa en la sangre tiene (colesterol o triglicéridos)
- si usted sufre de migraña padece, especialmente migraña con aura
- si usted un enfermedad cardíaca tiene (enfermedad de la válvula cardíaca, o una arritmia que fibrilación auricular se llama)
- si usted diabetes (diabetes) tiene.

Si más entonces un de estas condiciones en usted de aplicación es, o si un de estas enfermedades particularmente grave es, puede el riesgo de obtener de un coágulo de sangre incluso aún más aumentado estar.

Si un de las mencionadas anteriormente circunstancias cambia mientras usa Marvelon utiliza, por ejemplo si usted comienza a fumar o si un pariente cercano un coágulo de sangre (trombosis) tiene sin conocida causa, o si usted mucho en peso aumenta, informe esto entonces a su médico.

La píldora y cáncer

En mujeres que usan píldora utilizan se algo más cáncer de mama diagnosticado que en no usuarias de la píldora de la misma edad. Diez años después de dejar con la píldora no hay ninguna diferencia más. Es no conocido si esta diferencia es causada por la píldora. Puede también ser debido porque usuarias de píldoras más a fondo y con más frecuencia son examinadas, de modo que el cáncer de mama se detecta antes ..

raros casos se han en usuarias de la píldora benignos tumores hepáticos encontrados y en aún más raros casos malignos tumores hepáticos. A veces han estos tumores llevado a una que amenaza la vida interna sangrado. Si usted de repente tiene problemas con dolor abdominal, entonces debe usted inmediatamente ponerse en contacto con su médico .

Crónico infección con el virus del papiloma humano es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino. En mujeres que toman la píldora durante un período prolongado de tiempo puede de probabilidad de contraer de cáncer de cuello uterino ligeramente aumentada está. Es sin embargo no claro si esto es causado por la píldora, o que el hacer tiene con sexual conducta y otros factores (comomejor control del cuello uterino).Trastornos mentales trastornos

Algunas mujeres que hormonales anticonceptivos incluyendo Marvelon usan, han informado de de depresión o tristeza. La depresión puede seria son y puede a veces a pensamientos suicidas conducir. Si usted cambios de humor y síntomas de depresión experimenta, contacte lo más rápido posible con su médico para más médico consejo.

Usa usted otros medicamentos ?Usa

usted además Marvelon otros medicamentos o remedios herbales de remedios herbales, ha usted eso recientemente hecho o va usted esto quizás pronto hacer ?Dígale eso entonces su médico, médico, farmacéutico o partera. Esto se aplica también a medicamentos que usted sin receta puede obtener. Informe también a cualquier otro médico o dentista (de farmacéutico) que

le un otro medicamento prescribe que usted Marvelon usa. Ellos pueden entonces decirle si es necesario es un extra no hormonal anticonceptivo (por ejemplo un condón) usar y también cuánto tiempo usted eso entonces debe usar o eso el uso de un otro medicamento que usted necesita tiene, debe cambiar.

No use Marvelon si tiene hepatitis C tiene en para esto medicamentos con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir o glecaprevir/pibrentasvir usado, porque esto un aumento de uno enzima hepático (ALAT, uno prueba de función hepática) puede causar. Su médico prescribirá un otro anticonceptivo antes de que comience con con esta tratamiento. Marvelon puede aproximadamente 2 semanas después del de este tratamiento nuevamente ser iniciado. Ver sección 2 'Cuándo puede este medicamento no usar?').

Algunos medicamentos

- pueden una influenza tener en los niveles sanguíneos de Marvelon
- pueden Marvelon menos eficaz hacer para embarazo a prevenir
- pueden inesperadas hemorragias causar.

Estos incluyen entre otros medicamentos para el tratamiento de:

- epilepsia (por ejemplo primidona, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, felbamato)
- tuberculosis (por ejemplo rifampicina, rifabutina)
- infección por VIH (por ejemplo ritonavir, nelfinavir, nevirapine, efavirenz)
- hepatitis C-infección viral (por ejemplo boceprevir, telaprevir)
- otras infecciones (por ejemplo griseofulvina)
- alta presión arterial en los vasos sanguíneos de los pulmones (bosentan)
- depresivo estado de ánimo (el remedio herbal hierba de San Juan).

Si usted medicamentos o remedios herbales usa que Marvelon menos efectivo pueden hacer, debe usted también un método anticonceptivo de barrera usar. Porque el efecto de un otro medicamento sobre Marvelon hasta 28 días después de la suspensión de ese medicamento puede persistir, debe usted que extra método anticonceptivo de barrera durante que tiempo seguir usando.

Marvelon puede el efecto de otros medicamentos afectar, por ejemplo:

- medicamentos que ciclosporina contienen
- el anti-epiléptico medicamento lamotrigina (esto puede conducir a un aumento del número de ataques)

Análisis de laboratorio

Análisis de laboratorio Si se análisis de sangre u debe ser hecho, informe entonces su médico o el personal de laboratorio que usted está usando la píldora .. hormonales pueden de hecho el de resultados de algunos exámenes afectar.

Embarazo y lactancia

Embarazo

Si está embarazada , o piensa que está embarazada podría ser estar puede Marvelon no usar. Si sospecha que está embarazada mientras está usando Marvelon , contacte lo antes posible con su médico. Lactancia El

Lactancia

El uso de Marvelon se en general no se recomienda mientras una mujer está amamantando . Si deseala píldora aún quiere usar mientras usted todavía aún lactancia da, puede usted el mejor contacto contactar con su médico.

Conducción y el uso de máquinas

No hay ninguna indicación que el conducción y la capacidad para manejar máquinas puede usar afectada ser.

Marvelon contiene lactosa

Si su médico le ha informado que usted ciertos azúcares no tolera, consulte con su médico antes de que este medicamento tome.

Niños y adolescentes hasta 18 años

Hay ninguna clínica información sobre la eficacia y seguridad en adolescentes menores de 18 años.

Cuándo debe usted ir al médico durante el uso de este medicamento?

3. ¿Cómo toma usted este medicamento ?

Tome este medicamento siempre exactamente como su su médico o farmacéutico usted eso ha dicho. Duda usted sobre el correcto uso? Entonces contacte a su médico o farmacéutico.

Cuándo y cómo toma u de tabletas en?

La tira contiene 21 tabletas. En cada tableta se indica especificado en qué día esta debe ser tomada. Tome la tabletas cada día aproximadamente a las misma hora en, si es necesario con un poco de agua. Siga la dirección de la flecha que está en la tira indicada hasta que haya tomado las 21 tabletas completas ingerido. Después toma usted 7 días ninguna tableta. Durante estos 7 días debería una hemorragia comenzar (la llamada hemorragia por privación).). Esta comienza generalmente en el 2° o 3° día después de la última tableta de Marvelon. Comience en el 8° día con la siguiente tira, independientemente de si el sangrado ya ha terminado o no. Dit significa que usted siempre en el mismo día de la semana con un siguiente blíster comienza, y también que la hemorragia por privación cada mes aproximadamente en mismos días cae.

Cuándo empezar con la primera tira

Usted ha el último mes no ha usado píldora anticonceptiva.

Comience con Marvelon en el primer día de la ciclo (el primer día de su menstruación). Marvelon funciona en este caso directamente y usted no necesita ningún extra anticonceptivo que usar.

Puede también en día 2-5 del ciclo comenzar pero entonces debe en los primeros 7 días sí uno extra anticonceptivo (por ejemplo un condón) usar.

Cambio de otra píldora combinada, anillo vaginal o parche anticonceptivo

U puede con Marvelon comenzar en el día después de que haya tomado la última tableta de su anterior píldora ha tomado (así sin pausa). Si hay en su anterior píldora también no activas tabletas en la tira están, debe usted inmediatamente continuar después la última activa tableta de su anterior píldora (si usted no sabe cuál es , pregunte entonces a su médico o farmacéutico). Puede también comenzar más tarde, pero nunca más tarde del día después del de la período sin tabletas de su su anterior píldora (o después de la última tableta no activa de su anterior píldora).

Si cambia de un anillo vaginal o parche anticonceptivo puede comenzar con Marvelon empezar el día de extracción del anillo o el último parche. Puede también más tarde comenzar, pero usted debe en su último siete días después de la extracción del anillo o el último parche con Marvelon comenzar.

Cuando usted la píldora, parche o anillo completamente según el prescripciones ha usado y usted está seguro de que usted no embarazada está, puede usted además detener con el tomar de la píldora o el anillo o parche retirar en cada día de su actual ciclo y inmediatamente cambiar al uso de Marvelon.

Si usted estas instrucciones sigue no es necesario usar un método anticonceptivo (por ejemplo un condón) utilizar ..

Cambio de una píldora progestágena (minipíldora)

Usted puede de la una a la otra día cambiar a Marvelon, pero usted debe la primera 7 días sí un extra anticonceptivo (por ejemplo un condón) usar.

Cambio de la inyección anticonceptiva, un implante o uno que contiene hormonas dispositivo intrauterino

Comience con Marvelon cuando usted de otra manera la siguiente inyección debería recibir o en el día en que el implante o que contiene hormonas dispositivo intrauterino se elimina. U debe el primeros 7 días sin embargo sí un extra anticonceptivo (por ejemplo un condón) usar.

Después de un parto

Si acaba de dar a luz , su médico probablemente le recomendará esperar hasta su primera menstruación espontánea , pero a veces, pero a veces es posible antes de comenzar. Siga el consejo de su médico. Eso aplica también para el caso de lactancia materna en de píldora desea usar.

Después de un aborto espontáneo o aborto

Siga el consejo de su médico.

¿Ha usted demasiado mucho de este medicamento tomado?

Existen no reportes de efectos graves dañinos de tomar muchas de Marvelon tabletas a la vez simultáneamente. Si usted ha tomado varias tabletas a la vez ,puede que experimente molestias como náuseas , vómitoso vomitar de vaginal pérdida de sangre. Si usted descubre que un niño Marvelon ha ingerido, consulte entonces su médico para consejo.

Qué hacer ...

...en el olvido de comprimidos

Si usted **menos de 12 horas tarde está** con la toma de un uno tableta entonces es el efecto de la píldora no se reduce. Tome esa tableta entonces tan pronto como usted piensa en ello y toma las siguientes tabletas de nuevo a la hora habitual.

más de 12 horas tarde **más de 12 horas de retraso** eficacia de la píldora se vea reducida. Cuantas más tabletas haya olvidado consecutivamente, mayor será la probabilidad de que de la píldora se reduzca es. La probabilidad de protección insuficiente contra el embarazo es mayor si se omiten comprimidos al principio o al final del blíster. Por lo tanto, se aplican las siguientes reglas (ver también el esquema):

Más de 1 comprimido olvidado en un blíster

Póngase en contacto con con su médico.

1 tableta olvidada en semana 1

Tome la tableta olvidada tan pronto como lo recuerde, incluso si esto significa que debe tomar dos tabletas al mismo momento debe tomarlas. Tome además las tabletas nuevamente a la hora habitual en, pero usted también debe usar métodos anticonceptivos adicionales durante 7 días. Si ha tenido relaciones sexuales en la semana anterior a la omisión, debe considerar la posibilidad de embarazo. En ese caso, póngase en contacto con su médico de inmediato.

1 tableta olvidada en semana 2

Tome la tableta olvidada tan pronto como lo recuerde, incluso si esto significa que debe tomar dos tabletas al mismo momento debe tomar. Tome además las tabletas nuevamente en el habitual tiempo en. El La eficacia de la píldora no se ha reducido, no necesita usar anticonceptivos adicionales.

1 tableta olvidada en semana 3

Usted puede elegir entre 2 opciones sin adicional anticonceptivos que necesitar usar.

1. Tome la tableta olvidada tan pronto como piense en ello, incluso si esto significa que debe tomar dos tabletas al mismo tiempo. Continúe tomando las tabletas a la hora habitual. **Además, omite el período sin tabletas** y continúe inmediatamente con el siguiente blíster. Muy probablemente recibirá usted solo al final del final de la segunda tira real sangrado por privación, pero puede experimentar manchado o sangrado intermenstrual durante el segundo blíster.
2. También puede dejar de tomar el blíster correspondiente. Mantenga un período sin tabletas de 7 días o menos a (**cuenta siempre el día en que usted la tableta ha olvidado**).Después continúe va u simplemente continúe con el siguiente blíster.

Si sigue este método, siempre podrá comenzar el nuevo blíster en su día de inicio

habitual.

Si ha olvidado tomar tabletas en un blíster y no tiene sangrado en el próximo período normal sin tabletas, esto podría significar que está embarazada. Debe contactar a su médico antes de continuar con el siguiente blíster.

... en caso de trastornos gástricos y/o intestinales (por ejemplo, vómitos, diarrea severa) Si vomita o tiene diarrea severa, existe la posibilidad de que los principios activos no se absorban completamente en el cuerpo. Si vomita dentro de las 3-4 horas después de tomar una tableta, esta situación es similar a la de olvidar una tableta. Por lo tanto, en caso de vómitos, siga el mismo consejo que se indica arriba para el olvido de tabletas. Si tiene diarrea severa, consulte a su médico.

... si desea posponer su menstruación

Es posible posponer su menstruación, aunque no se recomienda. En casos excepcionales, puede posponer su menstruación continuando con un nuevo blíster de Marvelon sin un período sin tabletas. Puede continuar con este blíster hasta que se terminen todas las tabletas o detenerse antes si lo desea. Durante el uso de este segundo blíster, puede experimentar sangrado intermenstrual o manchado. Después del período habitual sin tabletas de 7 días, comience de nuevo con el siguiente blíster.

... si desea cambiar el día de inicio de su menstruación

Si toma sus tabletas según las indicaciones, su menstruación comenzará aproximadamente el mismo día cada vez. Si desea cambiar este día, puede hacerlo acortando el período normal sin tabletas entre dos blísters (pero nunca alargándolo). Por ejemplo, si su menstruación normalmente comienza el viernes y desea cambiarla al martes (3 días antes), entonces debe comenzar el nuevo blíster 3 días antes de lo habitual. Si hace que el período sin tabletas sea muy corto (por ejemplo, 3 días o menos), puede suceder que no tenga sangrado durante este período sin tabletas. Puede experimentar sangrado intermenstrual o manchado durante el siguiente blíster.

... en caso de sangrado inesperado

Con todas las píldoras anticonceptivas, a veces puede ocurrir sangrado inesperado (manchado o sangrado intermenstrual) en los primeros meses. Puede que necesite usar una compresa o tampón. En cualquier caso, continúe tomando sus tabletas normalmente. El sangrado irregular generalmente se detiene una vez que su cuerpo se ha acostumbrado a la píldora (después de aproximadamente 3 blísters). Si dura más, empeora o comienza de nuevo, debe contactar a su médico.

... si no se produce el sangrado esperado

Si ha tomado todas las tabletas correctamente, no ha tenido vómitos y/o diarrea, y no ha usado otros medicamentos, es muy poco probable que esté embarazada. Puede continuar con el siguiente blíster con tranquilidad.

Sin embargo, si el sangrado esperado no ocurre dos veces seguidas, podría estar embarazada. Contacte a su médico de inmediato. No continúe con el siguiente blíster de Marvelon hasta que su médico haya confirmado que no está embarazada.

Si deja de tomar el tomar de este medicamento

Usted puede con Marvelon dejar cuando quiera. Si no embarazada quiere quedar, consulte a su médico para consejo con relación a otros métodos fiables de control de natalidad.

Si usted deja porque desea quedar embarazada desea ser, se en general recomendado om te esperar hasta que usted una natural menstruación ha tenido antes de que usted intente en embarazo quedar embarazada. Usted puede entonces más fácil calcular cuándo el parto tendrá lugar.

4. Posibles efectos secundarios

Como cualquier medicamento puede también este medicamento tener efectos secundarios. No todos experimentan eso que ver. usted un efecto secundario especialmente si este grave de naturaleza es y es en lang persiste, o ocurre hay un cambio en su estado de salud del cual usted piensa que es causado puede ser por Marvelon? Entonces contacte a su arts.

Alle vrouwen die combinados hormonales anticonceptivos usan tienen un mayor riesgo de coágulos de sangre en las venas (tromboembolismo venoso [VTE]) o coágulos de sangre en las arterias (trombosis arterial- embolia [ATE]). Consulte para más información sobre los diferentes riesgos del uso de combinados hormonal anticonceptivos sección 2 'Cuándo no debe este medicamento no usar o debe tener especial cuidado con ello?'

Póngase en contacto inmediatamente con su médico si usted síntomas de angio-edema tiene como hinchazón de su cara, lengua yo garganta yo dificultades al tragar tragar de urticaria posible con problemas respiratorios (ver sección 2 'Cuándo debe tener cuidado con este medicamento ?').Como

en en todas píldoras combinadas, puede su patrón menstrual cambiar, especialmente durante los primeros meses del uso. Esta diferencia puede estar en cómo a menudo usted un sangrado tiene (ausencia de la hemorragia, menos frecuente, más frecuente o continuo), cuán grave el sangrado es, o cuánto tiempo la hemorragia dura.

Frecuente (ocurren en menos de 1 de cada 10 mujeres)estados

- depresivos ,cambios de humor dolor de cabeza
- náuseas
- náuseas dolor abdominal dolor abdominal
- sensibles senos, dolorosos senos
- aumento de peso.

A veces (ocurren en menos de 1 de cada 100 mujeres)retención de líquidos

- menos deseo de
- tener relaciones migraña
- vomitar
- vomitar, diarrea
- erupción cutánea, urticaria (ronchas)
- agrandamiento de los senos.

Rara vez (ocurren en menos de 1 de cada 1000 mujeres))

- dañinos coágulos de sangre en una vena o arteria, por ejemplo:
 - o en una pierna o pie (por ejemplo trombosis venosa profunda)
 - o en un pulmón (por ejemplo embolia pulmonar)
 - o ataque al corazón
 - o derrame cerebral
 - o 'pequeño derrame cerebral' o síntomas temporales como en un derrame cerebral, conocido como AIT (ataque isquémico transitorio)
 - o coágulos de sangre en el hígado, estómago2Fintestinos, riñones o ojos. La probabilidad de un coágulo de sangre tener es mayor más grande si hay otras condiciones que le aplican están que este riesgo aumentan (ver sección 2 para más información sobre las condiciones que el riesgo de coágulos de sangre aumentan y los síntomas de un coágulo de sangre).
- reacciones de hipersensibilidad
- más ganas de tener relaciones sexuales
- irritación de los ojos al el uso de lentes de contacto
- dolorosos, nódulos azulados en la piel (eritema nudoso), erupción cutánea con irregulares manchas rojas o úlceras (eritema multiforme) úlceras (eritema multiforme)
- secreción de la pezón, cambio en la secreción de la vagina
- pérdida de peso.

El informe de efectos secundarios

¿Tiene efectos secundarios , póngase en contacto con, póngase en contacto con su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a los efectos secundarios que no están en este prospecto . Usted puede reportar los efectos secundarios también a través de el Nederlands Efectos secundarios Centro Lareb, sitio web: www.lareb.nl. Al efectos secundarios a reportar, ayuda usted nosotros a más información a obtener sobre la seguridad de este medicamento.

5. Cómo almacena usted este medicamento?

Fuera de la vista y alcance de los niños mantener.

Use este medicamento no más na de última fecha de caducidad. Esa encuentra usted en la caja y la tira blíster después de EXP. Allí indica un mes y un año. La último día de ese mes es la fecha de caducidad fecha de caducidad.

por debajo de 30 °C. No en el congelador conservar ..
en el blíster original empaque blíster ter protección contra la luz y la humedad.

No tome este medicamento si ve por ejemplo que las tabletas están descoloridas tabletas descolorido de desmenuzado son o cuando usted otros signos visibles de deterioro en calidad observe.

No tire medicamentos por el fregadero fregadero o de wc y tire los no en el basurero. Pregunte a su farmacéutico qué hacer con medicamentos debe hacer que no más usa. Si usted medicamentos de la manera correcta desecha se destruyen de manera correcta y no llegan al medio ambiente en el medio ambiente Contenido.

6. Contenido de empaque y otra información

Qué sustancias contiene este medicamento ?Los

- principios activos de este medicamento son desogestrel desogestrel (150 microgramos) en etinilestradiol (30 microgramos).
- El otros componentes en este medicamento son dióxido de silicio coloidal anhidro, lactosa monohidrato, almidón de patata, povidona, ácido esteárico, all-rac-alfa-tocoferol.

Cómo se ve Marvelon y qué contiene un empaque ?El empaque contiene 1, 3 o 6 1, 3 o 6 tiras de blíster con 21 comprimidos.
No todos los mencionados tamaños de envase se en el comercio introducidos.

Los comprimidos son blancos, redondos, en ambos lados redondo y tienen un diámetro de 6 mm. En el un lado está 'TR' encima de '5' y en el otro lado 'Organon' en un de cinco puntas estrella.

Titular de la autorización para la comercialización y fabricante N.V. Organon
Kloosterstraat Calle del Monasterio 6
Países Bajos
Tel.: 00800 66550123 (+32 2 2418100)
dpoc.benelux@organon.com
dpoc.benelux@organon.com

En el registro inscrito bajo: RVG 08859

Este prospecto es para el última aprobado en mayo 2025