

Pakendi infoleht: teave kasutajale de kasutaja

Marvelon, tabletid

desogestreel, etinüülöstradiool

Olulised asjad mida te peate teadma üle kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase vahendid:

- Need vahendid kujutavad ühte kõige usaldusväärsematest pöörduvatest rasestumisvastastest meetoditest rasestumisvastased meetodid kui õigesti kasutatud ..
- annavad veidi väiksema midagi kõrgem risk tekkele trombi alates ühe verehüübe (tromboos) veenides ja arterites ,eriti esimesel aastal kui te see te üks kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane vahend kasutatakse või kui te pärast üks paus 4 nädalat või kauem jälle alustate kasutamisega kasutamine alates üks kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane.
- Pange hästi tähele ja võtke ühendust oma arstiga kui te arvate et te võimalik sümptomid on üks verehüübe on (vt jaotis 2 'Verehüübed (tromboos)').

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht enne kui seda ravimit hakkate kasutama sest on oluline teave sees teie jaoks.

- Säilitage see infoleht. Võib-olla vajate seda hiljem uuesti ..
- teil veel küsimusi küsimused? Võtke ühendust teie arstiga või apteekriga.
- Ärge andke seda ravimit mitte edasi teistele , sest see on ainult teile määratud . See võib võib kahjulik on teistele ,isegi kui neil on samad kaebused nagu teil. Kas
- teil tekib mõni kõrvaltoimetest mis on jaotises sure rubriik 4 seisab? Või saate te ühe kõrvaltoime mis ei selles selles infolehes seisab? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

Sisu kohta see pakendi infoleht

1. Mis on Marvelon ja milleks kasutatakse seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik kaasa on?
3. Kuidas võtate te seda ravimit sisse?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas säilitate te seda ravimit?
6. Sisu pakendi sees en muud teave

1. Mis on Marvelon ja milleks seda ravimit kasutatakse ?Koostis

ja tüüp pill Marvelon on

üks kombineeritud suukaudne rasestumisvastane pill rasestumisvastane tablett (de 'kombinatsioonipill'). Iga tablett sisaldab väikest kogust kahest erinevast naissuguhormoonist naissoost nimelt desogestreel (hormoon progesteronilaadsetoimega hormoon koos progesteronilaadne toime) ja etinüülöstradiool (üks hormoon koos östrogeense toimega). Tänu väikesele kogusele hormoone ,peetakse Marvelon arvatakse olevat kui üks madala annusega rasestumisvastane vahend. Kuna mõlemad hormoonid kõigis tablettides ribas samas koguses kombineeritud on, nimetatakse seda ühefaasiliseks -- kombinatsioonipill nimetatud.

Milleks kasutatakse seda ravimit kasutatakse?

Marvelon kasutatakse raseduse ärahoidmiseks rasedus Kui Marvelon õigesti kasutatakse.

Kui Marvelon õigesti kasutatakse võetakse (ilma et tabletid unustatakse) ontõenäosus võimalus rase jääda väga väike. Millal.

2. seda ravimit mitte ravim ei kasutama või peab te olema eriti ettevaatlik sellega olema?

Üldised märkused

Lugege enne kui te alustate Marveloni kasutamist Marveloni teave verehüüvete kohta (tromboos) in rubriik 2. See on eriti oluline et te loete millised on sümptomid on verehüüve üks verehüüve – vaata rubriik 2 'Verehüübed (tromboos)'.

Selles infolehes kirjeldatakse mõningaid olukordi kus peate lõpetama pillide kasutamise või peatama kasutamise pillide või koos kus de usaldusväärsus van de pill vähenenud võib olla. In sellistes olukordades peate te ennast hoiduma seksuaalsest vahekorra või kasutama üht täiendav rasestumisvastane vahend ilma hormoonideta kasutama, näiteks üks kondoom või muu barjäärimeetod. Ärge kasutage kalendri - või temperatuurimeetodit. temperatuurimeetod. Need meetodid võivad olla ebausaldusväärsed sest kuna pill mõjutab keha normaalset temperatuurimuutust ja emaka limaskestast muutusi kehatemperatuuri ja emaka limaskestast ajal menstruaaltsükkel.

Marvelon pakub samamoodi nagu teised hormonaalsed rasestumisvastased vahendid ei kaitse hiv vastu infektsiooni- muude seksuaalsel teel levivate haiguste haigused (suguhaigused).

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada? Te ei tohi seda ravimit kasutada kui teil on üks järgmistest haigustest alates allpool mainitud haigused on. Kui teil üks nendest allpool mainitud haigustest on, rääkige sellest siis oma arstile. Teie arst arutab teiega milline teine vorm vorm rasestumisvastane vahend sobivam on teile. Vaata ka jaotist ' Millal peate te lisaks Millal peab teie lisaks ettevaatlik olema koos selle ravimiga? '.

- Te olete ühe verehüübe sees ühe veresoone jalgade sees (sügav venoosne tromboos, DVT), de kopsud (kopsuemboolia) või mõni teine organ, või teil on see minevikus olnud ..
- teate et teil on häire häire on alates teie vere hüübimine – näiteks valk C- puudulikkus, valk S- puudulikkus, antitrombiin-III-puudulikkus, faktor V-Leiden või antikehad vastu fosfolipiidid.
- Teid tuleb olla opereeritud või te olete pika aja jooksul mitte jalul (vt jaotis 'Verehüübed (tromboos)').
- Teid on kunagi üks südameatakk või üks insult olnud.
- Teil on stenokardia (üks haigus mis tugev valu rinnus põhjustab põhjustab en üks esimene sümptom alates üks südameatakk võib olla) või üks 'mööduv isheemiline atakk' (TIA: mööduvad sümptomid alates üks insult) või te on see kunagi olnud.
- Teie on üks järgmistest haigustest, missuurendab riski verehüübe tekkeks teie arterites võib olla põhjustatud suurendama:
 - raske diabeet koos kahjustus veresoonte -
 - kõrge vererõhk -
 - raske kõrge rasvasisaldus teie veres veri veri (kolesterool triglütseriidid)
 - üks haigus mis hüperhomotsüsteineemia nimetatakse ..

- olete üks migreeni tüüp mida 'migreen auraga' nimetatakse (või nimetatud (of on see kunagi olnud).
- Te on pankreatiit (üks põletik kõhunäärme kohta) või on see olnud, kombineeritud koos üks kõrge rasvasisaldus sisse teie veres.
- Teil on kollatõbi (kollane värvimuutus naha või silmade) võiraske maksahaigus raske maksahaigus of on see olnud, ja de tulemused kohta maksafunktsiooni testid on veel mitte normaalne.
- Te on üks vorm kohta vähk või on see olnud mis tundlik võib olla hormoonide suguhormoonid (nagu rinnavähk või vähk suguelundite).Te
- U on maksavähk või on seda olnud.
- Teie on ebatavaline veritsus vaginast mille põhjus ei ole kindlaks tehtud . on kindlaks tehtud.
- U on üks ebanormaal paksenemine emaka limaskest.
- Te olete allergiline ühe komponendi selle ravimi sees selles ravimis. Need ained võib leida leida jaos rubriigis 6 sellest selle infolehe.

Kui üks nendest mainitud olukordadest tekib kui te juba kasutate Marveloni kasutate, siis peate u kohe lõpetama kasutamise kasutamine ja võtke ühendust oma arstiga. Kasutage vahepeal teist meetodit mitte -hormonaalset vahendit- mitte meetod alates rasestumisvastane vahend. Vaata ka 'Üldised märkused' alguses algus jaotis 2.

Ärge kasutage Marvelon'i kui teil on C-hepatiit C-hepatiit on en selleks ravimid met ombitasvir2Fparitaprevir2Fritonavir ja dasabuvir või glecaprevir2Fpibrentasvir kasutatakse (vt ka jaotis 2 'Kasutatakse u veel teised ravimid?').

Millal peab te lisaks ettevaatlik olema selle selle ravimiga?

Millal peab te ühendust võtma oma oma arst?

Kutsu kiireloomuline meditsiiniline abi sisse

- kui te võimalikke kaebusi või sümptomeid verehüübe ühte märgata , misvõivad tähendada et et u kannatab all ühe verehüübe in teie jalg (s.t. süvaveeni tromboos),ühe verehüübe in teie kops (s.ts.t.. kopsuemboolia), üks südameatakk või üks insult (vaata allpool jaotist ' VerehüübedVerehüübed tromboos)').Mine

edasi jaoks üks kirjeldus alates kaebused või sümptomid alates selle tõsised kõrvaltoimed vaata 'Kuidas tuvastada te üks verehüüve?'.

Rääkige seda oma arst, kui üks järgmistest olukordadest kehtib teie kohta . Kui haigus tekib või halveneb ,samal ajal kui te kasutate Marvelon'i , peate, peab u seda ka oma oma arstile rääkida.

- Teie suitsetate.
- Teie on diabeet.
- Te olete väga ülekaaluline ..
- U on üks kõrgenenud vererõhk.

- U on üks haigus südameklappide või üks teatud südame rütmihäire südame rütmihäire.
- on üks üks põletik in de veenid vahetult naha de all (pindmine tromboflebiit).
- Te on veenilaiendid.
- Keegi in teie otsene perekond on kunagi tromboos, üks südameatakk või üks insult olnud.
- Teil on migreen.
- Teil on epilepsia.
- Teil on kõrge rasvasisaldus sisse teie veres (hüpertriglütserideemia), või see haigus esineb sisse teie perekonnas või on teie perekonnas esinev esinev. Hüpertriglütserideemia on seotud toodud koos ühe kõrgema riskiga pankreatiidi (ühe põletik kõhunäärme kõhunäärresaama . Te.
- olema peab saama opereeritud või te olete kestel pikka aega mitte jalul (vaata 'Verehüübed (tromboos)' jaos 2). Kui te
- hiljuti sünnitasite , on teil on u üks suurenenud risk verehüüvete saamise oht verehüübed. Küsige oma arstilt, kuidas kiiresti pärast sünnitust sünnitus te saate alustada koos kasutamine Marveloni.
- Te on keegi teie teie otseses perekonnas kellel rinnavähk on olnud.
- Teil on maksahaigus või sapipõie haigus.
- U on de Crohni tõbi või haavandiline koliit (krooniline soolehaigus).
- U on süsteemne erütematoosluupus (SLE - üks haigus mis teie loomulikke immuunsüsteem kahjustab).
- Te olete hemolüütilis-ureemiline sündroom (HUS - üks häire verehüübimise mis põhjustab neerupuudulikkust põhjustab).Te
- olete sirprakuline aneemia sirprakuline aneemia (üks pärilik haigus punaste vereliblede).
- Teie teil on üks seisund mis esmakordselt raseduse ajal ilmnes või halvenes raseduse ajal raseduse of juures varem kasutamine van suguhormoonid, näiteks kuulmislangus, porfüüria (üks verehäire), herpes gestationis (nahalööve koos villidega raseduse ajal rasedus) või Sydenhami korea (üks närvihaigus kus äkilised liigutused keha toimuvad esinevad).
- Te saate sümptomid angio-ödeem nagu turse näo teie nägu, keel ja/ või kurk ja/ või raskused juures neelamine neelamisel või nõgestõbi võimalik koos hingamisraskustega. Võtke sellisel juhul võtke otse ühendust oma arstiga. Tooted koos östrogeenidega võivad sümptomeid pärilikust ja omandatud angio-ödeemist põhjustada või süvendada sümptomeid või.
- Teie on kloasm või teil on kunagi kloasmat olnud (kollakaspruunid pigmentlaigud, nn 'raseduslaigud', eriti näol näol); kui see see juhtum on, on see mõistlik et otsest kokkupuudet päikesevalgusega või ultraviolet- valgusega vältida .
Tablett.

verehüübed (tromboos verehüübed (tromboos)

VERESOONTE TROMBID (TROMBOOS)

Kui te üks kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane vahend nagu Marvelon kasutate, on teil suurem risk saada üks verehüübe tekkida te saama siis kui te ei kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane vahend kasutate. Harvadel harva esinevates juhtudel võib verehüübe veresoon ummistada veresoon ummistada ja tõsised probleemid põhjustada. Verehüübed võivad tekkida

- veenis veeni (seda nimetatakse 'venoosne tromboos', 'venoosne tromboemboolia' või VTE nimetatakse)
- sisse arterid (see nimetatakse 'arteriaalne tromboos', 'arteriaalne tromboemboolia' või ATE nimetatakse).

Inimene ei taastu alati täielikult täielik vahel verehüübed. Aastal harva esinevates juhtudes võivad esineda pikaajalised tõsised mõjud olla, või väga harva esinevates juhtudes võivad verehüübed surmavad on.

See on oluline et te teate et üldine risk verehüübe tekkeks on kahjulik Marveloni tõttu väike on.
KUIDAS TUNNET VEREHÜÜBE ÄRA?

Helistage

Lüliti kiirabi meditsiiniline abi in kui te ühe järgmistest kaebustest või sümptomitest täheldate ..

te ühe nendest kaebustest saate kaebused of sümptomid?	Kus saate te kannatada? kannatada?
turse ühe jala või mööda ühe veeni ühes jalgas või jalgas või jalalabas, eriti kui sellega kaasneb: valu või tundlikkus jalast see jalg, mida te võib-olla tunnete ainult seistes või kõndides kõrgendatud temperatuur kahjustatud jalgas muutunud jalg naha värvimuutus nahk nahk jalast see jalg, näiteks kahvatu, punane või sinine	Süvaveenide tromboos tromboos
äkiline seletamatu õhupuudus või kiire hingamine äkiline köha ilma selge põhjusega, kus te võite verd köhida terav valu rinnus, mis võib halveneda kui hingate sügavalt raske kerge tunne peas või pearinglus tunne sisse see pea of pearinglus kiire või ebaregulaarne südamelöögid raske valu teie kõhus Kui te kahtlete, võtke ühendust siis arstiga, sest koos üks arst, tahan mõned nendest nähtudest, nagu köha või hingeldus, võivad ekslikult olla kuna kergema haiguse näiteks nagu hingamisteede infektsioon (näiteks külmetus). Kopsuemboolia	Nähtused
esinevad enamasti ühes silm ilmnevad: kohe silmas ilmnevad: kaotus nägemise kaotus, või valutu hägune nägemine, mis võib areneda kaotuseks nägemise kaotus võrkkesta veenitromboos (verehüübe	võrkkestas veenitromboos võrkkestas see silm)

Kas teil esineb mõni neist kaebustest või sümptomitest?	Millest võite kannatada?
nägemine	
valu, ebamugavustunne, surve või raske, pigistav või täis tunne rinnus, käsivarres või rinnaku all täis tunne, seedehäired või õhupuudus ebamugavustunne ülakehas, mis kiirgab selga, lõualuusse, kurku, käsivarde ja kõhtu higistamine, iiveldus, oksendamine või peapööritus äärmine nõrkus, ärevus või hingeldus kiire või ebaregulaarne südametegevus	Südameatakk
äkiline nõrkus või tuimus näos, käsivarres või jalgas, eriti keha ühel küljel äkiline segadus, raskused rääkimisel või mõistmisel äkiline nägemisraskus ühes või mõlemas silmas äkiline kõndimisraskus, peapööritus, tasakaalu või koordinatsiooni kaotus äkiline, tugev või pikaajaline peavalu ilma teadaoleva põhjusega teadvuse vähenemine või minestamine koos või ilma epilepsiahoogudeta Insuldi sümptomid võivad mõnikord olla lühiajalised ja peaaegu kohe täielikult taastuda. Sellegipoolest peate viivitamatult pöörduma erakorralise meditsiiniabi poole, kuna teil võib olla oht saada veel üks insult.	Insult
käe või jala turse ja kerge sinakas värvumine tugev valu kõhus (äge kõht)	Verehüüve, mis ummistab teisi veresooni

VEREHÜÜBED VEENIS

Mis võib juhtuda kui tekib verehüüve veen is ? Kui verehüüve tekib veenis,

- kasutamine võib põhjustada kombineeritud hormonaalsed rasestumisvastased vahendid on seotud kõrgema riskiga verehüüvete tekkeks veenis (venoosne tromboos). See on seotud kõrgem riskiga verehüüvete kõrvaltoimed esinevad kuid harva ette. Tavaliselt ilmnevad need esimesel aastal kui üks kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane vahend kasutatakse ..
- üks üks verehüüve muutub moodustunud sisse veen arter jalgas üks või jalalabas, võib see põhjustada sügavat veenitromboosi (DVT) (SVT) põhjustada.
- Kui verehüüve jalgadest kandub kopsu ja seal peatub , võibsee põhjustada kopsuembooliat . See esineb.
- See tuleb väga harva jaoks et üks verehüüve on moodustunud in üks veen in üks teine organ, nagu silm silm (venoosne tromboos silmas võrkkest).

Millal on see risk trombi ühe verehüübe sees ühe veeni kõige kõrgem?

Risk verehüübe tekkeks ühe verehüübe sisse üks veen saada on kõrgeim esimesel aastal et üks naine esimest korda kombineeritud hormonaalset esimest korda üks kombineeritud hormonaalset antibeebipill kasutatud. See risk võib ka suurenenud olla kui te pärast ühe pausi 4 nädalat või kauem jälle alustate sellega kasutamine alates ühe kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase vahendi (sama toode, või teise toode kui varem).Pärast esimest aastat on risk madalam risk väiksem, kuid jääb midagi kõrgem kui kui te ei kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit kasutate. Kui te lõpetate Marveloni kasutamise, on teie risk peal üks verehüübe sees mõne nädala jälle normaalne.

Kuidas kõrge on risk peal üks verehüüve?

Risk sõltub ripub sellest alates teie loomulik risk VTE-le, ja tüüp kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane vahend mida te kasutate.

Üldine üldine risk peal verehüüve verehüüve in üks jalg või kops (süvaveeni tromboos või kopsuemboolia) Marveloniga onväike ..

- 10 000 naise kohta, kes ei kasuta ühtegi kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast hormonaalne rasestumisvastane vahend kasutama ja mitte rase olema, saama seal umbes 2 ühe perioodi jooksul ühe aasta jooksul verehüüve.
- Alates iga 10.000 naist kes kasutavad kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit kasutavad mis levonorgestreeli, noretisterooni või norgestimaati sisaldab, saavad umbes 5-7 juhtumit üks aasta üks verehüüve.
- Iga 10 000 naise seas, kes kasutavad kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit, mis sisaldab desogestreeli, nagu, nagu Marvelon, saama umbes umbes vahel 9 ja 12 aasta aasta verehüüve.
- See risk saada aasta verehüüve saada saama on sõltuv teie isiklikust meditsiinilisest ajaloost anamnees vtjaotisi ' Tegurid misteie riski verehüübe tekkeks suurendavad ' verehüüve sisse üks veen2Farter suurendama' allpool).

	Risk et aasta ühe aasta verehüübe tekkimine
Naised kes ei kasuta kombineeritud hormonaalset pilli/plaaster/rõngast ja ei ole rasedad	Umbes 2 iga 10 000 naise kohta
Naised kes kasutavad kombinatsioonipille mis sisaldavad levonorgestreeli, noretisterooni või norgestimaati Umbes	5-7 5-7 10 000 naise kohta naised
Naised kes Marvelon kasutavad	Umbes 9-12 iga 10.000 naise kohta

Tegurid mis teie riski verehüübe tekkeks veenides suurendavad on järgmised suurendama Het risk op ühe verehüübe Marveloniga on väike, kuid on olemas teatud olukorrad mis riski suurendavad. Teie risk on suurem:

- kui te raske ülekaal on (KMI [kehamassiindeks] kõrgem kui 30 kg/m²)
- kui üks teie teie lähedastest pereliikmetest noores noores eas (näiteks enne 50. aasta) ühe verehüübe on olnud sisse ühes jalgas, kopsus või mõnes elundis. Sellisel juhul võite te ühe päriliku hüübimishäire olema.

- kui te üks operatsioon peab läbima, või kui te pikka aega ei ole jalgadel seoses üks vigastus või kohta haigus, või kui teie jalg on kipsis on. See võib vajalik olla et enne operatsiooni , võikui te olete vähem liikuv kui tavaliselt, mõned mõned nädalat et lõpetada kasutamine kasutamine Marveloni. Kui peate peate lõpetama Marveloni, küsige siis oma arstilt millal te uuesti saate alustada kasutamisega kasutamine.
- kui te vanemaks saate (eriti eriti üle umbes 35 aasta)
- kui te viimase paari nädala jooksul sünnitanud olete.

See risk peal üks verehüüve tõuseb mida rohkem seal rohkem neist nendest tingimustest teid kehtib on.

Reis lennukiga (kauem kui 4 tund) võib teie riski trombi ajutiselt suurendada , erit kui on veel mõned muud loetletud tingimused olemas olukorrad tingimused teie kohta kohaldatav on.

Oluline on tähtis et teie oma arstile rääkige kui üks või rohkem nendest nendest tingimustest teie kohta kohaldatav on, isegi kui te selles kahtlete. Teie arst võib otsustada et te peate lõpetama Marveloni kasutamise Marveloni.

Kui üks eespool mainitud tingimustest muutub samal ajal kui te kasutate Marvelon'i , näiteks kui üks lähedane pereliige on verehüüve (tromboos)tromboos) saab ilma tuntud põhjuseta, või kui te palju kaalus juurde võtate, rääkige sellest siis oma arstile. VERESOONTE TROMB

Mis

Mis võib või juhtuda kui või tekib verehüüve on moodustunud sisse arteris ?Nii nagu verehüüve üks veenis sisse on verehüüve, võib verehüüve arteris tõsiseid probleeme põhjustada . See võib näitekssüdameataki või insuldi põhjustada . koos üks insult põhjustama.

Tegurid mis teie riski arteris trombi tekkeks suurendavad arteris trombi suurendavad Oluline on teada et te teate et risk trombi tekkeks üks südameatakk või insult tõttu kasutamine Marvelon väga väike on, kuid suurem võib olla:

- koos kasvav vanus (üle umbes 35 aastat)
- kui te suitsetate. Kui te kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit nagu Marvelon kasutate, soovitatakse et te lõpetaksite suitsetamise koos suitsetamine. Kui te ei saa lõpetada koos suitsetamine ja vanem olete kui 35 aastat, võib teie arst teile soovitada et teise teise tüüp rasestumisvastane vahend kasutama kasutada.
- kui teil ülekaal on
- kui teil kõrge vererõhk on
- kui üks teie teie lähedane perekond peal noor iga (enne 50. eluaastat) on südameatakk või insult olnud . Kuisee juhtum saate te ka ka üks suurenenud risk omama et üks südameatakk või insult saada ..
- teie, või üks liige teie lähedane perekond ,, üks kõrge rasvasisaldus veres veri on (kolesterool või triglütseriidid)
- kui te kannatate migreeni all, eriti migreen auraga

- kui te üks südamehaigus on (südameklapihaigus, või üks südamerütmihäire mida kodade virvendusarütmia nimetatakse)kui
- teil suhkruhaigus (diabeet) on ..

rohkem rohkem siis üks nendest nende tingimustest teie puhul kohaldatav on, või kui üks nendest nende haigustest eriti raske on, võib see riski riski saama alates üks verehüübe isegi veel edasi suurenenud olema.

Kui üks nendest ülalpool mainitud tingimustest muutub kui te kasutate Marvelon'i kasutate, näiteks kui te alustate suitsetamisega või kui pereliige saab verehüübe (tromboos verehüüve ilmatuntudpõhjuseta saab ilma tuntud põhjus, või kui te palju sisse kaalus juurde võtate, rääkige sellest siis oma arstile. Tablett

ja vähk Juures vähk

Kell naised kes pille kasutavad diagnoositakse veidi sagedamini rinnavähk kui siis juures mitte-pillikasutajatel samas vanuses . Kümneaastat pärast lõpetamist see lõpetama koos pill on pole erinevust enam. See on pole teada kas see erinevus on põhjustatud põhjustatud pilli poolt. See võib ka tulla sest pillide kasutajad põhjalikumalt ja sagedamini uuritakse ,et nii et rinnavähk varem avastatakse . Harvadel.

on leitud juhtumeid juures kellel pillikasutajad healoomulised maksakasvajad leitud ja in veel haruldasematel juhtudel pahaloolumulised maksakasvajad. Mõnikord on need kasvajakasvajad viinud eluohtliku sisemise verejooksuni verejooksuni veritsus. Kui te äkki tunnete saate tugevat kõhuvalu , siispeate te kohe ühendust võtma oma arstiga . Krooniline

Krooniline infektsioon met het inimese papilloomiviirus on peamine riskitegur emakakaelavähi saamiseks. naistel kes pillekasutavad pikema aja jooksul võib olla suurenenud risk emakakaelavähi tekkeks. de risk saada saamine alates emakakaelavähk veidi suurenenud olema. See on kuid mitte selge kas see on põhjustatud pillide poolt, või et see tegema valmistama on koos seksuaalne käitumine ja muud tegurid (nagu parem kontroll emakakaela üle).

Psüühikahäired häired

Mõned naised kes hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid sealhulgas Marvelon kasutavad, on teatanud depressioonist või meeleolulangusest . Depressioon. olla raske raske on ja võib mõnikord kuni enesetapumõtted viia. Kui teil on meeleolumuutused ja sümptomid alates depressioon kogete, võtke nii kiiresti kui võimalik ühendust oma arstiga jaoks edasi meditsiiniline nõuanne.

Kasutate te veel teisi ravimeid?

Kasutate te lisaks Marvelon veel teisi ravimeid või taimseid preparaate, on te seda hiljuti teinud või kavatsete seda varsti teha ? Rääkige sellestoma arstile, kui teil on küsimusi. apteeker või ämmaemand. See kehtib ka ravimite kohta , mida te ilma retseptita saate osta. Rääkige ka iga teise arstile või arstide hambaarst (või apteeker) kes teile mõne teise ravimi välja kirjutab mis te Marvelonit kasutate. Nad saavad teile siis öelda kas on vaja on mõne extra mittehormonaalne rasestumisvastane vahend (näiteks üks kondoom) kasutada ja ka kui kaua te seda siis peate kasutama või et see see kasutamine alates teise ravimi mida teil vaja on ,peab muutuma ..

Marvelon kui teil on hepatiit C C-hepatiit on en selleks ravimid koos ombitasviir/paritapreviir/ritonaviiir ja dasabuviir või glekapreviir/pibrentasviir kasutatakse, kuna see üks tõus kohta üks maksaensüüm (ALAT, üks maksafunktsiooni vereanalüüs) võib põhjustada.

Teie arst määrab teise rasestumisvastase vahendi välja enne kui alustate kasutamist koos see ravi. Marvelon võib umbes 2 nädalat pärast lõppu sellest see ravi uuesti alustada .. jaotis 2 ' MillalMillal ei tohi seda ravimit kasutada ?').Mõned

ravimid võivad

- mõjutada Marveloni veretaset võivad Marveloni vähem tõhusaks
- muuta et Marvelon vähem tõhusaks rasedus et ära hoida
- võivad ootamatud verejooksud põhjustada.

Nende hulka kuuluvad muude hulgas ravimid jaoks de ravi alates:

- epilepsia (näiteks primidoon, fenütoiin, fenobarbitaal, karbamasepiin, okskarbasepiin, topiramaat, felbamaat)
- tuberkuloos (näiteks rifampitsiin, rifabutiin)
- HIV-nakkus (näiteks ritonaviir, nelfinaviir, nevirapiin, efavirens)
- hepatiit C-viirusinfektsioon (näiteks botsepreviir, telapreviir)
- muud infektsioonid (näiteks griseofulviin)
- kõrge vererõhk veresoonte veresoontes kopsude kopsudes (bosentaan)
- depressiivne meeleolu (taimne ravim naistepuna).

Kui te ravimeid või taimseid ravimeid kasutate mis võivad Marveloni vähem efektiivseks muuta ,peate te ka veel ühe barjäärimeetod kasutama. Kuna mõju ühe teise ravimi Marvelonile kuni 28 päeva pärast selle lõpetamist selle ravimi võib kesta ,peab peab te lisakaitse barjäärimeetod jooksul see aeg kasutada ..

võib mõju toime teiste ravimite ravimite mõjutada mõjutamanäiteks näiteks:

- ravimid see tsüklosporiin sisaldavad
- anti-epilepsiaavastane ravim lamotrigiin (see võib viia kuni kõrgema hoogude arvuni).Laboratoorsed uuringud

Kui

vereanalüüs tehakse juures u peab tehtud olema, rääkige siis oma arstile või laboripersonalile et te tabletti kasutate. Hormonaalsed rasestumisvastased vahendid võivad nimelt de tulemused alates mõned uuringud mõjutada.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Kui te olete rase , või arvate et te rase võiksite olla on võib Marveloni mitte kasutada. Kui te kahtlustate et te rasedaks olete samal ajal kui te Marveloni kasutate, võtke siis nii kiiresti kui võimalik ühendust oma arstiga.

Imetamine

See kasutamine Marveloni ei ole üldiselt soovitatav mitte soovitatav kuni naine imetab rinnaga toitmist. Kui te tabletti ikkagi soovite kasutada samal ajal kui veel imetamine annab, saate te parim ühendust võtta oma arstiga. Teie

ja masinate kasutamine masinad Ei

ole märke puuduvad viited et de sõiduvõime ja see võime masinaid kasutada mõjutatud olla ..

sisaldab laktoosi Kui

teie arst teile on öelnud räägitud et te teatud suhkruid ei talu, võtke ühendust oma arstiga enne kui te seda ravimit võtate.

Lapsed ja noorukid kuni 18 aastat

On puudub kliiniline teave kohta tõhususe ja ohutuse noorukitel alla 18 aasta vanuses.

Millal peate te arsti poole pöörduma selle kasutamise selle seda ravimit?

3. Kuidas võtate te seda ravimit sisse?

Võtke seda ravimit alati sisse täpselt nagu teie arst või apteeker te et on öelnud. Kahtlete te ravimi õige kasutamise? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

Millal ja kuidas võtate u de tabletid sisse?

Riba sisaldab 21 tabletti. Iga tableti juures on märgitud millisel päeval see peab võtma võetama võetama võetama Võtke tabletid iga päev umbes kell samal ajal sisse, vajadusel vähese veega. Järgige de suunda noole järgi mis on ribal näidatud kuni olete kõik 21 tabletti võtnud võetud. Seejärel võtate te 7 päeva ei tabletti. Selle aja jooksul nende 7 päeva peaks verejooks algama (nn ärajäämisverejooks). nnimetatud võõrutusveritsus). See algab tavaliselt teisel või kolmandal päeval pärast viimast viimane päeval järgmise järgmise ribaga, olenemata sellest, kas veritsus on siis juba möödunud või mitte ei. See tähendab et te alustate alati samal nädalapäeval uue järgmise pakiga riba alustate, ja ka et de ärajätuvverejooks iga kuu umbes peal sama päevadel langeb.

Millal alustada esimese ribaga esimene riba

Te olete eelmisel kuul ei kasutanud rasestumisvastast tabletti ..

Alustage Marveloni esimesel päeval tsükli alguses (esimesel päeval oma menstruatsiooni).

Marvelontoimib sel juhul kohe ja te ei pea ei pea ei extra rasestumisvastane vahend kasutama ..

ka päeval 2-5 tsükli alustada kuid siis peate te esimese 7 päeva jah kasutama 7 päevad hästi üks lisaks rasestumisvastane vahend (näiteks üks kondoom) kasutada.

Üleminek teiselt kombineeritud pillilt , vaginaalnerõngas või rasestumisvastane plaaster Te rasestumisvastane plaaster

Te võib Marveloniga alustada päeval pärast kui te olete viimase tableti oma eelmisest pillist võtnud (seegailma pausita). Kuijuures juures teie eelmine pill ka mitteaktiivsed tabletid ribas on, peate te kohe jätkama pärast viimast aktiivset tabletti teie eelmisest eelmine pill (kui te ei tea milline see on, küsige seda siis oma arstilt või apteekrilt). Te võiteka hiljem alustada , kuid mitte

kunagi hiljem kuupäeval päev pärast lõppu tablettidevaba perioodi teie eelmisest pillist (või pärast viimast mitteaktiivset tabletti teie eelmisest pillist). eelmine pill).

Kui te vahetate alates vaginaalse rõnga või rasestumisvastase plaastri võite alustada Marveloniga alustama päeval päev eemaldamist rõnga või viimase plaastri . Te võiteka hiljem hiljem alustama, kuid te peate hiljemalt seitse päeva pärast rõnga eemaldamist või viimast plaaster Marveloniga alustama Marveloniga Kui.

tabletti võtate pill, plaaster või rõngas täielikult järgi de ettekirjutusi on kasutanud ja olete kindel et et te ei ole rase olete, saate te lisaks lõpetage võtmine võtmine pillide pill või rõnga või plaaster eemaldamine päeval iga päev teie teie praegune tsükkel ja kohe üleminek peale kasutamine Marveloni.

Kui te neid juhiseid järgite ei ole vaja kasutada täiendavat rasestumisvastast vahendit (näiteks kondoomi)kasutada . kasutama.

Üleminek alates ühest progestageenipillist (minipill)

Te võite ühest teiseni üle minna päev üle minna Marvelonile, kuid te peate esimesel päeval võtma esimese 7 päeva jah üks lisaks rasestumisvastane vahend (näiteks üks kondoom) kasutama.

Üleminek süstimisvastasest süstimiskontratseptiiv, üks implantaadist või üks hormoone sisaldav spiraal

Alustage Marveloniga millal te muidu järgmise järgmine süst saaks saada või päev millal see implantaadi või hormoone sisaldav spiraal saab eemaldatud. Te peate esimese 7 7 kuid kasutama küll üht lisaks rasestumisvastast vahendit (näiteks kondoomi)kasutama ..

Pärast sünnitust sünnitus

Kui te just sünnitasite , siis teie arst tõenäoliselt soovib oota kuni teie esimene spontaanne menstruatsioon , kuid mõnikord mõnikord on võimalik varem alustada .. arsti nõuandeid . See kehtib ka juhul, kui te imetate . juhtum te rinnaga toitmine annab en de pill soovite kasutada.

Pärast raseduse katkemist või aborti Järgige arsti nõuandeid . Kas teil liiga

palju võtnud olete ? kohta see ravim võetud?

On olemas pole teateid kohta tõsiseid kahjulikke tagajärgi võtmine suurtes kogustes kohta palju Marvelon tablette korraga. Kui te mõned tabletid korraga võtsite , siis võitete võimalik tunda iiveldust , oksendamist või peapööritust, kõhuvalu või vaginaalne verekaotus. Kui te avastate et laps Marvelon on sisse võtnud ,küsi siis oma arstilt nõu ..

teha teha ...

...juures see unustamine tablettide võtmist

Kui te **vähem kui 12 tundi hiljaks jäänud** olete selle võtmisega tableti võtmisel ühte tablett siis on ei toime ei tableti ei ole vähenenud. Võtke seda tabletti siis kohe, kui te sellele mõtlete ja võtke järgmised tabletid tavapärasel ajal.

Kui te **üle 12 tunni hiljaks** jäite tableti võtmisega, võib tableti toime väheneda.

Mida rohkem tablette järjest unustate, seda suurem on tõenäosus, et toime on tableti vähenenud on on. De võimalus puudulikuks kaitseks raseduse vastu rasedus on suurim, kui tablette jäetakse vahele riba alguses või lõpus. Seetõttu kehtivad järgmised reeglid (vt ka skeemi):

kui 1 1 unustatud ühes ribapakendis Võtke

ühendust koos koos koos teie arst.

1 tablett unustatud nädalal 1 1

Võtke unustatud tablett niipea, kui sellele mõtlete, isegi kui see tähendab, et peate võtma kaks tabletti samal võtma. Võtke edasi tabletid jälle tavalisel ajal uuesti peal de tavaline aeg sisse, aga te peate lisaks 7 päeva jooksul kasutama lisakaitsevahendeid. Kui teil oli vahekord nädal enne vahelejätmist, peate arvestama raseduse võimalusega. Sellisel juhul võtke kohe ühendust oma arstiga.

1 tablett unustatud sisse nädal 2

Võtke unustatud tablett niipea, kui sellele mõtlete, isegi kui see tähendab, et peate võtma kaks tabletti samal hetkel peate võtma. Võtke edasi tabletid jälle peale sama päeva tavaline aeg in. De Pilli toime ei ole vähenenud, te ei pea kasutama lisakaitsevahendeid.

1 tablett unustatud in nädal 3

Te võite valida välja 2 võimalust ilma lisakaitsevahenditeta kaitsevahendeid kasutada vaja kasutada.

1. Võtke unustatud tablett sisse niipea kui meelde tuleb, isegi kui see tähendaks, et peate kaks tabletti korraga võtma. Võtke edasi tablette tavapärasel ajal. **Jätke lisaks tabletivaba periood vahele** ja jätkake kohe järgmise ribaga. Tõenäoliselt saate te alles lõpus teise riba lõpus kätte teise riba lõpus tõeline ärajäämisveritsus, kuid teise lehe ajal võib teil esineda määrimist või läbimurdeveritsust.
2. Võite ka vastava lehe lõpetada. Teete 7-päevase või lühema tabletivaba perioodi peale (**helistage küll alati päev kaasa millal te tableti unustasite**). **Pärast seda jätkate**). Seejärel läheb u lihtsalt

jätkake järgmise ribaga.

Kui järgite seda meetodit, saate alati alustada uue ribaga oma kindlal alguspäeval.

Kui olete unustanud tablette võtta ja teil ei esine veritsust esimesel tavapärasel tabletivabal perioodil, võib see tähendada, et olete rase. Enne järgmise ribaga jätkamist peate võtma ühendust oma arstiga.

... mao- ja/või soolehäirete korral (näiteks oksendamine, tugev kõhulahtisus)

Kui oksendate või teil on tugev kõhulahtisus, on võimalus, et toimeained ei ole täielikult kehasse imendunud. Kui peate oksendama 3-4 tunni jooksul pärast tableti võtmist, on

see olukord sarnane tableti unustamisega. Seetõttu järgige oksendamise korral sama nõuannet, mis on antud tablettide unustamise kohta. Kui teil on tugev kõhulahtisus, konsulteerige oma arstiga.

... kui soovite oma menstruatsiooni edasi lükata

Menstruatsiooni edasilükkamine on võimalik, kuigi seda ei soovitata. Erandjuhtudel saate menstruatsiooni edasi lükata, jätkates uue Marveloni ribaga ilma tabletivaba perioodita. Võite selle ribaga jätkata, kuni kõik tabletid on võetud või soovi korral varem lõpetada. Selle teise riba kasutamise ajal võib teil esineda läbimurdeveritsust või määrimist. Pärast tavapärasest 7-päevast tabletivaba perioodi alustate uuesti järgmise ribaga.

... kui soovite oma menstruatsiooni alguspäeva muuta

Kui võtate tablette vastavalt juhistele, algab teie menstruatsioon alati umbes samal päeval. Kui soovite seda päeva muuta, saate seda teha, lühendades tavalist tabletivaba perioodi kahe riba vahel (kuid mitte kunagi pikendades). Näiteks, kui teie menstruatsioon algab tavaliselt reedel ja soovite, et see edaspidi algaks teisipäeval (3 päeva varem), siis peate nüüd 3 päeva varem kui tavaliselt uue ribaga alustama. Kui teete tabletivaba perioodi väga lühikeseks (näiteks 3 päeva või vähem), võib juhtuda, et teil ei esine veritsust selle tabletivaba perioodi jooksul. Järgmise riba ajal võib teil esineda läbimurdeveritsust või määrimist.

... ootamatu veritsuse korral

Kõigi rasestumisvastaste pillidega võib esimestel kuudel esineda ootamatut veritsust (määrimist või läbimurdeveritsust). Võib-olla ei saa te ilma hügieenisidemeta või tampoonita hakkama. Jätkake igal juhul lihtsalt oma tablettide võtmist. Ebaregulaarne veritsus lõpeb tavaliselt siis, kui teie keha on pilliga harjunud (umbes 3 riba järel). Kui see kestab kauem, muutub hullemaks või algab uuesti, peate võtma ühendust oma arstiga.

... kui oodatav veritsus jääb ära

Kui olete kõik tabletid õigesti võtnud, pole teil olnud oksendamist ja/või kõhulahtisust ning te pole kasutanud muid ravimeid, on väga ebatõenäoline, et olete rase. Võite rahulikult järgmise ribaga jätkata.

Kui oodatav veritsus jääb aga kaks korda järjest ära, võite olla rase. Võtke kohe ühendust oma arstiga. Ärge jätkake järgmise Marveloni ribaga enne, kui arst on kindlaks teinud, et te ei ole rase.

Kui te lõpetate selle võtma alates seda ravimit

Te võite Marveloniga lõpetada millal iganes soovite. Kui te ei taha rasedaks jääda, küsige siis oma arstilt nõu koos seoses teiste usaldusväärsete meetoditega rasestumisvastane reguleerimine sünnituskontroll.

lõpetate sest te rasedaks tahate jääda ,saab üldiselt sisse üldine soovitatav et oota kuni teil on loomulik menstruatsioon olnud enne kui proovite rasestuda . Te võite olla raseduse ootel. saate siis lihtsam välja arvutada millal sünnitus toimuma toimub toimuma.

4. kõrvaltoimed Nagu iga

ravim võib ka see ravim kõrvaltoimeid põhjustada .. Mitte kõik ei saa sellega kokku puutuda. Kas teil on kõrvaltoime, eriti kui see on tõsine iseloomult on ja ja pikk püsib, või tekib seal üks muutus sisse teie tervislik seisund millest te arvate et see põhjustatud võib olla Marvelon? Võtke siis ühendust teie arst.

Kõik naised kes kombineeritud hormonaalsed rasestumisvastased vahendid kasutavad on suurem risk verehüüvete tekkeks veresoontes (venoosne tromboemboolia[VTE]) või tromboemboolia [VTE]) või verehüübed arterites arterid (arteriaalne trombo- emboolia [ATE]). Vaata lisateabe saamiseks erinevate riskide kohta kasutamise kohta kombineeritud kasutamine kombineeritud hormonaalsed rasestumisvastased vahendid rubriik 2 'Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik sellega olema ?'.Võtke kohe ühendust

oma arstiga arst kui te sümptomid angio-ödeem saate nagu turse teie näo , keeleja või kurguja võiraskused neelamisel juures see neelama of nõgestõbi võimalik koos hingamisprobleemid (vt rubriik 2 'Millal peate te olema ettevaatlik olema koos selle ravimiga?').

Nagu juures kõik kombinatsioonipillid, võib teie menstruatsioonimuster muutuda, eriti ajal esimestel kuudel kasutamise ajal . Seeerinevus võib seisneda selles, kuidas kuidas sageli u üks verejooks saate (puudumine veritsus , vähemsageli ,sagedamini või pidev), kuiraske veritsus on, või verejooks on, või kui kaua de veritsus kestab.

Sageli (esinevad juures vähem kui 1 10-st naistest)depressiivsed

- meeleolud ,meeleolumuutused peavalu
- iiveldus
- iivelduskõhuvalu kõhuvalu
- tundlikud rinnad, valulikud rinnad
- kaalutõus.

Mõnikord (esinevad juhtudel vähem kui 1-1 100-st naistest)vedelikupeetus

- vähenenud soov
- seksida migreen oksendamine
- migreen
- oksendama, kõhulahtisus
- nahalööve, nõgestõbi (urtikaaria)
- suurenemine rinna rindade.

Harva (esineb vähem kui 1-1 1000-st naistest)

- kahjulikud verehüübed sisse veen arter või arter, näiteks:
 - o sisse veen jalg või jalg (näiteks süvaveeni tromboos))
 - o kops üks kops (näiteks kopsuemboolia)
 - o südameatakk
 - o insult

- o 'väike insult' või ajutised sümptomid nagu nagu üks insult, tundud kui TIA (mööduv isheemiline atakk)
- o verehüübed maksas, magu2Fsooled, neerud või silmad. tõenäosus saada verehüübe on saada on suurem suurem kui on muud tingimused teie puhul kehtivad on mis seda riski suurendavad (vt jaotis 2 lisateabe saamiseks selle kohta tingimuste kohta mis risk peal verehüübed suurendavad ja de sümptomid alates verehüübe).ülitundlikkusreaktsioonid
 - rohkem
 - soov seksida ärritus vahekorda astuma
 - silmad alates peal juures kasutamisel kasutamine kontaktiläätsede kontaktiläätseid
 - valulikud, sinakaspunased muhud nahal nahk (erythema nodosum), nahalööve koos ebaregulaarsete punaste laikude või haavandid (erythema multiforme)
 - eritised välja de nibu, muutused tupest eritised välja tupest
 - kaalulangus.

Teatamine kõrvaltoimetest kõrvaltoimetest kõrvaltoimetest

Kas teil esineb kõrvaltoimeid , võtke ühendust oma arstiga teie arst või apteeker. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mis ei ole selles pakendi infoleheskirjas . Te võite kõrvaltoimetest teatada ka läbi Hollandi Kõrvaltoimed Keskus Lareb, veebisait: www.lareb.nl. Läbi kõrvaltoimete teatamise ,aitate te meid et rohkem teavet saada ravimi ohutuse kohta selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas säilitada te seda ravimit?

Hoida nähtavusest ja kättesaamatus laste eest ..

seda ravimit enam ei rohkem pärast de aegumiskuupäev kõlblikkusaeg. Die leiate te karbil ja de blisterpakendil pärast EXP. Seal on kuu ja aasta . De aasta. viimane päev sellest kuust on aegumiskuupäev aegumiskuupäev.

alla 30 °C. Mitte sügavkülmas hoida . Hoida.

blisterpakendis . Hoida originaalblisterpakendis kaitse valguse ja niiskuse eest ..

võtke seda ravimit kui näete näiteks et tabletid on värvunud . tabletid värvunud of purustatud on of kui te muud nähtavad märgid van halvenemine in kvaliteet täheldate.

Ärge loputage ravimeid mitte kraanikausist alla või wc ja visake neid mitte prügikasti .. oma apteekrilt mida teha ravimitega mis te peate mis te enam ei kasuta. Kui te ravimeid õigesti õigel viisil kõrvaldada siis need õigel viisil hävitatakse ja ei satuvad keskkonda . Sisu õige.

6. Sisu pakendi pakend ja muu teave

Millised ained sisaldavad selles ravimis ?Toimeained

- selles ravimis on desogestreel see ravim on desogestreel (150 mikrogrammi) ja etünnüülöstradiool (30 mikrogrammi).
- De teised ained selles ravimis on veevaba kolloidne ränioksiid ränioksiidlaktoosmonohüdraat laktoosmonohüdraatkartulitärklis kartulitärklispovidoon povidoon, steariinhape, all-rac-alfa-tokoferool.

Kuidas näeb Marvelon välja ja mis sisaldub ühes pakendis?
Pakend sisaldab 1, 3 või 6 1, 3 või 6 blisterribad met 21 tabletid.
Mitte kõik nimetatud pakendisuurused on turul olemas ..

on valged, ümmargused , mõlemalt poolt juures mõlemad küljed kumer ja on läbimõõduga 6 mm.
Ühel poolel on 'TR' üleval '5' ja teisel poolel 'Organon' teised serva 'Organon' en üks viieharuline täht.

Luba omanik müügiloo jaoks turule viimine ja tootja N.V. Organon
Kloosterstraat Kloostri tänav 6
Holland
Tel.: 00800 66550123 (+32 2 2418100)
dpoc.benelux@organon.com
dpoc.benelux@organon.com

Registris registreeritud all: RVG 08859

See pakendi infoleht on viimati kinnitatud mais 2025 sisse mai 2025