

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle de käyttäjälle
Marvelon, tabletit
desogestreeli, etinyyliestradioli

Tärkeitä asioita jotka sinun täytyy tietää yhdistelmä hormonaalisista ehkäisyvalmisteista ehkäisy lääkkeet:

- Nämä lääkkeet muodostavat yhden yleisimmistä luotettavimmista käänteisistä ehkäisymenetelmistä ehkäisymenetelmä jos oikein käytetty ..
- antavat hieman jotain pientä korkeampi riski sen syntymiseen alkaen veritulppa veritulppa (tromboosi) laskimoissa ja valtimoissa ,erityisesti ensimmäisenä vuotena kun käytät sitä sinä yksi yhdistetty hormonaalinen ehkäisyvalmiste käytetty tai jos sinä jälkeen yksi keskeytys 4 viikkoa tai pidempään uudelleen aloitat käytön käyttö alkaen yksi yhdistetty hormonaalinen ehkäisyvalmiste.
- Huomioi hyvin ja ota yhteyttä lääkäriisi jos sinä ajattelet että sinulla mahdollisesti oireita jostakin yhdestä yksi verihyytymä on (katso kohta 2 'Verihyytymät (tromboosi)').

Lue huolellisesti koko pakkausseloste ennen kuin tätä lääkettä aiot ottaa sillä on tärkeää tietoa sisällä sinulle. Säilytä

- tämä pakkausseloste .. tarvitset sitä myöhemmin uudelleen . Onko.
- vielä sinä vielä kysymyksiä? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin.
- Älä anna tätä lääkettä muille , koska se on vain sinullemäärätty . Se voi sinä määrätty. Se voi haitallinen ovat muille ihmisille, vaikka heillä olisi samat oireet kuin sinulla. Jos
- sinulle ilmenee yksi seuraavista sivuvaikutuksista jotka on mainittu kohdassa osio 4 mainitaan? Tai saatte te sivuvaikutuksen joka ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu ? Ottakaa sitten yhteyttä teidän lääkäriin tai apteekkariin ..

Sisältö alkaen tämä pakkausseloste

1. Mikä on Marvelon ja mihin käytetään tätä lääkettä käytetään?
2. Milloin et saa tätä lääkettä käyttää tai täytyy olla erityisen varovainen varovainen mukaan ovat?
3. Kuinka ottaa te tätä lääkettä sisään?
4. Mahdolliset sivuvaikutukset
5. Kuinka säilyttää te tätä lääkettä?
6. Sisältö pakkauksen sisältö en muut tiedot

1. Mikä on Marvelon ja mihin tätä lääkettä käytetään ?Koostumus

ja tyyppi pilleri Marvelon on

yhdistelmä suun kautta otettava ehkäisytabletti oraalinen ehkäisytabletti (de 'yhdistelmätabletti'). Jokainen tabletti sisältää pienen määrän kahdesta eri naispuolisesta hormonista ,nimittäin desogestreeli desogestreeli hormoniprogesteronin kaltaisella vaikutuksella kanssa progesteronimainen toiminta) ja etinyyliestradioli (yksi hormoni jolla on estrogeeninen vaikutus). Koska pieni määrä hormoneja ,pidetään Marvelon pidetään kuin kuten yksi mataladosainen ehkäisyvalmiste. Koska molemmat hormonit kaikissa tableteissa liuskassa sama määrä yhdistetty ovat, kutsutaan sitä yksi yksivaiheinen- yhdistelmätabletti nimeltään.

Mihin käytetään tätä lääkettä käytetään?

Marvelon käytetään raskauden ehkäisyyn raskaus Jos Marvelon otetaan oikein käytetään.
Jos Marvelon otetaan oikein Jos Marvelon otetaan oikein käytetään (ilman että tabletit unohtuvat) onmahdollisuus tulla raskaaksi hyvin pieni . Milloin et saa.

2. lääkettä käyttää tämä lääke ei käyttää tai täytyy sinun olla erityisen varovainen sen kanssa olla?

Yleiset huomautukset

Lue ennen kuin aloitat Marvelonin käytön tiedot verihyytymistä tiedot yli verihyytymät (tromboosi) in kohta 2. On erityisen tärkeää että luet mitä oireet ovat veritulpan osalta yksi veritulppa – katso kohta 2 'Veritulpat (tromboosi)'.

Tässä esitteessä kuvataan joitakin tilanteita joissa sinun tulee lopettaa pillerin käyttö tai lopettaa pillerin käyttö tai jossa de luotettavuus van de pilleri heikentynyt voi olla. In tällaisissa tilanteissa täytyy u pidättäytyä van seksuaalisesta yhdynnästä tai yksi een lisä- ehkäisyväline ilman hormoneja käyttää, esimerkiksi yksi kondomi tai muu este-ehkäisyväline. Älä käytä kalenteria - tai lämpötilamenetelmää. lämpötilamenetelmä. Nämä menetelmät voivat olla epäluotettavia koska pilleri vaikuttaa normaaleihin muutoksiin kehonlämpötilassa ja kohdun limakalvossa aikana normaaleja muutoksia kehonlämpötilassa ja kohdun limakalvossa kuukautiskierto.

Marvelon tarjoaa net kuten muut hormonaaliset ehkäisyvalmisteet ei suojaa vastaan hiv -- (aids) tai muut seksuaalisesti tarttuvat taudit sairaudet (sukupuolitaudit).

Milloin et saa tätä lääkettä käyttää ?Et saa

tätä lääkettä käyttää jos sinulla on yksi näistä sairauksista ei käännettävää sisältöä alla mainittuja sairauksia on. Jos sinulla on jokin alla mainituista sairauksista ,kerro tästä sitten lääkärillesi . Sinun lääkärisi. Sinun lääkärisi keskustelee kanssanne keskustella mikä muu muoto ehkäisyä ehkäisy sopivampi on teille . Katso myös kohta kohta 'Milloin tarvitsette lisä varovainen ole kanssa tämä lääke?'.
Tämä lääke ei suojaa HIV:ta vastaan.

- Te olette yksi veritulppa verisuonessa yksi verisuoni jaloissa jalat (syvä laskimotromboosi , DVT), de, DVT), syvän laskimotromboosin keuhkot (keuhkoembolia) tai yksi muu elin, tai te on tämä aiemmin ollut ..
- tiedätte että teillä on häiriö häiriö on alkaen teidän veren hyytyminen – esimerkiksi proteiini C-puutos, proteiini S- puutos, antitrombiini-III-puutos, tekijä V-Leiden tai vasta-aineet vastaan fosfolipidit.
- U täytyy olla leikattu tai olet pitkän ajan pois jalkeilla (katsokohta ' VeritulpatVerihyytymät tromboosi)').U
- U on koskaan yksi sydänkohtaus tai yksi aivohalvaus ollut.
- Te on angina pectoris (yksi sairaus joka voimakas kipu rinnassa aiheuttaa aiheuttaa en yksi ensimmäinen oire alkaen yksi sydänkohtaus voi olla) tai yksi 'ohimenevä iskeeminen kohtaus' (TIA: ohimenevät oireet alkaen yksi aivohalvaus) tai sinä on tämä koskaan ollut.
- Te on yksi seuraavista sairauksista , jotkariski veritulppaan yksi veritulppa sisällä teidän valtimoissa voi voida lisätä:
 - vakava diabetes, johon liittyy vaurio verisuonissa -
 - kohonnut verenpaine -

- vakava kohonnut rasvapitoisuus veressäsi sisään sinun veri (kolesteroli triglyseridit)
- yksi sairaus joka hyperhomokysteinemia kutsutaan nimellä.
- Sinulla on yksi migreenityyppi jota 'aurallinen migreeni' kutsutaan nimellä (tai on tämä koskaan ollut).
- Teillä on haimatulehdus (yksi tulehdus haimassa haima) tai on tämä ollut, yhdistettynä kanssa yksi korkea rasvapitoisuus sisään sinun veressä.
- Sinulla on keltaisuus (keltainen värimuutos ihon tai silmien) taivakava maksan sairaus maksasairaus of on tämä ollut, ja de tulokset of maksakokeet ovat vielä ei normaali.
- Te on muoto of alkaen syöpä tai on tämä ollut joka herkkä voi olla hormoneille sukupuolihormonit (kuten rintasyöpä tai syöpä sukuelinten sukupuolielimet).
- Sinä on maksasyöpä tai on tätä ollut.
- Teillä on epätavallisia verenvuotoja emättimestä joiden syy ei ole määritetty . määritetty.
- U on yksi epänormaali paksuuntuminen kohdun limakalvosta.
- Olet allerginen yhdelle yksi aineista aineet tässä tässä lääkkeessä. Nämä aineet voit u löytää in kohdasta 6 tästä tämä pakkausseloste.

Jos yksi näistä mainituista tilanteista ilmenee kun käytät jo Marvelonia käytät, niin täytyy u välittömästi lopettaa käytön käyttö ja ota yhteyttä ottaa yhteyttä kanssa sinun lääkäriin. Käytä sillä välin sillä välin yksi toinen, ei- hormonaalinen menetelmä alkaen ehkäisy. Katso myös 'Yleiset huomautukset' kohdassa alussa osio 2.

Älä käytä Marvelon jos sinulla on hepatiitti C on on en tätä varten lääkkeet kanssa ombitasvir/paritaprevir/ritonaviiri ja dasabuvir tai glekapreviiri/pibrentasviiri käytetty (katso myös kohta 2 'Käytetty u vielä muita lääkkeitä?').

Milloin täytyy u erityistä varovaisuutta noudattaa tämän lääkkeen kanssa?

Milloin täytyy u ottaa yhteyttä ottaa yhteyttä teidän lääkäri?

Kutsu kiireellinen lääketieteellinen apu jos

- sinä mahdollisia oireita tai merkkejä verihyytymästä huomaat , jotka voivat tarkoittaaettä voida tarkoittaa se u kärsit jostakin yhdestä verihyytymästä sisällä sinun jalka (ts.. syvä laskimotromboosi),yhdestä verihyytymästä sisällä sinun keuhko (ts.ts.. keuhkoembolia), yksi sydänkohtaus tai yksi aivohalvaus (katso alla kohta osio 'Veritulpat (tromboosi)').

Mene lisätietoja yksi kuvaus ei käännettävää sisältöä oireista tai ilmenemismuodoista alkaen näiden vakavien sivuvaikutusten katso 'Kuinka tunnistat veritulpan ?'. Kerrosiitä

sinun lääkäriillesi sinä lääkäri, jos yksi seuraavista tilanteista koskee sinua. Jos sairaus ilmenee tai pahenee , kun käytät Marvelonia, sinun täytyy u Marvelon käytetty, täytyy u tämä myös sinun lääkäriillesi kerro kertoa.

- Sinä poltat.
- Sinulla on diabetes.

- Olet paljon liian ylipainoinen.
- U on yksi kohonnut verenpaine.
- U on yksi sairaus sydämen läppien tai yksi tietty sydämen rytmihäiriö.
- U on yksi tulehdus ihon laskimoissa lähellä ihoa (pintalaskimotulehdus).Teillä on suonikohjuja
- . Jollakin perheessänne.
- suonikohjuja . Joku läheisessä perheessänne on koskaan tromboosi, sydänkohtaus tai aivohalvaus ollut . Teillä.
- migreeni. Teillä on
- epilepsia. Teillä on.
- U on kohonneet rasvapitoisuudet sisään sinun veressäsi (hypertriglyseridemia), tai tämä sairaus esiintyy sisään sinun perheessäsi tai on sinun perheessäsi esiintynyt esiintynyt. Hypertriglyseridemia on yhteydessä tuotu korkeampaan yhteys korkeampi riski haimatulehduksen (yhteys tulehdus haiman haima) saada ..
- täytyy olla tulla leikattu tai olette kestävän pitkän ajan et jalkeilla (katso 'Veritulpat (tromboosi)' kohdassa 2). Jos olette
- äskettäin synnyttäneet , on on u yksi lisääntynyt riski saada saada alkaen verihyytymiä. Kysy sinun lääkäritäsi kuinka nopeasti jälkeen synnytyksen synnytys voit voit aloittaa kanssa käyttö Marvelonista.
- Sinulla on joku perheessäsi joka on sairastanut rintasyöpää rintasyöpä Sinulla on.
- tai sappirakon sairaus . maksasta tai sappirakko.
- U heeft de sairaus Crohnin tauti tai haavainen paksusuolentulehdus ulseratiivinen (krooninen suolistosairaus).
- U heeft systeeminen lupus erythematosus (SLE - yksi sairaus joka teidän luonnollinen immuunijärjestelmä vaikuttaa).
- Te on hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (HUS - yksi häiriö veren hyytyminen joka munuaisten vajaatoiminta aiheuttaa).
- Te on sirppisoluanemia (yksi perinnöllinen sairaus punasolujen verisolut).
- Te on yksi tila joka ensimmäistä kertaa esiintyi tai paheni raskauden aikana yksi raskaus of käytettäessä aikaisemmin käyttö van sukupuoli hormoneja, esimerkiksi kuulon heikkeneminen, porfyria (verisairaus), herpesgestationis gestationis ihottumarakkuloilla kanssa rakkulat raskauden aikana raskaus) tai Sydenhamin korea (yksi hermosairaus jossa äkilliset liikkeet kehon esiintyvät tapahtuvat).
- Sinä saat oireita angio-edeema kuten turvotus - sinun kasvot, kieli jaai kurkku jaai vaikeuksia kun nielemisessä tai nokkosihottuma mahdollisesti hengitysvaikeuksien kanssa . Otatässä tapauksessa tapaus suoraan yhteyttä teidän lääkäriin. Tuotteet joissa on estrogeeneja voivat aiheuttaa oireita perinnöllisestä ja hankitusta angio- edeemasta aiheuttaa tai pahentaa ..
- U on kloasmaa tai sinulla on koskaan kloasmaa ollut (kellanuskeita pigmenttiläiskiä, niin sanottuja 'raskaustäiskiä', erityisesti kasvoissa kasvoissa); jos tämä se tapaus on, onko se järkevää että suoraa altistumista auringonvalolle tai ultravioletti- valolle välttää . Pilleri.

verihyytymät (tromboosi verihyytymät (tromboosi)

VERIHYYTYMÄT (TROMBOOSI)

Jos käytät yhdistelmä hormonaalista ehkäisyvalmistetta kuten Marvelon on sinullakorkeampi riski saada verihyytymä kuin henkilöillä jotka eivät käytä sellaista saada sitten jos te ei yhdistetty hormonaalinen ehkäisyvalmiste käyttää. Harvinaisissa harvoin esiintyvissä tapauksissa voi veritulppa tukkia verisuonen verisuoni tukkia ja vakavia ongelmia aiheuttaa. Verihyytymät voivat muodostua

- suonissa laskimoissa (tätä kutsutaan 'laskimotromboosi', 'laskimotromboembolia' tai VTE nimelläVTE:n nimeltään)
- in valtimot (tätä kutsutaan 'valtimotromboosi', 'valtimotromboembolia' tai ATE nimellä). Eiaina

toivuta täysin ei aina täysin alkaen verihyytymät. harvoin esiintyviä tapauksia voi olla pitkäaikaisia vakavia vaikutuksia olla, tai hyvin harvoin esiintyviä tapauksia voi verihyytymät olla kohtalokkaita ovat.

Se on tärkeää että tiedätte että se yleinen riski verihyytymästä on pieni Marvelon-lääkkeen aiheuttama verihyytymä on pieni. MITEN TUNNISTAA VERIHYYTYMÄ?

Kytke

Kytkein kiireellinen lääketieteellinen apu in jos sinä yksi näistä seuraavista oireista tai merkkejä huomaat.

Saatko sinä yksi näistä oireista oireet of oireet?	Missä voit sinä kärsiä? turvotus
jalka tai pitkin laskimoa jalassa tai jalkaterässä, erityisesti jos tähän liittyy: tai jalka, erityisesti jos siihen liittyy: kipu tai arkuus jalan se joka ehkä tunnet vain seistessä tai kävellessä kohonnut lämpötila sisään vaikuttanut jalka värimuutos värimuutos ihon de iho alkaen se jalka, esimerkiksi kalpea, punainen tai sininen	Syvä laskimo tromboosi
äkillinen selittämätön hengitysvaikeus tai nopea hengitys äkillinen yskä ilman selvää syytä, jolloin voit yskää verta terävä kipu rinnassa, joka voi pahentua kun hengität syvään vakava kevyt tunne päässä tai huimaus tunne sisään se pää tai huimaus nopea tai epäsäännöllinen sydämenlyönti vakava kipu vatsassasi Jos epäilet, ota yhteyttä lääkäriin, koska sitten ota yhteyttä auki kanssa yksi lääkäri, haluta jotkut näistä oireista, kuten yskä tai hengenahdistus, voivat	Keuhkoembolia

virheellisesti olla koska varten yksi lievempi sairaus, kuten hengitystieinfektio (esimerkiksi flunssa).	
Oireet ilmenevät yleensä yhdessä silmän ilmestyä: välittömästi välittömästi näkökyvyn menetys näkökyvyn menetys, tai kivuton sumea näkö, joka voi kehittyä näkökyvyn menetykseksi näkökyvyn menetys verkkokalvon	Laskimotromboosi verkkokalvossa (verihyytymä verkkokalvossa se oog)
Onko sinulla jokin näistä oireista tai vaivoista?	Mistä voit kärsiä?
näkökyky	
kipu, epämukavuus, paine tai raskas, puristava tai täysi tunne rinnassa, käsivarressa tai rintalastan alla täysi tunne, ruoansulatushäiriö tai hengästyminen epämukavuus ylävartalossa, joka säteilee selkään, leukaan, kurkkuun, käsivarteen ja vatsaan hikoilu, pahoinvointi, oksentelu tai huimaus äärimmäinen heikkous, ahdistus tai hengenahdistus nopea tai epäsäännöllinen sydämenlyönti	Sydänkohtaus
äkillinen heikkous tai tunnottomuus kasvoissa, käsivarressa tai jalassa, erityisesti kehon toisella puolella äkillinen sekavuus, vaikeus puhua tai ymmärtää äkillinen näkövaikeus yhdessä tai molemmissa silmissä äkillinen kävelyvaikeus, huimaus, tasapainon tai koordinaation menetys äkillinen, voimakas tai pitkäkestoinen päänsärky ilman tunnettua syytä tajunnan heikkeneminen tai pyörtäminen, mahdollisesti epileptisen kohtauksen kanssa tai ilman Aivohalvauksen oireet voivat joskus kestää vain lyhyen aikaa ja palautua lähes välittömästi ja täysin. Silti sinun tulee hakeutua kiireelliseen lääkäriin hoitoon, koska sinulla voi olla riski saada uusi aivohalvaus.	Aivohalvaus
turvotus ja lievä sinertävyys käsivarressa tai jalassa voimakas kipu vatsassasi (akuutti vatsa)	Veritulppa, joka tukkii muita verisuonia

VERITULPAT LASKIMOSSA

Mitä voi tapahtua jos veritulppa muodostuu laskimossa veritulppa Käyttö muodostunut sisään yksi valtimo?

- Se käyttö alkaen yhdistetty hormonaalinen ehkäisyvalmisteet on yhteydessä tuotu kanssa korkeampi riski veritulppien esiintymiseen verisuonessa (laskimotromboosi). Tämälaskimoon liittyvä tromboosi). Tämä sivuvaikutukset

esiintyvät kuitenkin harvoin esiin. Yleensä ilmenevät ne ensimmäisen vuoden jolloin yhdistelmä hormonaalinen ehkäisyvalmiste käytetään . Jos.

- yksi yksi verihyytymä muodostuu muodostunut sisään suonessa laskimossa sisään jalassa tai jalka, voi se aiheuttaa syvän laskimotromboosin (DVT) aiheuttaa aiheuttaa.
- Jos verihyytymä jalasta kulkeutuu keuhkoon voi aiheuttaa keuhkoembolian . Se on hyvin harvinainen tilanne keuhkoembolia mutta.
- . Jos tämä harvoin varten että yksi verihyytymä muodostuu muodostunut laskimossa yksi toinen elin , kuten eläinsilmä (laskimotukos silmä (laskimoon liittyvä tromboosi in het verkkokalvo).

Milloin on se riski veritulppaan yksi verihyytymä in yksi laskimo se korkein?

Se riski saada yksi veritulppa in yksi laskimo saada on korkein ensimmäisenä vuotena kun nainen ensimmäistä kertaa nainen ensimmäistä kertaa yhdistetty hormonaalinen ehkäisy valmiste ehkäisyvalmiste käytetty. Se riski voi myös olla lisääntynyt olla jos te jälkeen yksi keskeytys 4 viikkoa tai pidempään uudelleen alkaa sen kanssa käyttö alkaen yksi yhdistetty hormonaalinen ehkäisyvalmiste (sama valmiste, tai toinen valmiste kuin aikaisemmin).Ensimmäisen vuoden jälkeen on riski se korkeampi pienempi, mutta pysyy hieman korkeampi kuin kun käytätte ei yhdistelmä hormonaalista ehkäisyä ..

Marvelonin, on teidän riskinne riski päällä yksi veritulppa sisällä muutaman viikon jälleen normaali.

Kuinka korkea on riski päällä yksi veritulppa?

Riski riippuu roikkuu ei alkaen sinun luonnollinen riski VTE:lle, ja tyypistä yhdistelmä hormonaalinen ehkäisyvalmiste jota sinä käytät.

Kokonais yleinen riski veritulppaan yksi veritulppa in yksi jalka tai keuhko (syvä laskimo tromboosi tai keuhkoembolia) Marvelonin kanssa on pieni.

- Jokaisesta 10 000 naisesta jotka eivät yhtään yhdistelmä hormonaalinen hormonaalinen ehkäisyvalmiste käyttää ja ei raskaana olla, saada noin kaksi 2 yksi jakso alkaen yksi vuosi vuoden veritulppa.
- Vuonna jokainen 10.000 naista jotka käyttävät yhdistelmä hormonaalista ehkäisyvalmistetta käyttävät joka levonorgestreeliä, noretisteronia tai norgestimaattia sisältää, saavat noin noin 5-7:ssä yksi vuosi yksi veritulppa.
- Jokaisesta 10 000 naisesta jotka käyttävät yhdistelmä hormonaalista ehkäisyvalmistetta joka sisältää desogestreelia desogestreeli kuten, kuten Marvelon, saavat noin noin välillä 9 ja 12 vuodessa vuosi yhden veritulpan.
- Riski riski saada yhden veritulpan saada saada on riippuvainen sinun henkilökohtaisesta lääketieteellisestä historiastasi anamneesi katsokohdat ' Tekijät jotka lisäävät riskiäsi veritulppaan riski verisuonissa yksi veritulppa sisään yksi laskimovaltimo lisätä' alla).

	Riski saada vuoden aikana veritulppa Naiset
jotka eivät käytä yhdistelmä hormonaalista pilleriä/laastaria/rengasta eivätkä ole raskaana	Noin 2 jokaisesta 10 000 naisesta Naiset
jotka käyttävät yhdistelmäpilleriä joka sisältää levonorgestreelia, noretisteronia tai norgestimaattia levonorgestreeli, noretisteroni tai norgestimaatti 5-7	jokaisesta 5-7 naisesta jokainen 10.000 naiset

Naiset jotka Marvelon käyttävät	Noin 9-12 jokaisesta 10 000 naisesta Tekijät
---------------------------------	--

jotka vaikuttavat riskiisi veritulppaan laskimossa laskimossa veritulppaan laskimossa laskimossa laskimossa lisääntyä

Het riski op yksi veritulppa Marvelonilla on pieni, mutta eräitä ovat tietyt olosuhteet jotka riski lisääntyä. Sinun riski on korkeampi:

- jos sinä vakava ylipaino on (BMI [body mass index] korkeampi kuin 30 kg/m²)
- jos yksi sinun lähainen perheenjäsen nuorena nuori ikä (esimerkiksi ennen 50. vuotta) on veritulppa ollut saanut sisään on jalassa, keuhkossa tai muussa elimessä. Jos näin on voit sinä on perinnöllinen hyytymishäiriö olla.
- jos te yksi leikkaus täytyy käydä läpi, tai jos te pitkä aika ei jaloillaan johtuen yksi vamma tai sairaus, tai jos sinun jalka on kipsissä on. Se voi olla tarpeen olla ennen leikkausta , tai kunolet vähemmän liikkuva , ja olet, muutama viikkoa ei lopettaa käytön käyttö Marvelon. Jos sinun täytyy lopettaa Marvelon, kysy sitten lääkäritäsi milloin voit aloittaa uudelleen voit aloittaa käytön käyttö.
- jos te vanhempi tulette (erityisesti erityisesti yli noin 35 vuotta)
- jos olette viime muutaman viikon synnyttäneet olette.

Se riski päällä yksi veritulppa kasvaa sitä mukaa tai enemmän näistä tilanteista koskee sinua sinusta soveltuu ovat.

Matka lentokoneella (pidempi kuin 4 tunti) voi sinun riski kohottaa yksi veritulppa tilapäisesti lisätä, erityisesti jos on vielä joitakin muita mainituista olosuhteista olosuhteet koskee sinua soveltuva ovat.

On tärkeää että kerrot sinun lääkärille kerrot jos yksi tai useampi näistä tilanteista koskee sinua soveltuva sovellus ovat, jopa jos te tästä epäilette. Teidän lääkäri voi päättää että te täytyy lopettaa Marvelonin käyttö Marvelonista.

Jos yksi yllä mainituista yllä mainituista olosuhteista muuttuu sillä aikaa kun käytät Marvelonia ,esimerkiksi jos yksi lähainen sukulainen saa veritulpan veritulppa tromboosi)) saa ilman tunnettu syy, tai jos sinä paljon painossa lisää tulee, kerro tämä sitten sinun lääkärille.
VERIHYYTYMÄ VALTIMOSSA

Mitä

Mitä voi tai tapahtua jos tai veritulppa muodostuu tulee valtimo ssa ? Aivankuten Vain veritulppa yksi laskimo ssa yksi valtimo, voi veritulppa valtimo aiheuttaa vakavia ongelmia . Se voi esimerkiksi aiheuttaa sydänkohtauksen tai aivohalvauksen . tai yksi aivohalvaus aiheuttaa.

Tekijät jotka sinun riskiäsi verisuonitukokseen valtimo lisäävät On tärkeää että tiedät että riski verisuonitukokseen on korkea tietyissä olosuhteissa ja tilanteissa yksi sydänkohtaus tai aivohalvaus käytön yhteydessä Marvelon-valmisteen hyvin pieni on, mutta suurempi voi tulla:

- iän kasvaessa (ylinoin noin 35 vuotta)
- jos sinä poltat. Jos käytät yhdistelmä hormonaalista ehkäisyä kuten Marvelon käytät ,suositellaan että sinä lopetat u lopeta kanssa tupakointi. Jos et voi

lopettaa tupakointi ja vanhempi olet kuin 35 vuotta ,voi lääkärisi suositella sinulle suositella että toinen toinen toinen tyyppi ehkäisyväline käyttää käyttää.

- jos sinulla ylipaino on
- jos sinulla korkea verenpaine on
- jos yksi jäsen sinun läheinen perhe op nuori ikä (ennen 50. vuotta) saanut sydänkohtauksen tai aivohalvauksen on saanut. Jos niin tapauksessa voit myös myös yksi lisääntynyt riski olla klo yksi sydänkohtaus tai aivohalvaus saada ..
- sinä, tai yksi jäsen sinun läheinen perhe ,, yksi kohonnut rasvapitoisuus veressä veri on (kolesteroli tai triglyseridit)
- jos sinä kärsit migreenistä ,erityisesti migreeni auralla jos
- sinä yksi yksi sydänsairaus on (sydänlappäsairaus, tai yksi sydämen rytmihäiriö joka eteisvärinä kutsutaan)jos
- sinulla diabetes (diabetes) on ..

enemmän lisää dan yksi näistä tämä olosuhteista koskee sinua sovellettavissa on, tai jos yksi näistä tämä sairauksista erityisen vakava on, voi se riski siitä saada alkaen yksi veritulppa jopa vielä edelleen lisääntynyt ovat.

Jos yksi yllä mainituista olosuhteista muuttuu kun käytät Marvelonia käytät käytetty, esimerkiksi jos te aloitatte tupakoimaan tai jos läheinen sukulainen saa veritulpan (tromboosi)ilmantunnettua saa ilman tunnettu syy, tai jos sinä paljon painossa paino lisää, kerro tämä sitten sinun lääkärillesi. Pilleri

ja syöpä Pillereiden ja

syöpä naiset jotka pilleriä käyttävät havaitaan hieman useammin rintasyöpää kuin sitten niillä jotka eivät käytä pilleriä samanikäisillä sama ikäisillä. Kymmenen vuotta jälkeen lopettamisen jälkeen kanssa pilleri on ei eroa enää. Se on ei tunnettu onko tämä ero aiheutuu johtuen pilleristä . Sevoi myös johtua tulevat koska pillerinkäyttäjät perusteellisemmin ja useammin tutkitaan ,jotta rintasyöpä aikaisemmin havaitaan . Harvinaisissa tapauksissa.

lähellä harvinainen tapaukset ovat kohdalla pillerin käyttäjät hyvänlaatuisia maksakasvaimia löydetty ja in vielä harvinaisemmissa tapauksissa pahanlaatuisia maksakasvaimia. Joskus ovat nämä kasvaimet johtaneet kriittiseen yhteen hengenvaaralliseen sisäiseen verenvuoto. Jos te yhtäkkiä kärsitte saada voimakkaasta kovasta vatsakipu, niin täytyy te välittömästi ottaa yhteyttä ottaa yhteyttä teidän lääkäriin lääkäri.

Krooninen infektio kanssa ihmisen papilloomaviruksen on tärkein riskitekijä kohdunkaulan syövän saamiselle alkaen kohdunkaulansyöpä. Naisilla jotka käyttävät ehkäisytablettiä pidemmän ajan aika voi olla de mahdollisuus saada kohdunkaulan syöpä hieman kohonnut on . Se on kuitenkin selvää onko tämä aiheutettu pillerin toimesta tai jostain muusta syystä. että se tehdä valmistaa on kanssa seksuaalinen käyttäytyminen ja muut tekijät (kuten parempi kontrolli kohdunkaulan kohdunkaula).

Psyykkiset häiriöt

Jotkut naiset jotka hormonaalisia ehkäisyvälineitä mukaan lukien Marvelon käyttävät, ovat ilmoittaneet masennuksesta tai alakuloisuudesta . Masennus. olla vakava vakava ovat ja voi joskus asti itsemurha-ajatuksiin johtaa. Jos sinulla on mielialanvaihteluita ja oireita masennuksesta koet , ota yhteyttämahdollisimman pian lääkäriisi ota yhteyttä sinun lääkäri varten lisäksi lääketieteellinen neuvo.

Käytätkö sinä muita lääkkeitä? Käytätkö

sinä lisäksi Marvelon muita lääkkeitä tai rohdosvalmisteita? Käytätkö, on te että lyhyesti sitten tehty tai aikoo te tämä ehkä pian tehdä? Kerro että sitten lääkärillesi, lääkäri, apteekki tai kättilö. Tämä koskee myös lääkkeitä jotka ilman reseptiä voit saada .. myös jokaiselle muulle lääkärille tai muulle lääkäri tai hammaslääkäri (tai apteekkari) joka toinen lääke määrää että käytät Marvelon . He voivat kertoa sinulle onko se tarpeen on toinen tarvitaan on yksi extra ei-hormonaal ehkäisyväline (esimerkiksi yksi kondomi) käyttää ja myös kuinka kauan te sitä sitten täytyy käyttää tai että se se käyttö alkaen toisen lääkkeen jota tarvitsette , täytyy muuttaa. Älä käytä Marvelon.

teillä on hepatiitti C . Käytä Marvelon ei jos teillä on hepatiitti C en tätä varten lääkkeet kanssa ombitasvir2Fparitaprevir2Fritonaviri ja dasabuvir tai glekapreviiri2Fpibrentasviiri käytetään, koska tämä yksi lisäys of yksi maksaentsyymi (ALAT, yksi maksatoimintakoe) voi aiheuttaa. Teidän lääkäri määrää yksi toinen ehkäisyvalmiste määrätä ennen te aloitatte kanssa tämä hoito. Marvelon voi noin 2 viikkoa jälkeen päättymisen tästä tämä hoito uudelleen voidaan aloittaa. Katso kohta 2 'Milloin et saa tätä lääkettä ei käyttää?').

Jotkut lääkkeet

- voivat vaikuttaa vaikutus olla veren pitoisuuksiin Marvelon
- voivat Marvelon vähemmän tehokas tehdä jotta raskaus voida estää
- voida odottamattomat verenvuodot aiheuttaa.

Näihin kuuluvat muun muassa lääkkeet hoitoon de hoito :

- epilepsia (esimerkiksi primidoni, fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini, okskarbatsepiini, topiramaatti, felbamaatti)
- tuberkuloosi (esimerkiksi rifampisiini, rifabutiini)
- hiv-infektio (esimerkiksi ritonaviri, nelfinaviiri, nevirapiini, efavirentsi)
- hepatiitti C-virusinfektio (esimerkiksi bocepreviiri, telapreviiri)
- muut infektiot (esimerkiksi griseofulviini)
- korkea verenpaine verisuonissa keuhkojen (keuhkot (bosentaani)
- masentunut mieliala (se yrttivalmiste mäkikuisma).

Jos käytät lääkkeitä tai yrttivalmisteita käytät jotka voivat tehdä Marvelonista vähemmän tehokas voivat tehdä, sinun täytyy myös myös yksi esteettinen ehkäisymenetelmä käyttää. Koska vaikutus yksi toinen lääke Marveloniin jopa 28 päivää jälkeen lopettamisen lopettaminen siitä tuo lääke voi jatkua, täytyy u joka ylimääräinen este-ehkäisymenetelmä kestää joka aika jatkaa käyttää.

Marvelon voi vaikuttaa vaikutukseen muista lääkkeistä lääkkeisiin vaikuttaa, esimerkiksi:

- lääkkeet die siklosporiini sisältävät
- anti-epileptinen lääke lamotrigiini (tämä voi johtaa lisääntyneeseen määrään kohtauksia). LaboratoriotutkimuksetJos

verikoe

tehdään verikoe kohdalla u täytyy tehdä tehty, kerro sitten sinun lääkärillesi tai laboratoriotyöntekijälle että käytät pilleriä .. ehkäisyvalmisteet voivat nimittäin nimittäin de tulokset alkaen joitakin tutkimuksia vaikuttaa.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Jos olet raskaana , tai luulet että olet raskaana voisit olla ovat et voi käyttää Marvelonia ei käyttää. Jos epäilet että olet raskaana kun käytät Marvelonia , ota yhteyttä mahdollisimman pian lääkäriisi. Imetys Se ota yhteyttä sinä lääkäri

Imetys

Se käyttö Marvelon ei yleensä suositella kun imetys jatkuu nainen antaa rintamaitoa . Jos haluat pilleriä kuitenkin käyttää käyttää samaan aikaan kun vielä on imetys antaa, voit ottaa parhaiten yhteyttä ottaa yhteyttä lääkäriisi kanssa.

Ajokyky ja koneiden käyttö koneiden

Ei ole ei viitteitä että de ajokyky ja se kyky käyttää koneita voi käyttää vaikuttaa voidaan.

Marvelon sisältää laktoosia

Jos sinun lääkäri on kertonut sinulle että te tiettyjä sokereita ei siedä, ota yhteyttä lääkäriisi ennen kuin otat tätä lääkettä ..

ja nuoret alle 18 vuotta vuosi

On ei kliinistä tietoa koskien tehokkuutta ja turvallisuutta nuorilla alle 18 vuoden ikäisillä.

Milloin pitää mennä lääkärin luo aikana tämä käyttö tästä tätä lääkettä?

3. Kuinka otatte te tätä lääkettä sisään?

Ota tätä lääkettä aina sisään tarkalleen kuin teidän lääkäri tai apteekkari sinä että on kertonut. Epäiletkö sinä oikeasta oikea käyttö? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäri tai apteekkari.

Milloin ja miten ottaa u de tabletit sisään?

Liuskassa sisältää 21 tablettia. Kun jokainen tabletti on merkitty ilmoitettu mihin päivänä tämä täytyy olla otettu . Otatabletti tabletit joka päivä noin päällä samaan aikaan sisään, tarvittaessa pienen vesimäärän kanssa. Noudata de nuolta ei voida joka on pakkauksessa joka on liuskalla merkitty kunnes olet ottanut kaikki 21 tablettia on otettu. Sen jälkeen otat 7 päivää ei tablettia. Tämän aikana näiden 7 päivän aikana vuodon alkaa (ns. lääkkeen lopettamisvuoto). tyhjennysvuoto). Tämä alkaa yleensä 2. tai 3. päivänä jälkeen viimeisen Marvelon-tabletin. Aloita 8. päivänä seuraavan seuraavan levyn, riippumatta siitä, onko vuoto silloin jo ohi vai ei ei. Tämä tarkoittaa että jatkat aina samana päivänä viikossa seuraavan seuraavan liuskan aloittamista, ja myös että tyhjennysvuoto tulee joka kuukausi noin op samoina päivinä sattuu.

Milloin aloittaa ensimmäisen levyn Ensimmäinen liuska

Olet käyttänyt viimeisen kuukauden aikana ei ehkäisytablettiä käyttänyt.

Aloita Marvelon ensimmäisenä päivänä ei voida kierron (ensimmäisenä päivänä alkaen kuukautistes alkamisesta). Marvelon toimii tässä tapauksessa heti ja sinun ei tarvitse ei extra ehkäisyväline käyttää käyttää.

Voit myös päivänä päivä 2-5 sykli aloittaa mutta silloin täytyy sinun ensimmäiset 7 päivää kyllä yksi ylimääräinen ehkäisyväline (esimerkiksi yksi kondomi) käyttää.

Siirtyminen yhdestä toisesta yhdistelmäpilleristä yhdistelmäpilleriemätinrengas tai ehkäisytaastari
Sinä ehkäisytaastari

U voit Marvelonilla aloittaa päivänä jälkeen kun olet viimeisen tabletin edellisestä pilleristäsi ottanut (ilman taukoa). Jos on taukovälissä kohdalla sinun edellinen pilleri myös ei-aktiivisia tabletit pakkauksessa ovat, täytyy sinun heti jatkaa jälkeen viimeisen aktiivisen tabletin sinun edellinen edellinen pilleri (jos et tiedä mikä se on, kysy sitten lääkäriltäsi tai apteekkariltasi). Voit myös myöhemmin aloittaa , mutta ei koskaan myöhemmin kuin päivänä jolloin sinun pitäisi aloittaa päivä jälkeen päättymisen ei käännettävää sisältöä tablettivapaan jakson alkaen sinun edellisen pillerin (tai jälkeen de viimeisen ei-aktiivisen tabletin sinun edellisen pillerin).

Jos vaihdat alkaen vaginaalisesta renkaasta tai ehkäisytaastarista , voit aloittaa Marvelonilla sinä Marvelonilla poistopäivänä päällä renkaan tai viimeisen taastarin poistamisen jälkeen . Voit myös aloittaa myöhemmin myöhemmin aloittaa, mutta sinun täytyy viimeistään seitsemän päivän kuluessa renkaan poistamisesta tai viimeisestä taastarista Marvelonilla aloittaa Marvelonilla Kun.

pillerin sinä pilleri, taastari tai rengas täysin mukaan de määräykset on käyttänyt ja olet varma siitä että et ole raskaana ole, voit käyttää lisäksi lopettaa kanssa ottaminen pillerin tai renkaan tai taastarin poistaminen päälle jokainen päivä sinun nykyinen kierto ja heti vaihtaa päälle seuraava päällä käyttö Marvelonista.

Jos näitä ohjeita noudatetaan ei ole tarpeen käyttää lisä ehkäisyvälinettä ehkäisyväline esimerkiksi kondomi) käyttää. tee käyttää.

Siirtyminen alkaen yhdestä progestiini pilleristä (minipilleri)

Voitte siirtyä yhdestä toiseen päällä päivänä siirtyä Marveloniin, mutta teidän täytyy Marvelon, mutta sinä ensimmäinen de päivä 7 päivää kyllä yksi ylimääräinen ehkäisyväline (esimerkiksi yksi kondomi) käyttää.

Siirtyminen pistos ehkäisystä ,yksi implantaatti tai of yksi hormonia sisältävä kierukka

Aloita Marvelon milloin te muuten seuraava injektio saisi tai päivänä jolloin se implantaatti tai hormonia sisältävä kierukka hormonia sisältävä kierukka poistetaan poistettu. Sinun täytyy ensimmäiset seitsemän 7 päivää kuitenkin kyllä yksi ylimääräinen ehkäisyväline (esimerkiksi kondomi yksi) käyttää.

Synnytyksen jälkeen synnytys

Jos olet juuri synnyttänyt , lääkäri sinun todennäköisesti suosittelee odottamaan kunnes ensimmäinen spontaani kuukautisesi , mutta joskus kuukautiset, mutta joskus onko se mahdollista aikaisemmin aloittaa .. lääkärisi neuvoa . Tämä koskee myös tilannetta, jossa annat imetystä . tapaus sinä imetys antaa en de pilleri haluat käyttää.

Keskenmenon tai abortin jälkeen
Noudata lääkärin ohjeita. Onko sinulla

liian paljon te paljon alkaen tämä lääke otettu?

On ei ole ei raportteja alkaen vakavista haitallisista seurauksista of the ottamisesta alkaen paljon Marvelon tabletteja samanaikaisesti. Jos sinä otit useita tabletteja samanaikaisesti ottaen, niin voit sinä mahdollisesti kokea pahoinvointia, oksentelua tai huonovointisuutta, tai vaginaaliverenvuoto. Jos sinä huomaat että lapsi on ottanut Marvelon on nauttinut, kysy sitten lääkäriltäsi neuvoa neuvoa.

Mitä tehdä ...

...bij het unohtaminen tablettien Jos

olet vähemmän kuin **12 12 myöhässä ottaessasi tabletin** ota se heti kun muistat sen tabletti sitten on ei vaikutus ei pilleri heikentynyt. Ota se tabletti sitten heti kun muistat ja ota seuraavat tabletit taas tavalliseen aikaan.

Jos olet **yli 12 tuntia myöhässä** tabletin ottamisessa, pillerin vaikutus voi olla heikentynyt. Mitä enemmän tabletteja olet peräkkäin unohtanut, sitä suurempi on riski, että vaikutus on ei pilleri heikentynyt on. De mahdollisuus riittämättömään suojaan raskaudelta on suurin, kun tabletteja jää väliin alussa tai lopussa liuskaa. Siksi seuraavat säännöt koskevat (katso myös kaavio): Yli on suurin, kun tabletteja jää väliin alussa tai lopussa liuskaa. Siksi sovelletaan seuraavia sääntöjä (katso myös kaavio):

tabletti unohtunut 1 liuska Ota yhteyttä kanssa

Ota ota yhteyttä av met sinun lääkäri.

1 tabletti unohtunut viikolla 1 1

Ota unohtunut tabletti heti kun muistat, vaikka se tarkoittaisi, että otat kaksi tablettia samana ottaa. Ota jatkossa tabletit taas tavalliseen aikaan uudelleen auki de tavanomainen aika in, mutta sinun täytyy myös käyttää lisäehkäisyä 7 päivän ajan. Jos olet harrastanut seksiä viikolla ennen unohtamista, on olemassa raskauden mahdollisuus. Ota siinä tapauksessa heti yhteyttä lääkäriisi.

1 tabletti unohtunut viikolla 2 2

Ota unohtunut tabletti heti kun muistat, vaikka se tarkoittaisi, että otat kaksi tablettia samana sinun täytyy ottaa. Jatka muuten tablettien ottamista taas kuten ennen tavallinen aika in. De Pillerin teho ei ole heikentynyt, sinun ei tarvitse käyttää lisäehkäisyä.

1 tabletti unohtunut in viikko 3

Voit valita kahdesta vaihtoehdosta 2 lisä ehkäisyvälineitä käyttämättä ehkäisyvälineitä tehdä tarvitsevat käyttää.

1. Ota unohtunut tabletti heti kun muistat, myös jos tämä tarkoittaisi, että sinun täytyy ottaa kaksi tablettia samaan aikaan. Ota jatkossa tabletit taas tavanomaiseen aikaan. **Jätä lisäksi tablettivapaa jakso väliin** ja jatka heti seuraavalla liuskalla. Todennäköisesti saat sinä vasta toisen liuskasi lopussa kuukautiset toisen liuskasi lopussa kuukautiset todellinen tyhjennysvuoto, mutta

- toisen liuskan aikana voi esiintyä tiputteluvuotoa tai läpäisyvuotoa.
2. Voit myös lopettaa kyseisen liuskan. Pidä tablettivapaa jakso, joka on 7 päivää tai vähemmän päälle (**soita aina päivä mukaan jolloin olet tabletin unohtanut**). **Sen jälkeen jatka unohtaa**). Sen jälkeen menee u tavallinen jatka seuraavalla liuskalla.
- Jos noudatat tätä menetelmää, voit aina aloittaa uuden liuskan vakiintuneena aloituspäivänäsi.

Jos olet unohtanut tabletteja liuskasta etkä saa vuotoa seuraavan normaalin tablettivapaan jakson aikana, se voi tarkoittaa, että olet raskaana. Ota yhteyttä lääkäriisi ennen kuin jatkat seuraavalla liuskalla.

... maha- ja/tai suolistohäiriöiden tapauksessa (esimerkiksi oksentelu, vaikea ripuli)
Jos oksennat tai sinulla on vaikea ripuli, on mahdollista, että vaikuttavat aineet eivät ole täysin imeytyneet kehoon. Jos oksennat 3-4 tunnin kuluessa tabletin ottamisesta, tilanne on verrattavissa tabletin unohtamiseen. Noudata siksi oksentelun tapauksessa samaa ohjetta kuin tablettien unohtamisen yhteydessä. Jos sinulla on vaikea ripuli, ota yhteyttä lääkäriisi.

... jos haluat siirtää kuukautisiasi

On mahdollista siirtää kuukautisia, vaikka sitä ei suositella. Voit poikkeustapauksissa siirtää kuukautisia jatkamalla uudella Marvelon-liuskalla ilman tablettivapaata jaksoa. Voit jatkaa tätä liuskaa, kunnes kaikki tabletit ovat loppuneet tai lopettaa halutessasi aikaisemmin. Tämän toisen liuskan aikana voi esiintyä läpäisyvuotoa tai tiputtelua. Tavanomaisen 7 päivän tablettivapaan jakson jälkeen aloitat seuraavan liuskan.

... jos haluat siirtää kuukautistesi alkamispäivää

Jos otat tabletit ohjeiden mukaan, kuukautisesi alkavat aina suunnilleen samana päivänä. Jos haluat muuttaa tätä päivää, voit tehdä sen lyhentämällä normaalia tablettivapaata jaksoa kahden liuskan välillä (mutta ei koskaan pidentämällä sitä). Esimerkiksi, jos kuukautisesi alkavat normaalisti perjantaina ja haluat siirtää sen tiistaille (3 päivää aikaisemmin), sinun on nyt aloitettava uusi liuska 3 päivää aikaisemmin kuin tavallisesti. Jos teet tablettivapaasta jaksosta hyvin lyhyen (esimerkiksi 3 päivää tai vähemmän), voi olla, että et saa vuotoa tämän tablettivapaan jakson aikana. Seuraavan liuskan aikana voi esiintyä läpäisyvuotoa tai tiputtelua.

... odottamattoman verenvuodon yhteydessä

Kaikkien ehkäisytablettien kanssa voi ensimmäisten kuukausien aikana esiintyä odottamatonta verenvuotoa (tiputtelua tai läpäisyvuotoa). Saatat tarvita kuukautissuojia. Jatka joka tapauksessa tablettien ottamista normaalisti. Epäsäännöllinen verenvuoto loppuu yleensä, kun kehosi on tottunut kyseiseen pilleriin (noin 3 liuskun jälkeen). Jos se kestää pidempään, pahenee tai alkaa uudelleen, ota yhteyttä lääkäriisi.

... jos odotettu vuoto jää pois

Jos olet ottanut kaikki tabletit oikein, et ole kärsinyt oksentelusta ja/tai ripulista, etkä ole käyttänyt muita lääkkeitä, on erittäin epätodennäköistä, että olet raskaana. Voit jatkaa seuraavalla liuskalla huoletta.

Jos odotettu vuoto jää kuitenkin kahdesti peräkkäin pois, saatat olla raskaana. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi. Älä jatka seuraavalla Marvelon-liuskalla ennen kuin lääkärisi on todennut, ettet ole raskaana.

Jos lopetat käytön ottaa alkaen tätä lääkettä

Voitte lopettaa Marvelonin käytön milloin tahansa. Jos te ette halua tulla raskaaksi, kysykää sitten lääkäriltänne neuvoa neuvonta kanssa koskee muita luotettavia menetelmiä ehkäisystä. Jos lopetat.

haluat tulla raskaaksi, yleensä raskaana haluaa tulla, tulee sisällä yleinen suositellaan odottaa että odottaa kunnes te olette luonnollinen kuukautiset on ollut ennen te yritätte tulla raskaaksi olla tulla raskaaksi. Te voitte kuin helpommin laskea milloin synnytys tapahtuu tulee tapahtumaan.

4. Mahdolliset sivuvaikutukset

Kuten jokainen lääke voi myös tämä lääke sivuvaikutuksia aiheuttaa. Ei kaikki saa siitä kärsiä.. saatte haittavaikutuksen, varsinkin jos se on vakava luonteeltaan ja on tärkeää ilmoittaa lang jatkuu, tai ilmenee on muutos terveydentilassasi josta ajattelet että se aiheutuu voi johtua Marvelonista? Ota sitten yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen joka voi auttaa sinua lääkäri.

Kaikki naiset jotka yhdistelmä hormonaalisia ehkäisyvalmisteita käyttävät ovat suuremmassa vaarassa saada veritulppia laskimoissa (laskimotromboembolia [VTE]) tai laskimoon liittyvä tromboembolia [VTE]) of verihyytymät in de valtimot (valtimotrombo -- [ATE]). Katso lisätietoja erilaisista riskeistä yhdistelmäehkäisyn käytön yhteydessä olevista riskeistä käytöstä yhdistelmä ehkäisyvalmisteiden hormonaaliset ehkäisyvalmisteet kohta 2 'Milloin et saa tätä lääkettä käyttää tai täytyy sinun olla erityisen varovainen sen kanssa olla?'. Ota heti yhteyttä

sinun lääkäriin lääkäri jos sinä oireita angio-edeemasta saat kuten turvotus alkaen kasvosi, kieli ja ai kurkkuja aivakeuksia vaikeudet kohdalla nielemisessä niellä of nokkosihottuma mahdollinen kanssa hengitysvaikeudet (katso kohta 2 'Milloin täytyy olla erityisen varovainen olemaan tämän lääkkeen kanssa?').

Kuten kanssa kaikki yhdistelmätabletit, voi sinun kuukautiskierto muuttua, erityisesti aikana ensimmäisten kuukausien käytön aikana. Tämä ero voi olla siinä, miten kuinka usein u yksi verenvuoto saa (puuttuminen verenvuodosta, vähemmän usein, useammin tai jatkuva), kuinkavakava verenvuoto on, tai on, tai kuinka kauan de verenvuoto kestää.

Usein (esiintyvät alle 1:llä 10:stä naisesta) masentuneet

- mielialat ,mielialanvaihtelut päänsärky
- pahoinvointi
- pahoinvointivatsakipu vatsakipu
- herkät rinnat, kivuliaat rinnat
- painonnousu.

Joskus (esiintyy alle 1 100:sta naisesta)

- nesteen kertyminen
- vähemmän halua olla yhdynnässä
- migreeni
- oksentelu, ripuli
- ihottuma, nokkosihottuma (urtikaria)
- suurentuminen ei voida rintojen.

Harvoin (esiintyy alle 1:llä 1000:sta naisesta))

- haitallisia verihyytymiä sisään suonessa laskimossa tai valtimossa, esimerkiksi:
 - o jalassa tai jalka (esimerkiksiisyvä laskimotromboosi) tromboosi)
 - o in yksi keuhko (esimerkiksi keuhkoembolia)
 - o sydänkohtaus
 - o aivohalvaus
 - o 'pieni aivohalvaus' tai tilapäiset oireet kuten kuten yksi aivohalvaus, tunnettu jos TIA (ohimenevä iskeeminen kohtaus)
 - o verihyytymät maksassa, vatsasuolisto, munuaiset tai silmät. Riski saada verihyytymä on suurempi tee saada on suurempi jos on muita olosuhteita jotka koskevat sinua soveltuvia ovat jotka tätä riskiä lisäävät (katso kohta 2 lisää tietoa olosuhteista yli olosuhteista jotka riski päällä veritulppia lisäävät ja de oireet alkaen yksi veritulppa).
- yliherkkyysoireet
- enemmän halu olla yhdynnässä
- ärsytys silmien alueella yhteydessä linssien käyttöön yhteydessä piilolinssit
- kivuliaat, sinipunaiset kyhmyt iholla iho (erythema nodosum), ihottuma epäsäännöllisillä punaisilla läiskillä tai haavaumat (erythema multiforme) (erythema multiforme)
- vuoto ulos de nänni, muutos emätinvuodossa vuoto ulos emättimestä
- painonlasku.

Haittavaikutusten ilmoittaminen alkaen haittavaikutuksista

Jos sinulla on haittavaikutuksia, ota yhteyttä sinun lääkäri tai apteekkari. Tämä koskee myös sivuvaikutuksia jotka eivät ole tässä pakkausselosteessa mainittu . Voit ilmoittaa sivuvaikutuksista myös ilmoittaa kautta kautta Nederlands Haittavaikutukset Centrum Lareb, verkkosivusto: www.lareb.nl. Haittavaikutukset ilmoittaa ilmoittaa, autatte meitä saamaan enemmän tietoa tiedot saada saada lääkkeen turvallisuudesta alkaen tämän lääkkeen.

5. Kuinka säilytät sinä tätä lääkettä?

Pidä näkyvistä ja ulottumattomissa lasten poissa ..

tätä lääkettä enää ei lisää na de viimeinen käyttöpäivä. Sen löydätte pakkauksesta laatikko ja de läpipainopakkaus EXP:n jälkeen. Siinä lukee kuukausi ja vuosi . De vuosi. De viimeinen päivä siitä kuukaudesta on viimeinen käyttöpäivä.

Säilytä alle 30 °C. Ei pakastimessa säilytettävä ..
alkuperäisessä pakkauksessa blisteripakkauksessa läpipainopakkaus kerran suojaus vastaan valoa ja kosteutta.

Ota tätä lääkettä ei jos näet että esimerkiksi tabletit ovat värjäytyneet tabletit värjäytyneet of murskattu ovat of kun te muita näkyviä merkkejä van heikkeneminen in laatu huomaat.
Älä huuhtele lääkkeitä ei viemäriin viemäriin tai wc ja heitä ne ei roskakoriin roskakori. Kysy sinun apteekkariltasi mitä sinun pitäisi tehdä lääkkeillä pitää tehdä jotka ei enää käytä. Jos lääkkeet oikealla tavalla hävität ne tuhotaan oikealla tavalla ja eivät päädy ympäristöön . Sisältö ei ympäristössä oikein.

6. Sisältö pakkauksen pakkaus ja muut tiedot

Mitkä aineet sisältyvät tähän lääkkeeseen ?Vaikuttavat

- aineet tässä lääkkeessä ovat desogestreeli lääke ovat desogestreeli (150 mikrogrammaa) en etinyyliestradioli (30 mikrogrammaa).
- De muut aineet in tämä lääke ovat vedetön kolloidinen piidioksidi, laktoosimonohydraatti, perunatärkkelys, povidoni, steariinihappo, all-rac-alfa-tokoferoli.

Kuinka näyttää Marvelon ja mitä sisältää pakkaus ? Pakkaussisältää
1, 3 tai 6 pakkaus sisältää 1, 3 tai 6 läpipainopakkaukset met 21 tabletit.
Ei kaikki mainitut pakkauskoot ovat markkinoilla saatavilla ..

ovat valkoisia, pyöreitä , ja, päällä molemmat puolet kupera ja ovat yksi halkaisijaltaan 6 mm.
Toisella puolella on 'TR' yläpuolella '5' ja toisella puolella 'Organon' muu reuna 'Organon' en yksi viisikulmainen tähti.

Haltija luvan myöntämiseen ja markkinoille saattamiseen ja valmistaja N.V. Organon
Kloosterstraat Kloosterstraat 6
Alankomaat
Puh.: 00800 66550123 (+32 2 2418100)
dpoc.benelux@organon.com
dpoc.benelux@organon.com

Rekisterissä rekisteröity alla: RVG 08859

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty toukokuussa 2025 sisään toukokuu 2025