

Notice: information pour l'utilisateur
Marvelon, comprimés
désogestrel, éthinylestradiol

Choses importantes que vous devez savoir sur les hormonaux contraceptifs moyens:

- Ces moyens constituent un des plus fiables réversibles méthodes contraceptives, à condition d'être correctement utilisés.
- Ils offrent un légèrement plus élevé risque de développement d'un caillot sanguin (caillot sanguin thrombose) dans les veines et artères, surtout dans la première année que vous utilisez un combiné hormonal contraceptif utilisé ou si vous après une interruption de 4 semaines ou plus recommencez à utiliser l'utilisation un combiné hormonal contraceptif.
- Attention bien à et contactez votre médecin si vous pensez que vous pourriez avoir des symptômes de un caillot sanguin (voir rubrique 2 'Caillots sanguins (thrombose)').

Lisez attentivement toute la notice avant de ce médicament prendre car il contient des informations importantes pour vous. Conservez

- cette notice .. vous en aurez besoin plus tard. Ayez -vous.
- besoin de quelque chose questions? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.
- Ne donnez ce médicament pas à d'autres, car il est seulement à vous prescrit. Il peut être nuisible pour d'autres, même si ils ont les mêmes symptômes que vous.
- Ressentez vous des un des effets secondaires mentionnés dans la section 4 figurent? Ou recevez vous un effet secondaire qui n'est pas dans cette notice figurent? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

Contenu de ce notice

1. Qu'est-ce que Marvelon et pourquoi est ce médicament utilisé?
2. Quand ne devez-vous ce médicament pas utiliser ou devez vous faire particulièrement attention avec sont?
3. Comment prenez vous ce médicament ?
4. Effets indésirables
5. Comment conservez vous ce médicament?
6. Contenu de l'emballage en autres informations

1. Qu'est-ce que Marvelon et pourquoi ce médicament est-il utilisé?

Composition et type de pil

Marvelon est une pilule contraceptive orale combinée (de 'pil combinée'). Chaque comprimé contient une petite quantité de deux différentes hormones féminines, à savoir désogestrel (une hormone avec effet progestatif) en éthinylestradiol (une hormone avec activité oestrogénique). En raison de la petite quantité d'hormones, Marvelon est considéré comme un faiblement dosé contraceptif. Parce que les deux hormones dans tous les comprimés dans la plaquette en la même quantité combinées sont, est un un monophasique- pil combinée appelé.

Pour quoi est ce médicament utilisé?

Marvelon est utilisé pour prévenir la grossesse de.

Si Marvelon correct Si Marvelon est correctement pris (sans que comprimés soient oubliés) est la probabilité de tomber enceinte très faible ..

2. ne devez-vous pas ce médicament prendre ? utiliser ou devez vous y prudent avec être?

Remarques générales

Lisez avant de vous commencez à utiliser l'utilisation de Marvelon les informations sur les caillots sanguins (thrombose) dans rubrique 2. Il est surtout important que vous lisiez quels sont les symptômes être d' un caillot sanguin – voir rubrique 2 'Caillots sanguins (thrombose)'.

Dans cette notice sont décrites certaines situations dans lesquelles vous devez arrêter de prendre la utilisation de la pilule ou dans lequel le fiabilité de la pilule réduite peut être. Dans de telles situations vous devez vous abstenir de rapports sexuels ou un autre complémentaire contraceptif sans hormones utiliser, par exemple un préservatif ou autre contraceptif barrière. Ne pas utiliser la méthode du calendrier- ou méthode de température. Ces méthodes peuvent être peu fiables parce que la pilule influence a sur la température corporelle normale changements de la muqueuse utérine et le pendant le de cycle menstruel.

Marvelon offre net comme d'autres hormonaux contraceptifs aucune protection contre une hiv-infection (sida) ou d'autres sexuellement transmissibles affections (IST).

Quand pouvez-vous ce produit ne pas utiliser?

Vous ne devez pas ce médicament ne pas utiliser si vous avez l'un des ci-dessous mentionnées affections avez. Si vous un des ci-dessous mentionnées affections avez, informez cela alors à votre médecin. Votre médecin va avec vous discuter quelle autre forme de contraception plus appropriée est pour vous. Voir aussi la section 'Quand devez vous prendre prudemment être avec ce médicament?'.

- Vous avez un caillot sanguin dans un vaisseau sanguin des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP), le poumons (embolie pulmonaire) ou un autre organe, ou vous avez cela dans le passé eu.
- Vous savez que vous un trouble a de votre coagulation sanguine – par exemple protéine C-déficiencia, protéine S- déficiencia, antithrombine-III-déficiencia, facteur V-Leiden ou anticorps contre phospholipides.
- U devez être opéré ou vous êtes pendant longue durée pas sur pied (voir rubrique 'Caillots sanguins (thrombose)').
- U a déjà un infarctus ou un AVC eu.
- Vous avez angine de poitrine (une affection qui provoque douleur intense dans la poitrine en un premier symptôme de un crise cardiaque peut être) ou un 'accident ischémique transitoire' (AIT : symptômes transitoires d' un AVC) ou vous a ceci jamais eu.
- Vous avez une des suivantes maladies, qui risque de un caillot sanguin dans vos artères peuvent augmenter:
 - grave diabète avec lésion de vaisseaux sanguins
 - sévère augmentation pression artérielle
 - un sérieux taux élevé de votre sang sang (cholestérol de triglycérides)
 - une affection qui hyperhomocystéinémie est appelée.

- Vous avez un type de migraine qui 'migraine avec aura' est appelée (ou a ceci jamais eu).
- Vous avez une pancréatite (une inflammation du pancréas) ou avez ceci eu, combiné avec un élevé teneur en graisses dans votre sang.
- Vous avez jaunisse (jaunissement de la peau ou des yeux) ou une grave maladie du foie maladie hépatique de a ce eu, et le résultats des tests de la fonction hépatique sont pas encore pas normaux.
- Vous avez une forme de cancer ou a ceci eu qui sensible peut être aux hormones sexuelles (comme cancer du sein ou cancer des organes génitaux).
- Vous a cancer du foie ou a eu cela.
- Vous avez des saignements inhabituels du vagin dont la cause n'est pas établie.
- U avez un épaissement anormal de l' endomètre.
- Vous êtes allergique à un des composants de ce médicament. Ces composants pouvez vous trouver dans rubrique 6 de cette notice.

Si une des situations mentionnées se produit pendant que vous utilisez déjà Marvelon , alors devez doit u immédiatement arrêter avec l' utilisation et contacter prendre contact avec votre médecin. Utilisez en attendant un autre ,non -- hormonale méthode de contraception. Voir aussi 'Remarques générales' au début de la section 2.

N'utilisez Marvelon pas si vous avez l'hépatite C a en pour cela médicaments avec ombitasvirparitaprevirritonavir et dasabuvir ou glecaprevirpibrentasvirutilisé (voir aussi rubrique 2 ' Utilisé Utilisé u encore autres médicaments?').

Quand devez u extra prudent être avec ce médicament?

Quand devez u contacter prendre avec votre médecin?

Appelez d'urgence médicale aide si

- vous remarquez d'éventuels symptômes ou signes d' un caillot sanguin , qui peuvent signifier que cela vous souffrez de un caillot sanguin dans votre jambe (c.-à-d.. thrombose veineuse profonde), un caillot sanguin dans votre poumon (c.-à-d. embolie pulmonaire), un infarctus ou un AVC (voir ci-dessous la section 'Caillots sanguins (thrombose)').

Consultez pour un description des symptômes ou manifestations de ces graves effets secondaires vers 'Comment reconnaître un caillot sanguin ?'. Dites

le à votre votre médecin, si un des suivantes situations s'applique à vous . Si la affection apparaît ou s'aggrave , pendant que vous utilisez Marvelon , vous devez, doit vous ce aussi à votre médecin dire.

- Vous fumez.
- Vous avez diabète.
- Vous êtes très en surpoids.
- Vous avez une hypertension artérielle.
- Vous avez une affection des valvules cardiaques ou une certaine arythmie.

- Vous avez une inflammation dans les veines juste sous la peau (thrombophlébite superficielle).
 - Vous avez des varices.
 - Quelqu'un dans votre famille proche a déjà thrombose, un infarctus ou un AVC eu.
 - Vous avez des migraines.
 - Vous avez épilepsie.
 - Vous avez augmenté taux de lipides dans votre sang (hypertriglycémie), ou cette affection se produit dans votre famille ou est survenue dans votre famille . survenu. Hypertriglycémie est en lien avec un un risque élevé de pancréatite (une inflammation du pancréas) avoir ..
 - devez être devenir opéré ou vous êtes pendant longue période pas sur pied (voir 'Caillots sanguins (thrombose)' dans rubrique 2).
 - Si vous récemment accouché êtes, avez u un risque élevé de développer des caillots sanguins. Demandez à votre médecin comment rapidement après l' accouchement vous pouvez commencer à utilisation de Marvelon.
 - Vous avez quelqu'un dans votre famille proche qui a eu un cancer du sein a eu.
 - Vous avez une affection du foie ou de la vésicule biliaire.
 - U a la maladie de Crohn ou colite ulcéreuse (maladie intestinale).
 - U a lupus érythémateux systémique (LES - une maladie qui votre système système immunitaire affecte).
 - Vous avez hémolytique-urémique syndrome (SHU - un trouble de la coagulation sanguine qui insuffisance rénale provoque).
 - Vous avez drépanocytose (un héréditaire maladie des globules rouges).
 - Vous avez un trouble qui pour la première fois ou s'est aggravé pendant une grossesse de chez antérieure utilisation des hormones sexuelles, par exemple perte auditive, porphyrie (une maladie du sang), herpès gestationis (éruption cutanée avec vésicules pendant le grossesse) ou chorée de Sydenham (une affection neurologique où mouvements soudains du corps se produisent).
-
- Vous présentez symptômes d'angio-œdème comme gonflement de votre visage, langue et/ou gorge et/ou difficultés à la déglutition ou urticaire éventuellement avec des problèmes respiratoires. Consultez dans ce cas contact direct avec votre médecin. Produits avec œstrogènes peuvent les symptômes de héréditaire et acquis angio-œdème provoquer ou aggraver.
 - Vous a chloasma ou vous a jamais chloasma eu (jaune-brun taches pigmentaires, appelées 'taches de grossesse', surtout sur le visage); si ce le cas est, est-il prudent de l'exposition directe exposition la lumière du soleil ou aux ultraviolets lumière à éviter.

La pilule et caillots sanguins (thrombose)

CLOUS DE SANG (THROMBOSE)

Si vous un combiné hormonal contraceptif comme Marvelon utilisez, avez vous un risque plus élevé de un caillot de sang avoir recevoir alors si vous aucun combiné hormonal contraceptif

utilisé. Dans rarement cas peut un caillot sanguin un vaisseau sanguin bloquer et en graves problèmes causer. Caillots sanguins peuvent se former

- dans veines (ceci est 'thrombose veineuse', 'thrombo-embolie veineuse' ou TEV appelé)
- dans artères (ceci est 'thrombose artérielle', 'embolie thrombo-artérielle' ou ATE appelé).

On ne récupère pas toujours de caillots sanguins. Dans rarement rencontrés cas peuvent il prolongés graves effets être, ou dans très rarement rencontrés cas peuvent caillots sanguins mortels sont.

Il est important que vous sachiez que le risque global de un caillot sanguin avec Marvelon faible est.

COMMENT RECONNAÎTRE UN CAILLOT SANGUIN ?

Contactez urgence médicale aide in si vous un des suivants symptômes ou signes remarquez.

Avez-vous vous un de ces symptômes de symptômes ?	Où pouvez vous souffrir de ?
<p>gonflement d'une jambe ou le long d'une veine dans une jambe ou pied, surtout si cela s'accompagne de : pied, surtout si cela s'accompagne de :</p> <ul style="list-style-type: none"> douleur ou sensibilité de la jambe, que vous pouvez ressentir uniquement en position debout ou en marchant température élevée dans la jambe affectée changement de couleur de la peau de le jambe, par exemple devenir pâle, rouge ou bleue 	<p>Profonde veineuse thrombose</p>
<p>soudain inexplicquée détresse respiratoire ou respiration rapide toux soudaine sans cause évidente, où vous pouvez cracher du sang vive douleur dans la poitrine, qui peut s'aggraver lorsque vous respirez profondément sensation de légèreté dans la tête ou vertiges vertige rapide ou irrégulier rythme cardiaque sévère douleur dans votre estomac</p> <p>Si vous hésitez, contactez alors un médecin, car un médecin, car certains de ces symptômes, tels que la toux ou l'essoufflement, peuvent être à tort être considérés comme une affection plus légère, comme une infection respiratoire (par exemple un rhume).</p>	<p>Embolie pulmonaire</p>
<p>Les symptômes apparaissent généralement dans un œil : immédiatement perte de la vision, ou vision floue indolore, qui peut se développer en perte de la trombose veineuse dans la rétine</p>	<p>(caillot de sang dans la le oeil)</p>

Avez-vous l'un de ces symptômes ou signes?	De quoi pouvez-vous souffrir?
vision	
douleur, inconfort, pression ou sensation de lourdeur, d'oppression ou de plénitude dans la poitrine, le bras ou sous le sternum sensation de plénitude, indigestion ou essoufflement inconfort dans le haut du corps irradiant vers le dos, la mâchoire, la gorge, le bras et l'estomac transpiration, nausée, vomissement ou vertige faiblesse extrême, anxiété ou essoufflement battement de cœur rapide ou irrégulier	Crise cardiaque
faiblesse soudaine ou engourdissement du visage, du bras ou de la jambe, surtout d'un côté du corps confusion soudaine, difficulté à parler ou à comprendre difficulté soudaine à voir d'un œil ou des deux yeux difficulté soudaine à marcher, vertige, perte d'équilibre ou de coordination mal de tête soudain, sévère ou prolongé sans cause connue diminution de la conscience ou évanouissement avec ou sans crise épileptique Les symptômes d'un AVC peuvent parfois être de courte durée et se rétablir presque immédiatement et complètement. Cependant, vous devez toujours demander une aide médicale d'urgence, car vous pourriez risquer d'avoir un autre AVC.	Accident vasculaire cérébral
gonflement et légère coloration bleue d'un bras ou d'une jambe douleur sévère dans votre abdomen (abdomen aigu)	Caillot de sang qui obstrue d'autres vaisseaux sanguins

CAILLOTS DE SANG DANS UNE VEINE

Que peut-il se passer si un caillot de sang est formé dans une veine?

- L'utilisation de combinés hormonaux contraceptifs est associée à un risque accru de caillots sanguins dans une veine (thrombose veineuse). Ceux-ci sont liés à des effets secondaires qui surviennent cependant rarement. La plupart du temps, ils se manifestent dans la première année qu'un combiné hormonal contraceptif est utilisé.
- Si un caillot sanguin est formé dans une veine dans une jambe ou pied, peut cela une thrombose veineuse profonde (TVP) provoquer.
- Si un caillot sanguin depuis la jambe est transporté et dans le poumon se retrouve, peut cela un embolie pulmonaire provoquer.

- Cela se très rarement pour que un caillot de sang est formé dans une veine dans un autre organe, comme l' œil (veineux thrombose dans le rétine).

Quand est le risque de un caillot sanguin dans une veine le plus élevé?

Le risque de un caillot sanguin dans une veine d'obtenir est le plus élevé au cours de la première année que une femme pour la première fois un combiné hormonal contraceptif utilisé. Le risque peut également être augmenté si vous après une interruption de 4 semaines ou plus recommencez à prendre le avec le utilisation de un combiné hormonal contraceptif (le même produit, ou un autre produit que précédemment).

Après la première année le risque risque plus petit, mais reste quelque plus élevé que lorsque vous n'utilisez pas de contraceptif hormonal combiné.

Si vous arrêtez Marvelon, votre risque de sur un caillot sanguin dans quelques semaines de nouveau normal.

Comment élevé est le risque de un caillot sanguin?

Le risque dépend de de votre naturel risque de TEV, et du type combiné hormonal contraceptif que vous utilisez.

Le risque global de un caillot sanguin dans un jambe ou poumon (thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire) avec Marvelon est faible.

- Sur chaque 10.000 femmes qui ne prennent aucun hormonal combiné contraceptif utiliser et ne pas être enceinte ,obtenir il environ 2 sur une période de un an un caillot sanguin caillot sanguin.
- De chaque 10.000 femmes qui un combiné hormonal contraceptif utilisent qui lévonorgestrel, noréthistérone ou norgestimate contient, reçoivent environ 5-7 sur 5-7 ans un an un caillot sanguin.
- De chaque 10.000 femmes qui un contraceptif hormonal combiné utilisent qui contient désogestrel, comme Marvelon, obtenir environ environ entre les 9 et 12 dans une année un caillot sanguin.
- Le risque de un caillot sanguin d' obtenir est dépendant de votre personnel médical antécédents (voir les sections 'Facteurs qui votre risque de un caillot sanguin dans un veineartère augmenter' ci-dessous).

	Risque de dans un an d'avoir un caillot sanguin
Femmes qui ne prennent pas de contraceptif hormonal combiné pilule/patch/anneau et ne sont pas enceintes	Environ 2 de chaque 10.000 femmes
Femmes qui utilisent une pilule combinée contenant lévonorgestrel, noréthistérone ou norgestimate contient Environ	5-7 5-7 chaque 10.000 femmes femmes
Femmes qui Marvelon utilisent	Environ 9-12 de chaque 10.000 femmes

Facteurs qui votre risque de un caillot sanguin dans une veine augmenter

Le risque de un caillot sanguin avec Marvelon est faible, mais il existe certaines circonstances qui risque augmentent. Votre risque est plus élevé:

- si vous sévère obésité avez (IMC [indice de masse corporelle] supérieur à 30 kg/m²)

- si un de vos proches membres de la famille à jeune âge (par exemple avant le 50e année) un caillot sanguin a eu dans un jambe, poumon ou autre organe. Dans ce cas pouvez vous un héréditaire trouble de la coagulation avoir.
- si vous un opération devez subir, ou si vous longue période d'immobilité en raison d'une blessure ou de maladie, ou si votre jambe dans le plâtre est. Il peut être nécessaire de avant une chirurgie, ou lorsque vous êtes moins mobile, quelques semaines à arrêter avec l' utilisation de Marvelon. Si vous devez arrêter avec Marvelon, demandez alors votre médecin quand vous pouvez recommencer avec l' utilisation utilisation.
- si vous plus âgé devenez (en particulier particulièrement au-dessus environ 35 ans)
- si vous avez dernières semaines accouché êtes. Le

Le risque de un caillot sanguin augmente à mesure que il plus de ces conditions s'appliquent à vous application sont.

Un voyage en avion (plus long que 4 heure) peut votre risque de un caillot sanguin temporairement augmenter, surtout si il y a quelques autres des circonstances mentionnées sur vous de applicable sont.

Il est important que vous le votre médecin informe si un ou plusieurs de ces conditions sur vous de applicable sont, même si vous en doutez. Votre médecin peut décider que vous devez arrêter l' utilisation de Marvelon.

Si un de la ci-dessus mentionnées conditions change pendant que vous utilisez Marvelon, par exemple si un proche parent a un caillot sanguin (thrombose) obtient sans connue cause, ou si vous beaucoup en poids prenez, dites cela alors à votre médecin.

CLOT DE SANG DANS UNE ARTÈRE

Que peut il se produire si il un caillot sanguin est formé dans une artère?

Tout comme un caillot sanguin dans une veine, peut un caillot sanguin dans une artère graves problèmes causer. Il peut par exemple un infarctus ou un AVC provoquer.

Facteurs qui votre risque de un caillot sanguin dans une artère augmentent

Il est important que vous sachiez que le risque de un crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral par l' utilisation de Marvelon très faible est, mais plus grand peut devenir:

- avec l'âge croissant (au-dessus'd'environ environ 35 ans)
- si vous fumez. Si vous un combiné hormonal contraceptif comme Marvelon utilisez, il est recommandé que vous arrêtiez avec fumer. Si vous ne pouvez arrêter de fumer et plus de 35 ans, peut votre médecin vous conseiller de un autre type contraceptif à utiliser.
- si vous surpoids avez
- si vous haute pression artérielle avez
- si un membre de votre proche famille sur jeune âge (avant le 50e année) un infarctus ou AVC a eu. Dans ce cas pouvez vous aussi un risque élevé avoir de un crise cardiaque ou AVC avoir obtenir.

- si vous, ou un membre de votre proche famille, un élevé taux de lipides dans le sang a (cholestérol ou triglycérides)
- si vous souffrez de migraine ,surtout migraine avec aura si
- vous un un maladie cardiaque a (maladie des valves cardiaques, ou un trouble du rythme cardiaque qui fibrillation auriculaire est appelé)
- si vous diabète (diabète) avez.

Si plus alors un de ces conditions sur vous de applicable est, ou si un de ces affections particulièrement grave est, peut le risque de le obtenir de un caillot sanguin même encore plus élevé être.

Si un des ci-dessus mentionnées conditions change pendant que vous utilisez Marvelon utilisez, par exemple si vous commencez à fumer ou si un proche parent a un caillot sanguin (thrombose) sans cause connue cause, ou si vous beaucoup en poids prenez, dites cela alors à votre médecin.

La pilule et cancer

Chez femmes qui utilisent pilule utilisent est un peu plus souvent cancer du sein diagnostiqué que chez non-utilisatrices de la pilule du même âge. Dix ans après l' arrêt avec le pilule il n'y a aucune différence plus. C'est pas connu si cette différence est causée par la pilule. Il peut aussi venir parce que utilisatrices de pilule plus approfondi et plus souvent sont examinées, afin que le cancer du sein plus tôt est détecté.

Dans rares cas sont chez utilisatrices de pilules bénignes tumeurs hépatiques trouvé et dans encore plus rares cas malignes tumeurs hépatiques. Parfois ont ces tumeurs conduit à une menaçant la vie interne saignement. Si vous soudainement souffrez de douleurs intenses abdominales, alors vous devez immédiatement contacter votre médecin . Chronique médecin.

Chronique infection avec le humain papillomavirus est le principal facteur de risque pour le développement de cancer du col de l'utérus. Chez les femmes qui prennent la pilule pendant une période prolongée utilisent peut de risque de contracter un cancer du col de l'utérus légèrement augmenté être. C'est cependant pas clair si cela est causé par la pilule, ou que le à faire a avec comportement sexuel et autres facteurs (commemeilleur contrôle du col de l'utérus).Troubles psychiques troubles

Certaines femmes qui utilisent des contraceptifs hormonaux y compris Marvelon ontsignalé , avoir fait état de dépression ou. mélancolie . La dépression sont et peut parfois à idées suicidaires conduire. Si vous des sautes d'humeur et symptômes de dépression ressentez, contactez rapidement possible votre médecin médecin pour plus médical conseil.

Utilisez vous encore d'autres médicaments?

Utilisez vous en plus de Marvelon encore d'autres médicaments ou remèdes à base de plantes, avez vous cela récemment fait ou allez vous le peut-être bientôt faire ?Informez cela alors votre médecin, médecin, pharmacien ou sage-femme. Cela s'applique également aux produits que vous sans ordonnance pouvez obtenir. Informez également chaque autre médecin ou arts of dentiste (ou pharmacien) qui vous un autre médicament prescrit que vous Marvelon utilisez. Ils peuvent vous alors informer si c'est nécessaire de un extra non hormonal contraceptif (par exemple un préservatif) utiliser et aussi combien de temps vous cela alors devez utiliser ou que cela le utilisation de un autre médicament que vous avez besoin ,doit changer ..

Marvelon pas si vous avez l'hépatite C hépatite C a en pour cela médicaments avec ombitasvirparitaprevirritonavir et dasabuvir ou glecaprevirpibrentasvir utilisé, car cela une augmentation de un enzyme hépatique (ALAT, un test sanguin de la fonction hépatique) peut provoquer. Votre médecin prescrira un autre contraceptif avant que vous commenciez à cette traitement. Marvelon peut environ 2 semaines après fin de ce traitement à nouveau être recommencé. Voir section 2 'Quand pouvez-vous ce médicament pas utiliser?').

Certains médicaments

- peuvent une influence avoir sur les niveaux sanguins de Marvelon
- peuvent Marvelon moins efficace rendre pour grossesse à prévenir
- peuvent inattendues saignements provoquer.

Ceux-ci incluent sous autres médicaments pour le traitement de :

- épilepsie (par exemple primidone, phénytoïne, phénobarbital, carbamazépine, oxcarbazépine, topiramate, felbamate)
- tuberculose (par exemple rifampicine, rifabutine)
- infection par le VIH (par exemple ritonavir, nelfinavir, nevirapine, efavirenz)
- hépatite C-infection virale (par exemple bocéprévir, télaprévir)
- autres infections (par exemple griséofulvine)
- haute pression artérielle dans les vaisseaux sanguins des poumons (bosentan)
- dépressive humeur (le remède à base de plantes millepertuis).

Si vous médicaments ou remèdes à base de plantes utilisez qui rendent Marvelon moins efficace peuvent rendre, devez vous aussi un méthode de contraception barrière utiliser. Parce que l'effet de un autre médicament sur Marvelon jusqu'à 28 jours après l'arrêt de ce médicament peut persister, doit vous qui utilisez une méthode barrière contraceptive pendant que temps continuer à utiliser.

Marvelon peut l'efficacité d'autres médicaments influencer, par exemple:

- médicaments qui ciclosporine contiennent
- l'anti-épileptique médicament lamotrigine (cela peut entraîner à une augmentation du nombre de crises).

Examens de laboratoire

Si un test sanguin chez u devez être fait, dites alors votre médecin ou le personnel de laboratoire que vous utilisez la pilule .. contraceptifs hormonaux peuvent en effet le de résultats de certains examens influencer.

Grossesse et allaitement

Grossesse

Si vous êtes enceinte , ou pensez que vous pourriez être enceinte être ne devez pas utiliser Marvelon pas utiliser. Si vous soupçonnez que vous êtes enceinte alors que vous utilisez Marvelon , contactez rapidementvotre médecin. Allaitement Le votre médecin.

Allaitement

Le utilisation de Marvelon est en général pas recommandée tant que une femme allaite . Si vous prenez lapilule quand même voulez utiliser pendant que vous encore allaitement donne, pouvez vous le mieux contact prendre avec votre médecin.

Aptitude à conduire et l' utilisation de machines

Il n'y a aucun indication que la capacité de conduire et la capacité à utiliser des machines peuvent être affectées ..

contient du lactose Si

vous médecin vous a informé dit que vous certains sucres ne tolérez, contactez alors votre médecin avant de prendre ce médicament.

Enfants et adolescents jusqu'à 18 ans

Il y a aucune clinique information sur l' efficacité et sécurité chez les adolescents de moins de 18 ans.

Quand devez-vous consulter un médecin pendant l' utilisation de ce médicament?

3. Comment prenez -vous ce médicament ?

Prenez ce médicament toujours exactement comme votre votre médecin ou pharmacien vous que a dit .. vous sur le bon usage ? Contactez alors votre médecin ou pharmacien ..

et comment prendre prend u de comprimés dans?

La plaquette contient 21 comprimés. Pour chaque comprimé est indiqué sur quel jour celui-ci doit être pris. Prenez le comprimés chaque jour environ à la même heure dans, si nécessaire avec un peu d'eau. Suivez la direction de la flèche qui est indiquée sur la bande jusqu'à ce que vous ayez pris les 21 comprimés comprimés comprimés pris. Ensuite prenez 7 jours pas de comprimé. Au cours de ces 7 jours une hémorragie doit commencer (le soi-disant saignement de privation).). Cette commence généralement le 2ème ou 3ème jour après le dernier comprimé de Marvelon. Commencez le 8ème jour avec la prochaine plaquette, indépendamment si le saignement est déjà terminé ou non. Dit signifie que vous continuez à le même jour de la semaine avec un suivant plaquette commencez, et aussi que le saignement de privation chaque mois environ sur les mêmes jours tombe.

Quand à commencer avec la première plaquette

Vous n'avez pas le mois dernier utilisé de pilule contraceptive ..

Commencez avec Marvelon le premier jour de la cycle (le premier jour de votre menstruation).

Marvelon fonctionne dans ce cas immédiatement et vous n'avez pas besoin aucun extra contraceptif à utiliser.

Vous pouvez aussi le jour 2-5 du cycle commencer mais alors devez vous dans la première 7 jours bien un extra contraceptif (par exemple un préservatif) utiliser.

Passage d'une autre pilule combinée pilule combinée anneau vaginal ou patch contraceptif Vous pouvez avec Marvelon commencer le jour après que vous ayez pris le dernier comprimé de votre précédente pilule avez pris (donc sans pause). S'il y a chez votre précédente pilule aussi non-actifs comprimés dans la plaquette se trouvent, doit vous immédiatement continuer après le dernier actif comprimé de votre précédente pil (si vous ne savez pas lequel c'est, demandez alors à votre médecin ou pharmacien). Vous pouvez aussi commencer plus tard, mais jamais plus tard que le jour après la fin de la période sans comprimé période de votre précédente pilule (ou après le dernier comprimé non actif de votre précédente pilule).

Si vous changez de un anneau vaginal ou patch contraceptif vous pouvez commencer avec Marvelon le jour du retrait de l'anneau ou du dernier patch . Vous pouvez également plus tard commencer, mais vous devez à son dernier sept jours après le retrait de l'anneau ou le dernier patch avec Marvelon commencer.

Quand vous le comprimé, patch ou anneau complètement selon le prescriptions a utilisé et vous êtes sûr de que vous n'êtes pas enceinte , pouvez vous de plus arrêter de prendre le comprimé ou l'anneau ou le patch retirer le chaque jour de votre actuel cycle et immédiatement passer à la utilisation de Marvelon.

Si vous ces instructions suivez il n'est pas nécessaire d'utiliser un contraceptif (par exemple un préservatif) d' utiliser.

Changement de une pilule progestative (minipilule)

Vous pouvez passer de la une à l' autre jour passer à Marvelon, mais vous devez la première 7 jours oui un extra contraceptif (par exemple un préservatif) utiliser.

Passage de la piqûre contraceptive, un implant ou un contenant des hormones stérilet

Commencez avec Marvelon quand vous autrement la prochaine injection devriez recevoir ou le jour où l' implant ou contenant des hormones stérilet est retiré. Vous devez le premiers 7 jours cependant bien un moyen contraceptif (par exemple un préservatif) utiliser.

Après un accouchement

Si vous venez d'accoucher , votre médecin vous recommandera probablement d' attendre jusqu'à vos premières règles spontanées , mais parfois parfois est-il possible plus tôt de commencer. Suivez le conseil de votre médecin. Cela s'applique également pour le cas où vous allaitez donne en de pil souhaitez utiliser.

Après une fausse couche ou avortement

Suivez le conseil de votre médecin.

Avez -vous trop pris de ce médicament pris?

Il n'existe aucun signalement de graves effets nocifs de la prise de beaucoup Marvelon comprimés en même temps. Si vous avez un certain nombre de comprimés en même temps pris , alors vous pouvez avoir éventuellement des problèmes avec des nausées , vomissements ou vomir

de vaginal saignement. Si vous découvrez que un enfant Marvelon a ingéré, demandez alors votre médecin pour conseil.

Que faire ...

...chez le oublié de comprimés

Si vous **moins de 12 heures en retard** êtes avec la prise d'un un comprimé puis est le effet du comprimé n'est pas diminué. Prenez ce comprimé dès que vous y pensez et prenez les comprimés suivants à l'heure habituelle.

Si vous **avez plus de 12 heures de retard** pour prendre un comprimé, l'effet du comprimé peut être diminué. Plus vous oubliez de comprimés consécutifs, plus le risque que l'effet du comprimé soit diminué est. La probabilité de protection insuffisante contre grossesse est le plus grand si des comprimés sont sautés au début ou à la fin de la plaquette. Par conséquent, les règles suivantes s'appliquent (voir également le schéma) :

de 1 1 oublié dans une plaquette Contactez

le avec sur avec votre médecin.

1 comprimé oublié dans semaine 1

Prenez le comprimé oublié dès que vous y pensez, même si cela signifie que vous devez prendre deux comprimés au même moment devez prendre. Prenez ensuite les comprimés de nouveau à l'heure habituelle dans, mais vous vous devez également utiliser des méthodes contraceptives supplémentaires pendant 7 jours. Si vous avez eu des rapports sexuels la semaine précédant l'oubli, vous devez tenir compte d'un risque de grossesse. Dans ce cas, contactez immédiatement votre médecin.

1 comprimé oublié dans semaine 2

Prenez le comprimé oublié dès que vous vous en souvenez, même si cela signifie que vous devez prendre deux comprimés au même moment devez prendre. Prenez ensuite les comprimés de nouveau à la habituelle temps in. Le L'efficacité de la pilule n'est pas réduite, vous n'avez pas besoin d'utiliser des contraceptifs supplémentaires.

1 comprimé oublié dans semaine 3

Vous pouvez choisir parmi 2 options sans supplémentaire contraceptifs utiliser devez utiliser.

1. Prenez le comprimé oublié dès que vous y pensez, même si cela signifie que vous devez prendre deux comprimés en même temps. Continuez à prendre les comprimés à l'heure habituelle. **De plus, sautez la période sans comprimé** et commencez immédiatement la plaquette suivante. Très probablement vous aurez vous seulement à la fin de la deuxième plaquette un véritable hémorragie de privation mais vous pouvez avoir des saignements ou des saignements intermenstruels pendant la deuxième plaquette.
2. Vous pouvez également arrêter la plaquette concernée. Vous respectez une période sans comprimé de 7 jours ou moins à (**comptez toujours le jour où vous avez oublié le comprimé**). **Ensuite** vous continuez va u simplement continuez avec la plaquette suivante.

Si vous suivez cette méthode, vous pouvez toujours recommencer une nouvelle plaquette le jour habituel de début.

Si vous avez oublié des comprimés dans une plaquette et que vous n'avez pas de saignement pendant la prochaine période normale sans comprimé, cela peut signifier que vous êtes enceinte. Vous devez contacter votre médecin avant de continuer avec la plaquette suivante.

... en cas de troubles gastriques et/ou intestinaux (par exemple vomissements, diarrhée sévère)

Si vous vomissez ou avez une diarrhée sévère, il est possible que les substances actives ne soient pas complètement absorbées par le corps. Si vous vomissez dans les 3-4 heures suivant la prise d'un comprimé, cette situation est donc comparable à celle d'un oubli de comprimé. Suivez donc en cas de vomissements le même conseil que celui indiqué ci-dessus pour l'oubli de comprimés. Si vous avez une diarrhée sévère, consultez votre médecin.

... si vous souhaitez retarder vos règles

Il est possible de retarder vos règles, bien que cela ne soit pas recommandé. Vous pouvez exceptionnellement retarder vos règles en continuant avec une nouvelle plaquette de Marvelon sans période sans comprimé. Vous pouvez continuer avec cette plaquette jusqu'à ce que tous les comprimés soient pris ou arrêter plus tôt si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir des saignements de percée ou des spottings pendant l'utilisation de cette deuxième plaquette. Après la période habituelle sans comprimé de 7 jours, vous recommencez avec la plaquette suivante.

... si vous souhaitez décaler le jour de début de vos règles

Si vous prenez vos comprimés selon les instructions, vos règles commenceront toujours à peu près le même jour. Si vous souhaitez changer ce jour, vous pouvez le faire en raccourcissant la période sans comprimé entre deux plaquettes (mais jamais en l'allongeant). Par exemple, si vos règles commencent normalement le vendredi et que vous souhaitez les décaler au mardi (3 jours plus tôt), vous devez maintenant commencer la nouvelle plaquette 3 jours plus tôt que d'habitude. Si vous raccourcissez beaucoup la période sans comprimé (par exemple à 3 jours ou moins), il se peut que vous n'ayez pas de saignement pendant cette période sans comprimé. Vous pouvez alors avoir des saignements de percée ou des spottings pendant la plaquette suivante.

... en cas de saignement inattendu

Avec toutes les pilules contraceptives, des saignements inattendus peuvent survenir au cours des premiers mois (spotting ou saignements de percée). Vous pourriez alors avoir besoin de protections hygiéniques. Continuez en tout cas à prendre vos comprimés normalement. Les saignements irréguliers cessent généralement lorsque votre corps s'habitue à la pilule concernée (après environ 3 plaquettes). Si cela dure plus longtemps, s'aggrave ou recommence, vous devez contacter votre médecin.

... si le saignement attendu ne se produit pas

Si vous avez pris tous les comprimés correctement, n'avez pas eu de vomissements et/ou de diarrhée, et n'avez pas utilisé d'autres médicaments, il est très peu probable que vous soyez enceinte. Vous pouvez alors continuer avec la plaquette suivante en toute tranquillité.

Cependant, si le saignement attendu ne se produit pas deux fois de suite, vous pourriez être enceinte. Contactez immédiatement votre médecin. Ne continuez pas avec la plaquette suivante de Marvelon avant que votre médecin n'ait confirmé que vous n'êtes pas enceinte.

Si vous arrêtez de prendre le prendre de ce médicament

Vous pouvez avec Marvelon arrêter quand vous voulez. Si vous ne enceinte voulez devenir, demandez à votre médecin pour conseil avec concernant à d'autres méthodes fiables de contraception.

Si vous arrêtez parce que vous voulez être enceinte, il est généralement recommandé recommandé de attendre jusqu'à ce que vous ayez une menstruation naturelle avant que vous essayiez de tomber enceinte . Vous pouvez pouvez que plus facile calculer quand l' accouchement aura lieu.

4. Effets indésirables

Comme tout médicament peut également ce médicament avoir des effets indésirables. Pas tout le monde en souffre . faire. vous ressentez un effet secondaire, surtout si celui-ci est grave , de nature lang persiste, ou apparaît il un changement dans votre état de santé dont vous pensez que cela peut être causé par devenir votre votre arts.

Alle femmes qui combinés hormonaux contraceptifs utilisent ont un risque plus élevé de caillots sanguins dans les veines (thrombo-embolie veineuse [VTE]) ou caillots sanguins dans les artères (artérielle thrombo- embolie [ATE]). Voir pour plus d'informations sur les différents risques de l' utilisation de combinés hormonale contraceptifs rubrique 2 'Quand ne devez-vous ce médicament pas utiliser ou devez-vous être particulièrement prudent avec être?'

Contactez immédiatement votre médecin si vous symptômes d'angio-œdème présentez comme gonflement de votre visage, langue etou gorge etou difficultés à avaler avaler de urticaire possible avec problèmes respiratoires (voir rubrique 2 'Quand devez vous faire attention avec ce médicament?').

Comme chez toutes pilules combinées, peut votre schéma menstruel changer, surtout pendant les premiers mois de l' utilisation. Cette différence peut résider dans comment souvent vous un saignement obtenez (absence de la saignement, moins souvent, plus souvent ou continu), comment sévère le saignement est, ou combien de temps le saignement dure.

Souvent (se produisent chez moins de 1 sur 10 femmes)humeurs dépressives

- dépressif changements d'humeurmaux de tête nausées
- ,
- douleurs abdominales, douleur abdominale
- sensibles seins, douloureux seins
- prise de poids.

Parfois (se produisent chez moins de 1 sur 100 femmes)rétention d'eau

- moins envie de
- faire l'amour migraine
- vomir
- vomissements, diarrhée
- éruption cutanée, urticaire (urticaire)
- augmentation des seins.

Rarement (surviennent chez moins de 1 sur 1000 femmes))

- nocif caillots sanguins dans une veine ou artère, par exemple:
 - o dans une jambe ou pied (par exemple thrombose veineuse profonde)
 - o dans un poumon (par exemple embolie pulmonaire)
 - o crise cardiaque
 - o AVC
 - o 'petit AVC' ou temporaire symptômes comme dans un AVC, connu si AIT (accident ischémique transitoire)
 - o caillots sanguins dans le foie, estomacintestins, reins ou yeux. Le risque de un caillot sanguin avoir est plus élevé plus grand si il y a d'autres circonstances qui vous concernent sont qui ce risque augmentent (voir rubrique 2 pour plus d'informations sur les circonstances qui le risque de caillots sanguins augmentent et les symptômes d'un caillot sanguin).
- réactions d'hypersensibilité
- plus envie de faire l'amour
- irritation des yeux lors de l' utilisation de lentilles de contact
- douloureux, nodules bleu-rouge dans la peau (érythème noueux), éruption cutanée avec taches rouges irrégulières ou ulcères (érythème polymorphe)
- écoulement de le mamelon, changement dans l' écoulement de le vagin
- perte de poids.

Le signalement des effets indésirables

Avez-vous des effets indésirables , contactez alorsvotre médecin votre médecin ou pharmacien. Cela s'applique également aux effets secondaires qui ne figurent pas dans cette notice. Vous pouvez signaler les effets secondaires également via le Néerlandais Effets secondaires Centre Lareb, site web : www.lareb.nl. En effets secondaires à signaler, vous aidez nous à obtenir plus d'informations à obtenir sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conservez -vous ce médicament?

Hors de la vue et portée des enfants garder.

Utilisez ce médicament plus jamais après le date limite de péremption. Vous trouvez cela sur la boîte et le blister après EXP. Il indique un mois et une année. La dernier jour de ce mois est la date limite de péremption.

Conserver en dessous de 30 °C. Ne pas au congélateur conserver.

Conserver dans l' emballage blister d'origine ter protection contre la lumière et l'humidité.

Ne prenez ce médicament pas si vous par exemple voyez que les comprimés sont décolorés de émietté sont ou lorsque vous autres signes visibles de détérioration de qualité remarquez. Ne jetez médicaments pas dans l' évier ou de wc et jetez les ne dans la poubelle. Demandez votre pharmacien ce que vous devez faire avec médicaments devez faire que vous ne plus utilisez. Si vous médicaments de la bonne manière éliminez ils sont de manière appropriée correcte détruits et n'entrent pas dans l'environnement . Contenu justifié.

6. Contenu de emballage et autres informations

Quelles substances contiennent dans ce médicament?

- Les substances actives dans ce médicament sont desogestrel désogestrel (150 microgrammes) en éthinylestradiol (30 microgrammes).
- Le autres substances dans ce médicament sont silice colloïdale anhydre, lactose monohydraté, amidon de pomme de terre, povidone, acide stéarique, all-rac-alpha-tocophérol.

Comment est Marvelon présenté et que contient un emballage?

L' emballage contient 1, 3 ou 6 plaquettes thermoformées avec 21 comprimés.

Pas toutes les tailles de conditionnement mentionnées sont sur le marché mises.

Les comprimés sont blancs, ronds, sur les deux côtés convexe et ont un diamètre de 6 mm.

Sur le un côté est 'TR' au-dessus '5' et sur l' autre côté 'Organon' en un à cinq branches étoile.

Titulaire de l' autorisation de mise sur le marché et fabricant N.V. Organon

Kloosterstraat Rue du Cloître 6

Pays-Bas

Tél.: 00800 66550123 (+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

dpoc.benelux@organon.com

Dans le registre inscrit sous: RVG 08859

Cette notice est pour le dernier approuvé en mai 2025