

Pakuotės lapelis: informacija skirta de vartotojui
Marvelon, tabletės
desogestrelis, etinilestradiolis

Svarbūs dalykai kuriuos turite žinoti apie kombinuotus hormoninius kontraceptikus priemonės:

- Šios priemonės sudaro vieną iš labiausiai patikimų grįžtamųjų kontracepcijos metodų, jei tinkamai naudojamos.
- Jos suteikia šiek tiek kažką didesnė rizika susirgti kraujo krešuliu nuo vienu kraujo krešuliu (trombozė) venose ir arterijose ,ypač pirmaisiais metais kai jūs tas u vienas kombinuotas hormoninis kontraceptikas naudojamas arba jei jūs po vieno pertraukos 4 savaitių arba ilgiau vėl pradėdate vartoti naudojimą nuo vienas kombinuotas hormoninis kontraceptikas.
- Atkreipkite dėmesį ir kreipkitės susisieki su savo gydytoją jei manote, kad jūs galbūt turite simptomų nuo vieno kraujo krešulys turi (žr. skyrių 2 'Kraujo krešuliai (trombozė)').

Perskaitykite gerai visą pakuotės lapelį prieš jūs šį vaistą pradėsite vartoti nes stovi svarbi informacija joje jums. Išsaugokite

- šį pakuotės lapelį .. jums jo prireiks vėliau vėl reikės ..
- jums dar dar klausimai? Tada susisieki su jūsų gydytoju arba vaistininku.
- Neduokite šio vaisto ne kitiems žmonėms , nes jis yratik jums paskirtas . Jis gali gali kenksmingas yra kitiems žmonėms, net jei jie turi tuos pačius simptomus kaip jūs.
- Jei jums pasireiškia vienas iš šalutinių poveikių kurie nurodyti skyriuje 4 stovėti? Ar gaunate jūs šalutinį poveikį kuris nėra šiame lapelyje nurodytas ? Susisieki su savogydytoju arba vaistininku . Turinys.

Turinys nuo ši pakuotės lapelis

1. Kas yra Marvelon ir kam yra šis vaistas naudojamas?
2. Kada jūs negalite šio vaisto vartoti arba turite būti ypač atsargūs su yra?
3. Kaip vartoti jūs šį vaistą ?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti jūs šį vaistą?
6. Pakuotės turinys pakuotė en kita informacija

1. Kas yra Marvelon ir kam šis vaistas naudojamas ?Sudėtis

ir tipas tabletė Marvelon yra

kombinuota geriamoji kontraceptinė tabletė kontraceptinės tabletės (de 'kombinuota tabletė'). Kiekviena tabletė turi nedidelį kiekį dviejų skirtingų moteriškų hormonų ,būtent desogestrelis desogestrelis hormonassu progesterono tipo poveikiu progesterono tipo veikimas) ir etinilestradiolis (hormonas hormonas su estrogeniniu poveikiu). Dėl mažo kiekio hormonų ,yra Marvelon laikomas kaip kaip vienas mažos dozės kontraceptikas. Kadangi abu hormonai visose tabletėse juostelėje vienodai kiekis sujungti yra, vadinamas tai vienfazis -- kombinuota tabletė vadinamas.

Kam yra šis vaistas naudojamas?

Marvelon yra naudojamas siekiant nėštumo išvengti ..

yra vartojamas išgertas (be kad tabletės yra pamiršamos) yra tikimybė pastoti labai maža . Kada galite.

2. vaisto nevertoti šis vaistas ne naudoti arba turite būti papildomai atsargūs su būti?

Bendrosios pastabos

Perskaitykite prieš pradėdami naudoti Marvelon vartojimą informaciją apie informaciją apie kraujo krešulius (trombozę) in skyrius 2. Tai yra ypač svarbu kad jūs skaitytumėte kokie yra simptomai yra iš kraujo krešulys kraujo krešulys žr. skyrius 2 'Kraujo krešuliai (trombozė)'.

Šioje pakuotės lapelyje aprašomos kelios situacijos kai turite nutraukti vartojimą tablečių arba naudojimą kontraceptinių tablečių arba kurioje de patikimumas iš tabletės sumažėjęs gali būti. Tokiose situacijose turite turi susilaikyti nuo prisiminti lytinio santykių arba iš naudoti papildomai kontraceptikas be hormonų naudoti, pavyzdžiui prezervatyvą arba kitą barjerinį kontraceptiką . Nenaudokitekalendoriaus - arba temperatūros metodo . kalendorius- arba temperatūros metodus. Šie metodai gali būti nepatikimi nes kadangi de tabletė turi įtakos turi normaliai kūno temperatūros pokyčiams iš ir ir gimdos gleivinei gimdos gleivinė per de menstruacijų ciklas.

Marvelon siūlo kaip ir kitos hormoninės kontraceptinės priemonės nėra apsauga nuo ŽIV -- (AIDS) ar kitų lytiškai plintančių ligų ligos (lytiškai plintančios infekcijos).

Kada negalite šio vaisto vartoti ? Jūs negalite

šio vaisto vartoti jei turite vieną iš šių būklių žemiau nurodytas ligas turite. Jei jūs vieną iš žemiau nurodytų ligų turite, pasakykite tai tada savo gydytojui. Jūsų gydytojas menas aptars su jumis aptarti kuri kita forma kontracepcijos priemonė tinkamesnė yra jums . Žr. taip pat skyrių ' Kadareikia jums papildomai jūs papildomai atsargiai būkite su šiuo vaistu?'

- Jūs turite kraujo krešulį kraujagyslėje iš kraujo indo kojų (giliųjų venų trombozė, DVT), de plaučiai (plaučių embolija) arba kitas organas , arba jūsturite tai praeityje turėjote . Jūs.
- kad jūs turite sutrikimą vienas sutrikimas turi iš jūsų kraujo krešėjimas – pavyzdžiui baltymas C-trūkumas, baltymas S- trūkumas, antitrombinas-III- trūkumas, faktorius V-Leiden arba antikūnai prieš fosfolipidai.
- U turite būti operuotas arba esate ilgą laiką ne ant kojų (žr.skyrių ' Kraujo krešuliaiKraujo krešuliai trombozė)').U
- U turi kada nors širdies priepuolį arba insultą patyrė ..
- turite krūtinės anginą (būklėkuri stiprų skausmą krūtinėje sukelia j krūtinė sukelia en vienas pirmasis simptomas iš vieno širdies priepuolio gali būti) arba vienas 'trumpalaikis išeminis priepuolis' (TIA: praeinantys simptomai iš vieno insulto) arba jūs turėjo tai kada nors turėjo.
- Jūs turite vieną iš šių ligų, kurios riziką dėl kraujo krešulio kraujo krešulys jūsų arterijose gali gali padidinti:
 - sunkus diabetas su pažeidimas kraujagyslių -
 - padidėjęs kraujospūdis -
 - sunkus padidėjęs riebalų kiekis kraujyje jūsų kraujyje kraujyje (cholesterolio trigliceridai)
 - viena liga kuri hiperhomocisteinemia vadinama ..
- turite vieną migrenos tipą kuris 'migrena su aura' vadinamas (arba paminėtas (of turėjo tai kada nors turėjo).

- Jūs turite pankreatitą (uždegimą kasos) arbaturėjote tai turėjo ,kombinuotą su vienu vienas aukštas riebalų kiekis į jūsų kraujyje.
- Jūs turite gelta (geltona odos spalva arba akys) arbasunki kepenų liga kepenų liga iš turi tai turėjo, ir kepenų rezultatai iš kepenų funkcijos tyrimų yra dar ne normalūs.
- Jūs turite vieną formą iš vėžys arba turėjo tai turėjo kuris jautrus gali būti hormonams lyties (kaip krūtis vėžys arba vėžys lytinių organų).
- Jūs turi kepenų vėžį arba turėjo tai buvo.
- Jūs turite neįprastą kraujavimą iš makšties kurio priežastis nenustatyta nėra yra nustatyta.
- U turite nenormalų sustorėjimą gimdos gleivinės . Jūs esate.
- vienai iš šio vaisto medžiagų . Šios medžiagos vaistas. Šis medžiagos galite u rasti in skyriuje 6 iš šio pakuotės lapelio.

Jei viena iš minėtų situacijų atsiranda kol jūs jau vartojate Marvelon , tadaturite privalote u nedelsiant nutraukti su vartojimu ir susisiekti su savo gydytoju. Vartokite tuo tarpu kitą kitą kitą kitą kitą- nehormoninę metodus iš kontracepcijos. Žr. taip pat 'Bendrosios pastabos' pradžioje skyriaus 2. 2.

Marvelon ne jei sergate hepatitu C turi It tam vaistai su ombitasviru/paritapreviru/ritonaviru ir dasabuviru arba glecapreviru/pibrentasviru vartojami (žr. taip pat skyrių 2 'Vartojami u dar kiti vaistai?').

Kada turite būti ypač atsargūs būti su šiuo vaistu?

Kada turite susisiekti su su jūsų gydytojas?

Kreipkitės skubią medicininę pagalbą jei

- jūs pastebite galimus simptomus ar požymius kraujo krešulio atsiradimo , kuriegali reikšti kad tas u sergate nuo vieno kraujo krešulio į jūsų kojoje (t.y.. giliųjų venų trombozė), vieno kraujo krešulio į jūsų plaučiuose (t.y. plaučių embolija), vienas širdies priepuolis arba vienas insultas (žr. žemiau skyrių ' Kraujo krešuliaiKraujo krešuliai trombozė)').Eikite

į už vienas aprašymas apie simptomus arba reiškinius šių šių rimtų šalutinių poveikių į 'Kaip atpažinti jūs kraujo krešulį ?'.Pasakykite

tai savo jūsų gydytojas, jei viena iš šių situacijų jums taikoma yra.

Jeigu liga atsiranda arba paūmėja, kol vartojate Marvelon ,turite turi jūs tai taip pat apie jūsų gydytojui pasakyti.

- Jūs rūkote.
- Jūs turite cukrinį diabetą.
- Jūs esate labai per sunkus.
- Jūs turite padidėjusį kraujospūdį ..
- turite širdies vožtuvų ligą arba tam tikrą širdies ritmo sutrikimą širdies ritmo sutrikimas.

- turite tam tikrą vienas uždegimas į venose ties po de oda (paviršinė tromboflebitas).
- Jūs turite venų varikozę.
- Kažkas į jūsų artimoje šeimoje turi kada nors trombozę, širdies priepuolį arba insultą patyrė ..
- turi migreną. Jūs
- turi epilepsiją ..
- turi turi padidėjęs riebalų kiekis į jūsų kraujyje (hipertrigliceridemija), arba ši liga yra į jūsų šeimoje arba buvo jūsų jūsu šeimoje. Hipertrigliceridemija yra susijusi su didesne rizika susirgti pankreatitu (kasos uždegimu) gauti . Jūsturite būti gauti.
- U turi būti operuotas arba jūs esate per ilgą laiką ne ant kojų (žr. 'Kraujo krešuliai (trombozė)' skyriuje 2).
- Jei jūs neseniai pagimdėte , turite u vienas padidėjusi rizika susirgti gauti nuo kraujo krešulių. Klauskite jūsų gydytojo, kaip greitai po gimdymo gimdymo jūs galite pradėti su naudojimas Marvelon.
- Jūs turite kažkas iš jūsų artimos šeimos kuris krūtis vėžį turėjo ..
- turite kepenų sutrikimą arba tulžies pūslės tulžies pūslė.
- Jūs turite de Krono ligą arba opinį kolitą opinis kolitas (lėtinė žarnyno liga).
- Jūs turite sisteminę raudonąją vilkligę (SLE - liga liga kuri jūsų natūralią imuninę sistema pažeidžia).
- Jūs turite hemolizinis-ureminis sindromas (HUS - sutrikimas kraujo krešėjimo kuris inkstų nepakankamumą sukelia). Jūsturite
- pjautuvinė anemija (pjautuvinė anemija (viena paveldima liga raudonųjų kraujo ląstelių).
- Jūs turite vieną sutrikimą kuris pirmą kartą pasireiškė arba pablogėjo nėštumo metu arba nėštumo metu iš prie anksčiau naudojimas iš lyties hormonų, pavyzdžiui klausos praradimas, porfirija (kraujo sutrikimas), herpesgestationis gestacinis odos bėrimassu pūslėlėmis pūslėlės nėštumo metu de nėštumas) arba Sydenhamo chorėja (viena nervų liga kai staigūs judesiai kūno atsiranda atsiranda).
- Jūs gaunate simptomus angio-edema tokius kaip patinimas iš jūsų veido, liežuvio ir/ar gerklės ir/ar sunkumai ryjant tai maistą arba dilgėlinė galimai su kvėpavimo problemomis. Kreipkitės į šį atvejį tiesiogiai susisieki su jūsų gydytoju. Produktai su estrogenais gali de simptomus nuo paveldimo ir įgyto angio-edema sukelti arba sustiprinti.
- Jūs turi chloasmą arba jūs turi kada nors chloasmą turėjo (geltonai-rudos pigmentinės dėmės, vadinamos 'nėštumo dėmės', ypač ant veido); jei tai tai atvejis yra, yra protinga apie tiesioginį poveikį saulės šviesai arba ultravioletinei šviesai vengti ..

ir kraujo krešuliai (trombozė (trombozė)

KRAUJAGYSLIŲ KREŠULIAI (TROMBOZĖ)

Jei jūs vieną kombinuotą hormoninį kontraceptiką kaip Marvelon vartojate, turite jūs didesnę riziką susirgti vienu kraujo krešuliu susirgti te gauti tada jei jūs ne kombinuotas hormoninis kontraceptikas naudojate. Retais retai pasitaikančiais atvejais gali kraujo krešulys kraujo indą užkimšti ir rimti problemas sukelti. Kraujo krešuliai gali susidaryti

- venose venose (tai vadinama 'venų trombozė', 'venų tromboembolija' arba VTE vadinama)
- in arterijose (tai vadinama 'arterinė trombozė', 'arterinė tromboembolija' arba ATE vadinama).

Žmonės neatsigauna visada visiškai pilnas iš kraujo krešulių. In retai pasitaikančiais atvejais gali būti ilgalaikiai sunkūs poveikiai būti, arba labai retai pasitaikančiais atvejais gali kraujo krešuliai būti mirtini yra.

Svarbu svarbu kad jūs žinotumėte kad bendras bendras rizika dėl kraujo žalingas kraujo krešulys dėl Marvelon maža yra.

KAIP ATPAŽINTI KRAUJO KREŠULĮ?

Kreipkitės skubios medicininės pagalbos in jei jūs vieną iš šių skundų arba simptomų pastebite.

Atsiranda jums vienas iš šių skundų of simptomai?	Kur galite jūs nuo kentėti?
<p>patinimas kojos arba išilgai venos kojoje arba pėdoje, ypač jei tai lydi: į vienas tepalas iš pėda, ypač jei tai lydi:</p> <p>skausmas arba jautrumas kojos kurį galite jausti tik stovint arba vaikstant padidėjusi temperatūra pažeistoje kojoje odos spalvos pokytis ant odos kojos odos koja koja, pavyzdžiui, išblyškusi, raudona arba mėlyna</p>	Giliųjų venų trombozė
<p>staigus nepaaiškinamas dusulys arba greitas kvėpavimas staigus kosulys be aiškios priežasties, kai jūs galite atkosėti kraujo aštrus skausmas krūtinėje, kuris gali sustiprėti kai giliai įkvepiate stiprus lengvumo jausmas galvoje arba galvos svaigimas į tai galva iš galvos svaigimas greitas arba nereguliarus širdies plakimas stiprus skausmas jūsų skrandyje Jei</p> <p>abejojate, kreipkitės tada į gydytoją, nes atvi su vienas gydytojas, noras kai kurie iš šių simptomų, kaip kosulys ar dusulys, gali būti klaidingai būti kadangi už lengvesnę būklę, kaip kvėpavimo takų infekcija (pavyzdžiui, peršalimas). Plaučių embolija</p>	Simptomai
<p>pasireiškia dažniausiai vienoje akies pusėje: nedelsiant op: nedelsiant regėjimo praradimas iš regėjimo, arba neskausmingas</p>	Veneuze trombose in het netvlies

neryškus matymas, kuris gali išsivystyti iki regėjimo praradimo Venų trombozė tinklainėje (kraujo krešulys tinklainėje)	(bloedstolsel tinklainėje tai akis)
Ar turite vieną iš šių nusiskundimų ar simptomų?	Nuo ko galite kentėti?
regėjimas	
skausmas, diskomfortas, spaudimas ar sunkumo, suspaudimo ar pilnumo jausmas krūtinėje, rankoje ar po krūtinkauliu pilnumo jausmas, nevirškinimas ar dusulys diskomfortas viršutinėje kūno dalyje, kuris plinta į nugarą, žandikaulį, gerklę, ranką ir skrandį prakaitavimas, pykinimas, vėmimas ar galvos svaigimas ekstremalus silpnumas, nerimas ar dusulys greitas ar nereguliarus širdies plakimas	Širdies priepuolis
staigus silpnumas ar veido, rankos ar kojos tirpimas, ypač vienoje kūno pusėje staigus sumišimas, sunkumas kalbėti ar suprasti staigus sunkumas matyti viena ar abiem akimis staigus sunkumas vaikščioti, galvos svaigimas, pusiausvyros ar koordinacijos praradimas staigus, stiprus ar ilgalaikis galvos skausmas be žinomos priežasties sumažėjęs sąmoningumas ar alpimas su ar be epilepsijos priepuolio Insulto simptomai kartais gali trukti trumpai ir beveik iš karto bei visiškai atsistatyti. Vis dėlto, turėtumėte nedelsiant kreiptis į skubią medicinos pagalbą, nes galite turėti riziką patirti dar vieną insultą.	Insultas
patinimas ir lengvas rankos ar kojos pamėlynavimas stiprus pilvo skausmas (ūminis pilvas)	Kraujo krešulys, užkemšantis kitus kraujagysles

KRAUJO KREŠULIAI VENOJE

Kas gali nutikti jei susidaro kraujo krešulys venoje kraujo krešulys Ką daryti jei kraujo krešulys susidarovenoje

- ? Vartojimas nuo kombinuoti hormoniniai kontraceptikai yra susiję su didesne rizika kraujo krešulių venose kraujo krešuliai venų trombozė). Šieveninė trombozė). Šis šalutinis poveikis pasitaiko tačiau retai pasireiškia. Dažniausiai atsiranda jie per pirmuosius metus kai vartojamas kombinuotas hormoninis kontraceptikas pradedamas naudoti.
- Jei vienas kraujo krešulys yra susidaręs į veną kojoje į veną kojoje arba pėdoje, gali tai veną gilią veninę trombozę (DVT) sukelti.

- Kai kraujo krešulys iš kojos yra nunešamas ir į plautį patenka, gali tai sukelti plaučių emboliją sukelti.
- yra labai dažna retai prieš kad kraujo krešulys susidaro venoje kitame organe pvz. akis (veninis kitas organas, kaip tas akis (veninė trombozė in het tinklainė).

Wanneer is het risico op een kraujo krešulys in een vena het didžiausia?

Het risico om een kraujo krešulys in venoje veną gauti yra didžiausia pirmaisiais metais kai moteris pirmą kartą vartoja kombinuotą hormoninį kontraceptiką pirmą kartą kombinuotą hormoninį kontraceptiką kontraceptikas naudojamas. Jis rizika gali taip pat padidėti būti jei jūs po vieno pertraukos iš 4 savaičių ar ilgiau vėl pradodate su naudojimas iš vieno kombinuoto hormoninio kontraceptiko (to paties produkto, arba kito produkto nei anksčiau).Po pirmųjų metų padidėja rizika tas rizika mažesnis, bet išlieka šiek tiek aukštesnis nei kai jūs nenaudojate kombinuoto hormoninio kontraceptiko ..
vartoti Marvelon, jūsų rizika jūsų padidėja ant vienas kraujo krešulys per kelias savaites vėl normalu.

Kaip didelė yra rizika dėl vieno kraujo krešulio?

Rizika priklauso nuo af iš jūsų natūralios rizikos VTE, ir nuo tipo kombinuoto hormoninio kontraceptiko kurį jūs naudojate.

Bendroji bendra rizika kraujo krešuliui susidaryti in vienas koja arba plautis (giliųjų venų trombozė arba plaučių embolija) su Marvelon yra maža.

- Iš kiekvienos 10.000 moterų kurios nėra vienintelis kombinuotas hormoninis kontraceptikas naudoti ir ne neščia būti, gauti apie maždaug 2 iš vienas laikotarpis per vienerius metus vienas kraujo krešulys.
- Iš kiekviena 10.000 moterų kurios vartoja kombinuotą hormoninį kontraceptiką naudojančios kuris levonorgestrelį, noretisteroną arba norgestimata turi, gauna apie 5-7 iš 5-7 metų vienas metai vienas kraujo krešulys.
- Iš kiekvienos 10.000 moterų kurios vienas kombinuotas hormoninis kontraceptikas naudoja kuris desogestrelį turi, kaip Marvelon, gauti apie maždaug tarp 9 ir 12 per metus metus metus kraujo krešulį.
- Rizika rizika susirgti kraujo krešuliu kraujo krešulį gauti gauti yra priklausomas nuo jūsų asmeninės medicininės istorijos (žr. skyrius ' Veiksniakurie jūsų riziką dėl kraujo krešulio kraujo krešulys į vienas venaarterija padidinti' žemiau).

	Rizika gauti per vienerius metus gauti kraujo krešulį
Moterys kurios nėra kombinuotų hormoninių tablečių/pleistro/žiedo nenaudoja ir nėra neščios	Apie 2 iš kiekvienu 10.000 moterų
Moterys kurios vartoja kombinuotąją tablete naudojančios levonorgestrelį, noretisteroną arba norgestimata turinčią Apie	5-7 5-7 kiekvienu 10.000 moterų moterys
Moterys kurios Marvelon naudoja	Apie 9-12 iš kiekvienos 10.000 moterų

Veiksniakurie jūsų riziką dėl kraujo krešulio kraujo krešulys veną vienas priedas padidinti

Het riziką op vienas kraujo krešulys su Marvelon yra mažas, bet yra yra tam tikros aplinkybės kurios riziką padidinti. Jūsų rizika yra didesnė:

- jei jūs sunkus antsvoris turite (KMI [kūno masės indeksas] didesnis nei 30 kg/m²)
- jei vienas iš jūsų artimųjų šeimos narių jauname amžiuje (pavyzdžiui pavyzdžiui prieš 50-uosius metus) jei kraujo krešulį turėjote patyrėte į koją plautį ar kitą organą. Tokiu atveju galite jūs turėti paveldimą polinkį krešėjimo sutrikimas turėti.
- jei jūs turite operacija turite patirti, arba jei jūs ilgą laiką nesate ant kojų dėl traumos arba sužalojimas iš liga, arba jei jūsų koja yra gipse yra. Tai gali būti reikalinga prieš operaciją , arba kai jūs mažiau judrus esate, ir keletą keletas savaites nutraukti naudojimą Marvelon. Jei turite nutraukti Marvelon, paklauskite savo gydytojo kada galite vėl pradėti naudojimą Marvelon. Jei turite nutraukti Marvelon, paklauskite.
- kai jūs senstate tampate (ypač ypač virš apie 35 metų)
- kai per pastarąjį kelias savaites pagimdėte esate. Tai

Tai rizika dėl vieno kraujo krešulio didėja kai yra daugiau iš šių aplinkybių jums taikomos yra.

Kelionė lėktuvu (ilgiau nei 4 valanda) gali jūsų riziką dėl kraujo krešulio laikinai padidinti, ypač jei yra dar keletas kitų iš paminėtų aplinkybių taikoma jums taikymas yra.

Svarbu svarbu kad jūs jūsų gydytojui pasakytumėte jei viena ar daugiau iš šių būsenų taikoma jums taikymas yra, net jei jūs dėl to abejojate. Jūsų gydytojas gali nuspręsti kad jūs turite nutraukti vartojimą Marvelon Marvelon.

Jei viena iš aukščiau nurodytų aplinkybių pasikeičia kol vartojate Marvelon ,pavyzdžiui jei vienas šalia giminaitis turi kraujo krešulį kraujo krešulys trombozė)) gauna be žinomos priežasties, arba jei jūs daug svorio padidėja ,pasakykite tai tada savo gydytojui. KRAUJAGYSLIŲ KREŠULYS ARTERIJOJE Ką

KRAUJAGYSLĖS KREŠULYS ARTERIJOJE

Kas gali ar atsitikti jei ar susidaro kraujo krešulys susiformuoja suformuotas arterijoje vienas venoje?

Kaip jei susidaro kraujo krešulys in venoje priedas, gali kraujo krešulys arterijoje sukelti rimtų problemų . Tai galipavyzdžiui sukelti širdies priepuolį arba insultą . insultas sukelti.

Veiksniai kurie jūsų riziką dėl kraujo krešulio arterijoje padidina Svarbu, kad žinotumėte kad rizika dėl kraujo krešulio arterijoje padidėja Svarbu kad vienas širdies priepuolis arba insultas dėl vartojimo Marvelon labai maža yra, bet didesnė gali tapti:

- su didėjančiu amžiumi (virš apie 35 metų)
- jei jūs rūkote. Jei jūs vartojate kombinuotą hormoninį kontraceptiką kaip Marvelon naudojate, rekomenduojama kad jūs mestumėte rūkyti su rūkymu. Jei jūs negalite nustoti rūkyti su rūkymu ir vyresni esate nei 35 metų, gali jūsų gydytojas jums pasiūlyti kitą kitą kitą tipas kontraceptikas naudoti naudoti.
- jei jūs antsvoris turite
- jei jūs aukštas kraujospūdis turite

- jei narys jūsų artimas šeima šeima ant jauno amžiaus (iki 50 metų) patyrė širdies smūgį arba insultą turėjo . Jeitai atvejis galite jūs taip pat taip vienas padidėjusi rizika turėti apie vienas širdies priepuolis arba insultas gauti ..
- jūs, arba vienas šeimos narys jūsų artimiausios šeimos ,, vienas padidėjęs riebalų kiekis kraujyje kraujyje turi (cholesterolis arba trigliceridai)
- jei jūs nuo migrenos kenčiate, ypač migrena su aura
- jei jūs vienas širdies liga turi (širdies vožtuvų liga, arba širdies aritmija kuri prieširdžių virpėjimas vadinama)jei
- jūs cukrinis diabetas (diabetas) turite ..

daugiau daugiau ir vienas iš šių sąlygų jums taikoma yra, arba jei vienas iš šių sutrikimų ypač sunkus yra, gali tai rizika dėl antibiotikas amoksicilinas 500 mg kapsulės, vartojamos tris kartus per dieną, gali sukelti šalutinį poveikį, pvz., pykinimą, viduriavimą ir alergines reakcijas. gauti iš vienas kraujo krešulys net dar toliau padidėjęs būti.

Jei vienas iš aukščiau paminėtų aplinkybių pasikeičia kol jūs naudojate Marvelon naudojate, pavyzdžiui jei jūs pradate rūkyti arba jei artimas giminitis turi kraujo krešulį kraujo krešulys trombozė)gauna be žinomos žinomas priežastis, arba jei jūs daug į svorį priaugate, pasakykite tai tada savo gydytojui. Tabletė

ir vėžys Prie tabletė

ir vėžys moterys kurios tabletę vartoja yra šiek tiek dažniau krūtis vėžys diagnozuojamas nei tarp nevartojančių tablečių tos pačios amžiaus . Dešimtmetų po nutraukimo vartojimo nutraukti su tablete yra nėra skirtumo daugiau. Tai yra ne žinoma ar šis skirtumas yra sukeltas dėl tabletės. Tai gali taip pat būti nes tablečių vartotojoms nuodugniau ir dažniau yra tiriamos, kad de krūtis vėžys anksčiau yra aptinkamas.

Retais atvejais yra pasitaikę prie tablečių vartotojoms gerybiniai kepenų navikai rasta ir in dar retesniais atvejais piktybiniai kepenų navikai. Kartais turėjo šios navikai sukėlė iki gyvybei pavojingos vidinės kraujavimo kraujavimas. Jei jūs staiga pajusite skausmą pilvo stiprų skausmą, tuomet turite jūs nedelsiant susisiekti su savo gydytoju .

Lėtinis infekcija su žmogaus papildomos virusu yra pagrindinis rizikos veiksnys gauti gimdos kaklelio vėžį gauti nuo gimdos kaklelio vėžys. Kai moterys kurios vartoja kontraceptines tabletes ilgesnį laiką naudojasi gali de rizika susirgti gauti nuo gimdos kaklelio vėžiu šiek tiek padidėjusi yra. Tačiau vis dėlto nėra aišku ar tai sukelia dėl tabletės , ar, arba kad tai daryti gaminti turi su seksualiniu elgesiu ir kitais veiksniais (pvz. geresnė kontrolė gimdos kaklelio).

Psichikos sutrikimai

Kai kurios moterys kurios hormoninius kontraceptikus įskaitant Marvelon naudoja, pranešė apie depresiją ar prislėgtumą . Depresija. būti rimta sunkus yra ir gali kartais iki savižudybės minčių vesti. Jei Jūs nuotaikos svyravimus ir simptomus depresijos patiriate , kreipkitės kuogreičiau galima į savo gydytoją menai prieš toliau medicininis patarimas.

Naudojate jūs dar kitus vaistus?

Naudojate jūs be Marvelon dar kitus vaistus ar žolinius preparatus, turite jūs tai neseniai padarėte arba ketinate jūs tai galbūt netrukus daryti ?Pasakykite tai tada savo gydytojui, menas, vaistininkas arba akušeris. Tai taikoma taip pat vaistams kurie be recepto galite įsigyti .. taip pat kiekvienam kitam gydytojui arba menas odontologas (ar vaistininkas) kuris jums kitą kitą vaistą išrašo kuris jūs Marvelon vartojate. Jie gali jums pasakyti ar tai reikalinga yra kitą papildomai

nehormoninis kontraceptikas (pavyzdžiui prezervatyvas) naudoti ir taip pat kiek laiko jūs tai tada turite naudoti ar tai iš tas tas vartojimas nuo kito vaisto kurio jums reikia, turipasikeisti. Nevartokite.

jei sergate hepatitu C kaip u hepatito C turi It tam vaistai su ombitasviruparitapreviruritonaviru ir dasabuviru arba glecaprevirupibrentasviru naudojami, nes tai padidėjimas iš nuo vienas kepenų fermentas (ALAT, vienas kepenų funkcijos kraujo tyrimas) gali sukelti. Jūsų gydytojas paskirs kitą kontraceptiką prieš pradėdami vartoti jūs pradėsite su ši gydymas. Marvelon gali maždaug 2 savaites po pabaigos šio šio gydymo vėl būti pradėtas. Žr. skyrių 2 'Kada ar galite šio vaisto ne vartoti?').

Kai kurie vaistai

- gali paveikti poveikį turėti kraujo lygius Marvelon
- gali Marvelon mažiau efektyvų padaryti dėl nėštumas gali išvengti
- gali netikėti kraujavimai sukelti.

Tam priklauso tarp kitų vaistai nuo de gydymas nuo:

- epilepsija (pavyzdžiui primidonas, fenitoinas, fenobarbitalis, karbamazepinas, okskarbazepinas, topiramatas, felbamatas)
- tuberkuliozė (pavyzdžiui rifampicinas, rifabutinas)
- ŽIV infekcija (pavyzdžiui ritonaviras, nelfinaviras, nevirapinas, efavirenas)
- hepatitas C-virusinė infekcija (pavyzdžiui bocepreviras, telapreviras)
- kitos infekcijos (pavyzdžiui grizeofulvinas)
- aukštas kraujospūdis kraujagyslėse plaučių (bosentanas (bosentanas)
- depresinė nuotaika (žolelių preparatas jonažolė).

Jei jūs vaistus arba žolelių preparatus vartojate kurie Marvelon mažiau efektyvus gali padaryti, turite jūs taip pat kitą barjerinis kontracepcijos metodus naudoti. Kadangi poveikis kitam vaistui ant Marvelon iki 28 dienų po nutraukimo to vaisto gali tęstis, reikia vaistasMarvelon turi jūs papildomai barjerinis kontracepcijos metodus per tas laikas toliau naudoti.

Marvelon gali poveikį kitų vaistų poveikį paveikti paveiktipavyzdžiui pavyzdžiui:

- vaistai kurie ciklosporinas turi
- anti-epilepsinis vaistas lamotriginas (tai gali sukelti iki padidėjusį priepuolių skaičių).Laboratoriniai tyrimai

Jei

kraujo tyrimas atliekamas pas jūs turite būti atlikta, pasakykite tada jūsų gydytojui arba laboratorijos personalui kad jūs vartojate tabletes .. kontraceptikai gali būtent būtent de rezultatai iš kai kurių tyrimų paveikti.

Nėštumas ir žindymas

Nėštumas

Jei esate nėščia, arba manote kad jūs nėščia galėtumėte būti yra galite vartoti Marvelon ne vartoti. Jei įtariate kad jūs nėščia esate kol jūs vartojate Marvelon, susisiekite kuogreičiau galima su savo gydytoju. Žindymas

Tai

Tai naudojimas Marvelon yra apskritai nerekomenduojamas kol moteris žindo kūdikį . Jei tabletę vis dėltonorite naudoti kol jūs dar žindote kūdikį dar žindymas duoda, galite su geriausia susisiekti kreiptis su jūsų gydytoju.

Vairavimas ir naudojimas naudojimas mašinų

Nėra yra jokių nurodymų kad de vairavimo gebėjimas ir tai gebėjimas naudoti mašinas gali būti paveiktas ..

turi laktozės Jei

jūsų gydytojas jums pasakė kad pasakyta jei jūs tam tikrų cukrų netoleruojate , kreipkitės įsavo gydytoją prieš jūs šį vaistą vartojate ..

ir paaugliai iki 18 metų metai

Yra nėra klinikinė informacija apie veiksmingumą ir saugumą jauniems žmonėms iki 18 metų.

Kada turėtumėte kreiptis į gydytoją vartojimo metu tas vartojimas nuo šio vaisto?

3. Kaip vartoti šį vaistą ? Gerkite

šį vaistą visada visada tiksliai kaip jūsų jūsų gydytojo arba vaistininko jūs kad turi pasakė. Abejokite jūs dėl teisingo vartojimo? Tada susisiekite su jūsų gydytoju arba vaistininku.

Kada ir kaip vartoti u de tabletės j?

Juostelė turi 21 tabletę. Kiekvienai tabletei nurodyta kurią dieną ji turi būti išgerta . Paimkite tabletę kurinurodyta tabletės kiekvieną dieną maždaug ant tuo pačiu laiku j, prirėikus su trupučiu vandens. Laikykitės de rodyklės iš krypties kuri nurodyta ant juostelės iki kol suvartosite visas 21 tabletę turi prarytas. Po to vartokite 7 dienas ne tabletės. Per šias 7 dienas turėtų prasideda kraujavimas turėtų prasideda (vadinamasis nutraukimo kraujavimas). Ši pradeda paprastai 2-ą arba 3-ą dieną po paskutinės paskutinis dieną su kita juoste, nepaisant ar kraujavimas jau pasibaigė ar ne ne. Dit reiškia kad jūs visada tą pačią dieną savaitės su kitu lapeliu pradedate, ir taip pat kad nutraukimo kraujavimas kiekvieną mėnesį maždaug ant tą pačią dieną sutampa.

Kada pradėti pirmąją juostelę pirmą juostelę

Jūs vartojote per praėjusį mėnesį nėra kontraceptinių tablečių vartojote.

Pradėkite vartoti Marvelon pirmąją dieną iš ciklo (pirmoji diena iš jūsų menstruacijų).

Marvelonveikia šiuo atveju iš karto ir jums nereikia u reikia nėra papildomai kontraceptiką naudoti naudoti.

Jūs galite taip pat ant dieną 2-5 ciklo ciklo pradėti bet tada turite jūs per pirmas 7 dienas taip vieną papildomą kontraceptiką (pavyzdžiui vieną prezervatyvą) naudoti.

Perėjimas nuo kitos kombinuotosios tabletės kombinuota tabletėmakštis žiedo ar kontraceptinio pleistro Jūs

U galite su Marvelon pradėti dieną po to, kai išgersite paskutinę tabletę iš jūsų ankstesnės tabletės esate išgėrę (taigi be pertraukos). Jei yra prie jūsų ankstesnė tabletė taip pat neveikliosios tabletės juostelėje yra, turite jūs nedelsiant tęsti po paskutinės veikliosios tabletės iš jūsų ankstesnės ankstesnis tabletė (jei jūs nežinote kuris tai yra, paklauskite to tada savo gydytojo ar vaistininko). Jūs galite taip patvėliau pradėti, bet niekada ne vėliau nei pradėti, bet niekada ne vėliau kaip diena po pabaigos iš tablečių neturėjimo laikotarpio nuo jūsų ankstesnės tabletės (arba po de paskutinės neveiksmingos tabletės iš jūsų ankstesnės tabletės).

Jei jūs pereinate nuo vieno makštis žiedo arba kontraceptinio pleistro galite pradėti su Marvelon pradėti dieną dieną nuo pašalinimo žiedo arba paskutinio pleistro. Jūs galite taip pat vėliau pradėti, bet jūs turite per vėliausiai septynias dienas po pašalinimo žiedo arba paskutinio pleistro su Marvelon pradėti su Marvelon Kai.

tabletę vartojate tabletė, pleistras arba žiedas visiškai pagal de nurodymus turite naudojote ir esate tikras dėl kad jūs ne nėsčia esate, galite jūs be to nutraukti su vartojimu tabletės arba žiedo arba pleistro pašalinimu ant kiekvienos dienos iš jūsų dabartinio ciklo ir nedelsiant pereiti prie naujo naudojimas Marvelon.

Jei jūs šias nurodymus laikysitės nėra reikia naudoti papildomą kontraceptiką kontraceptikas pavyzdžiui prezervatyvą) prezervatyvasnaudoti . naudoti.

Perėjimas nuo vienos progestageno tabletės (minitables)

Jūs galite nuo vienos prie kitos dienos pereiti prie Marvelon, bet jūs turite pirmąją dieną 7 dienas taip vieną papildomą kontraceptiką (pavyzdžiui vieną prezervatyvą) naudoti.

Perėjimas nuo injekcinės kontracepcijos, implantą arba iš vienas hormonų turintis spiralė

Pradėkite su Marvelon kai jūs kitaip kitą injekciją turėtumėte gauti arba dieną kurią implantas arba hormonų turintis spiralė hormonų turintis spiralė yra pašalinamas. Jūs turite pirmąsias septynias 7 dienas tačiau vis dėlto naudoti papildomą kontraceptiką (pavyzdžiui prezervatyvą prezervatyvas) naudoti.

Po gimdymo gimdymo

Jei ką tik pagimdėte, jūsų gydytojas tikriausiai patarė palaukti iki pirmosios spontaniškos menstruacijos, bet kartais menstruacija, bet kartais yra galima anksčiau pradėti .. gydytojo patarimo. Tai taikoma taip pat ir tuo atveju jei žindote kūdikį. žindymas suteikia It de tabletė norite naudoti.

Po persileidimo arba aborto Laikykitės gydytojo patarimo. Ar jūs per daug

vartojote vaisto? daug iš šio vaisto išgerta?

Yra nėra pranešimų apie rimtus žalingus padarinius dėl didelio kiekio Marvelon tablečių vienu metu tabletės tuo pačiu metu. Jei jūs keletą tablečių vienu metu išgėrėte, tada galite jūs galbūt

jausti pykinimą, vėmimą arba pykinimas, vemti iš vaginalinis kraujavimas. Jei jūs pastebėsite kad vaikas Marvelon yra prarijęs, kreipkitės į savo gydytoją dėl patarimo.

Ką daryti ...

...prie praleidžiant pamiršus tabletes Jei

jūs mažiau nei **12 12 per vėlai esate** su vartojimu vienos tabletės ... vienas tabletė tada yra veikimas tabletės nėra sumažėjęs. Išgerkite tabletę nesumažinta. Vartokite tabletę tada, kai tik prisimenate, ir toliau vartokite kitas tabletes įprastu laiku. pagalvokite apie tai ir kitą tabletę išgerkite įprastu laiku.

vėluojate daugiau nei 12 valandų **daugiau nei 12 valandų pavėluota** esate išgėrę tabletę, piliulės veiksmingumas gali būti sumažėjęs. Kuo daugiau tablečių iš eilės pamiršote išgerti, tuo didesnė tikimybė, kad tabletės sumažės tabletės veikimas sumažės yra. Tikimybė nepakankamos apsaugos nuo nėštumo yra didžiausia, jei tabletės praleidžiamos pradžioje arba pabaigoje juostelės. Todėl taikomos šios taisyklės (taip pat žr. schemą): Daugiau yra didžiausias, kai tabletės praleidžiamos pradžioje arba pabaigoje juostelės. Todėl taikomos šios taisyklės (taip pat žr. schemą):

1 tabletė 1 vienoje juostelėje Kreipkitės į
su kontaktas op su jūsų gydytojas.

1 pamiršta tabletė per savaitę 1

Išgerkite pamirštą tabletę, kai tik prisiminsite, net jei tai reikštų, kad turite išgerti dvi tabletes tuo pačiu metu turite išgerti. Toliau vartokite tabletes vėl įprastu laiku laiku įprastu laiku in, bet jūs taip pat turite 7 dienas naudoti papildomas kontracepcijos priemonės. Jei savaitę prieš praleidimą turėjote lytinių santykių, turite atsižvelgti į nėštumo galimybę. Tokiu atveju nedelsdami susisieki su savo gydytoju.

1 tabletę pamiršote savaitę 2 2

Išgerkite praleistą tabletę, kai tik prisiminsite, net jei tai reikštų, kad tą pačią dieną turėtumėte išgerti dvi tabletes turite išgerti. Toliau vartokite tabletes vėl pagal įprastą tvarką. Įprastas laikas viduje. Šis Tabletės veiksmingumas nesumažėjo, jums nereikia naudoti papildomų kontraceptikų.

1 tabletę pamiršta per savaitę 3

Jūs galite pasirinkti iš 2 galimybių be papildomų kontraceptikų naudoti reikia naudoti.

1. Išgerkite praleistą tabletę kai tik prisimenate, net jei tai reikštų, kad turite išgerti dvi tabletes vienu metu. Toliau vartokite tabletes įprastu laiku. **Be to, praleiskite laikotarpį be tablečių** ir iš karto tęskite su kita pakuote. Labiausiai tikėtina, gausite jūs tik pabaigoje antro pakuotės pabaigoje antrą pakuotę juostelę vieną tikras nutraukimo kraujavimas, tačiau antrosios juostelės metu galite patirti tepimą ar prasiveržimo kraujavimą.
2. Taip pat galite nustoti vartoti atitinkamą juostelę. Laikykitės 7 dienų ar trumpesnio laikotarpio be tablečių prie (**tel visada visada dieną kai kai jūs tabletę pamiršote**). **Po to tęskite**). Po to eina u paprastai

toliau su kita pakuote.

Jei laikysitės šio metodo, visada galėsite pradėti naują pakuotę savo įprastą pradžios dieną.

Jei pamiršote išgerti tablečių iš pakuotės ir per artimiausią įprastą tablečių neįvartojimo laikotarpį neatsiranda kraujavimo, tai gali reikšti, kad esate nėščia. Prieš tęsdami su kita pakuote, turite susisiekti su savo gydytoju.

... esant skrandžio ir/arba žarnyno sutrikimams (pavyzdžiui, vėmimas, stiprus viduriavimas)

Jei vemiame arba turime stiprų viduriavimą, yra tikimybė, kad veikliosios medžiagos nebuvo visiškai absorbuotos organizme. Jei turite vemti per 3-4 valandas po tabletės išgėrimo, ši situacija yra panaši į pamirštos tabletės atvejį. Todėl vėmimo atveju laikykitės to paties patarimo, kaip nurodyta aukščiau pamirštų tablečių atveju. Jei turite stiprų viduriavimą, pasitarkite su savo gydytoju.

... jei norite atidėti menstruacijas

Galima atidėti menstruacijas, nors tai nerekomenduojama. Išimtiniais atvejais galite atidėti menstruacijas, tęsdami naują Marvelon pakuotę be tablečių neįvartojimo laikotarpio. Galite tęsti šią pakuotę, kol visos tabletės bus suvartotos, arba, jei pageidaujate, anksčiau sustoti. Naudojant šią antrą pakuotę, galite patirti proveržio kraujavimą arba tepimą. Po įprasto 7 dienų tablečių neįvartojimo laikotarpio vėl pradėkite su kita pakuote.

... jei norite pakeisti menstruacijų pradžios dieną

Jeį vartojate tabletes pagal nurodymus, menstruacijos visada prasidės maždaug tą pačią dieną. Jei norite pakeisti šią dieną, galite tai padaryti sutrumpindami įprastą tablečių neįvartojimo laikotarpį tarp dviejų pakuočių (bet niekada nepratęsdami). Pavyzdžiui, jei jūsų menstruacijos paprastai prasideda penktadienį ir norite, kad jos prasidėtų antradienį (3 dienomis anksčiau), tuomet turite dabar 3 dienomis anksčiau nei įprastai pradėti naują pakuotę. Jei tablečių neįvartojimo laikotarpis yra labai trumpas (pavyzdžiui, 3 dienos ar mažiau), gali būti, kad per šį laikotarpį nebus kraujavimo. Tada galite patirti proveržio kraujavimą arba tepimą per kitą pakuotę.

... esant netikėtam kraujavimui

Naudojant visas kontraceptines tabletes, per pirmuosius kelis mėnesius kartais gali atsirasti netikėtas kraujavimas (tepimas arba proveržio kraujavimas). Galbūt negalėsite apsieiti be higieninių įklotų ar tamponų. Bet kokiu atveju toliau vartokite savo tabletes. Nereguliarus kraujavimas paprastai sustoja, kai jūsų kūnas pripranta prie atitinkamos tabletės (po maždaug 3 pakuočių). Jei tai trunka ilgiau, pablogėja arba vėl prasideda, turite susisiekti su savo gydytoju.

... jei tikėtinas kraujavimas neįvyksta

Jei visas tabletes išgėrėte teisingai, neturėjote vėmimo ir/arba viduriavimo, ir nenaudojote kitų vaistų, labai mažai tikėtina, kad esate nėščia. Galite saugiai tęsti su kita pakuote.

Jei tikėtinas kraujavimas neįvyksta du kartus iš eilės, galite būti nėščia. Nedelsdami susisiekite su savo gydytoju. Nepradėkite kitos Marvelon pakuotės, kol jūsų gydytojas nepatvirtins, kad nesate nėščia.

Jei jūs nutraukiate vartojimą vartoti šio šį vaistą

Jūs galite su Marvelon nutraukti kada tik norite. Jei nenorite nėščia tapti pastoti, klausykite tada savo gydytojo patarimo su dėl kitų patikimų metodų gimstamumo kontrolės . Jei jūs.

nes jūs norite pastoti , paprastai būtibūna tampa bendru atveju rekomenduojama apie laukti kol kol turėsite natūralias menstruacijas prieš bandydami pastoti . Jūs galite bando bandyti pastoti po menstruacijų. gali ir lengviau apskaičiuoti kada gimdymas įvyks vyks įvykti.

4. Šalutiniai poveikiai Kaip ir kiekvienas

vaistas gali taip pat šis vaistas šalutinius poveikius turėti .. Ne visi susiduria su tuo turėti reikalų. Ar jūs turite šalutinį poveikį, ypač jei jis sunkus pobūdžio yra ir ir lang tęsiasi, arba atsiranda yra pokytis jūsų sveikatos būklėje kuris jūs manote kad tai sukeltas gali būti dėl Marvelon? Susisiekite su jūsų sveikatos priežiūros specialistu. jūsų arts.

Alle moterys kurios kombinuotus hormoninius kontraceptikus naudoja turi didesnę riziką dėl kraujo krešulių venose (veninė tromboembolija[VTE]) arba tromboembolija [VTE]) arba kraujo krešuliai į arterijose (arterinė trombo- embolija [ATE]). Žr. daugiau informacijos apie skirtingas rizikas vartojant kombinuotus naudojimas vaistus kombinuotas hormoniniai kontraceptikai skyrius 2 'Kada negalite šio vaisto vartoti arba turite būti ypač atsargūs su juo būti ?'.Nedelsdami susisiekite su

savo gydytoju menas jei jūs simptomai angio-edema gaunate tokie kaip patinimas jūsų veido , liežuvioir arba gerklėsir arbasunkumai su rijimu tas nuryti iš dilgėlinė galimas su kvėpavimo problemos (žr. skyrius 2 'Kada reikia jums papildomai atsargiai būti su šis vaistas?').

Kaip prie visos kombinuotosios tabletės, gali jūsų menstruacijų ciklas pasikeisti, ypač per pirmuosius mėnesius vartojimo pradžioje . Šisskirtumas gali būti tame, kaip kaip dažnai u vienas kraujavimas gaunate (nebuvimas kraujavimo , mažiaudažnai ,dažniau ar nuolat), kaip sunkus kraujavimas yra, ar kraujavimas yra, arba kiek laiko de kraujavimas trunka.

Dažnai (pasitaiko tarp mažiau nei 1 iš 10 moterų)depresinės

- nuotaikos ,nuotaikos pokyčiai galvos skausmas
- pykinimas
- pykinimaspilvo skausmas pilvo skausmas
- jautrios krūtys, skausmingos krūtys
- svorio padidėjimas.

Kartais (pasitaiko mažiau nei 1 iš 100 moterų mažiau nei 1 iš 100 skysčių susilaikymasmažesnis noras

- turėti
- lytinius santykius migrena vėmimas
- migrena
- vėmimas, viduriavimas
- odos bėrimas, dilgėlinė (urtikarija)
- padidėjimas krūtų srityje.

Retai (pasitaiko mažiau nei 1 iš 1000 moterų mažiau nei 1 iš 1000 moterų)

- kenksmingi kraujo krešuliai į venoje priedas ar arterijoje, pavyzdžiui:
 - o kojoje vienas ar pėdoje (pavyzdžiui giliųjų venų trombozė)
 - o į vienas plautis (pavyzdžiui plaučių embolija)
 - o širdies priepuolis
 - o insultas
 - o 'mažas insultas' arba laikini reiškiniai kaip prievienas insultas, žinomas kaip TIA (trumpalaikis išeminis priepuolis)
 - o kraujo krešuliai kepenyse, skrandisžarnos, inkstai arba akys. tikimybė gauti kraujo krešulį yra didesnė gauti yra didesnis jei yra kitos sąlygos jums taikomos yra kurios šį riziką padidina (žr. skyrių 2 daugiau informacijos apie sąlygas sąlygos kurie riziką dėl kraujo krešulių padidina ir simptomai reiškiniai dėl vieno kraujo krešulio).
- padidėjusio jautrumo reakcijos
- daugiau noras turėti lytinius santykius
- dirginimas akių dirginimas prie naudojimo naudojimo kontaktinių kontaktinių lęšių
- skausmingi, mėlynai raudoni gumbeliai odoje oda (mazginė eritema), odos bėrimas su nelygiais raudonais dėmėmis arba opos (daugiakampė eritema)
- išskyros iš de spenelio, pokyčiai makšties išskyros iš makšties
- svorio netekimas.

Pranešimas apie nepageidaujamas reakcijas Jei patiriate nepageidaujamas reakcijas, susisieki su, susisieki su jūsų gydytojas arba vaistininkas. Tai taip pat taikoma šalutiniams poveikiams kurie nėra šiame pakuotės lapelyje nurodyti. Jūs galite šalutinius poveikius taip pat pranešti per Niderlands Šalutinis poveikis Centrum Lareb, svetainė: www.lareb.nl. Pranešdami šalutinį poveikį apie pranešti, padedate jūs mums gauti daugiau informacijos apie gauti apie saugumą šio vaisto vaistas.

5. Kaip laikyti jūs šį vaistą?

Laikyti nepasiekiamoje ir neprieinamoje vaikams vietoje ..

šio vaisto daugiau ne daugiau po de galiojimo data. Die rasite ant dėžutės ir ant lizdinės plokštelės po EXP. Ten nurodytas mėnuo ir metai . De metai. paskutinė diena iš to mėnesio yra galiojimo data.

Laikyti žemiau 30 °C. Nelaikyti šaldiklyje . Laikyti. lizdinėje pakuotėje originalus lizdinė pakuotė ter apsauga nuo šviesos ir drėgmės.

Vartokite šio vaisto ne jei jūs pavyzdžiui matote kad tabletės pakitusios spalvos pakitęs iš susmulkintas yra arba kai jūs kiti matomi požymiai iš blogėjimas į kokybę pastebite. Neskalkaukite vaistų ne per kriauklę arba tualetą ir išmeskite juos ne į šiukšliadėžę. Klauskite savo vaistininko ką daryti su vaistais turite daryti kurių ne be naudojate. Jei jūs vaistus tinkamu būdu išmesite jie bus tinkamai sunaikinti ir nepateks į aplinką . Turinys ateiti jie ne aplinkoje teisingai.

6. Turinys iš pakuotės ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate ?Veikliosios

- medžiagos šiame vaistiniame preparate yra desogestrelis vaistas yra desogestrelis (150 mikrogramų) ir etinilestradiolis (30 mikrogramų).
- Kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra bevandenis koloidinis silicio dioksidas silicio dioksidaslaktozės monohidratas laktozės monohidratasbulvių krakmolos bulvių krakmolaspovidonas povidonas, stearino rūgštis, all-rac-alfa-tokoferolis.

Kaip atrodo Marvelon ir kas yra pakuotėje ? Pakuotėturi

1, 3 arba 6 pakuotė sudėtyje yra 1, 3 arba 6 lizdinės plokštelės su 21 tabletėmis.

Ne visos nurodytos pakuotės yra rinkoje pateikiamos ..

yra baltos, apvalios , iš, prie abi pusės apvalus ir turi 6 mm skersmenį.

Vienoje pusėje yra „TR“ virš „5“ ir kitoje pusėje „Organon“ kitas kraštas 'Organon' en vienas penkiakampė žvaigždė.

Turėtojas leidimo prekiauti už rinkoje pateikimą ir gamintojas N.V. Organon

Kloosterstraat Vienuolyno gatvė 6

Nyderlandai

Tel.: 00800 66550123 (+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

dpoc.benelux@organon.com

Registruota įrašyta pagal: RVG 08859

Šis pakuotės lapelis yra paskutinį kartą patvirtintas gegužės mėnesį 2025 gegužė 2025