

Pakningsvedlegg: informasjon for brukeren brukeren

Marvelon, tabletter

desogestrel, etinyløstradiol

Viktige ting du må vite om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler:

- Disse midler utgjør en av de mest pålitelige reversible prevensjonsmetoder, forutsatt korrekt brukt.
- De gir en litt høyere risiko for utvikling av en blodpropp (trombose) i vener og arterier, spesielt i første året du du en kombinert hormonell prevensjonsmiddel brukt eller hvis du etter en avbrudd på 4 uker eller lengre igjen begynner med bruk av en kombinert hormonell prevensjonsmiddel.
- Merk godt på og ta kontakt med din lege hvis du tror at du muligens symptomer på en blodpropp har (se avsnitt 2 'Blodpropper (trombose)').

Les nøye hele pakningsvedlegget før du dette legemidlet skal ta for det står viktig informasjon i for deg.

- Oppbevar denne pakningsvedlegget. Kanskje trenger du det senere igjen ..
- du fortsatt enda spørsmål? Ta kontakt med din lege eller apotek.
- Gi denne medisinen ikke til andre , fordi det er kun til deg foreskrevet . Det kan være skadelig for andre, selv om har de samme symptomer som deg.
- Får du problemer med en av de bivirkningene som er nevnt i avsnitt 4 står? Eller får du en bivirkning som ikke i denne pakningsvedlegget står? Ta da kontakt med din lege eller apotek.

Innhold av denne pakningsvedlegg

1. Hva er Marvelon og hva brukes denne medisinen til?
2. Når bør du denne medisinen ikke bruke eller må du være ekstra forsiktig med er?
3. Hvordan tar du denne medisinen ?
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan oppbevarer du denne medisinen?
6. Innhold av emballasjen en andre informasjon

1. Hva er Marvelon og hva brukes denne medisinen til?

Sammensetning og type pille

Marvelon er en kombinert oral prevensjonspille (de 'kombinasjonspille'). Hver tablett inneholder en liten mengde av to forskjellige kvinnelige hormoner, nemlig desogestrel (et hormon med progesteron-lignende virkning) en etinyløstradiol (en hormon med østrogen virkning). På grunn av den lille mengden hormoner, blir Marvelon ansett som en lavdosert prevensjonsmiddel. Fordi begge hormonene i alle tablettene i stripen i samme mengde kombinert er, blir det en enfase-kombinasjonspille kalt.

Hva blir denne medisinen brukt?

Marvelon blir brukt for å forhindre graviditet ..

blir tatt inntatt (uten at tabletter blir glemte) er sjansen for å bli gravid svært liten . Når.

2. dette legemidlet ikke medisin ikke bruke eller må du være ekstra forsiktig med være?

Generelle merknader

Les før du begynner med å bruke Marvelon informasjonen om informasjon om blodpropper (trombose) i rubrikk 2. Det er særlig viktig at du leser hva symptomene er på en blodpropp – se rubrikk 2 'Blodpropper (trombose)'.

I denne pakningsvedlegget blir noen situasjoner beskrevet hvor du må stoppe med bruk av pillen eller hvor de påliteligheten av pillen redusert kan være. I slike situasjoner må du avstå fra seksuell samleie eller en en tilleggs prevensjonsmiddel uten hormoner bruke, for eksempel en kondom eller annet barriereprevensjonsmiddel. Ikke bruk av kalender - eller temperaturmetoden temperaturmetode. Disse metoder kan være upålitelige fordi p-pillen påvirker de normale endringene i kroppstemperaturen og livmorslimhinnen under den og det livmorslimhinne under de menstruasjonssyklus.

Marvelon tilbyr nettopp som andre hormonelle prevensjonsmidler ingen beskyttelse mot en hiv-infeksjon (aids) eller andre seksuelt overførbare sykdommer (seksuelt overførbare infeksjoner).

Når kan du ikke dette middelet ikke bruke?

Du kan ikke bruke dette legemidlet ikke bruke hvis du en av de nedenfor nevnte tilstander har. Hvis du en av de nedenfor nevnte tilstander har, fortell dette da til din lege. Din lege vil med deg diskutere hvilken annen form av prevensjon mer egnet er for deg. Se også avsnittet 'Når må du ekstra u ekstra forsiktig er med dette legemidlet?'.

- Du har en blodpropp i en blodåre i benene (dyp venetrombose , DVT), de, DVT), de lunger (lungeemboli) eller en annen organ, eller du har dette i fortiden hatt.
- Du vet at du en lidelse har av din blodkoagulasjon – for eksempel protein C-mangel, protein S- mangel, antitrombin-III-mangel, faktor V-Leiden eller antistoffer mot fosfolipider.
- U må bli operert eller du er i løpet av lang tid ikke på beina (se avsnitt 'Blodpropper (trombose)').
- Du har noen gang en hjerteinfarkt eller et slag hatt.
- Du har angina pectoris (en tilstand som sterke smerter i brystet forårsaker forårsaker en en første symptom av en hjerteinfarkt kan være) eller en 'transitorisk iskemisk anfall' (TIA: forbigående symptomer av et slag) eller du har dette noen gang hatt.
- Du har en av de følgende sykdommer, som risikoen for en blodpropp i dine arterier kan øke:
 - alvorlig diabetes med skade av blodårer
 - alvorlig forhøyet blodtrykk
 - en alvorlig forhøyet fettinnhold i ditt blod (kolesterol av triglyserider)
 - en lidelse som hyperhomocysteinemi kalles ..
- har en type migrene som 'migrene med aura' kalles (eller nevnt (of har dette noen gang hatt).
- Du har pankreatitt (en betennelse i bukspyttkjertelen) eller har dette hatt, kombinert med en høy fettinnhold i ditt blod.
- Du har gulsott (gul misfarging av hud eller øyne) eller en alvorlig leversykdom av har dette hatt, og den resultatene av leverfunksjonstester er ennå ikke normal.

- Du har en form av kreft eller har dette hatt som følsom kan være for kjønnsormoner (slik som brystkreft eller kreft i kjønnsorganene).
- Du har leverkreft eller har dette hatt.
- Du har uvanlige blødninger fra skjeden hvor årsaken ikke er fastslått fastsatt.
- Du har en unormal fortykkelse av livmorslimhinnen.
- Du er allergisk mot en av de stoffene i denne medisinen. Disse stoffene kan du finne i rubrikk 6 i denne pakningsvedlegget.

Hvis en av de nevnte situasjonene oppstår mens du allerede bruker Marvelon , så må du umiddelbart stoppe med bruken og kontakte ta kontakt med din lege. Bruk i mellomtiden en annen ,ikke -- hormonelle metode av prevensjon. Se også 'Generelle merknader' i begynnelsen av avsnitt 2.

Bruk Marvelon ikke hvis du har hepatitt C har en for dette medisiner med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir eller glecaprevir/pibrentasvir brukt (se også avsnitt 2 'Brukt u ennå andre medisiner?').

Når må u ekstra forsiktig være med dette legemidlet?

Når må u kontakte ta med legen din lege?

Ring nød medisinsk hjelp hvis

- du mulige symptomer eller tegn på en blodpropp merker , som kan bety at det du lider av en blodpropp i ditt ben (dvs.. dyp venetrombose), en blodpropp blodpropp ditt lunge (dvs.dvs. lungeemboli), en hjerteinfarkt eller en hjerneslag (se nedenfor avsnittet ' BlodpropperBlodpropper trombose').Gå

for for en beskrivelse av symptomene eller tegnene på disse alvorlige bivirkningene se 'Hvordan gjenkjenner du en blodpropp?'.

Fortell det legen din lege, hvis en av de følgende situasjoner gjelder for deg anvendelse er. Hvis tilstanden oppstår eller forverres ,mens du bruker Marvelon , må, måtte du dette også til din lege fortelle.

- Du røyker.
- Du har diabetes.
- Du er mye for tung.
- Du har en forhøyet blodtrykk.
- Du har en tilstand av hjerteklaffene eller en spesifikk hjerterytmeforstyrrelse.
- Du har en betennelse i årer rett under huden (overfladisktromboflebitt).Du
- har åreknuter ..
- i din nære familie familie har noen gang trombose, en hjerteinfarkt eller et slag hatt.
- Du har migrene.
- Du har epilepsi.
- Du har forhøyede fettinnhold i ditt blod (hypertriglyseridemi), eller denne tilstanden forekommer i din familie eller har forekommet i din familie tidligere

forekommet. Hypertriglyseridemi er i sammenheng brakt med en høyere risiko for pankreatitt (en betennelse i bukspyttkjertelen) å få.

- Du må bli operert eller du er i løpet av lang tid ikke på beina (se 'Blodpropper (trombose)' i avsnitt 2).
 - Hvis du nylig har født, har du en økt risiko for å få blodpropper. Spør din lege hvordan snart etter fødselen du kan begynne med bruk av Marvelon.
 - Du har noen i din nære familie som har hatt brystkreft. Du.
 - en tilstand i leveren eller i galleblæren av leveren eller av galleblære.
 - U har de sykdommen Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt (kronisk tarmsykdom).
 - Du har systemisk lupus erythematosus (SLE - en sykdom som ditt naturlige immunsystem påvirker).
 - Du har hemolytisk-uremisk syndrom (HUS - en forstyrrelse av blodkoagulasjon som nyresvikt forårsaker).
 - Du har sigdcelleanemi (en arvelig sykdom av de røde blodcellene).
 - Du har en tilstand som fører det første oppstod eller forverret under en graviditet av ved tidligere bruk av kjønns hormoner, for eksempel hørselstap, porfyri (en blodsykdom), herpes gestationis (hudutslett med blemmer under graviditet) eller Sydenham-chorea (en nervesykdom hvor plutselige bevegelser av kroppen oppstår). Du
-
- får symptomer på angio-ødem som hevelse av din ansikt, tunge og eller hals og eller vanskeligheter med å svelge eller elveblest muligens med pusteproblemer. Ta i dette tilfellet direkte kontakt med din lege. Produkter med østrogener kan de symptomene av arvelig og ervervet angio-ødem forårsake eller forverre.
 - Du har chloasma eller du har noen gang chloasma hatt (gul-brune pigmentflekker, såkalte 'svangerskapsflekker', spesielt i ansiktet); hvis dette tilfelle er, er det fornuftig å direkte eksponering for sollys eller ultrafiolett lys å unngå.

P-pillen pille og blodpropper (trombose)

BLODPROPPER (TROMBOSE)

Hvis du en kombinert hormonell prevensjon som Marvelon bruker, har du en høyere risiko for en blodpropp å få da hvis du ingen kombinert hormonell prevensjonsmiddel bruker. I sjelden forekommende tilfeller kan en blodpropp en blodåre blokkere og alvorlige problemer forårsake.

Blodpropper kan oppstå

- i årer (dette kalles 'venøs trombose', 'venøs tromboembolisme' eller VTE nevnt)
- i arterier (dette kalles 'arteriell trombose', 'arteriell tromboemboli' eller ATE nevnt).

Man kommer ikke alltid fullstendig av blodpropper. I sjeldne tilfeller kan det være langvarige alvorlige effekter være, eller i svært sjeldne tilfeller kan blodpropper være dødelige er.

Det er viktig at du vet at den generelle risikoen for en skadelig blodpropp fra Marvelon liten er.

HVORDAN GJENKJENNER DU EN BLODPROPP?

Kontakt akutt medisinsk hjelp i hvis du en av de følgende symptomer eller tegn merker.

Får du en av disse symptomene av symptomer?	Hvor kan du lide av?
<p>hevelse i et ben eller langs en vene i et ben eller fot, spesielt hvis dette er ledsaget av:</p> <ul style="list-style-type: none"> smerte eller ømhet av beinet, som du muligens bare føler når du står eller går mulig bare føles ved stående eller gående temperatur temperatur det berørte beinet fargeendring av huden på det berørte det benet, for eksempel blekt, rødt eller blått 	Dyp venøs trombose
<p>plutselig uforklarlig åndedrettsbesvær eller rask pust</p> <p>plutselig hoste uten tydelig årsak, hvor du kan hoste opp blod</p> <p>skarpe smerte i brystet, som kan bli verre hvis du tar dype pust</p> <p>alvorlig lett følelse i hodet eller svimmelhet svimmelhet</p> <p>rask eller uregelmessig hjerterytme</p> <p>alvorlig smerte i din mage</p> <p>Hvis du er i tvil, ta da kontakt med en lege, fordi ønsker noen av disse symptomene, som hoste eller kortpustethet, kan feilaktig vurderes bli siden for en mildere tilstand, som en luftveisinfeksjon (for eksempel forkjølelse).</p>	Lungeemboli
<p>Symptomer oppstår vanligvis i ett øye på:</p> <ul style="list-style-type: none"> umiddelbart tap av synet, eller smertefri uklart syn, som kan utvikle seg til tap av synet Venøs trombose i netthinnen 	(blodpropp blodpropp netthinnen det øye)
Får du noen av disse plagene eller symptomene?	Hva kan du lide av?
synsevne	
<p>smerte, ubehag, trykk eller en tung, klemmende eller fylt følelse i brystet, armen eller under brystbenet</p> <p>fylt følelse, fordøyelsesbesvær eller åndenød</p> <p>ubehag i overkroppen som stråler ut til rygg, kjeve, hals, arm og mage</p> <p>svette, kvalme, oppkast eller svimmelhet</p> <p>ekstrem svakhet, angst eller kortpustethet</p> <p>rask eller uregelmessig hjerterytme</p>	Hjerteinfarkt
plutselig svakhet eller nummenhet i ansikt, arm eller ben, spesielt på én side av kroppen	Slag

plutselig forvirring, problemer med å snakke eller forstå plutselig problemer med å se på ett eller begge øyne plutselig problemer med å gå, svimmelhet, tap av balanse eller koordinasjon plutselig, alvorlig eller langvarig hodepine uten kjent årsak nedsatt bevissthet eller besvimelse med eller uten epileptisk anfall Symptomene på et slag kan noen ganger vare kort og nesten umiddelbart og fullstendig gå over. Likevel bør du søke akutt medisinsk hjelp, da du kan ha risiko for å få et nytt slag.	
hevelse og lett blåfarging av en arm eller et ben alvorlig smerte i magen (akutt mage)	Blodpropp som blokkerer andre blodårer

BLODPROPPER I EN VENE

Hva kan det skje hvis det en blodpropp blir dannet i en vene?

- Bruken av fra kombinerte hormonelle prevensjonsmidler er i sammenheng brakt med en høyere risiko for blodpropper i en vene (venøs trombose). Disse bivirkninger kommer imidlertid sjelden for. Vanligvis oppstår de i løpet av første året at en kombinert hormonell prevensjonsmiddel blir brukt.
- Hvis det en blodpropp blir dannet i en vene i et ben eller fot, kan det en dyp venetrombose (DVT) forårsake forårsake.
- Hvis en blodpropp fra beinet blir ført med og i lungene havner, kan det en lungeemboli forårsake.
- Det er svært sjelden for at en blodpropp blir dannet i en vene i et annet organ, slik som øyet (venøsvenøs trombose i netthinnen).

Når er det risikoen for en blodpropp i en vene er høyest?

Risikoen for en en blodpropp i en vene å få er det høyest i det første året at en kvinne for første gang en kombinert hormonell prevensjonsmiddel brukt. Det risiko kan også økt være hvis du etter en avbrudd på 4 uker eller lengre igjen begynner med det bruk av en kombinert hormonell prevensjon (samme produkt, eller en annen produkt enn tidligere).

Etter det første året blir risikoen risiko mindre, men forblir noe høyere enn når du ikke kombinert hormonell prevensjon bruker.

Hvis du stopper med Marvelon, er din risiko for en blodpropp innen noen uker igjen normalt.

Hvordan høy er risikoen for en blodpropp?

Risikoen avhenger av av din naturlig risiko for VTE, og av typen kombinert hormonell prevensjon som du bruker.

Den generelle risikoen for en blodpropp i en ben eller lunge (dyp venøs trombose eller lungeemboli) med Marvelon er liten.

- Av hver 10.000 kvinner som ikke eneste kombinert hormonell prevensjonsmiddel bruke og ikke gravid være, får det omtrent 2 i en periode av et år en blodpropp.

- Av hver 10.000 kvinner som en kombinert hormonell prevensjon bruker som levonorgestrel, noretisteron eller norgestimant inneholder, får det omtrent 5-7 av en år en blodpropp.
- Av hver 10.000 kvinner som en kombinert hormonell prevensjon bruker som desogestrel inneholder, slik som Marvelon, får det omtrent mellom de 9 og 12 i et år en blodpropp.
- Risikoen for å få en blodpropp er avhengig av din personlige medisinske historie (se avsnittene ' Faktorer som din risiko for en blodpropp i en vene/arterie øke' nedenfor).

	Risiko for i et år å få en blodpropp
Kvinner som ikke kombinert hormonell pille/plaster/ring bruker og ikke er gravide	Omtrent 2 av hver 10.000 kvinner
Kvinner som en kombinasjonspille bruker som levonorgestrel, norethisteron eller norgestimant inneholder	Omtrent 5-7 av hver 10.000 kvinner
Kvinner som Marvelon bruker	Omtrent 9-12 av hver 10.000 kvinner

Faktorer som din risiko for en blodpropp i en vene øke

Det risiko for en blodpropp med Marvelon er liten, men det finnes visse omstendigheter som risiko øker. Din risiko er høyere:

- hvis du alvorlig overvekt har (BMI [body mass index] høyere enn 30 kg/m²)
- hvis en av dine nære familiemedlemmer i ung alder (for eksempel før det 50. år) en blodpropp har hatt i et ben, lunge eller annet organ. I det tilfellet kan du en arvelig koagulasjonsforstyrrelse har.
- hvis du en operasjon må gjennomgå, eller hvis du lang tid ikke på beina på grunn av en skade eller sykdom, eller hvis din benet i gips er. Det kan være nødvendig å før en operasjon, ellers når du er mindre mobil, noen noen uker å stoppe med bruk av Marvelon. Hvis du må stoppe med Marvelon, spør da din lege når du igjen kan begynne med bruk.
- hvis du eldre blir (spesielt spesielt over omtrent 35 år)
- hvis du i de siste få ukene født har.

Det risiko på en blodpropp øker etter hvert som det mer av disse omstendighetene gjelder for deg er ..

fly (lengre enn 4 deretter 4 time) kan din risiko for en blodpropp midlertidig øke, spesielt hvis det finnes noen andre av de nevnte omstendighetene på deg gjelder er.

Det er viktig at du din lege forteller hvis en eller flere av disse tilstandene på deg gjelder er, selv om du om dette tviler. Din lege kan bestemme at du må stoppe med bruk av Marvelon.

Hvis en av de ovenfor nevnte omstendigheter endrer seg mens du bruker Marvelon, (for eksempel hvis en nær slektning en blodpropp trombose)) får uten kjent årsak, eller hvis du mye i vekt øker, fortell dette da til legen din.

BLODPROPP I EN ARTERIE

Hva kan er skje hvis det en blodpropp blir dannet i en arterie?

Akkurat som en blodpropp i en vene, kan en blodpropp i en arterie alvorlige problemer forårsake. Det kan for eksempel en hjerteinfarkt eller en hjerneslag forårsake.

Faktorer som ditt risiko for en blodpropp i en arterie øker

Det er viktig at du vet at risikoen for en en hjerteinfarkt eller hjerneslag ved bruk av Marvelon svært liten er, men større kan bli:

- med økende alder (over omtrent 35 år)
- hvis du røyker. Hvis du en kombinert hormonell prevensjon som Marvelon bruker, anbefales at du slutter stopp med røyking. Hvis du ikke kan slutte med røyking og eldre er enn 35 år, kan din lege anbefale deg å bruke en annen type prevensjonsmiddel til bruke.
- hvis du overvekt har
- hvis du høyt blodtrykk har
- hvis et medlem av din nære familie på ung alder (før det 50. år) en hjerteinfarkt eller hjerneslag har hatt. I det tilfellet kan du også en økt risiko ha for en hjerteinfarkt eller hjerneslag å få.
- hvis du, eller et medlem av din nærmeste familie, en forhøyet fettinnhold i blodet har (kolesterol eller triglyserider)
- hvis du har migrene lider, spesielt migrene med aura
- hvis du en hjertesykdom har (hjerteklaffsykdom, eller en hjerterytmeforstyrrelse som atrieflimmer kalles)hvis
- du sukkersyke (diabetes) har ..

mer mer da en av disse tilstander på deg av anvendelse er, eller hvis en av disse sykdommer særlig alvorlig er, kan det risiko for få av en blodpropp selv enda videre økt være.

Hvis en av de ovenfor nevnte omstendigheter endrer seg mens du bruker Marvelon bruker, for eksempel hvis du begynner med røyking eller hvis en nær slektning en blodpropp (trombose) får uten kjent årsak, eller hvis du mye i vekt går opp, fortell dette da til legen din.

P-pillen og kreft Ved

Ved kvinner som bruker pillen bruker blir noe oftere brystkreft konstatert enn hos ikke-pillebrukere av samme alder. Ti år etter å ha sluttet med pillen er det ingen forskjell mer. Det er ikke kjent om dette forskjell blir forårsaket av pillen. Det kan også komme fordi pillebrukere grundigere og oftere blir undersøkt, slik at de brystkreft tidligere blir oppdaget.

I sjeldne tilfeller er hos pillebrukere godartede levertumorer funnet og i enda sjeldnere tilfeller ondartede levertumorer. Noen ganger har disse tumorene ført til en livstruende indre blødning. Skulle du plutselig få problemer med alvorlig magesmerte, da må du umiddelbart kontakte ta kontakt med din lege.

Kronisk infeksjon med humant papillomavirus er den viktigste risikofaktoren for å få livmorhalskreft . Hos kvinnensom bruker p-pillen over lengre tid kan tid bruke kan de sannsynligheten for å få fra livmorhalskreft lett økt er. Det er imidlertid ikke klart om dette blir

forårsaket av pillen, eller det det å lage har med seksuell atferd og andre faktorer (slik som bedre kontroll av livmorhalsen).

Psykiske lidelser

Noen kvinner som hormonelle prevensjonsmidler inkludert Marvelon bruker, har rapport gitt om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan alvorlig er og kan noen ganger til selvmordstanker lede. Hvis du humørsvingninger og symptomer på depresjon opplever, ta da så raskt som mulig kontakt med din lege for videre medisinsk råd.

Bruker du andre medisiner ?Bruker

du i tillegg til Marvelon andre medisiner eller urtepreparater av urtemedisiner, har du det nylig gjort eller skal du dette kanskje snart gjøre ?Fortell det da legen din, lege, apotek eller jordmor. Dette gjelder også for midler som du uten resept kan få. Fortell også til enhver annen lege eller tannlege (av apotek) som du en annen medisin foreskriver som du Marvelon bruker. De kan da fortelle om det nødvendig er en ekstra ikke-hormonell prevensjonsmiddel (for eksempel en kondom) å bruke og også hvor lenge du det må bruke eller det det bruk av et annet legemiddel som du trenger har, må endre.

Bruk Marvelon ikke hvis du har hepatitt C har i for dette medisiner med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir eller glecaprevir/pibrentasvir brukes, fordi dette en økning av en leverenzym (ALAT, en leverfunksjonsblodprøve) kan forårsake. Din lege vil en annen prevensjonsmiddel foreskrive før du begynner med denne behandlingen. Marvelon kan omtrent 2 uker etter slutten av denne behandlingen igjen bli startet. Se avsnitt 2 'Når kan du dette middel ikke bruke?').

Noen medisiner

- kan en påvirkning ha på blodnivåene av Marvelon
- kan Marvelon mindre effektiv gjøre for graviditet å forhindre
- kan uventede blødninger forårsake.

Disse inkluderer blant annet medisiner for behandling av: epilepsi

- (for eksempel for eksempel primidon, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, okskarbazepin, topiramet, felbamat)
- tuberkulose (for eksempel rifampicin, rifabutin)
- hiv-infeksjon (for eksempel ritonavir, nelfinavir, nevirapine, efavirenz)
- hepatitt C-virusinfeksjon (for eksempel boceprevir, telaprevir)
- andre infeksjoner (for eksempel griseofulvin)
- høyt blodtrykk i blodårene i lungene (bosentan)
- depressiv stemning (det urtepreparat johannesurt).

Hvis du medisiner eller urtepreparater bruker som kan gjøre Marvelon mindre effektiv kan gjøre, må du også en barriere-prevensjonsmetode bruke. Fordi effekten av en annen medisin på Marvelon kan vare i opptil 28 dager etter at seponering av den medisinen kan vedvare, må du som ekstra barriere-prevensjonsmetode i løpet av den tid fortsette å bruke.

Marvelon kan effekten av andre legemidler påvirke påvirkefor eksempel for eksempel:

- medisiner die ciklosporin inneholde
- det anti-epileptiske middel lamotrigin (dette kan føre til en økt antall anfall).

Laboratorieundersøkelser

Hvis det blodprøve ved du må bli gjort, fortell da din lege eller laboratoriepersonalet at du bruker pillen .. prevensjonsmidler kan nemlig nemlig de resultater av noen undersøkelser påvirke.

Graviditet og amming

Graviditet

Hvis du gravid er, eller tror at du gravid kan være er kan du Marvelon ikke bruke. Hvis du mistenker at du er gravid mens du bruker Marvelon , ta kontakt med legen din så snart som mulig .
Amming Det din lege.

Amming

Det bruk av Marvelon blir generelt ikke anbefalt så lenge en kvinne ammer . Hvis du pillenlikevel ønsker å bruke mens du fortsatt er ennå amming gir, kan du det beste kontakt ta opp med din lege.

Kjøreevne og bruk av maskiner

Det er ingen indikasjoner at de kjøreferdigheter og evnen til å bruke maskiner kan påvirkes .
Marvelon.

laktose Hvis legen din

har fortalt deg det fortalt at du bestemte sukkerarter ikke tåler, ta kontakt med din lege før du dette legemidlet tar.

Barn og ungdom opp til 18 år

Det er ingen klinisk informasjon om effektiviteten og sikkerheten hos ungdom under 18 år.

Når bør du kontakte legen under det bruk av dette legemidlet?

3. Hvordan tar du dette legemidlet inn?

Ta dette legemidlet alltid inn akkurat som legen din lege apotek du det har fortalt. Tviler du på riktige bruk? Ta da kontakt med din lege eller apotek.

Når og hvordan tar u de tablettene inn?

Stripen inneholder 21 tabletter. Ved hver tablett er angitt på hvilken dag denne skal tas inntas. Ta den tabletter hver dag omtrent på samme tid inn, om nødvendig med litt vann. Følg retningen av pilen som er på stripen angitt til du har tatt alle 21 tabletter har tatt inntatt. Deretter tar du 7 dager ingen tablett. I løpet av disse 7 dager skal en blødning begynne (den såkalte

bortfallsblødningen).). Denne begynner vanligvis på den 2. eller 3. dag etter den siste Marvelon-tabletten. Begynn på den 8. dag med den neste stripen, uavhengig om blødningen da allerede er over eller ikke. Dit betyr at du alltid på samme dag i uken med en neste brett begynner, og også at uttreksblødningen hver måned omtrent omtrent på samme dager faller.

Når å begynne med den første stripen

Du har den siste måneden ikke p-pille brukt.

Begynn med Marvelon på første dag av syklusen (den første dag av din menstruasjon). Marvelon virker i dette tilfellet umiddelbart og du trenger ikke ingen ekstra prevensjonsmiddel å bruke.

Du kan også på dag 2-5 i syklusen begynne men da må du i de første 7 dagene ja en ekstra prevensjonsmiddel (for eksempel en kondom) bruke.

Overgang fra en annen kombinasjonspille, vaginal ring eller prevensjonsplaster

Du kan med Marvelon begynne på dagen etter du har tatt siste tablett av din forrige pille har tatt (altså uten pause). Hvis det ved din forrige pille også ikke-virksomme tabletter i stripen sitter, må du umiddelbart fortsette etter den siste virksomme tablett av din forrige pille (hvis du ikke vet hvilken det er, spør da til din lege eller apotek). Du kan også starte senere, men aldri senere enn på dag etter slutten av den tablettfrie perioden av din forrige pille (eller etter den siste ikke-virksomme tablett av din forrige pille).

Hvis du bytter fra en vaginal ring eller prevensjonsplaster kan du begynne med Marvelon på den dagen for fjerning av ringen eller det siste plasteret. Du kan også senere begynne, men du må på sin siste syv dager etter fjerning av ringen eller siste plaster med Marvelon begynne ..

du pillen pille, plaster eller ring fullstendig i henhold til de forskriftene har brukt og du er sikker på at du ikke gravid er, kan du dessuten stoppe med å ta av pillen eller ringen eller plasteret fjerne på hver dag av din nåværende syklus og umiddelbart bytte til bruk av Marvelon.

Hvis du disse instruksjonene følger er det ikke nødvendig et ekstra prevensjonsmiddel (for eksempel et kondom) å bruke.

Overgang fra en gestagenpille (minipille)

Du kan fra den ene til den andre dag bytte til Marvelon, men du må den første 7 dager vel en ekstra prevensjonsmiddel (for eksempel en kondom) bruke.

Overgang fra sprøyteprevensjon, et implantat eller en hormonholdig spiral

Begynn med Marvelon når du ellers den neste injeksjon ville få eller på den dagen hvorpå det implantat eller hormonholdig spiral blir fjernet. Du må den første 7 dager imidlertid må en ekstra prevensjonsmiddel (for eksempel en kondom) bruke.

Etter en fødsel

Hvis du nettopp har født , vil din lege sannsynligvis anbefale å vente til din første spontane menstruasjon , mennoen ganger noen ganger er det mulig tidligere å begynne. Følg rådet fra legen din. Det gjelder også for tilfelle du ammer du amming gir en de pille ønsker bruke.

Etter en spontanabort eller abort

Følg rådet fra legen din .

Har du for mye av dette legemidlet inntatt?

Det finnes ingen rapporter av alvorlige skadelige konsekvenser av å inntak av mange Marvelon tabletter samtidig. Hvis du har tatt tabletter samtidig, kan du muligens oppleve ubehag som kvalme, oppkast eller kaste opp av vaginal blodtap. Skulle du oppdage at et barn Marvelon har inntatt, spør da din lege om råd.

Hva å gjøre ...

...ved det å glemme av tabletter

Hvis du **mindre enn 12 timer for sent** er med det å ta av en tablett da er den virkning av den pillen ikke redusert. Ta den tablett da likevel så snart du tenker på det og ta de neste tablettene igjen til vanlig tid.

Hvis du **mer enn 12 timer for sent** er med å ta en tablett, kan virkningen av pillen være redusert. Jo flere tabletter du har glemt på rad, desto større blir sjansen for at virkningen av den pillen redusert er. Den sannsynligheten for utilstrekkelig beskyttelse mot graviditet er størst hvis tabletter blir glemt i begynnelsen eller slutten av stripen. Derfor gjelder følgende regler (se også skjemaet):

Mer enn 1 tablett glemt i en stripe

Ta kontakt med med din lege.

1 glemt tablett i uke 1

Ta den glemte tablett så snart du husker det, selv om det betyr at du må ta to tabletter på samme tidspunkt må ta. Ta videre tablettene igjen på den vanlige tiden tid i, men du må også bruke ekstra prevensjon i 7 dager. Hvis du har hatt sex i uken før du glemte pillen, må du være oppmerksom på risikoen for graviditet. Kontakt legen din umiddelbart i så fall.

1 tablett glemt i uke 2

Ta den glemte tablett så snart du husker det, selv om det betyr at du må ta to tabletter på samme tidspunkt må ta. Fortsett å ta tablettene som vanlig . vanlig tid inn. De effekten av pillen er ikke redusert, du trenger ikke å bruke ekstra prevensjonsmidler.

1 tablett glemt i uke 3

Du kan velge mellom 2 muligheter uten ekstra prevensjonsmidler å trenger bruke.

1. Ta den glemte tablett så snart du tenker på det, også hvis dette betyr at du må ta to tabletter samtidig. Fortsett å ta tablettene til vanlig tid. **Hopp over den tablettfrie perioden** og fortsett med neste brett. Mest sannsynlig får du først på slutten av den andre brettet en ekte abstinensblødning, men du kan oppleve spotting eller gjennombruddsblødning under den andre stripen.
2. Du kan også stoppe med den aktuelle stripen. Du holder en tablettfri periode på 7 dager eller mindre på (**tel alltid alltid dagen med som du tablett har glemt**). **Deretter** går Deretter går u vanlig

videre med neste brett.

Hvis du følger denne metoden, kan du alltid begynne på nytt brett på din faste startdag.

Hvis du har glemt tabletter i et brett og ikke får en blødning i den første normale

tablettfrie perioden, kan det bety at du er gravid. Du må kontakte legen din før du fortsetter med neste brett.

... i tilfelle mage- og/eller tarmforstyrrelser (for eksempel oppkast, alvorlig diaré)
Hvis du kaster opp, eller har alvorlig diaré, er det en sjanse for at de aktive stoffene ikke er fullstendig absorbert i kroppen. Hvis du må kaste opp innen 3-4 timer etter å ha tatt en tablett, er denne situasjonen derfor sammenlignbar med å ha glemt en tablett. Følg derfor samme råd som angitt ovenfor for glemte tabletter i tilfelle oppkast. Hvis du har alvorlig diaré, kontakt legen din.

... hvis du ønsker å utsette menstruasjonen din en gang
Det er mulig å utsette menstruasjonen, selv om det ikke anbefales. I unntakstilfeller kan du utsette menstruasjonen ved å fortsette med et nytt brett Marvelon uten tablettfri periode. Du kan fortsette med dette brettet til alle tablettene er brukt opp eller stoppe tidligere hvis ønskelig. Du kan oppleve gjennombruddsblødning eller spotting mens du bruker dette andre brettet. Etter den vanlige tablettfrie perioden på 7 dager begynner du igjen med neste brett.

... hvis du vil endre startdagen for menstruasjonen din

Hvis du tar tablettene dine i henhold til instruksjonene, vil menstruasjonen din alltid begynne omtrent på samme dag. Hvis du vil endre denne dagen, kan du gjøre det ved å forkorte den normale tablettfrie perioden mellom to brett (men aldri forlenge den). For eksempel, hvis menstruasjonen din normalt begynner på en fredag og du vil endre det til tirsdag (3 dager tidligere), må du nå begynne med det nye brettet 3 dager tidligere enn vanlig. Hvis du gjør den tablettfrie perioden veldig kort (for eksempel 3 dager eller mindre), kan det hende at du ikke får en blødning i denne tablettfrie perioden. Du kan da oppleve gjennombruddsblødning eller spotting i løpet av neste brett.

... ved uventet blødning

Med alle p-piller kan det i løpet av de første månedene noen ganger oppstå uventet blødning (spotting eller gjennombruddsblødning). Du kan da kanskje ikke klare deg uten bind eller tampong. Fortsett uansett å ta tablettene dine som vanlig. Den uregelmessige blødningen stopper vanligvis når kroppen din har blitt vant til den aktuelle pillen (etter omtrent 3 brett). Hvis det varer lenger, blir verre eller begynner igjen, må du kontakte legen din.

... hvis den forventede blødningen uteblir

Hvis du har tatt alle tablettene riktig, ikke har hatt oppkast og/eller diaré, og heller ikke har brukt andre medisiner, er det svært usannsynlig at du er gravid. Du kan trygt

fortsette med neste brett.

Hvis den forventede blødningen imidlertid uteblir to ganger på rad, kan du være gravid. Kontakt legen din umiddelbart. Ikke fortsett med neste brett Marvelon før legen din har bekreftet at du ikke er gravid.

Hvis du stopper med det ta av dette legemidlet

Du kan med Marvelon slutte når du vil. Hvis du ikke gravid vil bli, spør da legen din om råd med hensyn til andre pålitelige metoder for prevensjon.

Hvis du slutter fordi du ønsker å bli gravid, blir vanligvis generelt anbefalt å vente til du har hatt en naturlig menstruasjon før du prøver å bli gravid . Du kan. U kan da enklere beregne når den fødselen vil finne sted.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan også dette legemidlet bivirkninger ha. Ikke alle får med det å gjøre. Får du en bivirkning, spesielt hvis den alvorlig av karakter er og lang vedvarer, eller oppstår det en endring i din helsetilstand som du tror at den forårsaket kan bli av Marvelon? Ta da kontakt med din arts.

Alle kvinner som kombinerte hormonelle prevensjonsmidler bruker har en høyere risiko for blodpropper i venene (venøs tromboembolisme [VTE]) eller blodpropper i arteriene (arteriell trombo- emboli [ATE]). Se for mer informasjon om de forskjellige risikoene ved bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler rubrikk 2 'Når kan du dette legemidlet ikke bruke eller må du være ekstra forsiktig med være?'

Ta umiddelbart kontakt med din lege hvis du symptomer på angio-ødem får slik som hevelse av ditt ansikt, tunge og/eller hals og/eller vanskeligheter med å svelge av elveblest mulig med pusteproblemer (se avsnitt 2 'Når må du ekstra forsiktig være med denne medisinen?').

Som ved alle kombinasjonspiller, kan din menstruasjonsmønster endre, spesielt under de første månedene av bruk. Denne forskjellen kan ligge i hvordan ofte du en blødning får (uteblitt av blødning, mindre ofte, oftere eller kontinuerlig), hvor alvorlig blødningen er, eller er, eller hvor lenge de blødningen varer.

Ofte (forekommer hos mindre enn 1 av 10 kvinner)depressive

- stemninger ,humørsvingninger hodepine
- kvalme
- kvalmemagesmerter magesmerter
- sensitive bryst, smertefulle bryst
- vektøkning.

Noen ganger (forekommer hos mindre enn 1 av 100 kvinner)væskeansamling

- mindre lyst til
- mindre lyst til å ha samleie migrene
- kaste opp
- kaste opp, diaré
- hudutslett, elveblest (urtikaria)

- forstørrelse av brystene.

Sjelden (forekommer hos mindre enn 1 av 1000 kvinner))

- skadelige blodpropper i en vene eller arterie, for eksempel:
 - o i et ben eller fot (for eksempel dyp venetrombose))
 - o i en lunge (for eksempel lungeemboli)
 - o hjerteinfarkt
 - o slag
 - o 'lite slag' eller midlertidige symptomer som ved et slag, kjent som TIA (transitorisk iskemisk anfall)
 - o blodpropper i leveren, magetarmen, nyrer eller øyne. Risikoen for en blodpropp blodpropp få er større større hvis det andre omstendigheter på deg som gjelder er som dette risiko øker (se avsnitt 2 for mer informasjon om de omstendighetene som øker risikoen for blodpropper øker og symptomene på en blodpropp).overfølsomhetsreaksjoner
- mer
- lyst til å ha samleie irritasjon
- av øynene øyne ved bruk av kontaktlinser smertefulle
- ,blårøde knuter i huden (erythema nodosum), hudutslett med ujevne røde flekker eller sår (erythema multiforme) sår (erythema multiforme)
- utflod ut de brystvorte, endring i utflod ut skjeden
- vekttap.

Det rapportere av bivirkninger

Får du bivirkninger , ta kontakt med, ta kontakt med din lege eller apotek. Dette gjelder også for bivirkninger som ikke i denne pakningsvedlegget står. Du kan bivirkninger også rapportere via Norsk Bivirkninger Senter Lareb, nettside: www.lareb.nl. Ved bivirkninger å rapportere, hjelper du oss med mer informasjon å få om sikkerheten til denne medisinen.

5. Hvordan oppbevarer du denne medisinen?

Utenfor synet og rekkevidde av barn holde.

Bruk denne medisinen ikke lenger etter den siste holdbarhetsdato. Den finner du på esken og blisterstrimmelen etter EXP. Der står en måned og et år . Den. De siste dag av den måneden er siste holdbarhetsdato.

Oppbevares under 30 °C. Ikke i fryseren oppbevares.

Oppbevares i original blisterpakning ter beskyttelse mot lys og fuktighet.

Ta denne medisinen ikke hvis du for eksempel ser at tablettene er misfarget misfarget av knust er eller når du andre synlige tegn på forringelse i kvalitet merker.

Skyll medisiner ikke i vasken eller wc og kast dem ikke i søppelbøtta. Spør din apotek hva du skal gjøre med medisiner må gjøre som du ikke lenger bruker. Hvis du medisiner på den riktige måten kaster blir de på en riktig måte destruert og kommer de ikke i miljøet til.

6. Innhold av emballasjen og annen informasjon

Hvilke stoffer finnes det i denne medisinen?

- De virkestoffene i denne medisinen er desogestrel desogestrel (150 mikrogram) og etinyløstradiol (30 mikrogram).
- De andre stoffene i denne medisinen er vannfri kolloidal silisiumdioksid, laktosemonohydrat, potetstivelse, povidon, stearinsyre, all-rac-alfa-tokoferol.

Hvordan ser Marvelon ut og hva inneholder en pakning?

Pakningen inneholder 1, 3 eller 6 1, 3 eller 6 blisterstrimler med 21 tabletter.

Ikke alle nevnte pakningsstørrelser blir i handelen brakt.

Tablettene er hvite, runde ,på til begge sider konveks og har en diameter på 6 mm.

På den ene siden står 'TR' over '5' og på den andre siden 'Organon' en en femkantet stjerne.

Innehaver av tillatelsen for markedsføring av legemidlet og produsent

N.V. Organon Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Nederland

Tlf.: 00800 66550123 (+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

I registeret innskrevet under: RVG 08859

Denne pakningsvedlegget er for den sist godkjent i mai 2025