

Ulotka: informacje dla użytkownika użytkownika
Marvelon, tabletki
dezogestrel, etynyloestradiol

Ważne rzeczy które musisz wiedzieć o złożonych hormonalnych antykoncepcyjnych środkach
środki:

- Te środki stanowią jedną z najbardziej wiarygodnych odwracalnych metod antykoncepcyjnych metody antykoncepcyjne jeśli prawidłowo stosowane ..
- zapewniają pewną nieco coś wyższe ryzyko wystąpienia powstania z zakrzepu krwi (zakrzepica) w żyłach i tętnicach, szczególnie w pierwszym roku gdy stosujesz jeden złożony hormonalny środek antykoncepcyjny używany lub jeśli Pan/Pani po jednej przerwie 4 tygodni lub dłużej ponownie zaczyna stosowanie użycie z jeden złożony hormonalny środek antykoncepcyjny.
- Uwaga dobrze na i skontaktuj się z swoim lekarzem jeśli myślisz że możesz mieć możliwe objawy z jeden zakrzep ma (patrz punkt 2 'Zakrzepcy (zakrzepica)').

Przeczytaj dokładnie całą ulotkę zanim przyjmiesz ten lek zaczniesz przyjmować ponieważ znajduje się ważne informacje w dla Ciebie.

- Zachowaj tę ulotkę. Może będziesz jej potrzebować ponownie później.
- Czy masz jeszcze pytania? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.
- Nie podawaj tego leku nie innym osobom , ponieważ jest on przeznaczony tylko dla Ciebie przepisany. Może być szkodliwy są dla innych, nawet jeśli mają oni te same dolegliwości co ty.
- Czy odczuwasz jedną z działań niepożądanych wymienionych w sekcji 4 występuje? Lub otrzymujesz Pan/Pani efekt uboczny który nie w tej ulotce występuje? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.

Spis treści z ten ulotka

1. Co to jest Marvelon i do czego jest ten lek stosowany?
2. Kiedy nie wolno tego leku używać lub należy zachować szczególną ostrożność ze są?
3. Jak przyjmować Pan/Pani ten lek ?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Pan/Pani ten lek?
6. Zawartość opakowania opakowanie en pozostałe informacje

1. Co to jest Marvelon en do czego jest ten lek stosowany?

Skład en typ tabletki

Marvelon to złożona doustna tabletki antykoncepcyjna (de 'pigulka złożona'). Każda tabletki zawiera małą ilość dwóch różnych żeńskich hormonów ,mianowicie dezogestrel dezogestrel hormono działaniu podobnym do progesteronu progesteronopodobne działanie) en etynyloestradiol (jeden hormon z działaniem estrogenowym).Ze względu na małą ilość hormonów ilość uważa się, żeMarvelon jest uważany za rozważany jako jeden niskodawkowy antykoncepcyjny. Ponieważ oba hormony we wszystkich tabletkach w pasku w tej samej ilości połączone są, jest to jednofazowy -- pigulka złożona nazywany.

Do czego jest ten lek używany?

Marvelon jest używany aby zapobiegać ciąży zapobiegać ..
jest przyjmowany przyjęty (bez że tabletki są zapomniane) jest szansa na zajście w ciążę bardzo mała.

2. Kiedy nie wolno tego leku przyjmować używać lub musisz być dodatkowo ostrożny z tym być?

Ogólne uwagi

Przeczytaj zanim zaczniesz używać Marvelon, użycie Marvelon, informacje o zakrzepach krwi (zakrzepica) w sekcji 2. Jest szczególnie ważne aby przeczytać co to za objawy są zakrzepu – patrz sekcja 2 ' zobacz rubryka 2 'Zakrzepy krwi (zakrzepica)'.
W tej ulotce opisano kilka sytuacji w których należy przestać stosować tabletkę lub używanie pigułki lub z w którym de wiarygodność leku tabletki zmniejszona może być. W takich sytuacjach należy się powstrzymać od stosunków seksualnych lub użyć innego uzupełniający środek antykoncepcyjny bez hormonów używać, na przykład prezerwatywa lub inny barierowy środek antykoncepcyjny . Nie stosuj metody kalendarzowej - lub metody temperaturowej. metoda termiczna. Te metody mogą być niewiarygodne ponieważ ponieważ pigułka wpływa na ma normalne zmiany zmiany temperatury ciała temperatura ciała w błonę śluzową macicy podczas podczas de cykl menstruacyjny.

Marvelon oferuje tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne nie zapewnia przed zakażeniem HIV- infekcją (AIDS) lub innymi seksualnie przenoszonymi choroby (choroby przenoszone drogą płciową).

Marvelon oferuje tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne nie zapewnia przed zakażeniem HIV- infekcją (AIDS) lub innymi seksualnie przenoszonymi choroby (choroby przenoszone drogą płciową).

Kiedy nie wolno tego leku używać ? Nie wolno

tego leku używać jeśli masz jedną z tych chorób poniżej wymienione choroby ma. Jeśli jeden z poniżej wymienionych chorób ma, powiedz to wtedy swojemu lekarzowi. Twój lekarz będzie z tobą omawiać które inne forma antykoncepcji antykoncepcji bardziej odpowiednia jest dla ciebie. Zobacz również sekcję sekcję 'Kiedy musisz dodatkowo ostrożnie są z tym lekiem?'.
• Pan ma zakrzep zakrzep naczyń krwionośnym nogi (zakrzepica żył głębokich , DVT), de żyły głębokiej, płuca (zatorowość płucna) lub inny organ , lub miałeś to w przeszłości miałeś ..
• że masz zaburzenie u jeden zaburzenie ma z twoje krzepnięcie krwi – na przykład białko C-niedobór, białko S- niedobór, antytrombina-III-niedobór, czynnik V-Leiden lub przeciwciała przeciw fosfolipidy.
• U musi być operowany lub jesteś przez długi czas nie na nogach (patrz punkt 'Zakrzepy krwi (zakrzepica)').
• U ma kiedykolwiek zawał serca lub udar mózgu miał.
• Pan/Pani ma dusznicę bolesną (choroba która silny ból w klatce piersiowej powoduje powoduje en een pierwszy objaw z zawału serca może być) lub przemijający atak niedokrwienny (TIA: przemijające objawy udaru mózgu) lubu ma to kiedykolwiek miał.
• Pan/Pani ma jedną z następujących chorób, które zwiększają ryzyko zakrzepu zakrzep Państwa tętnicach mogą mogą zwiększać:
- poważne cukrzyca z uszkodzenie naczyń krwionośnych -
- podwyższone ciśnienie krwi -

- Pan ma zakrzep zakrzep naczyń krwionośnym nogi (zakrzepica żył głębokich , DVT), de żyły głębokiej, płuca (zatorowość płucna) lub inny organ , lub miałeś to w przeszłości miałeś ..
- że masz zaburzenie u jeden zaburzenie ma z twoje krzepnięcie krwi – na przykład białko C-niedobór, białko S- niedobór, antytrombina-III-niedobór, czynnik V-Leiden lub przeciwciała przeciw fosfolipidy.
- U musi być operowany lub jesteś przez długi czas nie na nogach (patrz punkt 'Zakrzepy krwi (zakrzepica)').
- U ma kiedykolwiek zawał serca lub udar mózgu miał.
- Pan/Pani ma dusznicę bolesną (choroba która silny ból w klatce piersiowej powoduje powoduje en een pierwszy objaw z zawału serca może być) lub przemijający atak niedokrwienny (TIA: przemijające objawy udaru mózgu) lubu ma to kiedykolwiek miał.
- Pan/Pani ma jedną z następujących chorób, które zwiększają ryzyko zakrzepu zakrzep Państwa tętnicach mogą mogą zwiększać:
 - poważne cukrzyca z uszkodzenie naczyń krwionośnych -
 - podwyższone ciśnienie krwi -

- poważnie podwyższony poziom tłuszczów we twojej krwi (cholesterol z triglicerydy)
- jeden schorzenie które hiperhomocysteinemia jest nazywane.
- Pan/Pani ma jeden typ migreny który 'migrena z aurą' jest nazywany (lub ma to kiedykolwiek miał).
- Pan ma zapalenie trzustki (zapalenie trzustki) lub mato miał , w połączeniu z zapalenie z jeden wysoki poziom tłuszczu w twojej krwi.
- Masz żółtaczkę (żółte zabarwienie skóry lub oczu) lub ciężką chorobę wątroby poważne choroba wątroby z ma to miał, i w wyniki testów funkcji wątroby są jeszcze nie normalne.
- Pan/Pani ma postać formy z rak lub miał to przeszedł który wrażliwy może być na hormony płciowe (takie jak rak piersi lub rak narządów płciowych).
- Pan/Pani ma rak wątroby lub ma to miał.
- Pan ma nietypowe krwawienia z pochwy których przyczyna nie została ustalona ustalony.
- U ma nietypowe zgrubienie błony śluzowej macicy endometrium.
- uczulony na jeden z składników tego leku . Te. Ta substancje możesz Pan/Pani znaleźć w sekcji 6 tej tej ulotki.

Jeśli jedna z wymienionych sytuacji wystąpi podczas gdy już używasz Marvelon , należy musi u natychmiast przerwać z używaniem i skontaktować się z swoim lekarzem. Stosować w międzyczasie inną , nie- hormonalną- hormonalne metoda van antykoncepcji. Zobacz także 'Ogólne uwagi' na początku sekcji 2.

Nie używaj Marvelon jeśli masz wirusowe zapalenie wątroby typu C ma en do tego leki z ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir lub glecaprevir/pibrentasvir stosowane (patrz również sekcja 2 'Stosowane u jeszcze inne leki?').

Kiedy musisz u dodatkowo ostrożny być z tym lekiem?

Kiedy musisz u kontakt nawiązać z swoim lekarza?

Wezwij natę medyczną pomoc w

- jeśli masz możliwe objawy lub symptomy zakrzepu krwi zauważysz , któremogą oznaczać że że u cierpi na zakrzep krwi w twojej nodze (t.j.. zakrzepica żył głębokich), zakrzep krwi w twoich płucach (t.j. zatorowość płucna), jeden zawał serca lub jeden udar (patrz poniżej sekcja rozdział 'Zakrzepy krwi (zakrzepica)').

Idź do jeden opis objawów dolegliwości lub symptomów tych tych poważnych działań niepożądanych do 'Jak rozpoznać Pan jeden zakrzep?'

Powiedz to swojemu lekarz, jeśli jeden z następujących sytuacji dotyczy ciebie .

Jeśli schorzenie występuje lub pogarsza się, podczas stosowania Marvelon ,należy musi u to też do twojego lekarza powiedzieć.

- Ty palisz.
- Ty masz cukrzycę.
- Jesteś bardzo zbyt ciężki.

- U ma podwyższone ciśnienie krwi.
- U ma chorobę zastawek serca lub określone zaburzenie rytmu serca.
- U ma podwyższone zapalenie w żyłach tuż pod skórą (powierzchniowe zakrzepowe zapalenie żył). Masz
- żylaki . Ktoś.
- Twojej bliskiej rodzinie bezpośrednio rodzina ma kiedykolwiek zakrzepicę, zawał serca lub udar mózgu miał.
- Masz migrenę. Masz
- padaczkę . Masz.
- . Masz podwyższone poziomy tłuszczów w Twojej krwi (hipertriglicerydemia), lub to schorzenie występuje w Twojej rodzinie lub występowało w Twojej rodzinie wcześniej wystąpiło. Hipertriglicerydemia jest w związku z większym ryzykiem ryzyko zapalenia trzustki) otrzymać trzustka Powinieneś być monitorowany.
- Musisz być monitorowany operowany lub jesteś przez długi czas nie na nogach (patrz 'Zakrzepy (zakrzepica)' w sekcji 2).
- Jeśli niedawno urodziłaś , masz u jeden zwiększone ryzyko wystąpienia powstawania z zakrzepów krwi. Zapytaj swojego lekarza, jak szybko po porodzie możesz u zacząć zacząć z użycie Marvelon.
- Masz ktoś w twojej bliskiej rodzinie kto miał raka piersi . Masz.
- wątroby lub pęcherzyka żółciowego jeden choroba wątroby lub z pęcherzyk żółciowy.
- U ma de chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego ulcerosa (przewlekłą chorobę jelit).
- U ma układowy toczeń rumieniowaty (SLE - chorobę chorobę która twój naturalny układ odpornościowy uszkadza).
- U ma hemolityczno-mocznicy zespół (HUS - zaburzenie krzepnięcia krwi które niewydolność nerek powoduje).U
- ma anemię sierpowatą anemia sierpowata (jeden dziedziczna choroba czerwonych krwinek).
- Pan ma jeden schorzenie które po raz pierwszy pojawiło się lub pogorszyło się podczas ciąży podczas jeden ciąża z przy wcześniejszym użyciu hormonów płciowych hormony płciowe, na przykład utrata słuchu, porfiria (choroba krwi), opryszczka ciążowa (wysypka z pęcherzami podczas ciąży ciąży) lub płasawica Sydenhama (choroba neurologiczna w której nagłe ruchy ciała ciała występują).
- Masz objawy obrzęku naczynioruchowego takie jak obrzęk obrzęk z twojej twarzy, języka i/lub gardła i/lub trudności w przełykaniu lub pokrywka możliwe z problemami z oddychaniem . Skontaktuj się w takim przypadku z przypadkiem bezpośredni kontakt z twoim lekarzem. Produkty z estrogenami mogą objawy dziedzicznego i nabytego obrzęku naczynioruchowego powodować lub pogarszać . Ty.
- U ma ostudę lub ma kiedykolwiek ostudę miał (żółto-brązowe plamy pigmentacyjne, tak zwane 'plamy ciążowe', zwłaszcza na twarzy); jeśli to to

przypadek jest, jest to rozsądne aby bezpośrednio narażenie na światło słoneczne lub ultrafioletowe światło unikać ..

antykonieczny i zakrzepy krwi skrzepy krwi zakrzepicazakrzepica)

SKRZEPY KRWI (ZAKRZEPICA)

Jeśli stosujesz złożony hormonalny środek antykoncepcyjny taki jak Marvelon używasz, masz wyższe ryzyko wystąpienia skrzepu krwi jeśli stosujesz go otrzymać wtedy jeśli Pan/i nie złożony hormonalny środek antykoncepcyjny stosuje. W rzadko występujących przypadkach może zakrzep naczynie krwionośne zablokować naczynie krwionośne zablokować i poważne problemy powodować. Zakrzepy krwi mogą powstawać

- w żyłach (to nazywa się 'zakrzepica żylna', 'żylna choroba zakrzepowo-zatorowa' lub VTE nazywane)
- w tętnicach (to nazywa się 'tętnicza zakrzepica', 'tętnicza zakrzepowo-zatorowa' lub ATE nazywane).

Nie zawsze dochodzi się do pełnego zdrowia z zakrzepów krwi. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić długotrwałe poważne skutki, lub w bardzo rzadkich przypadkach mogą zakrzepy krwi być śmiertelne zakrzepy krwi śmiertelny są.

To jest ważne że Pan/Pani wie że ogólne ryzyko wystąpienia szkodliwego zakrzepu przez Marvelon małe jest. JAK ROZPOZNAĆ ZAKRZEP? Skontaktuj się

JAK ROZPOZNAĆ SKRZEP KRWI?

Przełącz natychmiast na pomoc medyczną jeśli masz jeden z następujących objawów lub symptomów zauważysz.

Czy masz jeden z tych objawów lub objawy?	Gdzie możesz cierpieć? na cierpieć?
obrzęk nogi lub wzdłuż żyły w nodze lub stopie, zwłaszcza jeśli towarzyszy temu: ból lub wrażliwość nogi tej nogi, którą możesz odczuwać tylko podczas stania lub chodzenia podwyższona temperatura w dotkniętej nodze zmiana koloru skóry tej nogi skóry tej to noga, na przykład staje się biała, czerwona lub niebieska	Głęboka żylna zakrzepica
nagła niewyjaśniona duszność lub szybkie oddychanie nagły kaszel bez wyraźnej przyczyny, przy którym możesz odkrztuszać krew ostry ból w klatce piersiowej, który może się pogorszyć gdy głęboko oddychasz poważne uczucie lekkości w głowie lub zawroty głowy zawroty głowy szybkie lub nieregularne tętno silny ból w Twoim żołądku	Objawy

<p>Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem, ponieważ jeden lekarz, chceć niektóre z tych objawów, takich jak kaszel lub duszność, mogą być niesłusznie być ponieważ dla łżejszego schorzenia, takiego jak infekcja dróg oddechowych (na przykład przeziębienie). Zatorowość płucna</p>	
<p>występują zwykle w jednym oku pojawiają się: natychmiast natychmiast utrata widzenia wzroku, lub bezbolesne zamazane widzenie, co może się rozwinąć do utraty widzenia w Żylna zakrzepica w siatkówce</p>	<p>(zakrzep zakrzep oku to oko)</p>
<p>Czy masz któryś z tych objawów lub dolegliwości?</p>	<p>Na co możesz cierpieć?</p>
<p>wzrok</p>	
<p>ból, dyskomfort, ucisk lub uczucie ciężkości, ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub pod mostkiem uczucie pełności, niestrawność lub duszność dyskomfort w górnej części ciała promieniujący do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy skrajna słabość, lęk lub duszność szybkie lub nieregularne bicie serca</p>	<p>Zawał serca</p>
<p>nagła słabość lub drętwienie twarzy, ramienia lub nogi, zwłaszcza po jednej stronie ciała nagłe zamieszanie, trudności w mówieniu lub rozumieniu nagłe trudności z widzeniem w jednym lub obu oczach nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji nagły, silny lub długotrwały ból głowy bez znanej przyczyny zmniejszona świadomość lub omdlenie z lub bez napadu padaczkowego Objawy udaru mogą czasami trwać krótko i niemal natychmiast i całkowicie ustąpić. Mimo to należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia kolejnego udaru.</p>	<p>Udar</p>
<p>obrzęk i lekkie zasinienie ramienia lub nogi silny ból w brzuchu (ostry brzuch)</p>	<p>Zakrzep krwi, który zatyka inne naczynia krwionośne</p>

ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się stać jeśli się zakrzep krwi tworzy w żyłach? Stosowanie leku

- może prowadzić do złożone hormonalne środki antykoncepcyjne jest w związku z wyższym ryzykiem zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). To jest związane z działaniem niepożądane występują jednak rzadko się. Zazwyczaj pojawiają się w pierwszym roku gdy jest złożony hormonalny środek antykoncepcyjny jest stosowany.
- Jeśli jakiś zakrzep jest utworzony w żyłę w nodze lub stopie, może to głęboką żylną zakrzepicę (DVT) powodować. powodować.
- Jeśli jeden zakrzep krwi z nogi zostanie przeniesiony i do płuca trafi, może to spowodować zatorowość płucną powodować.
- zdarza się bardzo bardzo rzadko dla że jeden zakrzep jest utworzony w żyła w inny organ, takie jakoko (żylna oko (żylna zakrzepica w siatkówce).

Kiedy jest ryzyko zakrzepu krwi zakrzep żyły jest najwyższe? Ryzyko zakrzepu krwi w żyły jeden zakrzep w żyła żyła dostać jest najwyższe w pierwszym roku że kobieta po raz pierwszy stosuje złożony hormonalny po raz pierwszy hormonalny antykoncepcyjny używany. Het ryzyko może również być zwiększone być jeśli u po przerwie przerwanie tygodni lub dłużej ponownie zaczyna z antykoncepcyjnym użycie z jednego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego (tego samego produktu, lub innego produktu niż wcześniej). Po pierwszym roku ryzyko się zmniejsza. mniejszy, ale pozostaje nieco wyższy niż gdy nie stosujesz złożone hormonalne środki antykoncepcyjne ..
przestaniesz stosować Marvelon, twoje ryzyko wystąpienia na jeden zakrzep wewnątrz kilka tygodni znowu normalny.

Jak wysokie jest ryzyko wystąpienia jednego zakrzepu?

Ryzyko zależy od af z twojego naturalnego ryzyka na ŻChZZ, i od rodzaju złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego który używasz stosujesz.

Ogólne całkowite ryzyko wystąpienia zakrzepu krwi w jeden noga lub płuco (głębokiej żylniej zakrzepicy lub zatorowość płucna) z Marvelon jest małe.

- Na każde 10.000 kobiet które nie żaden złożony hormonalny antykoncepcyjny używać i nie być w ciąży, otrzymać około 2 w okresie roku jeden okres z jeden rok jeden zakrzep krwi.
- Z każda 10.000 kobiet które stosują złożony hormonalny środek antykoncepcyjny używają który levonorgestrel, noretysteron lub norgestimát zawiera, otrzymują około 5-7 na 5-7 w jeden rok jeden zakrzep krwi.
- Z każde 10.000 kobiet które jeden złożony hormonalny środek antykoncepcyjny stosują który zawiera desogestrel, takie jak Marvelon, otrzymują około około pomiędzy 9 a 12 w roku roku rok zakrzep.
- Ryzyko ryzyko aby rok zakrzep dostać otrzymać jest zależny od twojej osobistej medycznej historii (zobacz sekcje ' Czynniki które twoje ryzyko na zakrzep w krwi w jeden żyłatętnica zwiększać' poniżej).

	Ryzyko na w jeden rok dostać zakrzep krwi
Kobiety które nie złożone hormonalne tabletki/plastry/pierścień nie używają i nie są w ciąży	Około 2 z każde 10.000 kobiet
Kobiety które stosują pigułkę złożoną używają która zawiera lewonorgestrel, noretysteron lub norgestimát	Około 5-7 z każde 10.000 kobiet

zawiera	
Kobiety które Marvelon używają	Okolo 9-12 z kazdego 10.000 kobiet

Czynniki które Twoje ryzyko zakrzepicy w krwi w żyły tętnica zwiększają
Het ryzyko na jeden zakrzep krwi z Marvelon jest małe, ale są pewne okoliczności które ryzyko zwiększają. Twoje ryzyko jest wyższe:

- jeśli masz poważną nadwagę (BMI [wskaźnik masy ciała] wyższy niż 30 kg/m²) jeśli
- jeden z twoich bliskich krewnych członkowie rodziny młodym wieku (na przykładna przykład przed 50. rokiem) jeśli zakrzep krwi miałeś wystąpił w nodze płucu lub innym narządzie. W takim przypadku możesz mieć dziedziczną predyspozycję zaburzenie krzepnięcia mieć.
- jeśli ty operację musisz przejść , lub jeśli ty długi czas nie na nogach z powodu urazu lub uraz of choroba, lub jeśli twój noga w gipsie jest. To może być konieczne aby przed operacją , lub kiedy jesteś mniej ruchliwy , kilka kilka tygodnie aby przestać z używaniem Marvelon. Jeśli musisz przestać używać Marvelon, zapytaj wtedy swojego lekarza kiedy możesz ponownie zacząć używać z używaniem.
- jeśli ty starszy stajesz się (w szczególności powyżej około 35 lat)
- jeśli w ciągu ostatnich kilku tygodni urodziłaś .

To ryzyko na jeden zakrzep wzrasta w miarę jak jest więcej z tych okoliczności na ciebie mających zastosowanie są.

Podróż samolotem samolotem (dłużej niż 4 godzina) może twoje ryzyko na zakrzep krwi tymczasowo zwiększyć, zwłaszcza jeśli są jeszcze kilka innych z wymienionych okoliczności na ciebie mają zastosowanie są.

Jest ważne że powiesz twojemu lekarzowi powiedz jeśli jeden lub więcej z tych okoliczności na ciebie mają zastosowanie są, nawet jeśli Pan/Pani wątpi w to. Twój lekarz może zdecydować że Pan/Pani musi przestać używać Marvelon. Jeśli

Jeśli jeden z powyżej wymienionych okoliczności zmienia się podczas używania Marvelon ,na przykład jeśli jeden z bliskich krewnych ma zakrzep (zakrzepica) dostaje bez znanej przyczyny, lub jeśli Pan dużo na wadze przybiera, powiedz to wtedy swojemu lekarzowi. **ZAKRZEP KRWI W TĘTNICY**

Skrzep krwi w tętnicy

Co może się stać jeśli się utworzy zakrzep zostanie utworzony w tętnicy ?Podobnie jak zakrzep w żyły w jeden tętnica, może zakrzep krwi w tętnicy poważne problemy powodować . Można przykład atak serca lub udar powodować . jeden udar powodować .

Czynniki które Twoje ryzyko zakrzepu w krwi w tętnicy zwiększają Jest ważne że wiesz że ryzyko zakrzepu w tętnicy zwiększa się jeden zawał serca lub udar przez stosowanie Marvelon bardzo małe jest, ale większe może stać się:

- z wzrastającym wiekiem (powyżej około 35 lat)
- jeśli ty palisz. Jeśli ty złożony hormonalny antykoncepcyjny taki jak Marvelon używasz ,zaleca się że ty przestaniesz u zatrzymaj z palenie. Jeśli nie możesz przestać z palenie i starszy jesteś niż 35 lat, może twój lekarz ci zalecić aby inny inny typ środek antykoncepcyjny do używania.
- jeśli masz nadwagę masz
- jeśli masz wysokie ciśnienie krwi masz
- jeśli członek twojej twojej bliskiej rodziny w młodym wieku (przed 50. rokiem) zawał serca lub udar miał . Wtakim przypadku możesz również również też jeden zwiększone ryzyko mieć aby jeden zawał serca lub udar dostać ..
- ty, lub jeden członek twojej bliskiej rodziny ,, jeden podwyższony poziom tłuszczów we krwi we krwi ma (cholesterol lub triglicerydy)
- jeśli cierpisz na migrenę ,zwłaszcza migrenę z aurą jeśli
- cierpisz na jeden choroba serca ma (choroba zastawkowa serca, lub jakies zaburzenie rytmu serca które migotanie przedsionków jest nazywane)
- jeśli masz cukrzycę (diabetes) masz.

Jeśli więcej dan jeden z tych okoliczności na ciebie z zastosowanie jest, lub jeśli jeden z tych schorzeń szczególnie poważny jest, może to ryzyko na dostać z jeden zakrzep krwi nawet jeszcze dalej zwiększone są.

Jeśli jeden z powyżej wymienionych okoliczności zmienia się podczas używania Marvelon stosujesz, na przykład jeśli ty zaczynasz palić lub jeśli bliski krewny ma zakrzep (tromboza)dostajebez znanej bez znane przyczyna, lub jeśli Pan dużo w waga przybiera, powiedz to wtedy do swojego lekarza.

Pigułka tabletki i rak

Przy kobiety które pigułkę używają jest nieco częściej rak piersi stwierdzany niż u nieużywających pigułki w tym samym wieku. Dziesięć lat po zaprzestaniu stosowania z pigułką jest żadna różnica więcej. To jest nie znane czy to różnica jest spowodowana przez pigułkę. To może również pochodzić ponieważ użytkownicy pigułek dokładniej i częściej są badane, tak że de rak piersi wcześniej zostaje wykryty.

W rzadkich przypadkach są u użytkownicy pigułek łagodne guzy wątroby znalezione i w jeszcze rzadszych przypadkach złośliwe guzy wątroby. Czasami te guzy doprowadziły do zagrożenia życia wewnętrznego krwawienie krwawienie. Jeśli masz nagle problem z silnym bólem brzucha, to musisz natychmiast skontaktować się z swoim lekarzem. Chroniczny lekarz

Przewlekła infekcja z ludzkim wirusem brodawczaka jest najważniejszym czynnikiem ryzyka dla rozwoju raka szyjki macicy rak szyjki macicyU kobiet stosujących pigułkę przez dłuższy czas może wystąpić de ryzyko zachorowania na zachorowanie na raka szyjki macicy nieznacznie zwiększone jest. Jest jednak nie jasne czy to jest spowodowane przez pigułkę, czy że to z tworzeniem ma z seksualnym zachowaniem i innymi czynnikami (takimi jak lepsza kontrola szyjki macicy).

Zaburzenia psychiczne

Niektóre kobiety które hormonalne środki antykoncepcyjne w tym Marvelon używają, zgłosiły przypadki depresji lub przygnębienia . Depresja. być poważna poważny są i może czasami do myśli samobójcze prowadzić. Jeśli doświadczasz wahania nastroju i objawy depresji

doświadczasz doświadczenieszybko możliwe z swoim lekarzem lekarz dla dalej medyczny porada.

Używasz u jeszcze inne leki?

Używasz u oprócz Marvelon jeszcze inne leki lub preparaty ziołowe, czy Pan/Pani to niedawno zrobił(a) czy zamierza Pan/Pani to może wkrótce zrobić? Proszę to wtedy swojemu lekarzowi, lekarz, farmaceuta lub położna. To dotyczy również dla środków które można bez recepty nabyć .. również każdego innego lekarza lub sztuka dentysta (lub farmaceuta) który ci inny lek przepisuje który używasz Marvelon . Oni mogąci wtedy powiedzieć czy to konieczne jest inny jest jeden extra niehormonalny środek antykoncepcyjny (na przykład prezerwatywa)stosować używać i również jak długo Pan to wtedy musi używać lub to że to użycie z innego leku którego potrzebujesz , musi sięzmienić . Nie używaj.

jeśli masz zapalenie wątroby typu C . jako u zapalenie wątroby typu C ma en do tego leki z ombitasvirparitaprevirritonavir i dasabuvir lub glecaprevirpibrentasvir używane, ponieważ to zwiększenie poziomu z jeden enzym wątrobowy (ALAT, jeden test czynności wątroby) może powodować. Twój lekarz przepisze jeden inny środek antykoncepcyjny przepisze zanim zaczniesz zaczniesz z ten leczenie. Marvelon może około 2 tygodnie po zakończeniu tego ten leczenie ponownie być rozpoczęte. Zobacz sekcja 2 'Kiedy czy możesz ten lek nie używać?').

Niektóre leki

- mogą wpływ mieć na poziomy we krwi Marvelon mogą
- Marvelon mniej skutecznym uczynić aby o ciąży do zapobiegania
- mogą nieoczekiwane krwawienia powodować.

Do tego należą między innymi leki na de leczenie :

- padaczki (na przykład primidon, fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, okskarbazepina, topiramata, felbamat)
- gruźlica (na przykład ryfampicyna, ryfabutyna)
- zakażenie HIV (na przykład ritonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz)
- wirusowe zapalenie wątroby typu C-infekcja wirusowa (na przykład boceprewir, telaprewir)
- inne infekcje (na przykład gryzeofulwina)
- wysokie ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bosentanbozentan)
- depresyjny nastrój (ziołowy środek dziurawiec).

Jeśli używasz leków lub ziołowych środków stosujesz które mogą uczynić Marvelon mniej skutecznym mogą sprawić, musisz również stosować inną metoda antykoncepcji barierowej używać. Ponieważ efekt innego leku na Marvelon do 28 dni po zaprzestaniu stosowania tego leku może utrzymywać się , należy, musi u dodatkową bariera-antykoncepcyjna przez tę czas kontynuować używać.

Marvelon może działanie leków na inne leki wpływać, na przykład:

- leki die cyklosporyna zawierać
- przeciw-padaczkowy lek lamotrygina (to może prowadzić do zwiększonej liczby napadów).Badania laboratoryjne

Jeśli

badanie krwi przy przy u musi zostać zrobione, powiedz wtedy swojemu lekarzowi lub personelowi laboratoryjnemu że używasz tabletki .. środki antykoncepcyjne mogą mianowicie mianowicie de wyniki z niektórych badań wpływać.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli jesteś w ciąży , lub myślisz że jesteś w ciąży mogłabyś być są nie wolno stosować Marvelon nie używać. Jeśli podejrzewasz że jesteś w ciąży podczas gdy stosujesz Marvelon , skontaktuj się jak najszybciej z lekarzem. Karmienie piersią Jeśli skontaktuj się z twój lekarz

Karmienie piersią

To użycie Marvelon jest w ogóle nie zalecane tak długo jak kobieta karmi piersią . Jeśli chcesz tabletkę jednak używać używać podczas gdy jeszcze jeszcze karmienie piersią daje, możesz skontaktować się z najlepiej kontakt nawiązać z twoim lekarzem.

Zdolność prowadzenia pojazdów i używanie maszyn Nie

ma żadnych wskazań brak że zdolność do prowadzenia pojazdów i zdolność do obsługiwanie maszyn mogą używać być wpływane ..

zawiera laktozę Jeśli

Twój lekarz Ci powiedział że powiedział że Pan/i określone cukry nie toleruje, skontaktuj się z swoim lekarzem zanim Pan/i ten lek zażyje.

Dzieci i młodzież do 18 lat

Nie ma żadnych klinicznych informacji na temat skuteczności i bezpieczeństwa u młodzieży poniżej 18 lat.

Kiedy powinienes udać się do lekarza podczas to stosowanie tego leku ? Jak

3. przyjmować ten lek ? Przyjmuj ten

lek zawsze dokładnie tak, jak zalecił twój lekarz lekarza lub farmaceuta u że powiedział .. w prawidłowe stosowanie ? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą ..

i jak przyjmować przyjmuje u de tabletki w?

Pasek zawiera 21 tabletek. Przy każdej tabletkce jest wskazane w który dzień ta musi być przyjęta. Weź tabletki każdego dnia około o tej samej porze przyjmować, w razie potrzeby popijając wodą. Postępuj zgodnie z kierunkiem strzałki na pasku wskazanym aż do przyjęcia wszystkich 21

tabletek masz przyjęte przyjęte. Następnie przyjmujesz 7 dni żadnej tabletki. W ciągu tych 7 dni powinno wystąpić krwawienie z odstawienia (tzw. krwawienie z odstawienia). Ta zwykle zaczyna się 2. lub 3. dnia po ostatniej tabletkce Marvelon. Rozpocznij 8. dnia z następnym opakowaniem, niezależnie od tego, czy krwawienie już minęło czy nie. Dit oznacza że u steeds op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint, en ook dat de krwawienie z odstawienia każdego miesiąca mniej więcej na tych samych dniach przypada.

Kiedy zacząć pierwszy z pierwszą listę

Pani nie stosowała w ostatnim miesiącu żadnej tabletki antykoncepcyjnej używała.

Rozpocznij przyjmowanie Marvelon w pierwszym dniu cyklu (pierwszy dzień dnia twojej twojej menstruacji). Marvelon działa w tym przypadku od razu i nie musisz brać dodatkowy środek antykoncepcyjny do użycia.

Możesz również w dzień 2-5 cyklu rozpocząć ale wtedy musisz w pierwszych siedmiu dniach 7 dodatkowe zabezpieczenie jeden dodatkowy środek antykoncepcyjny (na przykład jeden prezerwatywa) używać.

Przejdźcie z innej tabletki złożonej pigułka antykoncepcyjna złożona pierścien dopochwowy lub plaster antykoncepcyjny Ty plaster antykoncepcyjny

U możesz z Marvelon rozpocząć w dzień po jak ostatnią tabletkę z twojego poprzedniego pigułka zażyłeś (więc bez przerwy). Jeśli przy twoim poprzednim pigułka też nieaktywne tabletki w blisterze znajdują się, musisz ty natychmiast kontynuować po ostatniej aktywnej tabletkce z twojego poprzedniego opakowania pigułka (jeśli pan nie wie która to jest, zapytaj wtedy swojego lekarza lub farmaceuty). Możesz również później zacząć, ale nigdy później niż w, ale nigdy później niż w dniu dzień po zakończeniu okresu bez tabletek okresu z twojego poprzedniego pigułka (lub po ostatniej nieaktywnej tabletki z twojego poprzedniego pigułka).

Jeśli przechodzisz z pierścienia dopochwowego lub plastra antykoncepcyjnego możesz rozpocząć stosowanie Marvelon rozpocząć w dniu usunięcia pierścienia lub ostatniego plastra. Możesz również później też później rozpocząć, ale Pan(i) musi w najpóźniej siedem dni po usunięciu pierścienia lub ostatniego plastra z Marvelon rozpocząć z Marvelon Kiedy.

tabletki przyjmuje tabletki, plaster lub pierścień całkowicie zgodnie z przepisami ma użyć i jesteś pewien że ty nie w ciąży jesteś, możesz ty ponadto przestać z przyjmowaniem tabletki lub pierścienia lub plastra usunąć usuwać każdy dzień z twojego obecnego cyklu i natychmiast przejść na na użycie Marvelon.

Jeśli te wskazówki przestrzegasz to nie jest potrzebne dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywa) stosować. używać.

Przełączenie z jednej pigułka progestagennej (minipigułka)

Możesz przejść z jednej na drugą dnia przełączyć się na Marvelon, ale musisz pierwszą tabletkę wziąć pierwszego 7 dni tak jeden dodatkowy środek antykoncepcyjny (na przykład jeden prezerwatywa) używać.

Przejdźcie z zastrzyku antykoncepcyjnego, implantu lub of jeden zawierający hormony spirala

Rozpocznij od Marvelon kiedy Pan/Pani inaczej następny zastrzyk miałby otrzymać lub w dniu dzień kiedy implant lub zawierający hormony spirala hormonalny spirala antykoncepcyjna jest

usunięty. Pani musi pierwsze 7 dni jednak tak dodatkowo środek antykoncepcyjny (środek antykoncepcyjny na przykład prezerwatywa) używać. używać.

Po porodzie Jeśli właśnie urodziłaś dziecko, twój lekarz prawdopodobnie zaleci ci poczekać do pierwszej spontanicznej menstruacji, ale czasami spontaniczne miesiączka, ale czasami jest to możliwe wcześniej rozpocząć .. zaleceniami lekarza. To dotyczy również przypadku gdy karmisz piersią dla to przypadek u karmienie piersią daje en de pigułka chcesz używać.

Po poronieniu lub aborcji Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza. Czy masz za

dużo u ci wiele z tego leku przyjęto?

Nie istnieją żadne zgłoszenia o poważnych szkodliwych skutkach przy przyjmowaniu zbyt wielu tabletek Marvelon jednocześnie jednocześnie. Jeśli Pan/i kilka tabletek jednocześnie zażył/a, to może Pan/i ewentualnie mieć problemy z nudnościami, wymiotami lub wymiotować z dopochwowy krwawienie. Jeśli pan/pani odkryje że dziecko Marvelon przyjęło, zapytaj wtedy swojego lekarza o radę. Co.

Co robić ...

...przy pominięciu tabletek Jeśli jesteś

mniej niż **12 godzin** z **przyjęciem tabletki** zgięcie z to przyjmować z jeden tabletką wtedy jest działanie tabletki nie zmniejszone. Weź tę tabletkę jak tylko sobie przypomnisz i przyjmij kolejne tabletki o zwykłej porze.

Jeśli **spóźniłaś się z przyjęciem tabletki o więcej niż 12 godzin**, działanie tabletki może być zmniejszone. Im więcej tabletek zapomniałaś przyjąć z rzędu, tym większe jest ryzyko, że działanie tabletki zostanie zmniejszone. zmniejszony is. De szansa na niewystarczającą ochronę przed ciążą jest największa, gdy tabletki są pomijane na początku lub na końcu blistra. Dlatego obowiązują następujące zasady (patrz także schemat):

Więcej niż 1 tabletką zapomniana w jednym blistrze

Skontaktuj się z twój lekarz.

1 zapomniana tabletką w tygodniu 1

Weź zapomnianą tabletkę, gdy tylko sobie przypomnisz, nawet jeśli oznacza to, że musisz wziąć dwie tabletki w tym samym momencie musisz przyjąć. Przyjmuj dalej tabletki znowu o zwykłej porze przyjmowania czasu w, ale musisz również przez 7 dni stosować dodatkowo środki antykoncepcyjne. Jeśli w tygodniu przed pominięciem miałaś stosunek, musisz liczyć się z możliwością zajścia w ciążę. W takim przypadku natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

1 tabletką zapomniana w tygodniu 2

Weź zapomnianą tabletkę, gdy tylko sobie przypomnisz, nawet jeśli oznacza to, że musisz przyjąć dwie tabletki w tym samym momencie musisz przyjąć. Kontynuuj przyjmowanie tabletek jak zwykle w tym zwykły czas w. De Działanie pigułki nie jest

zmniejszone, nie musisz używać dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

1 tabletka zapomniana w tydzień 3

Możesz wybrać z 2 2 bez dodatkowych środków antykoncepcyjnych do musisz używać.

1. Weź zapomnianą tabletkę gdy tylko sobie przypomnisz, nawet jeśli oznacza to, że musisz przyjąć dwie tabletki jednocześnie. Następnie przyjmuj tabletki o zwykłej porze. **Pomiń również okres bez tabletek** i od razu przejdź do następnego blistra. Najprawdopodobniej dostaniesz ty dopiero na końcu drugiego blistra krwawienie z drugiego blistra prawdziwe krwawienie z odstawienia, ale podczas drugiego opakowania mogą wystąpić plamienia lub krwawienia przełomowe.
2. Możesz również przerwać przyjmowanie danego opakowania. Zachowaj przerwę bez tabletek trwającą 7 dni lub mniej do (**licz zawsze dzień w którym zapomniałaś tabletki**). **Następnie kontynuuj zgięcie zapomnieć**). Następnie idzie u zwykły

kontynuuj z następnym opakowaniem.

Jeśli stosujesz tę metodę, zawsze możesz zacząć nowe opakowanie w swoim stałym dniu rozpoczęcia.

Jeśli zapomniałaś tabletek z opakowania i nie wystąpi krwawienie w najbliższym normalnym okresie bez tabletek, może to oznaczać, że jesteś w ciąży. Skontaktuj się z lekarzem przed kontynuowaniem z następnym opakowaniem.

... w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. wymioty, ciężka biegunka) Jeśli wymiotujesz lub masz ciężką biegunkę, istnieje ryzyko, że substancje czynne nie zostały w pełni wchłonięte przez organizm. Jeśli wymiotujesz w ciągu 3-4 godzin po zażyciu tabletki, sytuacja ta jest podobna do zapomnienia tabletki. W przypadku wymiotów postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi powyżej dla zapomnianych tabletek. Jeśli masz ciężką biegunkę, skonsultuj się z lekarzem.

... jeśli chcesz opóźnić miesiączkę

Możliwe jest opóźnienie miesiączki, chociaż nie jest to zalecane. W wyjątkowych przypadkach możesz opóźnić miesiączkę, kontynuując nowe opakowanie Marvelon bez okresu bez tabletek. Możesz kontynuować to opakowanie, aż wszystkie tabletki zostaną zużyte lub przerwać wcześniej, jeśli chcesz. Podczas stosowania tego drugiego opakowania możesz doświadczyć krwawienia przełomowego lub plamienia. Po zwykłym 7-dniowym okresie bez tabletek rozpocznij kolejne opakowanie.

... jeśli chcesz przesunąć dzień rozpoczęcia miesięczki

Jeśli przyjmujesz tabletki zgodnie z instrukcją, miesięczka będzie się zaczynać mniej więcej tego samego dnia. Jeśli chcesz zmienić ten dzień, możesz to zrobić, skracając normalny okres bez tabletek między dwoma opakowaniami (ale nigdy go nie wydłużając). Na przykład, jeśli twoja miesięczka zwykle zaczyna się w piątek i chcesz ją przesunąć na wtorek (3 dni wcześniej), musisz teraz zacząć nowe opakowanie 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeśli okres bez tabletek jest bardzo krótki (np. 3 dni lub mniej), może się zdarzyć, że nie wystąpi krwawienie w tym okresie. Możesz wtedy doświadczyć krwawienia przełomowego lub plamienia podczas następnego opakowania.

... w przypadku nieoczekiwanego krwawienia

Przy wszystkich pigułkach antykoncepcyjnych w pierwszych kilku miesiącach może czasami wystąpić nieoczekiwane krwawienie (plamienie lub krwawienie przełomowe). Możesz wtedy potrzebować podpaski lub tamponu. W każdym razie kontynuuj przyjmowanie tabletek. Nieregularne krwawienie zwykle ustaje, gdy organizm przyzwyczai się do danej pigułki (po około 3 opakowaniach). Jeśli trwa dłużej, nasila się lub zaczyna się ponownie, skontaktuj się z lekarzem.

... jeśli oczekiwane krwawienie nie wystąpi

Jeśli przyjąłeś wszystkie tabletki prawidłowo, nie miałaś wymiotów i/lub biegunki, i nie stosowałaś innych leków, jest bardzo mało prawdopodobne, że jesteś w ciąży. Możesz spokojnie kontynuować z następnym opakowaniem.

Jeśli jednak oczekiwane krwawienie nie wystąpi dwa razy z rzędu, możesz być w ciąży. Natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Nie kontynuuj z następnym opakowaniem Marvelon, dopóki lekarz nie potwierdzi, że nie jesteś w ciąży.

Jeśli przestaniesz przyjmować przyjmować z tego leku

Możesz przestać stosować Marvelon kiedy tylko chcesz. Jeśli nie chcesz zajść w ciążę, zapytaj wtedy swojego lekarza o poradę lekarza o porada z odniesieniu do innych wiarygodnych metod planowania rodziny.

Jeśli przestajesz ponieważ chcesz zajść w ciążę, zwykle, w ogóle ogólny zalecane aby czekać aż będziesz miała naturalną menstruację zanim spróbujesz zajść w ciążę. Możesz spróbować zajść w ciążę po tym niż łatwiej obliczyć kiedy poród poród będzie mieć miejsce.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek może również ten lek działania niepożądane mieć. Nie każdy ma z tym do czynienia. Czy Pan jakieś działanie niepożądane, zwłaszcza jeśli jest poważne z natury to i lang utrzymuje się, lub występuje jakaś zmiana zmian Twoim stanie zdrowia o której myślisz że jest spowodowana może być przez Marvelon? Skontaktuj się wtedy z Twoim lekarzem. lekarz.

Wszystkie kobiety które złożone hormonalne środki antykoncepcyjne stosują mają większe ryzyko zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa[VTE]) lub zakrzepowo-

zatorowy [VTE]) of zakrzepy krwi w tętnicach (tętnicza zakrzepica- zatorowość [ATE]). Zobacz dla więcej informacji o różnych ryzykach stosowania użycia z złożonych hormonalne antykoncepcyjne rubryka 2 'Kiedy nie wolno tego leku nie stosować lub musisz być szczególnie ostrożny z nim być?'

Skontaktuj się bezpośrednio z swoim lekarzem jeśli u objawy obrzękunaczynioruchowego dostaniesz takie jak obrzęk twarzy twojej twarzy, języka i/gardło i/of trudności w przełykaniu przełykania of pokrzywka możliwe z problemy z oddychaniem (patrz punkt 2 'Kiedy należy zachować ostrożność przy tym leku ?').Jak

w przypadku przy wszystkie tabletki złożone, może twój wzorzec menstruacyjny zmienić, zwłaszcza podczas pierwszych miesięcy stosowania . Ta różnicamoże dotyczyć tego w jaki sposób w jaki sposób często u jeden krwawienie dostaje (brak krwawienia , najczęściej ,częśćiej lub ciągłe), jakciężkie krwawienie jest, lub krwawienie jest, lub jak długo krwawienie trwa ..

występują mniej niż 1 na 10 kobiet mniej niż 1 na 10 depresyjnenastroje

- depresyjny zmiany nastrojuból głowy nudności
- ,
- ból brzucha, ból brzucha
- wrażliwe piersi, bolesne piersi
- przyrost masy ciała.

Czasami (występują u mniej niż 1 na 100 kobiet)zatrzymanie płynów

- mniejsza ochota na
- uprawianie seksu migrena
- wymioty
- wymiotować, biegunka
- wysypka, pokrzywka (pokrzywka)
- powiększenie piersi piersi.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 kobiet))

- szkodliwe zakrzepy w żyła lub tętnica ,na przykład na przykład:
 - o noga lub stopa (na przykładgłęboka zakrzepica żylna))
 - o w płucu (na przykład zatorowość płucna)
 - o zawał serca
 - o udar
 - o „mały udar” lub przejściowe objawy takie jak przy udarze ,znane znany jeśli TIA (przemijający atak niedokrwienny)
 - o zakrzepy krwi w wątrobie, żołądekjelita, nerki lub oczy. Ryzyko na wystąpienie zakrzepu krwi jest większe otrzymać jest większy jeśli są inne okoliczności dotyczące ciebie zastosowanie są które to ryzyko zwiększają (patrz sekcja 2 dla więcej informacji o okolicznościach które ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi zwiększają i objawy występowania zakrzepu krwi). reakcje nadwrażliwościwiększa
- ochota na
- uprawianie seksu podrażnienie oczu stosunek seksualny

- podrażnienie z oczu przy używaniu soczewki kontaktowe soczewek kontaktowych bolesne
- ,niebieskoczerwone guzki w skórze (rumień guzowaty), wysypka wysypka skórna nieregularnymi czerwonymi plamami lub wrzodami (rumień wielopostaciowy) (erythema multiforme)
- wydzielina z de brodawki sutkowej, zmiana w wydzielinie z pochwy
- utrata masy ciała.

Zgłaszanie działań niepożądanych działań niepożądanych działań niepożądanych
Czy masz działania niepożądane , skontaktuj się z, skontaktuj się z twój lekarz lub farmaceuta. To dotyczy również dla działań niepożądanych które nie w tej ulotce są. Możesz zgłaszać działania niepożądane również zgłosić przez Nederlands Działania niepożądane Centrum Lareb, strona internetowa: www.lareb.nl. Przez działania niepożądane zgłaszać zgłosić, pomagasz nam uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku bezpieczeństwo z to lekarstwo.

5. Jak przechowuje Pan/Pani ten lek?

Poza zasięgiem i dostępem dzieci trzymać ..

tego leku nie więcej więcej po de najlepiej spożyć przed datą ważności. Znajduje się ona znajduje się na pudełku i na blistrze po EXP. Tam jest miesiąc i rok . De. De ostatni dzień tego miesiąca jest ostateczny termin ważności.

Przechowywać poniżej 30 °C. Nie w zamrażarce przechowywać.
Przechowywać w oryginalnym blistrze ter ochrona przed światłem i wilgocią.

Weź ten lek nie jeśli zauważysz że na przykład tabletki są przebarwione tabletki przebarwiony of pokruszony są of kiedy Pan(i) inne widoczne oznaki pogorszenia pogorszenia w jakości zauważy. Nie spłukuj leków nie przez zlew lub toaleta i wyrzuć je nie do kosza na śmieci. Zapytaj swojego farmaceutę co zrobić z lekami które należy zrobić z tymi, nie już używasz. Jeśli leki w właściwy sposób utylizujesz zostaną one w odpowiedni sposób zniszczone i nie trafią do środowiska . Zawartość słusznie.

6. Zawartość z opakowania i inne informacje

Jakie substancje są w tym leku?

- Substancje czynne w tym leku to desogestrel dezogestrel (150 mikrogramów) en etynyloestradiol (30 mikrogramów).
- De inne substancje w tym leku są bezwodny koloidalny dwutlenek krzemu, monohydrat laktozy, skrobia ziemniaczana, povidon, kwas stearynowy, all-rac-alfa-tokoferol.

Jak wygląda Marvelon i co zawiera opakowanie ? Opakowaniezawiera 1, 3 lub 6 opakowanie zawiera 1, 3 lub 6 paski blistrowe z 21 tabletkami. Nie wszystkie wymienione wielkości opakowań są w handlu dostępne.

Tabletki są białe, okrągłe ,z do obie strony wypukłe i mają średnicę 6 mm.

Na jednej stronie jest 'TR' nad '5' i na drugiej stronie 'Organon' 'Organon' en jeden pięcioramienna gwiazda.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i producent N.V. Organon

Kloosterstraat Kloosterstraat 6

Holandia

Tel.: 00800 66550123 (+32 2 2418100)

d poc.benelux@organon.com

d poc.benelux@organon.com

W rejestrze zarejestrowany pod: RVG 08859

Ta ulotka jest dla ostatni raz zatwierdzona w maju 2025