

Folheto: informação para o utilizador  
Marvelon, comprimidos  
desogestrel, etinilestradiol

Coisas importantes que você deve saber sobre combinados hormonais contraceptivos meios:

- Estes meios constituem um dos mais confiáveis reversíveis métodos anticoncepcionais, desde que corretamente utilizados.
- Eles proporcionam um ligeiro maior risco de desenvolvimento de um coágulo sanguíneo (trombose) nas veias e artérias, especialmente no primeiro ano que você um combinado hormonal contraceptivo usado ou se você após uma interrupção de 4 semanas ou mais recomeça a com o uso de um combinado hormonal contraceptivo.
- Atenção cuidadosamente em e entre em contato com seu médico se você acha que você possivelmente sintomas de um coágulo de sangue tem (veja seção 2 'Coágulos de sangue (trombose)').

Leia cuidadosamente todo o folheto informativo antes de você este medicamento começar a tomar porque há está importante informação em para você.

- Guarde este folheto. Talvez precise dele mais tarde novamente ..
- você ainda alguma perguntas? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.
- Não este medicamento não para outras pessoas, pois é apenas para você prescrito. Ele pode prejudicial são para outros, mesmo que tenham eles os mesmos sintomas que você.
- Se você sentir um dos efeitos colaterais mencionados na seção 4 constar? Ou tem você um efeito colateral que não neste este folheto informativo consta? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

Conteúdo de este folheto

1. O que é Marvelon e para que é este medicamento usado?
2. Quando não deve este medicamento ser usado ou deve ter cuidado especial com são?
3. Como toma você este medicamento ?
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazena você este medicamento?
6. Conteúdo da embalagem em outras informações

1. O que é Marvelon e para que é este medicamento usado?

Composição e tipo pílula

Marvelon é uma combinada oral pílula anticoncepcional (de 'pílula combinada'). Cada comprimido contém uma pequena quantidade de dois diferentes hormônios femininos, nomeadamente desogestrel (um hormônio com ação semelhante à progesterona funcionamento) em etinilestradiol (um hormônio com atividade estrogênica ).Devido à pequena quantidade de hormônios ,é Marvelon considerado como como um baixa dosagem anticoncepcional. Porque ambos hormônios em todos comprimidos na cartela em mesma quantidade combinados estão, é um um monofásico- pílula combinada chamado.

Para que é este medicamento usado?

Marvelon é usado para prevenir a gravidez . Se Marvelon for.

corretamente é ingerido (sem que comprimidos sejam esquecidos) é a probabilidade de engravidar ser muito pequena ..

2. pode você este medicamento não usar ou deve ter cuidado extra cautela com ser?

#### Geral observações

Leia antes de começar a usar Marvelon, a informação sobre coágulos sanguíneos coágulos sanguíneos (trombose) em rubrica 2. É especialmente importante que você leia quais são os sintomas de um coágulo sanguíneo coágulo de sangue veja rubrica 2 ' 2 'Coágulos de sangue (trombose)'.  
Em este folheto são algumas situações descritas nas quais você deve parar de usar o da pílula ou em que o confiabilidade da pílula reduzida pode estar. Em tais situações deve você abster-se de relações sexuais ou um um adicional contraceptivo sem hormônios usar, por exemplo um preservativo ou outro método de barreira. Não use o método de calendárioou método de temperatura. Estas métodos podem ser pouco confiáveis porque a pílula afeta a mudanças normais da temperatura corporal temperatura corporal o endométrio durante o de ciclo menstrual.

Marvelon oferece assim como outros hormonais contraceptivos nenhuma proteção contra uma hiv- infecção (aids) ou outras sexualmente transmissíveis doenças (DSTs).

Quando pode você este medicamento não usar?  
Você não pode este medicamento não usar se você uma das abaixo mencionadas doenças tem. Se você um das abaixo mencionadas doenças tem, informe isso então ao seu médico. Seu médico irá com você discutir qual outro formato de anticoncepção mais adequado é para você. Veja também a seção 'Quando deve você extra cautela seja com este medicamento?'.  
• Você tem um coágulo sanguíneo em um vaso sanguíneo das pernas (trombose venosa profunda , TVP), o, TVP), de pulmões (embolia pulmonar) de um outro órgão, ou você teve isso no passado ..  
• sabe que você tem um distúrbio tem de seu coagulação sanguínea – por exemplo proteína C-deficiência, proteína S- deficiência, antitrombina-III- deficiência, fator V-Leiden ou anticorpos contra fosfolipídios.  
• U deve ser operado ou você está durante longo tempo não de pé (veja seção 'Coágulos sanguíneos (trombose)').  
• U tem alguma vez um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral teve.  
• Você tem angina pectoris (uma condição que intensa dor no peito causa em um primeiro sintoma de um ataque cardíaco pode ser) ou um 'ataque isquêmico transitório' (AIT: sintomas transitórios de um acidente vascular cerebral ) ou você) ou tem isto alguma vez tido.  
• Você tem uma das seguintes doenças, que aumentam o risco de um coágulo sanguíneo nas suas aumentar:  
- grave diabetes com danificação de vasos sanguíneos  
- grave aumentada pressão arterial  
- um grave aumentado nível de gordura no seu sangue (colesterol de triglicerídeos)  
- uma condição que hiper-homocisteinemia é chamada.

Quando pode você este medicamento não usar?

Você não pode este medicamento não usar se você uma das abaixo mencionadas doenças tem. Se você um das abaixo mencionadas doenças tem, informe isso então ao seu médico. Seu médico irá com você discutir qual outro formato de anticoncepção mais adequado é para você. Veja também a seção 'Quando deve você extra cautela seja com este medicamento?'.  
• Você tem um coágulo sanguíneo em um vaso sanguíneo das pernas (trombose venosa profunda , TVP), o, TVP), de pulmões (embolia pulmonar) de um outro órgão, ou você teve isso no passado ..  
• sabe que você tem um distúrbio tem de seu coagulação sanguínea – por exemplo proteína C-deficiência, proteína S- deficiência, antitrombina-III- deficiência, fator V-Leiden ou anticorpos contra fosfolipídios.  
• U deve ser operado ou você está durante longo tempo não de pé (veja seção 'Coágulos sanguíneos (trombose)').  
• U tem alguma vez um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral teve.  
• Você tem angina pectoris (uma condição que intensa dor no peito causa em um primeiro sintoma de um ataque cardíaco pode ser) ou um 'ataque isquêmico transitório' (AIT: sintomas transitórios de um acidente vascular cerebral ) ou você) ou tem isto alguma vez tido.  
• Você tem uma das seguintes doenças, que aumentam o risco de um coágulo sanguíneo nas suas aumentar:  
- grave diabetes com danificação de vasos sanguíneos  
- grave aumentada pressão arterial  
- um grave aumentado nível de gordura no seu sangue (colesterol de triglicerídeos)  
- uma condição que hiper-homocisteinemia é chamada.

- Você tem um coágulo sanguíneo em um vaso sanguíneo das pernas (trombose venosa profunda , TVP), o, TVP), de pulmões (embolia pulmonar) de um outro órgão, ou você teve isso no passado ..
- sabe que você tem um distúrbio tem de seu coagulação sanguínea – por exemplo proteína C-deficiência, proteína S- deficiência, antitrombina-III- deficiência, fator V-Leiden ou anticorpos contra fosfolipídios.
- U deve ser operado ou você está durante longo tempo não de pé (veja seção 'Coágulos sanguíneos (trombose)').
- U tem alguma vez um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral teve.
- Você tem angina pectoris (uma condição que intensa dor no peito causa em um primeiro sintoma de um ataque cardíaco pode ser) ou um 'ataque isquêmico transitório' (AIT: sintomas transitórios de um acidente vascular cerebral ) ou você) ou tem isto alguma vez tido.
- Você tem uma das seguintes doenças, que aumentam o risco de um coágulo sanguíneo nas suas aumentar:
  - grave diabetes com danificação de vasos sanguíneos
  - grave aumentada pressão arterial
  - um grave aumentado nível de gordura no seu sangue (colesterol de triglicerídeos)
  - uma condição que hiper-homocisteinemia é chamada.

- Você tem um tipo de enxaqueca que 'enxaqueca com aura' é chamada (ou tem isto alguma vez teve).
- Você tem pancreatite (uma inflamação do pâncreas) ou tem isto teve, combinado com uma alto teor de gordura em seu sangue.
- Você tem icterícia (amarelamento da pele ou olhos ) ou uma grave doença hepática de tem este teve, e o resultados de testes de função hepática são ainda não normais.
- Você tem uma forma de câncer ou teve isto teve que sensível pode ser a hormônios sexuais (como câncer de mama ou câncer dos órgãos genitais).
- Você tem câncer de fígado ou tem isso teve.
- Você tem sangramentos incomuns da vagina cuja causa não foi determinada estabelecido.
- U tem uma espessamento anormal do endométrio endométrio.
- alérgico a um dos componentes deste medicamento . Estas. Esta substâncias pode você encontrar em seção 6 deste este folheto informativo.

Se uma das mencionadas situações ocorrer enquanto você já está usando Marvelon , então deve imediatamente parar com o uso e entrar em contato com o seu médico. Use no meio tempo um outro, não- hormonal método de anticoncepção. Veja também 'Observações gerais' no início da seção 2.

Não use Marvelon se você tiver hepatite C u hepatite C tem em para isso medicamentos com ombitasvirparitaprevirritonavir e dasabuvir ou glecaprevirpibrentasvir usado (veja também seção 2 'Usado u ainda outros medicamentos?').

Quando deve u extra cuidado ser com este medicamento?

Quando deve u entrar em contato com seu médico?

Chame emergência médica ajuda se

- você possíveis sintomas ou sinais de um coágulo de sangue notar, que podem significar que u sofre de um coágulo de sangue em sua perna (ou seja. trombose venosa profunda), um coágulo de sangue em seu pulmão (ou seja. embolia pulmonar), um ataque cardíaco ou um derrame (veja abaixo a seção 'Coágulos sanguíneos (trombose)').

Vá para um descrição dos sintomas ou sinais destes estes graves efeitos colaterais para 'Como reconhecer você um coágulo sanguíneo?'

Informe ao seu médico, se um das seguintes situações se aplica a você .

Se a condição surgir ou agravar, enquanto você usa Marvelon , deve deve você isso também ao seu médico informar.

- Você fuma.
- Você tem diabetes.
- Você está muito acima do peso.
- U tem uma pressão arterial elevada ..

- tem uma condição das válvulas cardíacas ou uma determinada arritmia cardíaca arritmia cardíaca.
  - tem uma um inflamação na veias logo abaixo da pele (tromboflebite superficial).
  - Você tem varizes.
  - Alguém na sua família imediata tem alguma vez trombose, um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral teve.
  - Você tem enxaqueca.
  - Você tem epilepsia.
  - Você tem aumentados níveis de gordura no seu sangue (hipertrigliceridemia), ou esta condição ocorre na sua família ou ocorreu na sua família anteriormente ocorrido. Hipertrigliceridemia está em associação com um maior risco de pancreatite ( uma inflamação do pâncreas pâncreas desenvolver . Você.
  - ser deve ser operado ou você está durante longo tempo não de pé (veja 'Coágulos de sangue (trombose)' na seção 2).
  - Se você recentemente deu à luz está, tem u um aumentado risco de ter de coágulos sanguíneos. Pergunte seu médico como rapidamente após o parto você pode começar com o uso de Marvelon.
  - Você tem alguém na sua família imediata que câncer de mama teve ..
  - tem uma doença do fígado ou da vesícula biliar vesícula biliar.
  - U tem a doença de Crohn ou colite ulcerativa (doença intestinal crônica).
  - U tem lúpus eritematoso sistêmico (LES - uma doença que seu sistema sistema imunológico afeta).
  - U tem hemolítico-urêmico síndrome (HUS - um distúrbio da coagulação sanguínea que insuficiência renal causa).
  - U tem anemia falciforme (um hereditária doença dos glóbulos vermelhos).
  - Você tem uma condição que pela primeira vez ocorreu ou piorou durante uma gravidez de em anterior uso de hormônios sexuais, por exemplo perda auditiva, porfiria (uma doença sanguínea), herpes gestationis (erupção cutânea com vesículas durante o gravidez) ou coreia de Sydenham (uma doença neurológica em que movimentos súbitos do corpo ocorrem).
- 
- Você apresenta sintomas de angio-edema como inchaço de seu rosto, língua eou garganta eou dificuldades ao engolir ou urticária possivelmente com problemas respiratórios . Consulte emeste caso caso contato direto com seu médico. Produtos com estrogênios podem os sintomas de hereditário e adquirido angio-edema causar ou agravar.
  - Você tem cloasma ou você tem alguma vez cloasma teve (amarelo-acastanhadas manchas de pigmentação, chamadas 'manchas de gravidez', especialmente no rosto); se isso o caso é, é prudente evitar exposição direta exposição luz solar ou luz ultravioleta te evitar ..

pílula e coágulos sanguíneos coágulos sanguíneos trombosedrombose)

## COÁGULOS DE SANGUE (TROMBOSE)

Se você um combinado hormonal contraceptivo como Marvelon usa, tem você um maior risco de um coágulo de sangue ter obter então se você nenhum combinado hormonal contraceptivo usado. Em raramente ocorrentes casos pode um coágulo sanguíneo um vaso sanguíneo obstruir e graves problemas causar. Coágulos sanguíneos podem ocorrer

- em veias (isto é chamado 'trombose venosa', 'tromboembolismo venoso' ou TEV chamado)
- em artérias (isto é 'trombose arterial', 'tromboembolismo arterial' ou ATE chamado).

Nem sempre se recupera completamente de coágulos sanguíneos. Em raros casos podem haver efeitos prolongados graves ser , ou em muito raros casos podem coágulos sanguíneos ser mortais letal são.

É importante que você saiba que o risco geral de um coágulo prejudicial devido ao Marvelon é pequeno . COMO RECONHECER UM COÁGULO?

Ligue

Interruptor emergência médica ajuda in se você um dos seguintes sintomas ou sinais notar.

Se você um desses sintomas sintomas de sintomas?	Onde pode você sofrer de?
inchaço de uma perna ou ao longo de uma veia em uma perna ou pé, especialmente se isso for acompanhado de: dor ou sensibilidade da perna, que você pode sentir apenas ao ficar de pé ou caminhar temperatura elevada na perna afetada mudança de cor da pele da pele de o perna, por exemplo, ficar pálida, vermelha ou azul	Profunda venosa trombose
repentina inexplicada falta de ar ou respiração rápida repentinamente tosse sem causa aparente, em que você pode tossir sangue aguda dor no peito, que pode piorar quando você respira profundamente sensação grave de leveza na cabeça ou tontura de tontura rápida ou irregular batimento cardíaco grave dor no seu estômago  Se você tem dúvidas, entre em contato com um médico, pois quer alguns destes sintomas, como tosse ou falta de ar, podem ser erroneamente ser considerados como uma condição mais leve, como uma infecção respiratória (por exemplo, resfriado).	Embolia pulmonar
Sintomas ocorrem geralmente em um olho só: imediatamente perda de a visão, ou indolor visão turva, que pode se desenvolver para	Trombose venosa na retina (coágulo no a

perda de a	oog)
Você tem algum desses sintomas ou sinais?	De que você pode sofrer?
visão	
<p>dor, desconforto, pressão ou uma sensação pesada, apertada ou cheia no peito, braço ou sob o esterno</p> <p>sensação de plenitude, indigestão ou falta de ar</p> <p>desconforto na parte superior do corpo que irradia para as costas, mandíbula, garganta, braço e estômago</p> <p>sudorese, náusea, vômito ou tontura</p> <p>fraqueza extrema, ansiedade ou falta de ar</p> <p>batimento cardíaco rápido ou irregular</p>	Ataque cardíaco
<p>fraqueza súbita ou sensação de dormência no rosto, braço ou perna, especialmente de um lado do corpo</p> <p>confusão súbita, dificuldade para falar ou entender</p> <p>dificuldade súbita para ver em um ou ambos os olhos</p> <p>dificuldade súbita para caminhar, tontura, perda de equilíbrio ou coordenação</p> <p>dor de cabeça súbita, severa ou prolongada sem causa conhecida</p> <p>consciência reduzida ou desmaio com ou sem convulsão</p> <p>Os sintomas de um derrame podem às vezes durar pouco e se recuperar quase imediatamente e completamente. No entanto, você ainda deve procurar ajuda médica de emergência, pois pode haver risco de ter outro derrame.</p>	Derrame
<p>inchaço e leve coloração azulada de um braço ou perna</p> <p>dor intensa no abdômen (abdômen agudo)</p>	Coágulo de sangue que obstrui outros vasos sanguíneos

## COÁGULOS DE SANGUE EM UMA VEIA

Wat kan er gebeuren als er een coágulo de sangue wordt formado em uma veia?

- O uso de combinados hormonais anticoncepcionais é em relação trazido com um maior risco de coágulos sanguíneos em uma veia (trombose venosa). Este efeitos colaterais ocorrem no entanto raramente ocorrem. Meestal ocorrem eles no primeiro ano que um combinado hormonal contraceptivo é usado.
- Se houver um coágulo de sangue é formado em uma veia em uma perna ou pé, pode causar uma trombose venosa profunda (TVP) causar.
- Se um coágulo de sangue do a perna é transportado e no pulmão chegar, pode causar uma embolia pulmonar causar.

- É muito frequente raramente para que um coágulo sanguíneo é formado in uma veia in um outro órgão, como o olho (venoso trombose no retina).

Quando é o risco de um coágulo sanguíneo em uma veia o mais alto?

O risco de um coágulo de sangue in uma veia ter é o mais alto no primeiro ano que uma mulher pela primeira vez um combinado hormonal hormonal anticoncepcional usado. O risco pode também aumentar estar se você após uma interrupção de 4 semanas ou mais recomeça com o com o uso de um combinado hormonal contraceptivo (mesmo produto, ou um outro produto que anteriormente).

Após o primeiro ano o risco risco menor, mas permanece um pouco mais alto do que quando você não contraceptivo hormonal combinado usa.

Se você parar com Marvelon, o seu risco de um coágulo de sangue dentro algumas semanas novamente normal.

Como alto é o risco de um coágulo de sangue?

O risco depende de de seu natural risco de TEV, e do tipo combinado hormonal contraceptivo que você usa.

O risco geral de um coágulo sanguíneo em um perna ou pulmão (profunda venosa trombose ou embolia pulmonar) com Marvelon é pequeno.

- De cada 10.000 mulheres que não nenhum combinado hormonal anticoncepcional usar e não grávida estar, ter cerca de aproximadamente 2 em um período de um ano um coágulo sanguíneo.
- De cada 10.000 mulheres que um combinado hormonal contraceptivo usam que levonorgestrel, noretisterona ou norgestimato contém, recebem cerca de aproximadamente 5-7 em um ano um coágulo de sangue.
- De cada 10.000 mulheres que um combinado hormonal contraceptivo usam que desogestrel contém, como Marvelon, obter cerca de aproximadamente entre os 9 e 12 em um ano um coágulo sanguíneo.
- O risco de um coágulo sanguíneo ter obter é dependente de seu histórico médico pessoal (veja as seções 'Fatores que seu risco de um coágulo em uma veia2Fartéria aumentar' abaixo).

	<b>Risco de em um ano ter um coágulo sanguíneo</b>
Mulheres que <b>não</b> usam hormonal combinada pílula/adesivo/anel e não estão grávidas	Aproximadamente 2 de cada 10.000 mulheres
Mulheres que um comprimido combinado usam que <b>levonorgestrel, noretisterona ou norgestimato</b> contém	Aproximadamente 5-7 de cada 10.000 mulheres
Mulheres que Marvelon usam	Cerca de 9-12 de cada 10.000 mulheres

Fatores que seu risco de um coágulo sanguíneo em uma veia aumentar

O risco de um coágulo sanguíneo com Marvelon é pequeno, mas há certas circunstâncias que aumentam o risco .. risco é maior mais alto:

- se você grave obesidade tem (IMC [índice de massa corporal] superior a 30 kg/m<sup>2</sup>)

- se um dos seus próximos parentes em tenra idade (por exemplo antes o 50º ano) um coágulo sanguíneo teve em uma perna, pulmão ou outro órgão. Em esse caso pode você uma hereditária distúrbio de coagulação ter.
- se você uma cirurgia precisar submeter-se, ou se você longo tempo não está de pé devido a uma lesão ou doença, ou se seu perna no gesso está. O pode necessário ser para antes uma cirurgia, ou quando você menos móvel está, alguns semanas para parar com o uso de Marvelon. Se você precisar parar com Marvelon, pergunte então seu médico quando você pode começar novamente com o uso.
- se você envelhece fica (em particular acima aproximadamente 35 anos)
- se você nas últimas poucas semanas deu à luz .

O risco de um coágulo de sangue aumenta à medida que há mais destas condições se aplicam a você . Uma viagem de.

Uma viagem por mais de 4 (mais longo dan 4 hora) pode seu risco de um coágulo sanguíneo temporariamente aumentar, especialmente se houver algumas outras das mencionadas circunstâncias condições em você de aplicação são.

É importante que você o seu médico informe se um ou mais de estas condições em você de aplicação são, mesmo se você sobre isso duvida. Seu médico pode decidir que você deve parar com o uso de Marvelon.

Se um dos acima mencionadas circunstâncias muda enquanto você usa Marvelon ,por exemplo se um parente próximo tem um coágulo sanguíneo (trombose) recebe sem conhecida causa, ou se você muito em peso ganha, informe isso então ao seu médico.

## COÁGULO DE SANGUE EM UMA ARTÉRIA

O que pode ou acontecer se ou um coágulo de sangue é formado em uma artéria? Assim como um coágulo de sangue em uma veia, pode um coágulo sanguíneo em uma artéria graves problemas causar. O pode por exemplo um ataque cardíaco ou um derrame causar.

Fatores que seu risco de um coágulo sanguíneo em uma artéria aumentam

É importante que você saiba que o risco de um ataque cardíaco ou derrame pelo uso de Marvelon muito pequeno é, mas maior pode tornar-se:

- com aumentando idade (acima aproximadamente 35 anos)
- se você fuma. Se você um combinado hormonal contraceptivo como Marvelon usa, é recomendado que você pare com fumar. Se você não consegue parar de fumar e mais de 35 anos, pode seu médico lhe recomendar a um outro tipo contraceptivo a usar.
- se você sobrepeso tem
- se você alta pressão arterial tem
- se um membro da sua próxima família em jovem idade (antes dos 50 anos) um ataque cardíaco ou derrame teve . Em esse caso pode você também também um aumentado risco ter de um ataque cardíaco ou derrame ter receber.

- se você, ou um membro da sua próxima família, um aumentado nível de gordura no sangue tem (colesterol ou triglicerídeos)
- se você sofre de enxaqueca, especialmente enxaqueca com aura se
- você tem uma doença cardíaca tem (doença da válvula cardíaca, ou uma arritmia cardíaca que fibrilação atrial é chamada)
- se você diabetes (diabetes) tem.

Se mais então um de estas condições em você de aplicável é, ou se um de estas doenças particularmente grave é, pode o risco de obter de um coágulo de sangue mesmo ainda mais aumentado estar.

Se um dos acima mencionadas circunstâncias mudar enquanto você usa Marvelon utiliza, por exemplo se você começa a fumar ou se um parente próximo um coágulo sanguíneo (trombose) tem sem conhecido causa, ou se você muito em peso ganha, informe isso então ao seu médico.

### A pílula e câncer

Em mulheres que usam pílula é algo mais frequentemente câncer de mama diagnosticado do que em não usuárias de pílula da mesma idade. Dez anos após a parada com o comprimido não há nenhuma diferença mais. Não é conhecido se esta diferença é causada pelo comprimido. Pode também vir porque usuárias de pílula mais minucioso e mais frequentemente são examinadas, para que o câncer de mama mais cedo seja detectado.

Em raros casos são em usuárias de pílula benignos tumores hepáticos encontrados e in ainda mais raros casos malignos tumores hepáticos. Às vezes têm estes tumores levado a uma ameaça à vida interna hemorragia. Caso você de repente tenha problemas com forte dor abdominal, então deve você imediatamente entrar em contato com seu médico. Crônica

Crônica infecção com o humano papilomavírus é o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer do colo do útero. Em mulheres que usam a pílula por longos períodos de tempo pode de chance de contrair de câncer do colo do útero ligeiramente aumentado ser. É no entanto não claro se isso é causado pela pílula, ou que o fazer fazer tem com comportamento sexual comportamento e outros fatores (como melhor controle do colo do útero).

### Transtornos mentais

Algumas mulheres que hormonais contraceptivos incluindo Marvelon usam, têm relato feito de depressão ou tristeza. Depressão pode grave são e pode às vezes até pensamentos suicidas levar. Se você mudanças de humor e sintomas de depressão experimentar, entre em contato o mais rápido possível com seu médico para mais médico conselho.

### Usa você outros medicamentos ? Usa

você além Marvelon outros medicamentos ou fitoterápicos de remédios à base de plantas, tem você isso recentemente feito ou vai você fazer talvez em breve fazer ? Informe isso então seu médico, médico, farmacêutico ou parteira. Isto aplica-se também a medicamentos que você sem receita pode obter. Informe também a qualquer outro médico ou dentista (ou farmacêutico) que lhe um outro medicamento prescreve que você Marvelon usa. Eles podem então informar se é necessário é um extra não-hormonal contraceptivo (por exemplo um preservativo) usar e também quanto tempo você isso então deve usar ou isso esse o uso de um outro medicamento que você precisa ter, deve mudar.

Use Marvelon não se você tem hepatite C tem em para isso medicamentos com ombitasvirparitaprevirritonavir e dasabuvir ou glecaprevirpibrentasvir usado, porque isso um aumento de um enzima hepática (ALAT, um teste de função hepática) pode causar. Seu médico prescreverá um outro contraceptivo antes de começar a com esta tratamento. Marvelon pode cerca de 2 semanas após término de este tratamento novamente ser iniciado. Veja seção 2 'Quando pode este medicamento não usar?').

#### Alguns medicamentos

- podem uma influência ter nos níveis sanguíneos de Marvelon
- podem Marvelon menos eficaz tornar para gravidez para prevenir
- podem inesperadas hemorragias causar.

Incluem entre outros medicamentos para o tratamento de: epilepsia

- ( por exemplo por exemplo primidona, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, felbamato)
- tuberculose (por exemplo rifampicina, rifabutina)
- infecção por HIV (por exemplo ritonavir, nelfinavir, nevirapina, efavirenz)
- hepatite C-infecção viral (por exemplo boceprevir, telaprevir)
- outras infecções (por exemplo griseofulvina)
- alta pressão arterial nos vasos sanguíneos dos pulmões (bosentan)
- depressiva humor (o fitoterápico erva-de-são-joão).

Se você medicamentos ou fitoterápicos usa que tornam o Marvelon menos eficaz podem fazer, deve você também um método de barreira anticoncepcional usar. Porque o efeito de um outro medicamento sobre Marvelon até 28 dias após a interrupção de esse medicamento pode persistir, deve você que extra método de barreira anticoncepcional durante que tempo continuar usar.

Marvelon pode a eficácia de outros medicamentos afetar, por exemplo:

- medicamentos die ciclosporina conter
- o anti-epiléptico medicamento lamotrigina (isto pode levar a um aumento do número de crises).

#### Exames laboratoriais

Se houver exame de sangue em u deve ser feito, informe então seu médico ou o pessoal de laboratório que você está usando a pílula utiliza. Contraceptivos hormonais podem de fato o resultados de alguns exames afetam.

#### Gravidez e amamentação

##### Gravidez

Se você está grávida , ou acha que você poderia estar grávida poderia estar são pode tomar Marvelon não usar. Se você suspeitar que você está grávida enquanto você toma Marvelon usa , entre em rápido possível contato com seu médico. Amamentação

##### Amamentação

O uso de Marvelon é em geral não recomendado enquanto uma mulher amamenta . Se você pílula ainda quiser usar enquanto você ainda está amamentação dá, pode consultar o melhor contato entrar com seu médico.

Habilidade de condução e o uso de máquinas

Não há nenhuma indicação que a capacidade de dirigir e a capacidade de usar máquinas ser usar afetado ser.

Marvelon contém lactose

Se seu médico lhe disse informou que você determinados açúcares não tolera, entre em contato com seu médico antes de você este medicamento tomar.

Crianças e adolescentes até 18 anos

Há nenhuma informação clínica sobre a eficácia e segurança em adolescentes abaixo dos 18 anos.

Quando deve você procurar o médico durante o uso de este medicamento?

### 3. Como toma você este medicamento ?

Tome este medicamento sempre exatamente como seu seu médico de farmacêutico você que tem informado. Dúvida você sobre o correto uso? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

Quando e como toma o comprimidos em?

A cartela contém 21 comprimidos. Em cada comprimido está indicado em qual dia este deve ser tomado. Tome o comprimidos cada dia aproximadamente na mesma hora em, se necessário com um pouco de água. Siga a direção da seta que está na tira indicada até que você tenha tomado todos os 21 comprimidos tem ingerido. Depois tome 7 dias nenhum comprimido. Durante estes 7 dias deve uma hemorragia começar (a chamada hemorragia de privação ).). Esta começa geralmente no 2º ou 3º dia após o último comprimido de Marvelon. Comece no 8º dia com a próxima cartela, independentemente se o sangramento já terminou ou não. Dit significa que você sempre no mesmo dia da semana com um próximo blister começa, e também que a hemorragia de privação todo mês aproximadamente em mesmos dias cai.

Quando a começar com a primeira cartela

Você não a último mês nenhum pílula anticoncepcional usuou.

Comece com Marvelon no primeiro dia da ciclo (o primeiro dia da sua menstruação). Marvelon funciona neste caso imediatamente e você não precisa não precisa nenhum extra contraceptivo a usar.

Você pode também no dia 2-5 do ciclo começar mas então deve você nos primeiros 7 dias sim um extra contraceptivo (por exemplo um preservativo) usar.

Mudança de uma outra pílula combinada, anel vaginal ou adesivo contraceptivo

Você pode com Marvelon começar no dia após você tomar o último comprimido do seu anterior pílula ter tomado (então sem pausa). Se houver em seu anterior pílula também não-ativos comprimidos na tira estão, deve você imediatamente continuar após o último ativo comprimido de seu anterior pílula (se você não sabe qual é, pergunte então ao seu médico ou farmacêutico). Você pode também começar mais tarde, mas nunca depois do, mas nunca mais tarde do que em dia após o término da período sem comprimidos da sua anterior pílula (ou após o último comprimido não ativo da sua anterior pílula).

Se mudar de um anel vaginal ou adesivo anticoncepcional pode começar com Marvelon iniciar no dia da remoção do anel ou do último adesivo. Você pode também mais tarde começar, mas você deve em seu último sete dias após a remoção do anel ou o último adesivo com Marvelon começar.

Quando você a pílula, adesivo ou anel completamente de acordo com o prescrições tem usado e você está certo de que você não grávida está, pode você além disso parar com o uso do comprimido ou o anel ou adesivo remover em cada dia do seu atual ciclo e imediatamente mudar para o uso de Marvelon.

Se você estas instruções seguir não é necessário usar um método contraceptivo (por exemplo um preservativo) para usar.

Mudança de uma pílula de progestagênio (minipílula)

Você pode de uma para a outra dia mudar para Marvelon, mas você deve Marvelon, mas você primeira de primeiro 7 dias sim um extra contraceptivo (por exemplo um preservativo) usar.

Transição da injeção contraceptiva, um implante ou um contendo hormônio dispositivo intrauterino

Comece com Marvelon quando você de outra forma a próxima injeção deveria receber ou no dia em que o implante ou contendo hormônio dispositivo intrauterino é removido. Você deve o primeiros 7 dias no entanto sim um método contraceptivo adicional (por exemplo um preservativo) usar.

Na um parto

Se você acabou de dar à luz, o seu médico provavelmente recomendará esperar até a sua primeira menstruação espontânea, mas às vezes é possível mais cedo começar a. Siga o conselho do seu médico. Isso aplica-se também ao caso você amamenta amamentação dá em de pílula deseja usar.

Após um aborto espontâneo ou aborto

Siga o conselho do seu médico.

Tem você demasiado muito de este medicamento ingerido?

Há não existem nenhum relatos de graves efeitos adversos da ingestão de muitos Marvelon comprimidos ao mesmo tempo. Caso você tenha um número de comprimidos ao mesmo tempo tomado, então pode você possivelmente ter problemas de náusea náuseavômito ou de vaginal perda de sangue. Caso você descubra que uma criança Marvelon tomou, peça então seu médico por conselho ..

## fazer fazer ...

### **...em o esquecimento de comprimidos**

Se você **menos de 12 horas atrasado está** com a tomada de um um comprimido então é o efeito da pílula não está reduzido. Tome esse comprimido então assim que você lembrar e tome os próximos comprimidos novamente no horário habitual.

Se você **mais de 12 horas atrasado** está para tomar um comprimido, o efeito da pílula pode estar reduzido. Quanto mais comprimidos você esquecer consecutivamente, maior será a chance de que o efeito da pílula esteja reduzido is. De chance de proteção insuficiente contra gravidez é maior quando os comprimidos são omitidos no início ou no final da cartela. Portanto, aplicam-se as seguintes regras (veja também o esquema):

**de 1 1 esquecido em uma cartela Entre**  
em contato com com seu médico.

### **1 comprimido esquecido em semana 1**

Tome o comprimido esquecido assim que se lembrar, mesmo que isso signifique que você tomará dois comprimidos ao mesmo momento deve tomar. Tome depois os comprimidos novamente no horário habitual tempo in, mas você deve também usar métodos contraceptivos adicionais durante 7 dias. Se você teve relações sexuais na semana anterior ao esquecimento, deve considerar a possibilidade de gravidez. Nesse caso, entre em contato com seu médico imediatamente.

### **1 comprimido esquecido na semana 2**

Tome o comprimido esquecido assim que se lembrar, mesmo que isso signifique tomar dois comprimidos ao mesmo momento deve tomar. Continue a tomar os comprimidos novamente no habitual tempo in. O A eficácia da pílula não está reduzida, você não precisa usar métodos contraceptivos adicionais.

### **1 comprimido esquecido na semana 3**

Você pode escolher entre 2 opções sem métodos contraceptivos adicionais precisar usar.

1. Tome o comprimido esquecido assim que você lembrar, mesmo que isso signifique que você deve tomar dois comprimidos ao mesmo tempo. Continue tomando os comprimidos no horário habitual. **Além disso, pule o período sem comprimidos** e continue imediatamente com a próxima cartela. Muito provavelmente você só no final do segundo blister um da segunda cartela verdadeira hemorragia de privação, mas você pode ter spotting ou sangramento de escape durante a segunda cartela.
2. Você também pode parar com a cartela em questão. Você mantém um período sem comprimidos de 7 dias ou menos em **(contar sempre o dia em que você o**

**comprimido esqueceu ). Depois** continua Depois disso vai u simplesmente continue com a próxima cartela.  
Se você seguir este método, poderá sempre começar a nova cartela no seu dia fixo de início.

Se você esqueceu de tomar comprimidos em uma cartela e não tiver sangramento no próximo período normal sem comprimidos, isso pode significar que você está grávida. Você deve entrar em contato com seu médico antes de continuar com a próxima cartela.

... em caso de distúrbios gástricos e/ou intestinais (por exemplo, vômito, diarreia grave)  
Se você vomitar ou tiver diarreia grave, há uma chance de que as substâncias ativas não sejam completamente absorvidas pelo corpo. Se você vomitar dentro de 3-4 horas após tomar um comprimido, essa situação é semelhante a esquecer de tomar um comprimido. Portanto, em caso de vômito, siga o mesmo conselho indicado acima para esquecer comprimidos. Se você tiver diarreia grave, consulte seu médico.

... se você quiser adiar sua menstruação uma vez  
É possível adiar sua menstruação, embora isso não seja recomendado. Em casos excepcionais, você pode adiar sua menstruação continuando com uma nova cartela de Marvelon sem o período sem comprimidos. Você pode continuar com esta cartela até que todos os comprimidos acabem ou parar antes, se desejar. Durante o uso desta segunda cartela, você pode ter sangramento de escape ou spotting. Após o habitual período sem comprimidos de 7 dias, você começa novamente com a próxima cartela.

... se você quiser mudar o dia de início da sua menstruação

Se você tomar seus comprimidos conforme as instruções, sua menstruação começará sempre aproximadamente no mesmo dia. Se você quiser mudar esse dia, pode fazê-lo encurtando o período normal sem comprimidos entre duas cartelas (mas nunca prolongando-o). Por exemplo, se sua menstruação normalmente começa na sexta-feira e você quer mudá-la para terça-feira (3 dias antes), então você deve começar a nova cartela 3 dias antes do habitual. Se você fizer o período sem comprimidos muito curto (por exemplo, 3 dias ou menos), pode acontecer de você não ter sangramento durante este período sem comprimidos. Você pode então ter sangramento de escape ou spotting durante a próxima cartela.

... em caso de sangramento inesperado  
Com todas as pílulas anticoncepcionais, pode ocorrer sangramento inesperado (spotting ou sangramento de escape) nos primeiros meses. Você pode precisar de

absorventes ou tampões. Continue tomando seus comprimidos normalmente. O sangramento irregular geralmente para quando seu corpo se acostuma com a pílula (após cerca de 3 cartelas). Se durar mais, piorar ou começar novamente, entre em contato com seu médico.

... se o sangramento esperado não ocorrer

Se você tomou todos os comprimidos corretamente, não teve vômito e/ou diarreia, e não usou outros medicamentos, é altamente improvável que você esteja grávida. Você pode continuar com a próxima cartela sem preocupações.

Se o sangramento esperado não ocorrer duas vezes seguidas, você pode estar grávida. Entre em contato com seu médico imediatamente. Não continue com a próxima cartela de Marvelon até que seu médico confirme que você não está grávida.

Se você parar de tomar o tomar de este medicamento

Você pode com Marvelon parar quando quiser. Se você não grávida quiser ficar, peça então seu médico por conselho com relação a outros métodos confiáveis de planejamento familiar.

Se você parar porque você quer ficar grávida, geralmente no geral recomendado para esperar até que você tenha um ciclo menstrual natural antes de tentar engravidar . Você pode tentarengavidar . do que mais fácil calcular quando o parto irá ocorrer.

#### 4. Possíveis efeitos colaterais

Como qualquer medicamento pode também este medicamento efeitos colaterais ter. Não todos têm com isso a. Se você tiver umefeito colateral , especialmente se for grave de natureza e lang persiste, ou ocorre há uma mudança na sua condição de saúde da qual você acha que isso pode ser causado pode ser por Marvelon? Entre em contato com seu arts.

Alle mulheres que combinados hormonais contraceptivos usam têm um maior risco de coágulos sanguíneos nas veias (tromboembolismo venoso [TEV]) ou coágulos sanguíneos na artérias (arterial trombo- embolia [ATE]). Veja para mais informações sobre os diferentes riscos do uso de combinado hormonal anticoncepcional rubrica 2 'Quando pode você este medicamento não usar ou deve ter cuidado especial com ser?'

Entre em contato imediatamente com seu médico se você sintomas de angio-edema tiver como inchaço de seu rosto, língua e/ou garganta e/ou dificuldades ao engolir engolir de urticária possível com problemas respiratórios (ver seção 2 'Quando deve ter cuidado ser com este medicamento?').

Como em todas pílulas combinadas, pode seu padrão menstrual mudar, especialmente durante os primeiros meses do uso. Esta diferença pode estar em como frequentemente você um sangramento recebe (ausência do sangramento, menos frequentemente, mais frequentemente ou contínuo), quão intenso o sangramento é, ou quanto tempo o sangramento dura.

Frequentemente (ocorrem em menos de 1 em 10 mulheres )humores

- depressivos ,alterações de humor dor de cabeça
- náusea
- náuseador abdominal dor abdominal
- sensíveis seios, dolorosos seios

- ganho de peso.

Às vezes (ocorrem em menos de 1 em 100 mulheres )retenção de líquidos

- menos desejo de
- ter relações sexuais enxaqueca
- vômito
- vomitar, diarreia
- erupção cutânea, urticária (urticária)
- aumento das mamas.

Raramente (ocorrem em menos de 1 em 1000 mulheres ))

- prejudiciais coágulos sanguíneos em uma veia ou artéria, por exemplo:
  - o em uma perna ou pé (por exemplo trombose venosa profunda)
  - o em um pulmão (por exemplo embolia pulmonar)
  - o ataque cardíaco
  - o derrame
  - o 'pequeno derrame' ou temporários sintomas como em um derrame, conhecido como AIT (ataque isquêmico transitório)
  - o coágulos sanguíneos no fígado, estômago intestinos, rins ou olhos. A probabilidade de um coágulo sanguíneo ocorrer é maior maior se houver outras condições aplicáveis a você aplicável estão que este risco aumentam (ver seção 2 para mais informações sobre as condições que o risco de coágulos sanguíneos aumentam e os sintomas de um coágulo sanguíneo).
- reações de hipersensibilidade
- mais vontade de ter relações sexuais
- irritação dos olhos em o uso de lentes de contato
- dolorosos, nódulos azul-avermelhados na pele (eritema nodoso), erupção cutânea com irregulares manchas vermelhas ou úlceras (eritema multiforme) úlceras (eritema multiforme)
- secreção de o mamilo, mudança na secreção da vagina
- perda de peso.

O relato de efeitos colaterais

Você tem efeitos colaterais , entre em contato com, entre em contato com seu médico ou farmacêutico. Isto aplica-se também a efeitos colaterais que não neste folheto estão . Você pode efeitos colaterais também relatar através do via o Nederlands Efeitos colaterais Centro Lareb, site: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Ao efeitos colaterais relatar relatar, ajuda você nos a mais informações obter sobre a segurança deste medicamento medicamento medicamento.

## 5. Como armazenar você este medicamento?

Fora da vista e alcance de crianças manter.

Use este medicamento não mais na de última data de validade. Isso encontra você na caixa e a blister após EXP. Lá está um mês e um ano. O último dia do mês é a data de validade data de validade.

abaixo 30 °C. Não no congelador conservar ..  
na embalagem original blister ter proteção contra luz e umidade.

Tome este medicamento não em se você por exemplo ver que os comprimidos descoloridos de esfarelado são ou quando você outros sinais visíveis de deterioração na qualidade notar. Descarte medicamentos não pelo esgoto ou de wc e jogue os não no lixo. Pergunte seu farmacêutico o que fazer com medicamentos deve fazer que você não mais usa. Se você medicamentos da maneira correta descartar serão eles de uma forma correta destruídos e não eles entram no meio ambiente acidentalmente ..

## 6. Conteúdo de embalagem e outras informações

Quais substâncias estão neste medicamento ?Os

- princípios ativos neste medicamento são desogestrel medicamento são desogestrel (150 microgramas) em etinilestradiol (30 microgramas).
- De outras substâncias em este medicamento são silício coloidal anidro, lactose monoidratada, amido de batata, povidona, ácido esteárico, all-rac-alfa-tocoferol.

Como parece Marvelon e o que contém uma embalagem ?A  
embalagem contém 1, 3 ou 6 1, 3 ou 6 blisterstrips com 21 comprimidos.  
Nem todas as mencionadas tamanhos de embalagem são no comércio colocados.

Os comprimidos são brancos, redondos, em ambos lados convexo e têm um diâmetro de 6 mm. De um lado está 'TR' acima '5' e do outro lado 'Organon' borda 'Organon' em um de cinco pontas estrela.

Titular da autorização para a comercialização e fabricante N.V. Organon  
Kloosterstraat Rua do Convento 6  
Países Baixos  
Tel.: 00800 66550123 (+32 2 2418100)  
dpoc.benelux@organon.com  
[dpoc.benelux@organon.com](mailto:dpoc.benelux@organon.com)

No registro inscrito sob: RVG 08859

Este folheto informativo é para o última aprovado em maio 2025