

Prospect: informații pentru utilizator utilizator
Marvelon, comprimate
desogestrel, etinilestradiol

Lucruri importante pe care trebuie să le știți despre contraceptivele hormonale combinate anticoncepționale mijloace:

- Aceste mijloace formează un dintre cele mai de încredere reversibile metode contraceptive, dacă sunt utilizate corect.
- Ele oferă un ușor mai mare risc de apariția unui cheag de sânge (tromboză) în vene și artere, în special în primul an când dumneavoastră un combinat hormonal contraceptiv utilizat sau dacă dumneavoastră după o întrerupere de 4 săptămâni sau mai mult începeți din nou cu utilizarea a un combinat hormonal contraceptiv.
- Atenție bine la și contactați medicul dumneavoastră dacă credeți că aveți posibil simptome de un un cheag de sânge are (vezi rubrica 2 'Cheaguri de sânge (tromboză)').

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a acest medicament să luați pentru că există informații importante în pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. Poate aveți nevoie de el din nou mai târziu.
- Aveți dumneavoastră încă întrebări? Contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul.
- Nu dați acest medicament nu altora la alții, deoarece este doar pentru dumneavoastră prescris. Acesta poate dăunător sunt pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră. Aveți
- probleme cu unul dintre efectele secundare menționate în secțiunea rubrică 4 sunt? Sau aveți dumneavoastră un efect secundar care nu în acest prospect este menționat? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Conținutul din acest prospect

1. Ce este Marvelon și pentru ce se acest medicament utilizat?
2. Când nu trebuie să acest medicament nu utilizați sau trebuie să fiți extra precaut cu sunt?
3. Cum luați dumneavoastră acest medicament ?
4. Posibile efecte secundare
5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?
6. Conținutul ambalajului ambalaj en alte informații

1. Ce este Marvelon și pentru ce se folosește acest medicament?

Compoziție și tip pastilă

Marvelon este o pilulă contraceptivă orală combinată (de 'pilula combinată'). Fiecare tabletă conține o cantitate mică de două diferite hormoni feminini, și anume desogestrel (un hormon cu efect asemănător progesteronului) și etinilestradiol (un hormon cu efect estrogenic). Datorită cantității mici de hormoni cantitate este Marvelon considerat ca considerat ca un cu doză mică contraceptiv. Deoarece ambele hormoni în toate comprimatele din folie în aceeași cantitate combinați sunt, este un monofazic -- pil combinată numit.

Pentru ce este acest medicament utilizat?

Marvelon este utilizat pentru a preveni sarcina ..

este administrat ingestie (fără ca comprimatele să fie uitate) este șansa de a rămâne însărcinată foarte mică ..

2. nu trebuie să utilizați acest medicament nu utiliza sau trebuie să fiți extra precaut cu fiți?

Generale observații

Citiți înainte să începeți cu utilizarea Marvelon informațiile despre cheaguri de sânge cheaguri de sânge (tromboză) în rubrică 2. Este în special important că dumneavoastră citiți ce sunt simptomele ale unui cheag de sânge cheag de sânge vezi rubrică 2 ' 2Cheaguri de sânge (tromboză)'.

În acest prospect sunt descrise câteva situații în care trebuie să opriți utilizarea medicamentului contraceptiv sau de în care de fiabilitatea a pilulei scăzută poate fi. În astfel de situații trebuie să vă abțineți de la relații sexuale sau un suplimentar contraceptiv fără hormoni utilizați, de exemplu un prezervativ sau alt metodă contraceptivă de barieră. Nu folosiți metoda calendarului - sau metoda temperaturii metoda temperaturii. Aceste metode pot fi nesigure pentru că deoarece de pilula influență are asupra normale schimbări ale temperaturii corpului și endometrului în timpul în timpul de ciclu menstrual.

Marvelon oferă la fel ca alte hormonale contraceptive nici o protecție împotriva unei hiv- infecție (SIDA) sau alte transmisibile sexual afecțiuni (boli cu transmitere sexuală).

Când nu trebuie să acest medicament nu utilizați?

Nu trebuie să acest medicament nu utilizați dacă aveți o dintre mai jos menționate afecțiuni aveți. Dacă aveți o dintre mai jos menționate afecțiuni aveți, spuneți acest lucru atunci medicului dumneavoastră . Medicul dumneavoastră va cu dumneavoastră discuta care altă formă de anticoncepție mai potrivită este pentru dumneavoastră. Vezi de asemenea secțiunea ' Când trebuie să luați suplimentar u extra atenție fiți cu acest medicament? '.

- Ați avut un cheag de sânge într-un vas de sânge al picioarelor (tromboză venoasă profundă , TVP), de, TVP), de plămâni (embolie pulmonară) sau un alt organ, sau ați avut aceasta în trecut ..
- că aveți o tulburare un tulburare are de dumneavoastră coagularea sângelui – de exemplu proteină C-deficiență, proteină S- deficiență, antitrombină-III-deficiență, factor V-Leiden sau anticorpi împotriva fosfolipide.
- U trebuie să fiți operat sau sunteți pe o perioadă lungă imobilizat pe picioare (vezi rubrica 'Cheaguri de sânge (tromboză)').
- U are vreodată un infarct sau un accident vascular cerebral avut.
- Ați aveți angină pectorală (o afecțiune care cauzează durere în piept severă en un primul simptom de un infarct poate fi) sau un 'atac ischemic tranzitoriu' (AIT: simptome tranzitorii de un accident vascular cerebral) sau dumneavoastră are acest vreodată avut.
- Dumneavoastră aveți o dintre următoarele boli, care risc de un cheag de sânge în dumneavoastră artere pot crește:
 - severe diabet cu deteriorare a vaselor de sânge
 - sever crescută tensiune arterială

- un sever crescut nivel de grăsimi în sângele dumneavoastră (colesterol de trigliceride)
- o afecțiune care hiperhomocisteinemie este numită.
- Aveți o tip de migrenă care 'migrenă cu aură' este numită (sau (of a avut acest vreodată a avut).
- Dumneavoastră ați avut pancreatită (o inflamație a pancreasului) sau ați avut acest a avut, combinat cu o ridicat conținut de grăsime în dumneavoastră sânge.
- Aveți icter (îngălbenireapielii sau ochilor) sau o afecțiunehepatică gravă gravă afecțiune hepatică de are acest avut, și de rezultatele ale testelor funcției hepatice sunt încă nu normale.
- Dumneavoastră aveți o formă de cancer sau a avut acest a avut care sensibil poate fi la hormoni sexuali (cum ar fi cancer de sân sau cancer al organelor genitale).
- Dumneavoastră are cancer la ficat sau are acest lucru a avut.
- Dumneavoastră aveți sângerări neobișnuite din vagin a căror cauză nu a fost stabilită stabilit.
- U aveți o îngroșare anormală a mucoasei uterine.
- Sunteți alergic la una dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe puteți u găsi în rubrica 6 din acest prospect.

Dacă una dintre situațiile menționate apare în timp ce utilizați deja Marvelon , atuncitrebuie trebuie u imediat opriți utilizarea utilizarea și contactați contact cu medicul dumneavoastră. Utilizați în timpul un altul, nu- hormonală metodă de contracepție. Vezi de asemenea 'Observații generale' la începutul secțiunii 2.

Nu utilizați Marvelon dacă aveți hepatită C u hepatita C are en pentru aceasta medicamente cu ombitasvir2Fparitaprevir2Fritonavir și dasabuvir sau glecaprevir2Fpibrentasvir utilizat (vezi de asemenea rubrica 2 'Utilizat u încă alte medicamente?').

Când trebuie să fiți precaut fiți cu acest medicament?

Când trebuie să contactați luați legătura cu dumneavoastră medic?

Chemați de urgență medicală ajutor dacă

- aveți posibile simptome sau semne de un cheag de sânge observați , carepot însemna că acel u suferiți de un cheag de sânge în piciorul dumneavoastră (adică. tromboză venoasă profundă), un cheag de sânge în plămânul dumneavoastră (adică. embolie pulmonară), un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral (vezi mai jos secțiunea ' Cheaguri de sângeCheaguri de sânge tromboză').Mergi

la pentru un descriere a simptomelor sau manifestărilor acestor efecte grave secundare la 'Cum recunoașteți un cheag de sânge ?'.Spuneți

asta medicului dumneavoastră medic, dacă un dintre următoarele situații se aplică dumneavoastră .

Dacă afecțiunea apare sau se agravează, în timp ce utilizați Marvelon, trebuie să vă consultați medicul dumneavoastră sau să contactați medicul dumneavoastră.

- Dumneavoastră fumați.
- Dumneavoastră aveți diabet.
- Sunteți foarte supraponderal ..
- U aveți o tensiune arterială crescută.
- U aveți o afecțiune a valvelor cardiace sau o anumită aritmie.
- U aveți o inflamație în vene aproape sub piele (tromboflebită superficială). Aveți varice . Cineva.
- familia dumneavoastră apropiată directă familie are vreodată tromboză, un infarct sau un accident vascular cerebral avut.
- Aveți probleme cu migrenele. Aveți epilepsie . Aveți epilepsie . crescute niveluri de grăsimi în sângele dumneavoastră (hipertrigliceridemie), sau această afecțiune apare în familia dumneavoastră sau a apărut în familia dumneavoastră anterior apărut. Hipertrigliceridemie este în legătură adusă cu un risc mai mare de pancreatită (o inflamație a pancreasului) a face.
- Trebuie să fiți operat sau sunteți pe parcursul lungă perioadă nu pe picioare (vezi 'Cheaguri de sânge (tromboză)' în rubrica 2).
- Dacă ați născut recent, aveți un risc crescut de a face cheaguri de sânge. medicul dumneavoastră cum repede după naștere puteți începe să luați medicamentul din nou utilizare de Marvelon.
- Aveți pe cineva în familia dumneavoastră apropiată care a avut cancer la sân . Aveți.
- afecțiune a ficatului sau a vezicii biliare afecțiune ficatului sau de vezica biliară.
- U aveți de boala Crohn sau colită ulceroasă (cronică intestinală).
- U aveți lupus eritematos sistemic (LES - lupus eritematos (LES - boală care vă naturală natural sistem imunitar afectează).
- Dumneavoastră aveți hemolitic-uremic sindrom (HUS - o tulburare a coagulării sângelui care insuficiență renală cauzează).
- Dumneavoastră aveți anemie cu celule în seceră (un ereditară boală a celulelor roșii din sânge).
- Dumneavoastră aveți o afecțiune care pentru prima dată a apărut sau s-a agravat în timpul unei sarcini de la anterior utilizare de hormoni sexuali, de exemplu pierderea auzului, porfirie (o afecțiune a sângelui), herpes gestationis (erupție cutanată cu vezicule în timpul al sarcinii) sau coreea Sydenham (o afecțiune neurologică în care mișcări bruște ale corpului apar).
- Aveți simptome de angio- edem cum ar fi umflături umflare de dumneavoastră față, limbă și gât sau dificultăți la înghițire sau urticarie posibil cu probleme respiratorii . Consultați acest caz caz contact direct cu medicul dumneavoastră. Produse cu estrogeni pot de simptomele de ereditar și dobândit angio-edem cauza sau agrava.

- Dumneavoastră are cloasmă sau dacă are vreodată cloasmă avut (galben-maronii pete pigmentare, așa-numitele 'pete de sarcină', mai ales pe față); dacă acest caz este, este înțelept să evitați expunerea la lumina soarelui sau la lumină ultravioletă evitați.

Pilula și cheaguri de sânge cheaguri de sânge tromboză(tromboză)

CHEAGURI DE SÂNGE (TROMBOZĂ)

Dacă utilizați un combinat hormonal contraceptiv precum Marvelon utilizați, aveți un risc mai mare de a un cheag de sânge a primi apoi dacă dumneavoastră nu combinat hormonal contraceptiv utilizați. În rare cazuri poate un cheag de sânge un vas de sânge bloca și în grave probleme cauza. Cheaguri de sânge pot apărea

- în vene (aceasta se numește 'tromboză venoasă', 'trombo-embolie venoasă' sau TEV numită de TEV numit)
- în artere (acest se numește 'tromboză arterială', 'trombo-embolie arterială' sau ATE numit).

Nu se recuperează întotdeauna complet de cheaguri de sânge. În rareori cazuri pot apărea efecte de lungă durată grave efecte fi, sau în foarte rareori cazuri pot cheaguri de sânge fi mortale letal sunt.

Este important că dumneavoastră știți că riscul general de un cheag de sânge dăunător din cauza Marvelon mic este. CUM RECUNOAȘTEȚI UN CHEAG DE SÂNGE?

Contactați

Comutare de urgență medicală ajutor în dacă dumneavoastră un dintre următoarele simptome sau semne observați.

Aveți dumneavoastră unul dintre aceste simptome de simptome?	Unde puteți să suferiți? umflarea
unui picior sau de-a lungul unei vene în un picior sau laba piciorului, mai ales dacă este însoțită de: de picior, mai ales dacă este însoțit de: durere sau sensibilitate a piciorului, care poate fi simțită doar când stați în picioare sau mergeți temperatură crescută în piciorul afectat schimbare de culoare a pielii piciorului piciorul piciorul, de exemplu devine palid, roșu sau albastru	Tromboză venoasă profundă
bruscă neexplicată dificultate respiratorie sau respirație rapidă tuse fără cauză clară, în care puteți să tușiți sânge ascuțită durere în piept, care poate deveni mai intensă dacă respirați adânc senzație severă de amețală în cap sau vertij amețală rapid sau neregulat ritm cardiac severă durere în dumneavoastră stomac	Embolie pulmonară

Dacă vă îndoiți, contactați atunci contact cu un medic, deoarece că unele dintre aceste simptome, cum ar fi tusea sau dificultatea de respirație, pot fi eronat fi considerate ca o afecțiune mai ușoară, cum ar fi o infecție respiratorie (de exemplu, răceală).	
Simptomele apar de obicei la un ochi singur: imediat pierderea vederii a vederii, sau vedere încețoșată fără durere, ceea ce se poate dezvolta în pierderea vederii a vederii	Tromboză venoasă în retină (cheag de sânge în retină ochi)
Aveți una dintre aceste plângeri sau simptome?	De ce puteți suferi?
vedere	
durere, disconfort, presiune sau o senzație grea, apăsătoare sau plină în piept, braț sau sub stern senzație de plenitudine, indigestie sau dificultăți de respirație disconfort în partea superioară a corpului care radiază spre spate, maxilar, gât, braț și stomac transpirație, greață, vărsături sau amețeli slăbiciune extremă, anxietate sau dificultăți de respirație bătăi rapide sau neregulate ale inimii	Infarct
slăbiciune bruscă sau amorțeală a feței, brațului sau piciorului, în special pe o parte a corpului confuzie bruscă, dificultăți de vorbire sau de înțelegere dificultăți bruște de vedere la unul sau ambii ochi dificultăți bruște de mers, amețeli, pierderea echilibrului sau coordonării durere de cap bruscă, severă sau de lungă durată fără cauză cunoscută conștiență redusă sau leșin cu sau fără convulsie Simptomele unui accident vascular cerebral pot dura uneori doar puțin timp și se pot recupera aproape imediat și complet. Totuși, trebuie să solicitați asistență medicală de urgență, deoarece există riscul de a avea un alt accident vascular cerebral.	Accident vascular cerebral
umflare și ușoară colorare albastră a unui braț sau picior durere severă în abdomenul dumneavoastră (abdomen acut)	Cheag de sânge care blochează alte vase de sânge

CHEAGURI DE SÂNGE ÎNTR-O VENĂ

Ce se poate întâmpla dacă se formează un cheag de sânge este format într-o venă ?Utilizarea

- medicamentului de către combinate hormonale contraceptive este asociat cu un risc crescut de cheaguri de sânge într-o venă (tromboză venoasă). Acestea (venoasă tromboză). Această efecte secundare apar însă rar pentru. De obicei apar ele în primul an când un combinat hormonal contraceptiv este utilizat.
- Dacă există un cheag de sânge este format în o venă în un picior sau laba piciorului, poate cauza o tromboză venoasă profundă (TVP) provoca.
- Dacă un cheag de sânge din picior este transportat și în plămân ajunge, poate să provoace embolie pulmonară embolie pulmonară.
- Apare foarte frecvent rar pentru că un cheag de sânge este format in o venă in un alt organ, cum ar fi ochiul (venosvenoasă tromboză în retină).

Când este riscul de un cheag de sânge în o venă este cel mai mare?

Riscul de a avea un cheag de sânge în o venă a obține este cel ridicat în primul an când o femeie pentru prima dată un combinat hormonal anticonceptiv utilizat. Het risc poate de asemenea crescut fi dacă dumneavoastră după o întrerupere de 4 săptămâni sau mai mult din nou începeți cu utilizarea de unui combinat hormonal contraceptiv (același produs, sau unui alt produs decât anterior).

După primul an devine riscul risc mai mic, dar rămâne ceva mai mare decât când utilizați nu combinat hormonal contraceptiv utilizați.

Dacă opriți utilizarea cu Marvelon, riscul dumneavoastră de un cheag de sânge în câteva săptămâni din nou normal.

Cum mare este riscul de un cheag de sânge?

Riscul depinde de af de dumneavoastră natural risc de TEV, și de tipul combinat hormonal contraceptiv pe care îl utilizați.

Riscul general de un cheag de sânge cheag de sânge în un picior sau plămân (tromboză venoasă profundă sau embolie pulmonară) cu Marvelon este mic.

- Din fiecare 10.000 femei care nu niciun combinat hormonal anticonceptiv utiliza și nu însărcinată fi, obține aproximativ 2 în o perioadă de un an un cheag de sânge cheag de sânge.
- De la fiecare 10.000 femei care un combinat hormonal contraceptiv utilizează care levonorgestrel, noretisteron sau norgestimat conține, primesc aproximativ 5-7 din 5-7 ani un an un cheag de sânge.
- Din fiecare 10.000 femei care un combinat hormonal contraceptiv utilizează care desogestrel conține, cum ar fi Marvelon, a obține aproximativ aproximativ între 9 și 12 în un an un cheag de sânge.
- Riscul riscul de a un cheag de sânge a obține este dependent de dumneavoastră personală medicală antecedente (vezi secțiunile ' Factoricare dumneavoastră risc de un cheag de sânge în în un venă2Farteră crește' mai jos).

	Risc de în un an a avea un cheag de sânge
Femei care nu utilizează hormonale pilulă/patch/inel combinat și nu sunt însărcinate	Aproximativ 2 din fiecare 10.000 femei
Femei care utilizează o pilulă combinată care conține levonorgestrel, noretisteron sau norgestimat conține	Aproximativ 5-7 din fiecare 10.000 femei
Femei care Marvelon utilizează	Aproximativ 9-12 din fiecare

10.000 femei

Factori care vostru risc de un cheag de sânge în o venă crește

Het risc de un cheag de sânge cu Marvelon este mic, dar există sunt anumite circumstanțe care risc crește. Riscul dumneavoastră risc este mai mare:

- dacă aveți sever obezitate aveți (IMC [indicele de masă corporală] mai mare de 30 kg/m²)
- dacă un dintre dumneavoastră apropiați membri ai familiei la vârstă fragedă (de exemplu înainte al 50-lea an) un cheag de sânge a avut a avut în un picior, plămân sau alt organ. În acel caz puteți să un ereditară tulburare de coagulare aveți.
- dacă dumneavoastră o operație trebuie să suferiți, sau dacă dumneavoastră lungă perioadă nu sunteți pe picioare din cauza unei accidentări sau boală, sau dacă dumneavoastră piciorul în gips este. poate necesar fi să înainte de o operație, sau când sunteți mai puțin mobil , câteva săptămâni să opriți utilizarea utilizarea Marvelon. Dacă trebuie să opriți Marvelon, întrebați atunci medicul dumneavoastră când puteți din nou să începeți utilizarea utilizarea.
- dacă dumneavoastră îmbătrâniți deveniți (în mod special peste aproximativ 35 ani)
- dacă dumneavoastră în ultimele câteva săptămâni ați născut .

Acesta risc de un cheag de sânge crește pe măsură ce sunt mai multe dintre aceste condiții se aplică în cazul dumneavoastră sunt.

O călătorie cu avionul (mai lungă de 4 oră) poate dumneavoastră risc de un cheag de sânge temporar crește, în special dacă există câteva alte dintre menționate condiții condiții pe dumneavoastră aplicabil sunt.

Este important că dumneavoastră medicului spuneți dacă o sau mai multe dintre aceste condiții pe dumneavoastră aplicabil sunt, chiar dacă dumneavoastră despre aceasta aveți îndoieli. Medicul dumneavoastră poate decide că dumneavoastră trebuie să opriți utilizarea Marvelon. Dacă

Dacă un dintre mai sus menționate condiții se schimbă în timp ce utilizați Marvelon ,de exemplu dacă un membru apropiat de familie un cheag de sânge (tromboză) primește fără cunoscut cauză, sau dacă dumneavoastră mult în greutate câștigați, spuneți acest lucru atunci la medicul dumneavoastră.

CHEAG DE SÂNGE ÎNTR-O ARTERĂ

Ce poate să se întâmple dacă se formează un cheag de sânge este format într-o arteră ?La fel ca un cheag de sânge într-o venă un ader, poate un cheag de sânge în o arteră probleme grave provoca. Poate de exemplu un atac de cord sau un accident vascular cerebral provoca cauza.

Factori care vă riscul de un cheag de sânge într-o arteră cresc Este important să știți că riscul de un cheag de sânge în un infarct sau accident vascular cerebral prin utilizarea Marvelon foarte mic este, dar mai mare poate deveni:

- cu creșterea vârstei (peste aproximativ 35 ani)
- dacă dumneavoastră fumați. Dacă dumneavoastră un combinat hormonal contraceptiv precum Marvelon utilizați, se recomandă că dumneavoastră opriți cu fumatul. Dacă nu puteți să renunțați la fumat și aveți mai mult de 35 de ani, poate medicul dumneavoastră vă poate recomanda să un altul tip contraceptiv a utiliza.
- dacă aveți supraponderalitate aveți
- dacă aveți tensiune arterială ridicată aveți
- dacă un membru al familiei dumneavoastră apropiate pe tânără vârstă (înainte de al 50-lea an) un infarct sau accident vascular cerebral a avut . În cazul în care puteți să de asemenea de asemenea un risc crescut a avea de a un infarct sau accident vascular cerebral a face.
- dacă dumneavoastră, sau un membru al familiei apropiate ,, un crescut nivel de grăsime în sânge are (colesterol sau trigliceride)
- dacă suferiți de migrenă , în special migrenă cu aură dacă suferiți de
- un u un afecțiune cardiacă are (afecțiune a valvelor cardiace, sau o aritmie cardiacă care fibrilație atrială este numită)
- dacă aveți diabet (diabet zaharat) aveți.

Dacă mai mult atunci un dintre aceste condiții se aplică la dvs. aplicabil este, sau dacă un dintre aceste afecțiuni deosebit grav este, poate riscul de la a obține de un cheag de sânge chiar mai departe crescut sunt.

Dacă un dintre de mai sus menționate circumstanțe se schimbă în timp ce utilizați Marvelon utilizați, de exemplu dacă dumneavoastră începeți să fumați sau dacă un membru de familie un cheag de sânge (tromboză) face fără cunoscut cauză, sau dacă dumneavoastră mult în greutate câștigați, spuneți acest lucru atunci la medicul dumneavoastră.

Pilula anticoncepțională și cancer

La femeile care folosesc pilula utilizează este ceva mai frecvent cancer de sân diagnosticat decât la femeile care nu folosesc pilula de aceeași vârstă. Zece ani după oprirea utilizării cu pilula nu există niciun diferență mai. Este nu cunoscut dacă această diferență este cauzată de pilula. Poate de asemenea să fie pentru că utilizatoarele de pilule mai amănunțit și mai frecvent sunt examinate, astfel încât de cancerul de sân mai devreme este descoperit.

În cazuri rare cazuri sunt la utilizatoarele de pilule benign tumori hepatice găsite și în încă mai rare cazuri maligne tumori hepatice. Uneori au aceste tumori condus la o amenințătoare de viață internă sângerare. Dacă dumneavoastră brusc aveți probleme cu durere abdominală, atunci trebuie dumneavoastră imediat contact luați cu medicul dumneavoastră.

Cronică infecția cu virusul papilloma uman este principalul factor de risc pentru a dezvolta de la cancer de col uterin. La femeile care iau anticoncepționalele pe termen lung utilizează poate de șansa de a obține de cancer de col uterin ușor crescut sunt. Este totuși nu clar dacă acest lucru este cauzat de pilulă, sau că it a face are cu comportament sexual și alți factori (precum un control mai bun al colului uterin).

Tulburări psihice

Unele femei care hormonale contraceptive inclusiv Marvelon utilizează, au raportat despre de la depresie sau tristețe. Depresia poate fi severă sunt și poate uneori până la gânduri de sinucidere

duce. Dacă aveți schimbări de dispoziție și simptome de depresie experimentați, contactați cât mai repede posibil medicul dumneavoastră medic pentru mai departe medical sfat.

Folosiți dumneavoastră alte medicamente ?Folosiți

dumneavoastră pe lângă Marvelon alte medicamente sau remedii pe bază de plante de remedii pe bază de plante, ați dumneavoastră asta recent făcut sau veți face dumneavoastră acest lucru poate în curând faceți? Spuneți asta atunci medicului dumneavoastră, farmacist sau moașă. Acest lucru se aplică de asemenea pentru medicamente pe care le fără rețetă puteți obține. Informați de asemenea pe fiecare alt medic sau dentist (sau farmacist) care vă un alt medicament prescrie că utilizați Marvelon . Eipot să vă spună dacă este necesar să un alt extra non-hormonal contraceptiv (de exemplu un prezervativ) să utilizați și cât timp dumneavoastră acesta atunci trebuie utilizați sau acesta acel al utilizarea a unui alt medicament care aveți nevoie de, trebuie să schimbați.

Nu utilizați Marvelon dacă aveți hepatită C u hepatita C are en pentru aceasta medicamente cu ombitasvirparitaprevirritonavir și dasabuvir sau glecaprevirpibrentasvir utilizat, deoarece acest o creștere de un enzimă hepatică (ALAT, un test de sânge pentru funcția hepatică) poate cauza. Medicul dumneavoastră va un alt contraceptiv prescrie înainte să începeți cu acest tratament. Marvelon poate aproximativ 2 săptămâni după încheierea acestui acest tratament din nou fi reluat. Vezi secțiunea 2 'Când aveți voie acest medicament nu utilizați?').

Unele medicamente

- pot o influență avea asupra nivelurilor sanguine de Marvelon
- pot Marvelon mai puțin eficient face să sarcină a preveni
- pot neașteptate sângerări cauza.

Acestea includ sub alte medicamente pentru de tratamentul de:

- epilepsie (de exemplu primidon, fenitoină, fenobarbital, carbamazepină, oxcarbazepină, topiramat, felbamat)
- tuberculoză (de exemplu rifampicină, rifabutină)
- infecție HIV (de exemplu ritonavir, nelfinavir, nevirapine, efavirenz)
- hepatita C-infecție virală (de exemplu boceprevir, telaprevir)
- alte infecții (de exemplu griseofulvin)
- tensiune arterială în vasele de sânge ale plămânilor (bosentan)
- depresivă stare (remediu pe bază de plante sunătoare).

Dacă utilizați medicamente sau remedii pe bază de plante utilizați care pot face Marvelon mai puțin eficient pot să, trebuie să de asemenea un metodă contraceptivă de barieră utiliza. Deoarece efectul unui alt medicament asupra Marvelon poate dura până la 28 zile după oprirea administrării acelui medicament poate continua ,trebuie trebuie utilizați suplimentar metodă de barieră contraceptivă pe durata care timp continuați să utilizați.

Marvelon poate influența eficacitatea altor medicamente medicamente afecta, de exemplu:

- medicamente die ciclosporină conțin
- anti-epileptic medicament lamotrigină (acest poate duce la un număr crescut de crize).

Investigații de laborator

Dacă se analiză de sânge la u trebuie fie făcut, spuneți atunci medicului dumneavoastră sau personalului de laborator că utilizați pilula .. hormonale pot de fapt să de rezultate de unele investigații influențează.

Sarcina și alăptarea

Sarcina

Dacă sunteți însărcinată , sau credeți că sunteți însărcinată ați putea fi nu aveți voie să utilizați Marvelon nu utilizați. Dacă suspectați că sunteți însărcinată în timp ce utilizați Marvelon , contactați cât mai repede posibil medicul dumneavoastră. Alăptarea Este medicul dumneavoastră. Alăptarea

Este

Acesta utilizarea a Marvelon este în general nu recomandată atâta timp cât o femeie alăptează . Dacă doriți săpilula totuși să utilizați în timp ce dumneavoastră încă încă alăptare dă, puteți să cel mai bine contactați luați legătura cu medicul dumneavoastră. medicul dumneavoastră.

Aptitudinea de a conduce vehicule și utilizarea utilizarea mașinilor

Nu există nu există indicii că de abilitatea de a conduce și capacitatea de a folosi mașini poate fi afectată . Marvelon.

lactoză Dacă medicul

dumneavoastră v-a spus că spus că dumneavoastră anumite zaharuri nu tolerați, contactați medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament ..

și adolescenți până la 18 ani an

Există niciun clinică informație despre eficacitatea și siguranța la adolescenți sub de 18 ani.

Când trebuie să mergeți la medic în timpul utilizarea utilizarea acestui acest medicament?

3. Cum luați dumneavoastră acest medicament ?

Luați acest medicament întotdeauna exact așa cum vă medicul medicul farmacist dumneavoastră că a spus v-a spus. Aveți îndoieli cu privire la corecta utilizare? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Când și cum luați u de tablete în?

Folia conține 21 tablete. La fiecare tabletă este indicat în care zi aceasta trebuie să fie administrată. Luați comprimate fiecare zi aproximativ la aceeași oră în, dacă este necesar cu

puțină apă. Urmați indicațiile direcția săgeții săgeată care este pe folie indicată până când ați luat toate cele 21 de comprimate ați luat administrat. Apoi luați 7 zile fără comprimat. În decursul acestor 7 zile ar trebui o sângerare să înceapă (așa-numita sângerare de întrerupere). Aceasta începe de obicei în a 2-a sau a 3-a zi după ultima tabletă Marvelon. Începeți în a 8-a zi cu următorul blister, indiferent dacă sângerarea este deja terminată sau nu. Aceasta înseamnă că trebuie să continuați în aceeași zi a săptămânii cu un următorul blister începeți, și de asemenea că sângerarea de întrerupere fiecare lună aproximativ pe aceleași zile cade.

Când să începeți cu prima folie

Nu ați în ultima lună nu ați folosit pilulă contraceptivă.

Începeți cu Marvelon în prima zi a ciclului (prima zi a menstruației dumneavoastră).

Marvelon funcționează în acest caz imediat și nu trebuie nevoie niciun extra contraceptiv să utilizați.

Puteți de asemenea în ziua 2-5 a ciclului începeți dar atunci trebuie să utilizați primele 7 zile da un extra contraceptiv (de exemplu un prezervativ) utilizați.

Trecerea de la o altă pilulă combinată, inel vaginal sau pasture contraceptiv

Dumneavoastră puteți cu Marvelon începe în ziua după ce ați luat ultima tabletă de la anteriorul pilulă ați luat (deci fără pauză). Dacă există la dumneavoastră anterior pastilă de asemenea neactive comprimate în folie sunt, trebuie să imediat continuați după ultima ultimul activ comprimat de dumneavoastră anterior pilulă (dacă nu știți care este aceasta , întrebați atunci pe medicul dumneavoastră sau farmacistul). Puteți de asemenea începeți mai târziu, dar niciodată mai târziu de zi după încheierea a perioadei fără tablete de la dumneavoastră anterior pilulă (sau după ultima tabletă neactivă de la dumneavoastră anterior pilulă).

Dacă treceți de la un inel vaginal sau pasture contraceptiv puteți începe cu Marvelon începeți în ziua îndepărtării a inelului sau a ultimului pasture. Puteți de asemenea mai târziu începeți, dar dumneavoastră trebuie la cel târziu șapte zile după îndepărtarea inelului sau a ultimei pasturi cu Marvelon începeți.

Când luați pilula, pasture sau inel complet conform de prescripții ați utilizat și sunteți sigur de că nu sunteți însărcinată sunteți, puteți să în plus opriți cu luarea a pilulei sau a inelului sau pasturele îndepărtați în fiecare zi a dumneavoastră curentului ciclu și imediat treceți la utilizarea a Marvelon.

Dacă urmați aceste instrucțiuni , nu este necesar să folosiți un contraceptiv suplimentar (de exemplu un prezervativ) să utilizați.

Trecerea de la o pilulă progestativă (minipilulă)

Puteți trece de la una la cealaltă zi treceți la Marvelon, dar trebuie să trebuie să prima primul 7 zile da un extra contraceptiv (de exemplu un prezervativ) utilizați.

Trecerea de la injecția contraceptivă, un implant sau un care conține hormoni dispozitiv intrauterin

Începeți cu Marvelon când dumneavoastră altfel următoarea injecție ar primi sau în ziua în care dispozitivul implant sau dispozitivul care conține hormoni intrauterin este eliminat. Dvs. trebuie să primele 7 zile totuși să un contraceptiv suplimentar (de exemplu un prezervativ) utilizați.

După o naștere

Dacă tocmai ați născut , vă va medicul probabil recomanda să așteptați până la prima menstruație spontană , dar uneori uneori este posibil mai devreme să începeți. Urmați sfatul medicului dumneavoastră. Acest lucru se aplică de asemenea pentru cazul în care alăptați u alăptare dă en de pil doriți utiliza.

După un avort spontan sau avort

Urmați sfatul medicului dumneavoastră. dumneavoastră medic.

Ați luat prea mult de acest medicament luat?

Există nu rapoarte despre efecte grave dăunătoare ale administrării unei cantități mari de multe Marvelon comprimate odată. Dacă ați luat un număr de comprimate deodată , atunciputeți să aveți posibil disconfort din cauza greață greațăvărsături sau de vaginal pierdere de sânge. Dacă dumneavoastră descoperiți că un copil Marvelon a luat ,cereți atunci medicul dumneavoastră pentru sfat ..

să faceți a face ...

...la uitarea de comprimate Dacă

ați mai puțin **de 12 12 întârziat cu administrarea** unui cu acesta a lua de la un tabletă atunci este eficacitatea pilulei nu scăzută. Luați această tabletă atunci când vă amintiți și luați următoarele tablete la ora obișnuită. gândiți-vă la asta și luați din nou următoarele comprimate la ora obișnuită.

întârziați mai mult de 12 ore **mai mult de 12 ore întârziere** efectul pilulei poate fi redus. Cu cât ați uitat mai multe comprimate consecutiv, cu atât este mai mare șansa ca pilulei să fie scăzută scăzut este. Probabilitatea de protecție insuficientă împotriva sarcinii sarcină este cel mai mare atunci când comprimatele sunt omise la începutul sau la sfârșitul benzii. Prin urmare, se aplică următoarele reguli (vezi și schema):

mult de 1 comprimat uitat într-o bandă

Contactați medicul dumneavoastră imediat medicul dumneavoastră medic.

1 tabletă uitată în săptămână 1

Luați tableta uitată imediat ce vă amintiți, chiar dacă aceasta ar însemna să luați două tablete în același moment trebuie să luați. Luați în continuare tabletele din nou la ora obișnuită de administrare în, dar trebuie să utilizați, de asemenea, metode contraceptive suplimentare timp de 7 zile. Dacă ați avut relații sexuale în săptămâna anterioară omiterii, trebuie să luați în considerare riscul de sarcină. În acest caz, contactați imediat medicul dumneavoastră.

1 tabletă uitată în săptămâna 2

Luați tableta uitată imediat ce vă amintiți, chiar dacă aceasta înseamnă să luați două tablete în același moment trebuie să luați. Continuați să luați tabletele ca de uzuală timp în. De Eficacitatea pilulei nu este redusă, nu trebuie să utilizați metode contraceptive suplimentare.

1 tabletă uitată în săptămâna 3

Puteți alege din 2 2 fără metode contraceptive suplimentare a necesita utilizați.

1. Luați comprimatul uitat imediat ce vă amintiți, chiar dacă aceasta ar însemna că trebuie să luați două comprimate în același timp. Continuați să luați comprimatele la ora obișnuită. **Săriți, de asemenea, perioada fără comprimate** și continuați imediat cu următorul blister. Cel mai probabil veți avea abia la sfârșitul al doilea blister o menstruație la adevărat sângerare de retragere, dar este posibil să aveți spotting sau sângerare de întrerupere în timpul celei de-a doua folie.
2. Puteți, de asemenea, să opriți folia respectivă. Mențineți o perioadă fără tablete de 7 zile sau mai puțin la (**tel bine întotdeauna ziua în care ați uitat să luați tableta**). După aceea continuați merge u obișnuit

continuați cu următorul blister.

Dacă urmați această metodă, puteți începe întotdeauna cu noul blister în ziua dumneavoastră obișnuită de început.

Dacă ați uitat să luați comprimate dintr-un blister și nu aveți sângerare în următoarea perioadă normală fără comprimate, acest lucru poate însemna că sunteți însărcinată. Trebuie să contactați medicul înainte de a continua cu următorul blister.

... în caz de tulburări gastrice și/sau intestinale (de exemplu, vărsături, diaree severă)
Dacă vomăți sau aveți diaree severă, există șansa ca substanțele active să nu fie complet absorbite în organism. Dacă trebuie să vomăți în decurs de 3-4 ore după ce ați luat un comprimat, această situație este similară cu cea în care ați uitat să luați un comprimat. Prin urmare, în caz de vărsături, urmați același sfat ca cel indicat mai sus pentru uitarea comprimatelor. Dacă aveți diaree severă, consultați medicul.

... dacă doriți să amânați menstruația o dată

Este posibil să amânați menstruația, deși acest lucru nu este recomandat. În cazuri excepționale, puteți amâna menstruația continuând cu un nou blister Marvelon fără perioadă fără comprimate. Puteți continua cu acest blister până când toate comprimatele sunt consumate sau să opriți mai devreme, dacă doriți. În timpul utilizării acestui al doilea blister, este posibil să aveți sângerări de întrerupere sau spotting. După perioada obișnuită fără comprimate de 7 zile, începeți din nou cu următorul blister.

... dacă doriți să schimbați ziua de început a menstruației

Dacă luați comprimatele conform instrucțiunilor, menstruația va începe aproximativ în aceeași zi de fiecare dată. Dacă doriți să schimbați această zi, puteți face acest lucru scurtând perioada normală fără comprimate între două blistere (dar niciodată prelungind-o). De exemplu, dacă menstruația dumneavoastră începe de obicei vineri și doriți să o mutați marți (cu 3 zile mai devreme), atunci trebuie să începeți noul blister cu 3 zile mai devreme decât de obicei. Dacă faceți perioada fără comprimate foarte scurtă (de exemplu, 3 zile sau mai puțin), este posibil să nu aveți sângerare în această perioadă fără comprimate. Puteți avea sângerări de întrerupere sau spotting în timpul următorului blister.

... în caz de sângerare neașteptată

Cu toate pilulele contraceptive, în primele câteva luni poate apărea uneori sângerare neașteptată (spotting sau sângerare de întrerupere). Este posibil să nu puteți face față fără absorbante sau tampoane. Continuați să luați comprimatele în mod obișnuit. Sângerarea neregulată se oprește de obicei odată ce corpul dumneavoastră s-a obișnuit cu pilula respectivă (după aproximativ 3 blistere). Dacă durează mai mult, se agravează sau începe din nou, trebuie să contactați medicul.

... dacă sângerarea așteptată nu apare

Dacă ați luat toate comprimatele corect, nu ați avut vărsături și/sau diaree și nu ați folosit alte medicamente, este foarte puțin probabil să fiți însărcinată. Puteți continua cu următorul blister fără griji.

Dacă sângerarea așteptată nu apare de două ori la rând, este posibil să fiți însărcinată. Contactați imediat medicul. Nu continuați cu următorul blister Marvelon până când medicul nu a stabilit că nu sunteți însărcinată.

Dacă opriți utilizarea a lua de acest medicament

Puteți opri cu Marvelon oricând doriți. Dacă nu doriți să rămâneți însărcinată, cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru sfat sfat cu referire la alte metode fiabile de control al nașterii.

Dacă vă opriți pentru că doriți să rămâneți gravidă, se în general consideră recomandat să așteptați până când aveți o menstruație naturală înainte să încercați să rămâneți însărcinată.

Puteți să a afecta. U poți dan mai ușor calcula când de nașterea va avea loc.

4. Posibile efecte secundare

Ca orice medicament poate de asemenea acest medicament efecte secundare avea. Nu toată lumea are de-a face cu asta. Aveți o reacție adversă, mai ales dacă aceasta este gravă de natură este și lang persistă, sau apare o schimbare în starea dumneavoastră de sănătate despre care credeți că aceasta poate fi cauzată de Marvelon? Contactați medicul dumneavoastră dacă este cazul arts.

Toate femeile care utilizează contraceptive hormonale combinate au un risc mai mare de cheaguri de sânge în vene (tromboembolism venos [VTE]) sau cheaguri de sânge în artere (arterială trombo-embolie [ATE]). Vezi pentru mai multe informații despre diferitele riscuri ale utilizării de combinate hormonale anticoncepționale rubrică 2 'Când nu trebuie să acest medicament nu utilizați sau trebuie să fiți precaut cu el?'

Contactați imediat medicul dumneavoastră medic dacă dumneavoastră simptome de angio-edem aveți cum ar fi umflarea a feței, limbiși or gâtuluiși ordificultăți la înghițire al înghițire de

urticarie posibil cu probleme respiratorii (vezi rubrica 2 'Când trebuie să fiți precaut fiți cu acest medicament?').

Așa cum la toate pilulele combinate, poate vostru modelul menstruației schimba, mai ales în timpul primelor luni de utilizare . Această diferență poate fi în modul în care în cât de adesea u un sângerare primiți (absența a sângerării, mai puțin adesea, mai des sau continuă), cât de severă este sângerarea , sau cât timp de sângerarea durează.

Frecvent (apar la mai puțin de 1 din 10 femei)stări

- depresive ,schimbări de dispoziție dureri de cap
- greață
- greațădureri abdominale durere abdominală
- sensibile sâni, dureros sâni
- creștere în greutate.

Uneori (apar la mai puțin de 1 din 100 femei)retenție de lichide

- scăderea dorinței de
- mai puțin chef de face dragoste migrenă
- vărsături
- a vomita, diaree
- erupție cutanată, urticarie (urticarie)
- mărirea a sânilor.

Rareori (apar la mai puțin de 1 din 1000 femei))

- dăunătoare cheaguri de sânge în o venă sau arteră, de exemplu:
 - o în un picior sau laba piciorului (de exemplu tromboză venoasă profundă)
 - o în un plămân (de exemplu embolie pulmonară)
 - o infarct miocardic
 - o accident vascular cerebral
 - o 'mic accident vascular cerebral' sau simptome temporare cum ar fi în cazul unui accident vascular cerebral, cunoscut ca TIA (atac ischemic tranzitor)
 - o cheaguri de sânge în ficat, stomacintestine, rinichi sau ochi. Riscul de un cheag de sânge cheag de sânge obține este mai mare mai mare dacă există alte condiții care se aplică dumneavoastră sunt care acest risc cresc (vezi secțiunea 2 pentru mai multe informații despre condiții care riscul de cheaguri de sânge cresc și simptomele manifestările unui un cheag de sânge).
- reacții de hipersensibilitate
- mai dorință de a face dragoste
- iritație a ochilor ochilor la utilizarea lentilelor de contact dureroase lentile de contact
- nodulialbastru-roșii în piele (eritem nodos), erupție cutanată cu pete roșii neregulate sau ulceratii (eritem multiform) ulcere (eritem multiform)
- secreție din de mameloane, schimbare în secreție din vagin
- scădere în greutate.

Raportarea reacțiilor adverse Aveți reacții adverse

, contactați un medic sau un farmacist dumneavoastră medicul sau farmacistul. Acest lucru se aplică de asemenea pentru efecte secundare care nu în acest prospect sunt menționate. Puteți raporta efectele secundare de asemenea prin intermediul Neerlandeză Efecte secundare Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Prin efecte secundare a raporta, ajutați ne să obținem mai multe informații a obține despre siguranța acestui medicament.

5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?

A se păstra vederea și accesul copiilor departe ..

acest medicament nu mai mult după data de expirare a termenului de valabilitate. Aceasta găsiți pe cutie și pe blister după EXP. Acolo este o lună și un an. Termenul ultimul zi din acea lună este data de expirare data de expirare.

la sub 30 °C. Nu păstrați în congelator . Păstrați.
ambalajul original de tip blister ambalaj blister ter protecție împotriva luminii și umezelii.

Luați acest medicament nu dacă vedeți că de exemplu tabletele sunt decolorate sau deteriorate de sfărâmat sunt sau când dumneavoastră alte semne vizibile de deteriorare în calitate observați. Nu aruncați medicamentele nu în chiuvetă sau de wc și aruncați le nu în coșul de gunoi. Întrebați farmacistul dumneavoastră ce să faceți cu medicamentele care nu mai utilizați nu mai folosiți. Dacă dumneavoastră medicamentele în modul corect eliminați sunt ele în un mod corect distruse și nu ajung în mediu . Conținutul în mediu justificat.

6. Conținut din ambalaj și alte informații

Ce substanțe sunt în acest medicament?

- Substanțele active în acest medicament sunt desogestrel desogestrel (150 microgrami) și etinilestradiol (30 microgrami).
- Alte substanțe din acest medicament sunt dioxid de siliciu coloidal anhidru dioxid de siliciolactoză monohidrat lactoză monohidrat amidon de cartofi amidon de cartofipovidonă povidonă, acid stearic, all-rac-alfa-tocoferol.

Cum arată Marvelon și ce conține un ambalaj ?Ambalajul
conține 1, 3 sau 6 conține 1, 3 sau 6 benzi blister cu 21 comprimate.
Nu toate mărimile de ambalaj menționate sunt pe piață disponibile.

Comprimatele sunt albe, rotunde ,pe la ambele părți rotund și au un diametru de 6 mm.
Pe o parte este 'TR' deasupra '5' și pe cealaltă parte 'Organon' 'Organon' en un cu cinci colțuri stea.

Deținător al autorizației pentru introducerea pe piață și producător N.V. Organon
Kloosterstraat Strada Mănăstirii 6

Țările de Jos

Tel.: 00800 66550123 (+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

dpoc.benelux@organon.com

În registru înregistrat sub: RVG 08859

Acest prospect este pentru ultima dată aprobat în mai 2025

Transtoyou