

Bipacksedel: information för användaren användare
Marvelon, tabletter
desogestrel, etinylestradiol

Viktiga saker som du måste veta om kombinerade hormonella preventivmedel medel:

- Dessa medel utgör en av de mest pålitliga reversibla preventivmetoder, om korrekt används.
- De ger en något högre risk för uppkomst av en blodpropp (trombos) i vener och artärer, särskilt under första året som du en kombinerat hormonellt preventivmedel används eller om du efter en avbrott på 4 veckor eller längre börjar igen med användning av en kombinerad hormonell antikonception.
- Observera noggrant och ta kontakt med din läkare om du tror att du möjligen symtom på en blodpropp har (se avsnitt 2 'Blodproppar (trombos)').

Läs noggrant hela bipacksedeln innan du denna medicin ska ta eftersom det finns viktig information i för dig.

- Spara denna bipacksedel. Kanske behöver du den senare igen behövs.
- Har du fortfarande frågor? Kontakta då din läkare eller apotekare.
- Ge denna medicin inte vidare till andra, eftersom det är endast till dig förskrivet. Det kan skadlig är för andra, även om de har samma symtom som du.
- Får du besvär av en av de biverkningar som i avsnitt 4 står? Eller får du en biverkning som inte i denna bipacksedel står? Kontakta då din läkare eller apotekare.

Innehåll av denna bipacksedel

1. Vad är Marvelon och vad används denna medicin för?
2. När får du denna medicin inte använda eller måste du vara extra försiktig med är?
3. Hur tar du denna medicin ?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar du denna medicin?
6. Innehåll av förpackningen en övrig information

1. Vad är Marvelon en vad används detta läkemedel för ?Sammansättning

och typ piller Marvelon är en kombinerad oral antikonceptions piller p-piller (de 'kombinationspiller'). Varje tablett innehåller en liten mängd av två olika kvinnliga hormoner, nämligen desogestrel (ett hormon med progesteronliknande verkan) en etinylestradiol (en hormon med östrogen verkan). På grund av den lilla mängden hormoner, anses Marvelon som som en lågdoserad antikonceptionsmedel. Eftersom båda hormonerna i alla tabletter i remsan i samma mängd kombinerade är, blir det en enfas- kombinationspiller kallad.

För vad används denna medicin används?

Marvelon används för att förhindra graviditet ..

används tas in (utan att tabletter glöms) är risken för att bli gravid mycket liten . När får du.

2. använda denna medicin inte inte använda eller måste du vara extra försiktig med vara?

Allmänna anmärkningar

Läs innan du börjar med att använda Marvelon informationen om information om blodproppar (trombos) i avsnitt 2. Det är särskilt viktigt att du läser vad symtomen är på en blodpropp – se avsnitt 2 'Blodproppar (trombos)'.

I denna bipacksedel beskrivs några situationer där du måste sluta med användningen av p-piller eller av där de tillförlitligheten av p-piller minskad kan vara. I sådana situationer måste du avstå från sexuell samlag eller en kompletterande preventivmedel utan hormoner använda, till exempel en kondom eller annat barriärpreventivmedel. Använd inte användning av kalender- eller temperaturmetoden. Dessa metoder kan vara opålitliga eftersom att de piller påverkar har den normala förändringar av kroppstemperaturen och det livmoderslemlinjan under de menstruationscykel.

Marvelon erbjuder precis som andra hormonella preventivmedel inget skydd mot en hiv- infektion (aids) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar (könssjukdomar).

När får du detta läkemedel inte använda?

Du får detta läkemedel inte använda om du en av de nedan nämnda sjukdomar har. Om du en av de nedan nämnda sjukdomar har, berätta detta då för din läkare. Din läkare ska med dig diskutera vilken annan form av preventivmedel lämpligare är för dig. Se även avsnittet 'Närbehöver du extra du extra försiktig vara med detta läkemedel?'.

- Du har en blodpropp i ett blodkärl i benen (djup ventrombos , DVT), de, DVT), den lungor (lungemboli) eller en annan organ, eller du har detta tidigare haft ..
- vet att du en störning störning har av din blodkoagulation – till exempel protein C-brist, protein S- brist, antitrombin-III-brist, faktor V-Leiden eller antikroppar mot fosfolipider.
- U måste bli opererad eller du är under lång tid inte på benen (se avsnitt 'Blodproppar (trombos)').
- U har någonsin en hjärtattack eller en stroke haft.
- Du har angina pectoris (en sjukdom som svår smärta i bröstet orsakar en en första symtom av en hjärtattack kan vara) eller en 'transitorisk ischemisk attack' (TIA: övergående symtom av en stroke) eller du har detta någonsin haft.
- Du har en av de följande sjukdomar, som risken för en blodpropp i dina artärer kan öka:
 - allvarlig diabetes med skada av blodkärl
 - allvarlig förhöjt blodtryck
 - en allvarligt förhöjd fetthalt i ditt blod (kolesterol av triglycerider)
 - en sjukdom som hyperhomocysteinemi kallas ..
- har en typ av migrän som 'migrän med aura' kallas (eller nämnd (of har detta någonsin haft).
- Du har pankreatit (en inflammation i bukspottkörteln) eller har detta haft, kombinerat med en hög fettinnehåll i ditt blod.
- Du har gulsot (gul färgning av huden eller ögonen) eller en allvarlig leversjukdom av har detta haft, och den resultaten av leverfunktionstester är ännu inte normala.
- Du har en form av cancer eller har detta haft som känslig kan vara för könshormoner (såsom bröstcancer eller cancer i könsorganen).

- Du har levercancer eller har detta haft.
- Du har ovanliga blödningar från vagina vars orsaken inte är fastställd fastställd.
- U har en abnorm förtjockning av livmoderslemhinnan.
- Du är allergisk mot en av de ämnen i denna medicin. Dessa ämnen kan du hitta i avsnitt 6 i denna bipacksedel.

Om en av de nämnda situationerna uppstår medan du redan använder Marvelon , då måste du omedelbart sluta med användningen och kontakta din läkare. Använd under tiden en annan , icke -hormonell inte- hormonell metod av preventivmedel. Se även 'Allmänna anmärkningar' i början av avsnitt 2.

Använd Marvelon inte om du har hepatit C har en för detta mediciner med ombitasvir2Fparitaprevir2Fritonavir och dasabuvir eller glecaprevir2Fpibrentasvir används (se även avsnitt 2 'Används u ännu andra läkemedel?').

När måste u extra försiktig vara med detta läkemedel?

När måste u kontakta ta med din läkare?

Ring akut medicinsk hjälp om

- du möjliga symtom eller tecken på en blodpropp upptäcker , som kan betyda att det du lider av en blodpropp i ditt ben (d.v.s. djup ventrombos), en blodpropp blodpropp dina lungor (d.v.s.d.v.s. lungemboli), en hjärtattack eller en stroke (se nedan avsnittet rubrik 'Blodproppar (trombos)').

Gå till en beskrivning av symtom eller tecken på dessa allvarliga biverkningar till 'Hur känner du igen en blodpropp

?'. Berätta det läkare, om en av de följande situationer gäller för dig. tillämplig är.

Om tillståndet sjukdom uppstår eller förvärras, medan du använder Marvelon, använder, måste du detta också till din läkare berätta.

- Du röker.
- Du har diabetes.
- Du är mycket för tung.
- Du har en förhöjt blodtryck.
- Du har en sjukdom i hjärtklaffarna eller en viss hjärtrytmrubbning.
- Du har en inflammation i vener nära under huden (ytlig tromboflebit).Du har åderbräck ..
- i din närmaste familj familj har någonsin trombos, en hjärtinfarkt eller en stroke haft.
- Du har besvär av migrän.
- Du har epilepsi.
- Du har förhöjda fettvärden i ditt blod (hypertriglyceridemi), eller denna sjukdom förekommer i din familj eller har förekommit i din familj tidigare förekommit. Hypertriglyceridemi är i samband förknippad med en högre risk för pankreatit (en inflammation i bukspottkörteln) att få.

- Du bör bli opererad eller du är under lång tid inte på benen (se 'Blodproppar (trombos)' i avsnitt 2).
 - Om du nyligen fött har du en ökad risk för att få från blodproppar. Fråga din läkare hur snart efter förlossningen du kan börja med användning av Marvelon.
 - Du har någon i din direkta familj som bröstcancer har haft.
 - Du har en sjukdom i levern eller i gallblåsan.
 - U har de sjukdomen Crohns sjukdom eller ulcerös kolit ulcerosa (kronisk tarmsjukdom).
 - U har systemisk lupus erythematosus (SLE - en sjukdom som din naturliga immunsystem påverkar).
 - Du har hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS - en störning av blodkoagulationen som njursvikt orsakar).
 - Du har sicklecellanemi (en ärftlig sjukdom av de röda blodcellerna).
 - Du har en sjukdom som för första gången uppstod eller försämrades under en graviditet av vid tidigare användning av könshormoner, till exempel hörselnedsättning, porfyri (en blodsjukdom), herpes gestationis (hudutslag med blåsor under de graviditeten) eller Sydenham-korea (en nervsjukdom där plötsliga rörelser av kroppen inträffar). Du
-
- får symtom på angio- ödemsåsom svullnad svullnad av din ansikte, tunga och/eller hals och/eller svårigheter vid att svälja eller nässelutslag möjligt med andningssvårigheter. Kontakta i detta fall direkt kontakt med din läkare. Produkter med östrogener kan de symtom av ärftligt och förvärvat angio-ödem orsaka eller förvärra.
 - Du har kloasma eller du har någonsin kloasma haft (gul-bruna pigmentfläckar, så kallade 'graviditetsfläckar', särskilt i ansiktet); om detta det fall är, är det klokt att direkt exponering för solljus eller ultraviolett ljus att undvika.

P-piller och blodproppar (blodproppar tromboembolism)

BLODPROPPAR (TROMBOS)

Om du en kombinerad hormonell preventivmedel som Marvelon använder, har du en högre risk för en blodpropp att få då om du ingen kombinerat hormonellt preventivmedel använder. I sällsynta fall kan en blodpropp ett blodkärl blockera och en allvarlig problem orsaka. Blodproppar kan uppstå

- i vener (detta kallas 'venös trombos', 'venös tromboembolism' eller VTE kallad)
- i artärer (detta kallas 'arteriell trombos', 'arteriell tromboembolism' eller ATE benämns).

Man återhämtar inte alltid fullständigt av blodproppar. I sällsynta fall kan det finnas långvariga allvarliga effekter vara, eller i mycket sällsynta fall kan blodproppar vara dödliga dödlig är.

Det är viktigt att du vet att den allmänna risken för en skadlig blodpropp av Marvelon liten är.

HUR KÄNNER DU IGEN EN BLODPROPP?

Kontakta akut medicinsk hjälp i om du en av de följande symtom eller tecken upptäcker.

Får du en av dessa symtom av symtom?	Var kan du lida av?
<p>svullnad av ett ben eller längs en ven i ett ben eller fot, särskilt om detta åtföljs av: smärta eller ömhet i benet, som du möjligen bara känner när du står eller går förhöjd temperatur temperatur det drabbade benet färgförändring av huden på benet från det benet, till exempel blekt, rött eller blått</p>	Djup venös trombos
<p>plötslig oförklarlig andnöd eller snabb andning plötslig hosta utan tydlig orsak, där du kan hosta upp blod skarp smärta i bröstet, som kan bli värre när du andas djupt allvarlig lätt känsla i huvudet eller yrsel av yrsel snabb eller oregelbunden hjärtslag allvarlig smärta i din mage</p> <p>Om du tvekar, kontakta då en läkare, för att en läkare, vissa av dessa symtom, såsom hosta eller andfåddhet, kan felaktigt bli betraktade som en mildare åkomma, såsom en luftvägsinfektion (till exempel förkylning).</p>	Lungemboli
<p>Symtom uppträder vanligtvis i ett öga : omedelbart förlust av synen, eller smärtfri suddig syn, som kan utvecklas till förlust av det Venös trombos i näthinnan (blodpropp</p>	Venös trombos i näthinnan det i det ögon)
Får du något av dessa besvär eller symtom?	Vad kan du lida av?
synförmåga	
<p>smärta, obehag, tryck eller en tung, klämd eller full känsla i bröstet, armen eller under bröstbenet full känsla, matsmältningsbesvär eller andnöd obehag i överkroppen som strålar ut mot ryggen, käken, halsen, armen och magen svettning, illamående, kräkningar eller yrsel extrem svaghet, ångest eller andfåddhet snabb eller oregelbunden hjärtrytm</p>	Hjärtattack
<p>plötslig svaghet eller domningar i ansikte, arm eller ben, särskilt på ena sidan av kroppen plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå plötsliga svårigheter att se på ett eller båda ögonen plötsliga svårigheter att gå, yrsel, förlust av balans eller koordination</p>	Stroke

plötslig, svår eller långvarig huvudvärk utan känd orsak minskad medvetenhet eller svimning med eller utan epileptiskt anfall Symtomen på en stroke kan ibland vara kortvariga och återhämta sig nästan omedelbart och fullständigt. Ändå bör du omedelbart söka akut medicinsk hjälp, eftersom du kan riskera att få ytterligare en stroke.	
svullnad och lätt blåfärgning av en arm eller ett ben svår smärta i buken (akut buk)	Blodpropp som blockerar andra blodkärl

BLODPROPPAR I EN VEN

Vad kan det hända om det en blodpropp bildas i en ven? Användningen

- av läkemedlet från kombinerade hormonella preventivmedel är i samband med en högre risk för blodproppar i en ven (venöstrombos). Dessa biverkningar förekommer dock sällan för. Vanligtvis uppträder de under första året som ett kombinerat hormonellt preventivmedel används ..
- en blodpropp blir bildad i en ven i ett ben eller fot, kan det en djup ventrombos (DVT) orsaka.
- Om en blodpropp från benet blir transporterad och i lungan hamnar, kan det en lungemboli orsaka.
- Det är mycket sällan för att en blodpropp bildas i en ven i ett annat organ, såsom ögat (venös trombos i näthinnan).

När är risken för en blodpropp i en ven som högst?

Risken för att en blodpropp i en ven att få är det högst under det första året som en kvinna för första gången en kombinerad hormonell antikonceptionsmedel används. Det risk kan också ökad vara om du efter en avbrott på 4 veckor eller längre börjar igen med användning av en kombinerad hormonell antikonception (samma produkt, eller en annan produkt än tidigare). Efter det första året blir risken risk mindre, men förblir något högre än när du inte kombinerat hormonellt preventivmedel använder.

Om du slutar med Marvelon, är din risk för en blodpropp inom några veckor igen normalt.

Hur hög är risken för en blodpropp i en ven?

Risken beror på om det av din naturligt risk för VTE, och av typen kombinerad hormonell antikonception som du använder.

Den totala risken för en blodpropp i en ben eller lunga (djup venös trombos eller lungemboli) med Marvelon är liten.

- Av varje 10.000 kvinnor som inte någon kombinerad hormonell antikonceptionsmedel använda och inte vara gravid är, får det ungefär 2 av en period av ett år en blodpropp.
- Av varje 10.000 kvinnor som använder kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat innehåller, får cirka 5-7 av 5-7 in en år en blodpropp.

- Av varje 10.000 kvinnor som en kombinerad hormonell preventivmedel använder som desogestrel innehåller, såsom Marvelon, får cirka ungefär mellan 9 och 12 på ett år en blodpropp.
- Risken att få en blodpropp är få är beroende av din personliga medicinska sjukdomshistoria (se avsnitten rubrikerna 'Faktorer som ditt risk för en blodpropp i en ven2Fartär öka' nedan).

	Risk att i ett år få en blodpropp
Kvinnor som inte kombinerade hormonella piller/plåster/ring använder och inte är gravida	Ungefär 2 av varje 10.000 kvinnor
Kvinnor som en kombinationspiller använder som levonorgestrel, noretisteron eller norgestim innehåller	Ungefär 5-7 av varje 10.000 kvinnor
Kvinnor som Marvelon använder	Ungefär 9-12 av varje 10.000 kvinnor

Faktorer som ditt risk för en blodpropp i en ven öka

Det risk för en blodpropp med Marvelon är liten, men det finns vissa omständigheter som risk ökar. Din risk är högre:

- om du allvarlig övervikt har (BMI [body mass index] högre än 30 kg/m²)
- om en av dina närmaste familjemedlemmar i ung ålder (till exempel före det 50:e året) en blodpropp har haft i ett ben, lunga eller annat organ. I det fallet kan du en ärftlig koagulationsstörning ha.
- om du en operation måste genomgå, eller om du lång tid inte på benen på grund av en skada eller sjukdom, eller om din benet i gips är. Det kan vara nödvändigt att före en operation, ellernär du är mindre rörlig, några några veckor att sluta med användning av Marvelon. Om du måste sluta med Marvelon, fråga då din läkare när du igen kan börja med användning.
- om du blir äldre blir (särskilt speciellt över ungefär 35 år)
- om du under de senaste få veckorna fött har.

Det risk på en blodpropp ökar ju det fler av dessa omständigheter gäller för dig ..

flyg (längreän 4 då 4 timme) kan din risk för en blodpropp tillfälligt öka, särskilt om det finns några andra av de nämnda omständigheterna på dig tillämplig är.

Det är viktigt att du din läkare berättar om en eller flera av dessa tillstånd på dig tillämplig är, även om du tvekar om detta. Din läkare kan besluta att du måste sluta med användningen av Marvelon.

Om en av de ovan nämnda omständigheterna förändras medan du använder Marvelon, till exempel om en nära familjemedlem en blodpropp blodpropp trombos)) får utan känd orsak, eller om du mycket i vikt ökar, berätta detta då för din läkare.

BLODPROPP I EN ARTÄR

Vad kan er hända om det finns en blodpropp bildas i en artär ?Precis

som en blodpropp blodpropp en ven åder, kan en blodpropp i en artär allvarliga problem orsaka. Det kan till exempel en hjärtattack eller en stroke orsaka.

Faktorer som ditt risk för en blodpropp i en artär ökar

Det är viktigt att du vet att risken för en en hjärtattack eller stroke genom användning av Marvelon mycket liten är, men större kan bli:

- med ökande ålder (över ungefär 35 år)
- om du röker. Om du en kombinerad hormonell antikonception som Marvelon använder, rekommenderas att du slutar sluta med rökning. Om du inte kan sluta med rökning och äldre än 35 år, kan din läkare rekommendera att en annan typ preventivmedel att använda.
- om du övervikt har
- om du högt blodtryck har
- om en medlem av din närmaste familj på ung ålder (före det 50:e året) en hjärtattack eller stroke har haft. I det fallet kan du också en ökad risk ha för en hjärtattack eller stroke få ..
- du, eller en medlem av din närmaste familj ,, en förhöjd fetthinnehåll i blodet har (kolesterol eller triglycerider)
- om du lider av migrän ,särskilt migrän med aura om
- du en en hjärtsjukdom har (hjärtklaffsjukdom, eller en hjärtrytmrubbning som förmaksflimmer kallas)om
- du diabetes (diabetes) har ..

mer mer då en av dessa tillstånd på dig av tillämplig är, eller om en av dessa sjukdomar särskilt allvarlig är, kan risken risk för få av en blodpropp även ännu vidare ökad vara.

Om en av de ovan nämnda omständigheterna förändras medan du använder Marvelon används, till exempel om du börjar med röka eller om en nära familjemedlem en blodpropp (trombos) får utan känd orsak, eller om du mycket i vikt går upp, berätta detta då för din läkare.

P-piller och cancer Vid

Vid kvinnor som använder p-piller använder upptäcks något oftare bröstcancer diagnostiseras än hos icke-pilleranvändare i samma ålder. Tio år efter att sluta med piller finns det ingen skillnad mer. Det är inte känt om detta skillnad orsakas av piller . Detkan också komma komma eftersom pilleranvändare grundligare och oftare blir undersökta, så att de bröstcancer tidigare upptäcks ..

sällsynta fall är hos vid pilleranvändare godartade levertumörer funnits och in ännu sällsyntare fall elakartade levertumörer. Ibland har dessa tumörer lett till en livshotande inre blödning. Om du plötsligt får problem med svår buksmärta, då måste du omedelbart kontakta din läkare. med din

läkare. infektion med humant papillomvirus är den viktigaste riskfaktorn för att få från livmoderhalscancer. Hos kvinnor som använder p-piller under längre tid kan kan de risk för att få av livmoderhalscancer något ökad är. Det är dock inte klart om detta orsakas av p-piller , eller, eller det det att göra har med sexuellt beteende och andra faktorer (såsom bättre kontroll av livmoderhalsen).

Psykiska störningar

Vissa kvinnor som hormonella preventivmedel inklusive Marvelon använder, har rapporterat om depression eller nedstämdhet nedstämdhet. kan vara allvarlig är och kan ibland till

självordstankar leda. Om du humörsvingningar och symtom av depression upplever, kontakta då så snart som möjligt din läkare för vidare medicinsk råd.

Använder du andra läkemedel? Använder du förutom Marvelon andra läkemedel eller örtmedicin av örtmedel, har du det nyligen gjort eller ska du kanske snart göra? Berätta då din läkare, din läkare, apotekare eller barnmorska. Detta gäller också för medel som du utan recept kan få. Berätta också för varje annan läkare eller tandläkare (eller apotekare) som du en annan medicin förskriver som du Marvelon använder. De kan då berätta om det nödvändigt är en extra icke-hormonell preventivmedel (till exempel en kondom) att använda och också hur du då måste använda eller att det användning av en annan medicin som du behöver har, måste ändra.

Använd Marvelon inte om du har hepatit C har en för detta mediciner med ombitasvir2Fparitaprevir2Fritonavir och dasabuvir eller glecaprevir2Fpibrentasvir används, eftersom detta en ökning av en leverenzym (ALAT, en leverfunktionsblodtest) kan orsaka. Din läkare kommer att en annan preventivmedel förskriva innan du börjar med denna behandling. Marvelon kan ungefär 2 veckor efter slutet av denna behandling åter startas .. avsnitt 2 ' NärNär får du detta läkemedel inte använda?').

Vissa läkemedel

- kan en påverkan ha på blodnivåerna av Marvelon
- kan göra Marvelon mindre effektivt för graviditet att förhindra
- kan oväntade blödningar orsaka.

Dessa inkluderar bland andra läkemedel för de behandling av:

- epilepsi (till exempel primidon, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramid, felbamid)
- tuberkulos (till exempel rifampicin, rifabutin)
- hiv-infektion (till exempel ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz)
- hepatit C-virusinfektion (till exempel boceprevir, telaprevir)
- andra infektioner (till exempel griseofulvin)
- högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (bosentan)
- depressiv stämning (det örtmedel johannesört).

Om du läkemedel eller örtmedel använder som gör Marvelon mindre effektivt kan göra, måste du också en barriärmetod för preventivmedel använda. Eftersom effekten av en annan medicin på Marvelon upp till 28 dagar efter att sluta med den medicinen kan fortsätta, måste du som extra barriärpreventivmetod under den tid fortsätta använda.

Marvelon kan påverka effekten av andra läkemedel påverka, till exempel:

- läkemedel die ciklosporin innehåller
- det anti-epileptiska läkemedlet lamotrigin (detta kan leda till en ökad frekvens av anfall).

Laboratorieundersökningar

Om det blodprov vid du måste bli gjort, berätta då din läkare eller laboratoriepersonal att du använder p-piller .. preventivmedel kan nämligen påverka de resultat av vissa undersökningar påverka.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du gravid är, eller tror att du gravid skulle kunna vara får du använda Marvelon inte använda. Om du misstänker att du är gravid medan du använder Marvelon , kontakta då så snartsom möjligt din läkare. Amning Det läkare.

Amning

Det användning av Marvelon rekommenderas i allmänhet inte så länge en kvinna ammar . Om du pillerändå vill använda medan du fortfarande du ger amning ger, kan du bäst kontakta din läkare. Körförmåga och

användning av maskiner Det finns inga indikationer är ingen instruktioner att de körförmåga och den förmåga att använda maskiner kan använda påverkas bli.

Marvelon innehåller laktos

Om din läkare har berättat att du vissa sockerarter inte tål, kontakta då din läkare innan du denna medicin tar.

Barn och ungdomar upp till 18 år

Det finns ingen klinisk information om effektiviteten och säkerheten hos ungdomar under 18 år.

När ska du till läkaren under det användning av detta läkemedel?

3. Hur tar du detta läkemedel in?

Ta detta läkemedel alltid in precis som din läkare eller apotekare du det har berättat. Tvivlar du på rätt användning? Kontakta då din läkare eller apotekare.

När och hur tar u de tabletter in?

Remsan innehåller 21 tabletter. Vid varje tablett anges vilken dag denna ska tas tas tas tastas tabletter varje dag ungefär på samma tid in, vid behov med lite vatten. Följ den riktning av pilen som finns på remsan angiven tills du har tagit alla 21 tabletter har har intagen. Därefter tar du 7 dagar ingen tablett. Under dessa 7 dagar bör en blödning att börja (den så kallade bortfallsblödningen). Denna börjar vanligtvis på den 2:a eller 3:e dagen efter den sista Marvelon-

tabletten. Börja på den 8:e dagen med nästa remsa, oavsett om blödningen då redan är över eller inte. Detta betyder att du alltid på samma dag i veckan med en nästa karta börjar, och också att den bortfallsblödning varje månad ungefär på samma dagar faller.

När att börja med den första remsan

Du har den senaste månaden ingen p-piller använt.

Börja med Marvelon på första dagen av cykeln (den första dagen av din menstruation). Marvelon fungerar i detta fall direkt och du behöver ingen extra preventivmedel att använda.

Du får också på dag 2-5 i cykeln börja men då måste du under de första 7 dagarna dock en extra preventivmedel (till exempel en kondom) använda.

Övergång från en annan kombinationspiller, vaginal ring eller preventivplåster

Du kan med Marvelon börja på dagen efter du har sista tabletten av din tidigare piller har tagit (så utan paus). Om det vid din föregående piller också icke-aktiva tabletter i remsan sitter, måste du omedelbart fortsätta efter den sista aktiva tabletten av din föregående pil (om du inte vet vilken det är, fråga då din läkare eller apotekare). Du får också senare börja , men aldrig senare än på den, men aldrig senare än den dag efter slutet av den tablettfria perioden av din föregående piller (eller efter den sista överksamma tabletten av din föregående piller).

Om du byter från en vaginal ring eller preventivplåster kan du börja med Marvelon påbörja på dagen av borttagning av ringen eller det sista plåstret. Du får också senare börja, men du måste på sin senast sju dagar efter avlägsnandet av ringen eller den senaste plåstret med Marvelon börja ..

du tabletten piller, plåster eller ring fullständigt enligt de föreskrifter har använt och du är säker på att du inte gravid är, kan du dessutom sluta med att ta pillret eller ringen eller plåstret ta bort på varje dag av din nuvarande cykel och omedelbart byta till på det användning av Marvelon.

Om du dessa anvisningar följer är det inte nödvändigt att extra preventivmedel (till exempel en kondom) att använda.

Övergång från en gestagenpiller (minipiller)

Du kan från den ena till den andra dagen byta till Marvelon, men du måste den första 7 dagar väl en extra preventivmedel (till exempel en kondom) använda.

Övergång från p-spruta, ett implantat eller en hormoninnehållande spiral

Börja med Marvelon när du annars den nästa injektion skulle få eller på dagen då det implantat eller hormoninnehållande spiral blir borttagen. Du måste de första 7 dagarna dock använda ett extra preventivmedel (till exempel en kondom) använda.

Efter en förlossning

Om du just har fött barn, kommer din läkare troligen rekommendera att vänta tills din första spontana menstruation , menibland ibland är det möjligt tidigare att börja. Följ rådet från din läkare. Det gäller också för det fall du ammar ger bröstmjolk en de piller vill använda.

Efter ett missfall eller abort

Följ rådet från din läkare. Har

du för mycket mycket av detta läkemedel intagit?

Det finns inga rapporter av allvariga skadliga konsekvenser av att ta av många Marvelon tabletter samtidigt. Om du ett antal tabletter samtidigt har tagit, då kan du möjligen få problem med illamående, kräkningar eller vaginalt blodförlust. Om du upptäcker att ett barn Marvelon har intagit, fråga då din läkare om råd.

Vad att göra ...

...vid det glömma av tabletter

Om du **mindre än 12 timmar för sen** är med det ta av en tablett då är den verkan av den piller inte minskad. Ta den tablett då ändå så snart du kommer ihåg det och ta nästa tabletter vid den vanliga tiden.

Om du **mer än 12 timmar för sent** är med att ta en tablett, kan effekten av p-piller vara minskad. Ju fler tabletter du har glömt i rad, desto större blir risken att verkan av den piller minskad är. Den risken för otillräckligt skydd mot graviditet är störst om tabletter glöms bort i början eller slutet av karta. Därför gäller följande regler (se även schemat):

Mer än 1 tablett glömd i en karta

Kontakta omedelbart med din din läkare.

1 glömt tablett i vecka 1

Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det skulle innebära att du tar två tabletter vid samma tillfälle måste ta. Ta därefter tabletter igen på den vanliga tiden tid in, men du måste också använda extra preventivmedel i 7 dagar. Om du har haft sex under veckan innan du glömde, bör du vara medveten om risken för graviditet. Kontakta i så fall omedelbart din läkare.

1 tablett glömd i vecka 2

Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det skulle innebära att du tar två tabletter samtidigt. ögonblick måste ta. Ta vidare de tabletter igen på de vanlig tid in. De Effekten av pillret har inte minskat, du behöver inte använda extra preventivmedel.

1 tablett glömd i vecka 3

Du kan välja mellan 2 alternativ utan extra preventivmedel att behöva använda.

1. Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg, även om det skulle innebära att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt sedan att ta tabletterna vid den vanliga tiden. **Hoppa dessutom över den tablettfria perioden** och fortsätt direkt med nästa remsa. Mest sannolikt får du först i slutet av den andra remsan en en äkta bortfallsblödning men du kan under den andra karta få problem med spotting eller genombrottsblödning.
2. Du kan också sluta med den aktuella karta. Du håller en tablettfri period på 7 dagar eller mindre på (**räkna alltid den dag med då du tabletten har glömt**). **Därefter** fortsätter Sedan går u vanlig

fortsätt med nästa karta.

Om du följer denna metod kan du alltid börja med den nya karta på din vanliga startdag.

Om du har glömt tabletter i en karta och inte får någon blödning under den första vanliga tablettfria perioden kan det betyda att du är gravid. Du bör kontakta din läkare innan du fortsätter med nästa karta.

... vid mag- och/eller tarmstörningar (till exempel kräkningar, svår diarré)

Om du kräks eller har svår diarré finns det en risk att de aktiva substanserna inte har absorberats fullständigt i kroppen. Om du kräks inom 3-4 timmar efter att ha tagit en tablett är denna situation jämförbar med att ha glömt en tablett. Följ därför samma råd som ovan för att glömma tabletter vid kräkningar. Om du har svår diarré, kontakta din läkare.

... om du vill skjuta upp din menstruation

Det är möjligt att skjuta upp din menstruation, även om det inte rekommenderas. I undantagsfall kan du skjuta upp din menstruation genom att fortsätta med en ny karta Marvelon utan tablettfri period. Du kan fortsätta med denna karta tills alla tabletter är slut eller sluta tidigare om du så önskar. Under användningen av denna andra karta kan du uppleva genombrottsblödning eller spotting. Efter den vanliga tablettfria perioden på 7 dagar börjar du sedan med nästa karta.

... om du vill ändra startdagen för din menstruation

Om du tar dina tabletter enligt anvisningarna kommer din menstruation alltid att börja på ungefär samma dag. Om du vill ändra denna dag kan du göra det genom att förkorta den vanliga tablettfria perioden mellan två kartor (men aldrig förlänga den). Till exempel, om din menstruation normalt börjar på en fredag och du vill ändra det till en tisdag (3 dagar tidigare), måste du nu börja med den nya kartan 3 dagar tidigare än vanligt. Om du gör den tablettfria perioden mycket kort (till exempel 3 dagar eller mindre) kan det hända att du inte får någon blödning under denna tablettfria period. Du kan då uppleva genombrottsblödning eller spotting under nästa karta.

... vid oväntad blödning

Med alla p-piller kan oväntad blödning (spotting eller genombrottsblödning) ibland uppstå under de första månaderna. Du kanske inte kan klara dig utan binda eller tampong. Fortsätt i alla fall att ta dina tabletter som vanligt. Den oregelbundna blödningen brukar upphöra när din kropp väl har vant sig vid pillret (efter cirka 3 kartor). Om det varar längre, blir värre eller börjar igen, bör du kontakta din läkare.

... om den förväntade blödningen uteblir

Om du har tagit alla tabletter korrekt, inte haft kräkningar och/eller diarré, och inte använt andra läkemedel, är det mycket osannolikt att du är gravid. Du kan då lugnt fortsätta med nästa karta.

Om den förväntade blödningen uteblir två gånger i rad kan du vara gravid. Kontakta omedelbart din läkare. Fortsätt inte med nästa karta Marvelon innan din läkare har fastställt att du inte är gravid.

Om du slutar med det ta av detta läkemedel

Du kan sluta med Marvelon när du vill. Om du inte gravid vill bli ,fråga då din läkare om råd råd med avseende på andra tillförlitliga metoder för preventivmedel.

Om du slutar eftersom du vill bli gravid ,blir i allmänhet i det allmänna rekommenderas att vänta tills du har haft en naturlig menstruation innan du försöker bli gravid . Du kan träffa. U kan då lättare beräkna när förlossningen förlossning kommer äga rum.

4. Möjliga biverkningar

Som varje läkemedel kan också detta läkemedel biverkningar ha. Inte alla får det att göra. Får du en biverkning, särskilt om den allvarlig till karaktär är och lang fortsätter, eller uppstår det en förändring i din hälsotillstånd som du tror att den orsakas kan vara av Marvelon? Kontakta då din arts.

Alla kvinnor som kombinerade hormonella preventivmedel använder har en högre risk för blodproppar i venerna (venös tromboembolism [VTE]) eller blodproppar i artärerna (arteriell trombo- emboli [ATE]). Se för mer information om de olika riskerna med användning av kombinerade hormonella antikonceptiva rubrik 2 'När får du detta läkemedel inte använda eller måste du vara extra försiktig med vara?'.
DU

Kontakta omedelbart din läkare om du symtom av angio-ödem får såsom svullnad av ditt ansikte, tunga och/eller hals och/eller svårigheter vid att svälja av nässelutslag möjligt med andningsproblem (se avsnitt 2 'När måste du extra försiktig vara med denna medicin?').

Som vid alla kombinationspiller, kan din menstruationsmönster förändras, särskilt under de första månaderna av användning. Denna skillnad kan ligga i hur ofta du en blödning får (uteblivande av blödning, mindre ofta, oftare eller kontinuerlig), hur svår blödningen är, eller är, av hur länge de blödningen varar.

Ofta (förekommer hos mindre än 1 av 10 kvinnor)depressiva

- stämningar ,humörförändringar huvudvärk
- illamående
- illamåendebuksmärta buksmärta
- känsliga bröst, ömma bröst
- viktökning.

Ibland (förekommer hos mindre än 1 av 100 kvinnor)vätskeansamling

- mindre lust att
- ha samlag migrän

- kräkas
- kräkas, diarré
- hudutslag, nässelutslag (urtikaria)
- förstoring av bröstet.

Sällan (förekommer hos mindre än 1 av 1000 kvinnor)

- skadliga blodproppar i en ven eller artär, till exempel:
 - o i ett ben eller fot (till exempel djup ventrombos)
 - o i en lunga (till exempel lungemboli)
 - o hjärtinfarkt
 - o stroke
 - o 'liten stroke' eller tillfälliga symtom som vid en stroke, känd som TIA (transitorisk ischemisk attack)
 - o blodproppar i levern, magetarmar, njurar eller ögon. Risken för en blodpropp att få är större om det andra omständigheter på dig är tillämplig är som detta risk ökar (se avsnitt 2 för mer information om omständigheterna som risk för blodproppar ökar och symtomen på en blodpropp).överkänslighetsreaktioner
- mer
- lust att ha samlag irritation
- i ögonen ögon vid användning av kontaktlinser smärtsamma
- ,blåröda knölar i huden (erythema nodosum), hudutslag med oregelbundna röda fläckar eller sår (erythema multiforme) (erythema multiforme)
- flytning ut de bröstvårtan, förändring i flytning ut ur slidan
- viktnedgång.

Att rapportera om biverkningar

Får du biverkningar , kontakta då, kontakta då din läkare eller apotekare. Detta gäller även för biverkningar som inte i denna bipacksedel står. Du kan biverkningar också rapportera via Nederländska Biverkningar Centrum Lareb, webbplats: www.lareb.nl. Genom biverkningar att rapportera, hjälper du oss att få information om säkerheten för detta läkemedel detta medicin.

5. Hur förvarar du denna medicin?

Utanför synhåll och räckhåll för barn hålla.

Använd denna medicin inte mer efter de sista hållbarhetsdatum. Den finner du på lådan och de blisterförpackningen efter EXP. Där står en månad och ett år. Den sista dag av den månad är sista utgångsdatum.

Förvara under 30 °C. Inte i frysen förvara.

Förvara i ursprungliga blisterförpackningen ter skydd mot ljus och fukt.

Ta denna medicin inte om du till exempel ser att tablettorna är missfärgade missfärgad av sönderbruten är av när du andra synliga tecken på försämring i kvalitet märker.

Spola mediciner inte ner i avloppet eller toaletten och släng dem inte i soporna. Fråga din apotekare vad du ska göra med läkemedel som du inte längre använder används. Om du

mediciner på rätt sätt bortskaffar blir de på ett korrekt sätt förstörda och kommer de inte ut i miljön hamnar ..

6. Innehåll av förpackningen och övrig information

Vilka ämnen finns i denna medicin?

- De aktiva ämnena i denna medicin är desogestrel (150 mikrogram) och etinylestradiol (30 mikrogram).
- De andra ämnen i denna medicin är vattenfri kolloidal kiseldioxid, laktosmonohydrat, potatisstärkelse, povidon, stearinsyra, all-rac-alfa-tokoferol.

Hur ser Marvelon ut och vad finns i en förpackning?

Förpackningen innehåller 1, 3 eller 6 1, 3 eller 6 blisterförpackningar med 21 tabletter. Inte alla nämnda förpackningsstorlekar säljs på marknaden ..

är vita, runda , på, till båda sidor konvex och har en diameter på 6 mm.

På ena sidan står 'TR' ovan '5' och på den andra sidan 'Organon' en en femuddig stjärna.

Innehavare av tillståndet för att släppa ut på marknaden och tillverkare N.V. Organon

Kloosterstraat Kloostergatan 6

Nederländerna

Tel.: 00800 66550123 (+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

dpoc.benelux@organon.com

I registret registrerad under: RVG 08859

Denna bipacksedel är för den senast godkänd i maj 2025