

Pakendi infoleht: teave kasutajale de kasutaja Mebendasool CF 100 mg, tabletid mebendasool

Lugege hoolikalt de pakendi infoleht enne kui seda ravimit hakkate kasutama, sest seal on oluline teave sees teie jaoks.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nagu kirjeldatud selles selles infolehes või nagu teie arst apteeker te et on öelnud.

Hoia seda infolehte. Võib-olla on teil seda hiljem jälle vaja.

Kas teil veel küsimused? Võtke ühendust oma apteekriga.

Kas teil tekib probleeme mõne kõrvaltoimega, mis on loetletud punktis 4 kirjas? Või kas teil tekib te mõni kõrvaltoime mis mitte sisse selles infolehes on? Võtke ühendust oma arstiga või apteekriga.

Kas teie kaebus pärast 14 päeva ei vähene, või muutub see isegi halvem? Võtke ühendust teie arstiga.

Sisu sellest sellest pakendi infoleht

1. Mis on Mebendasool CF 100 mg ja milleks kasutatakse seda ravimit ? Millal
2. Millal ei tohi te seda ravimit mitte võtta või peate olema eriti ettevaatlik sellega olema?
3. Kuidas kasutate te seda ravimit?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas säilitate te seda ravimit?
6. Pakendi sisu ja muud teave Mis on

1. Mebendasool CF 100 mg ja milleks kasutatakse seda ravimit ravim kasutatakse?

Ravimigrupp

Mebendasool CF 100 mg kuulub rühma rühm ravimitest ravimid mis anthelmintikumid nimetatakse nimetatakse. Mebendasool on üks aine mis ussikesed võib tappa. See on tõhus vastu infektsioonid alates naaskelsabad, ümarussid, piitsussid- ja konksussid.

Mebendasool tapab nii ussid, vastsed nagu munad.

In mõnel juhul (peamiselt raske infektsioonid konksussidega või piitsussidega piugussidkus pole puudub täielik tervenemine saavutatud on, toimub seal küll üks vähenemine munade eritamine toimumine vähemalt vähemalt 90 %.

Kasutamine ravimi ravim

Mebendasool CF 100 mg kasutatakse infektsioonide korral nugiusside põhjustatud jaoksnaaskelsabad ümarussidümarussid piugussid piitsussid ja.

2. . Millal ei tohi seda ravimit võtta of peab te olema eriti ettevaatlik sellega olema?

Millal ei tohi te seda ravimit mitte kasutada?

- Te olete allergiline mõne ühe koostisosa vastu in see ravim. Need ained saate te leida rubriigis jaotises 6.

Millal peate olema eriti ettevaatlik olema selle ravimiga toode?

Võtke ühendust oma arstiga või apteekriga enne kui te seda ravimit kasutate:

- Lastel alla 2 aasta . Onvähe kogemusi selle koos ravimiga ravim juures lastel noorem kui 2 aastat; see kasutamine kohta mebendasool juures lastel noorem kui 2 aastat on seetõttu mitte peal kasutada soovitama.
- Ei pea olema erilist dieeti või lahtistit kasutama kasutamisel mebendazool juures rakendamisel alates mebendazool. Kui usinakkus esineb kaasneb läheb koos kõhulahtisus, peab inimene ka seda kõhulahtisus ravima.
- Et uuesti nakatumist pärast ravi vältida ,tuleb toimeaine juures nakkus koos naaskelsabad kogu pere peab olema ravitud.
- Abiainet päikesekollane (E110) võib allergilisi reaktsioone ,sealhulgas astma astma, põhjustada. Ülitundlikkusreaktsioonid esinevad sagedamini juhtudel kellel inimestel kellel on ülitundlikkus atsetüülsalitsüülhappe vastu.
- Kui te ka metronidasooli kasutate. Kombinatsioon nende nende toodete võib viia Stevens-Johnsoni sündroomini (raske ülitundlikkusreaktsioon koos (kõrge) palavikuga, punased laigud nahal ,liigesvalud liigesvalud enof silmapõletik) of toksiline epidermaalne nekrolüüs (raske, äkiline (ülitundlikkuse) reaktsioon kaasneb koos palavik ja ja villid nahal nahk/naha koorumine nahal nahk).

Kasutate te veel teisi ravimeid?

Kasutate te lisaks Mebendasool CF 100 mg veel teised ravimid, kas te seda hiljuti teinud või kas on võimalus et te lähitulevikus teisi ravimeid kasutate või ravimeid hakkate kasutama? Rääkige et siis oma arstile või apteekrile.

Teised ravimid võivad mõjutada toimet alates mebendasool mõjutada. See kehtib samuti jaoks ravimid mida te ainult vahetevahel ja harva kasutate, jaoks ravimid mida te hiljuti olete kasutanud ja jaoks ravimid mida te ilma ilma retsept võib osta.

De imendumine van mõned ravimid sõltub alates maos olevast happesisaldusest hape maos ;mebendasool võib de de imendumine alates nende ravimite mõjutada.

Pikaajalisel kasutamisel kasutamine kõrgete annuste korral võib või toimuda koostoime esinevad maohappe inhibiitoriga tsimetidiin.

Rasedus ja imetamine

Kas olete rase, arvate te rase olevat , sooviterase jääda või toidate te imetate ? Võtke siis ühendust oma teie arsti, enne te seda ravimit kasutate.

Mebendasool võib olla kasutatud raseduse ajal rasedus, kuid esimese kolme kuu jooksul ainult peal nõuandel alates teie arsti. Võimalikud riskid juures see väljakirjutamisel alates Mebendasool CF 100 mg raseduse ajal rasedus tuleb hinnata . saada vastu de oodatavad eelised ravist ravi. Ajal de periood alates imetamine ainult kasutada pärast konsultatsiooni oma teie arstiga.

Küsi oma arstilt või apteekrilt kell nõu enne kui sa mõnda ravimit võtad.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine masinatest

Pole olemas mingeid andmeid teada mõju kohta see toode sõiduvõimekus ja reaktsioonikiirus reaktsioonivõimeMõju on kuid mitte tõenäoline.

Mebendasool CF 100 mg sisaldab laktoosi

Kas teie arst teile rääkinud et te mõningaid suhkruid ei talu? Võtke siis ühendust oma arstiga enne kui seda ravimit võtate.

Mebendasool CF 100 mg sisaldab seda värvaine päikesekollane (E110)  
Päikesekollane võib allergilisi reaktsioone põhjustada.

Mebendasool CF 100 mg sisaldab naatriumi  
See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) tableti kohta, see tähendab et selles olemus 'naatriumivaba' on.

### 3. Kuidas kasutate te seda ravimit?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nagu kirjeldatud sisse selle pakendi infoleht või nagu teie arst või apteeker teile seda on öelnud .. te õige kasutamise ? Võtke siis ühendust teie arstiga või apteekriga arstide apteeker.

#### Annustamine

De järgnev annustamine kehtib nii lastele alates 2 2 kui täiskasvanutele . Eiole vajalik eriline dieet dieet of lahtisti te saama välja kirjutatud. Kui de usnakkus kaasneb läheb koos kõhulahtisus, peab inimene samaaegselt de sümptomid sellest te ravida.

Infektsioonid koos naaskelsabad: 1 tablett ja pärast 14 päeva uuesti 1 tablett, vajadusel iga 14 päeva korrata. Infektsioonid koos ümarussidega, piitsussidega ja konksussidega: 1 tablett hommikul ja 1 tablett õhtul, 3 3 päeva jooksul.

Kui kolme nädala pärast pole täielik tervenemine on saavutatud, tuleb ravi korrata . Kuidas võtta.

#### Tabletid Kuidas võtta ?

Tabletid Kuidas võtta võivad vähese veega olla võetud või närida.

Purustage tablett enne kui te selle annate väikesele väikesele lapsele annate. Hoidke väikest last alati silma peal augud samal ajal kui see see ravim võtab.

#### Lapsed nooremad kui 2 aastat

Kuna ebapiisavad andmed ei saa annustamissoovitust anda olla antud jaoks lapsed nooremad kui 2 aastat. Ärge andke mebendasooli mitte lastele alla 2 aasta ilma kõigepealt oma arstiga või apteekriga konsulteerimata tee on konsulteerinud.

Konsulteerige ühe arstiga kui sümptomid süvenevad või 14 päeva 14 ei parane ..

kui te sina täheldatud et mebendasool liiga tugev või just liiga vähe toimib, konsulteerige siis oma arstiga või apteekriga.

#### Kas teil liiga veel van see ravim kasutanud?

Millal te liiga palju Mebendasool CF 100 mg, tabletid olete võtnud, võtke siis kohe ühendust oma arstiga või apteeker.

Juures üleannustamine tekivad seedetrakti häired nagu kõhuvalu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus ilmnevad. patsient vett või limonaadi lasta juua koos selles aktiveeritud süsi. Kui tabletid lühikest aega tagasi võetud on, on see mõistlik patsiendil patsient panna oksendama ..

unustasite unustatud seda ravimit kasutada? Kuidas naaskelsabad on oluline et teine annus 14 päeva võetakse. 14 päevad saab võetud. Kui see periood kauem kui 15 päeva on peate te tõenäoliselt veel üks kolmas tablett võtma pärast 14 päeva.

Konsulteerige sisse et juhtum teie arst.

Kolme päeva kuurid võtate te unustatud annuse sisse niipea kui te sellele mõtlete. Kuid, kui see aeg aeg on jaoks järgmine annus, võtke te tavaline annus sisse ja lõpetage kuur kuni tabletid otsa kuni de tabletid peal on.

Võtke mitte kahekordset annust et unustatud annust tasa teha. Kas teil.

küsimusi selle kasutamise kohta? kasutamine alates see ravim? Võtke ühendust teie arstiga või apteekriga.

#### 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim võib ka see ravim kõrvaltoimeid põhjustada, kuigi saab mitte kõik sellega et teha. Allpool loetletakse de kõrvaltoimed mis võivad esineda juures de ravi koos Mebendasool CF 100 mg. De CF 100 mg. De hindamine kohta kõrvaltoimete on põhineb järgmistel sagedustel sagedused:

sageli :: 1 10-st kasutajast Sageli: 1 kuni 10-st 100-st 10 100-st kasutajad

Mõnikord: 1 juhtu kuni 10 juhtu 1 000 kasutaja kohta

Harva: 1 juhtu kuni 10 juhtu 10 000 kasutaja kohta

Väga harva: Vähem kui 1 juhtu 10 000 kasutaja kohta

Pole teada: Võib koos olemasolevate andmetega mitte määrata Üldised

haigused Pole

teada :: Vere-

ja lümfisüsteemi haigused Harva

:: valgete vereliblede osas vererakud

Immuunsüsteemi häired

Harva: ülitundlikkus, juures raske ülitundlikkus vastu ained ravimis ravim võib üks raske reaktsioon tekkida kus see veresooneid järsku väga lai saavad, koos kui tagajärg et vererõhk vererõhk langeb ja süda kiiresti kuid nõrgalt lööb, nähtav kui kahvatus, rahutus, ja niiske nahk (anafülaktiline reaktsioon). Äärmuslikel juhtudel võib teadvusekaotus esinevad (anafülaktoidne reaktsioon).

Närvisüsteemi häired

Harva: krampid, peapööritus

Seedetrakti häired

Sageli: kõhuvalu

Mõnikord: magu- ja soolevaevused, kõhulahtisus, gaasid

Maks- ja sapipõiehaigused

Harva: põletik maksas, ebanormaalsed maksafunktsiooni testid

## Nahk- ja nahaaluskoe haigused

Harva: sügelus, nahahaigus mille puhul pealmine kiht nahalt nahk eraldub nahalt alumistest kihtidest ja erythema multiforme, üks haigus mille puhul paistes punased laigud villid võivad tekkida (Stevens-Johnsoni sündroom või toksiline epidermaalne nekrolüüs), nahalööve, tursunud nägu (angio-ödeem), nõgestõbi, juuste väljalangemine

Konsulteerige koheselt oma arstiga kui üks järgmistest järgmine sümptomid ilmnevad:

- Tõsine nahahaigus nahahaigusnagu nahalööve nahalöövevillid nahal ja valulikumid haavandid suus haavandid sisse suu, silmad või ano-genitaalne piirkond (puudutab seda aastat ja suguelundid), kaasneb palavikuga ..
- reaktsioon mis toimub kohe koheselt pärast manustamist ja iseloomustatakse on poolt nahalööve, sügelus, hingamisraskused ja turse näol.
- Tõsine ülitundlikkusreaktsioon mis esineb toimub lühike pärast manustamist manustamine ja iseloomustab on poolt nõgestõbi, sügelus, turse, minestus ja hingamisraskused, keset keskel teised sümptomid.

See teatamine kõrvaltoimetest kõrvaltoimed

Kas teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arstiga või apteekriga . Seekteib ka võimalike kõrvaltoimete võimalik kõrvaltoimed mis mitte selles selles pakendi infolehes seisavad. Te võite kõrvaltoimeid ka otse teatada läbi Hollandi Kõrvaltoimete Keskus Lareb, veebisait: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Kõrvaltoimete kõrvaltoimeid te teatades, võib te meid aitama rohkem teavet saada kohta ohutuse selle ravimi . Kuidas.

### 5. te seda ravimit ? ravim?

Hoida nähtavuse ja käeulatusest lastel eemal. hoidma. alla 25 °C. Hoida

originaalpakendis kaitseks valguse eest. tere kaitsta valguse eest. ja niiskus.

Kasutamine seda ravimit mitte enam pärast de aegumiskuupäeva aegumiskuupäev See on leitav pakendil peal peale " Mitteleida tee kasutama pärast:" või "Exp.:". Seal on kuu ja aasta . Viimanepäev sellest kuust on aegumiskuupäev . Loputage ravimeid.

Loputada ravimid mitte läbi kraanikausi või WC ja visake neid mitte prügikasti prügikasti. Küsige oma apteekrilt mida teha ravimitega peate tegema mida te mitte rohkem kasutatud. Nad muutuvad siis ühel vastutustundlikul viisil hävitatud ja ei satu mitte keskkonda sattuma.

### 6. Sisu pakendi ja muud muud informatsioon Millised ained sisaldab see ravim ? Toimeaine

- toimeaine on selles ravimis on mebendasool . Iga tablett sisaldab 100 mg mebendasooli 100 mg mebendasool.
- De teised ained selles ravimis on laktoosmonohüdraat laktoosmonohüdraat vt all jaotis 2 " Mebendasool CF 100 mg sisaldab laktoosi"), kartulitärklis kartulitärklis, naatriumtärklisglükolaat, sahharoid-naatrium, polüvidoon (E1202), talk, kolloidne veevaba ränioksiid (E551), magneesiumstearaat (E470b), apelsinimaitseaine, päikesekollane FCF alumiiniumlakk (E 110) (vt all rubriik 2 "Mebendasool CF 100 mg sisaldab de värvaine päikesekollane FCF Alumiiniumlakk (E110)").

Kuidas näeb Mebendasool CF 100 mg välja ja kui palju on seal ühes pakend?

Tabletid tabletid on roosa-kollane kuni oranž-kollane, ümmargune koos ühe läbimõõduga 10 mm koos ühe murdjoonega ühel küljel ja teisel küljel teised külg valikuline märgitud "mebendasool" ja "100".

Tabletid sisse blisterpakend. blister sisaldab 2, 6 või 10 tabletti, pakitud sisse kordne 2, 6 või 10 tabletti sisse karbis ..

kõik nimetatud pakendisuurused ei ole turul olemas . Luba.

Hoidja müügiluba jaoks jaoks turule viimine ja tootja litsentsiomanik

Centrafarm  
B.V. Van de  
Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda  
Holland  
Tootja

Centrafarm  
Services B.V. Van de  
Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda  
4814 NE Breda  
Holland

Sanico NV  
Veedijk 59  
2300 Turnhout  
Belgia

Registris registreeritud numbri all  
RVG 57042, Mebendasool CF 100 mg, tabletid

See pakendi infoleht on viimati see uuendatud heaks kiidetud sisse detsembris 2024

Rohkem teavet selle ravimi kohta on saadaval CBG veebisaidil ([www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl)).