

Notice: information pour l' utilisateur Mebendazole CF 100 mg, comprimés mébendazole

Lisez attentivement la notice avant d' utiliser ce médicament utiliser, car il indique importante information dans pour vous.

Utilisez ce médicament toujours exactement comme décrit dans cette notice ou comme votre arts de pharmacien vous que a dit.

Conservez cette notice. Peut-être a vous en aurez besoin plus tard de nouveau besoin.

Avez vous encore questions? Contactez alors votre pharmacien.

Avez -vous des problèmes avec un des effets secondaires mentionnés dans la rubrique 4 ?

Ouavez -vous un effet secondaire qui la non dans ce notice indiqué? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

Votre votre symptôme après 14 jours non réduit, ou devient il même pire? Contactez votre médecin.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Mebendazole CF 100 mg et dans quel cas ce médicament est-il utilisé?
2. Quand pouvez-vous ce médicament pas prendre ou devez vous y prudent avec être?
3. Comment utilisez vous ce médicament?
4. Effets secondaires
5. Comment conservez -vous ce médicament?
6. Contenu de l' emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Mebendazole CF 100 mg et à quoi sert ce médicament utilisé?

Groupe de médicaments

Mébendazole CF 100 mg appartient à la groupe de médicaments qui anthelminthiques est appelé. Mébendazole est un agent qui vers peut tuer. Il est efficace contre les infections de oxyures, ascaris, trichocéphales- et ankylostomes.

Mébendazole tue à la fois vers, larves comme œufs.

Dans certains cas (principalement infections sévères par ankylostomes ou trichocéphales) où aucun complète guérison obtenue est, se produit il bien une réduction de l' excrétion des œufs a lieu d'au moins 90 %. Application

du médicament Mebendazole

Mébendazole CF 100 mg est utilisé pour les infections par oxyures, ascaris, trichocéphales et ankylostomes.

2. Quand ne devez-vous pas ce médicament pas prendre de doit vous devez être particulièrement prudent avec être?

Quand ne devez-vous pas ce médicament ne pas utiliser?

- Vous êtes allergique à un des composants dans ce médicament. Ces substances pouvez vous trouver dans rubrique 6.

Quand devez vous faire attention avec ce médicament ??

Contactez votre médecin ou pharmacien avant que vous ce médicament utilisiez:

- Chez les enfants de moins de 2 ans. Il y a peu d'expérience avec le médicament chez enfants de moins de 2 ans; l' utilisation de mébendazole chez enfants de moins de 2 ans est donc pas recommandée pour conseiller.
- Il n'est pas nécessaire de ou laxatif être utilisé lors de l'application de mébendazole. Si l' infection par les vers accompagné va avec diarrhée, doit on aussi cette diarrhée traiter.
- Pour réinfection après traitement prévenir éviter, doit en cas de infection par oxyures toute la famille doit être traitée.
- L' excipient jaune orangé (E110) peut provoquer des réactions, y compris l'asthme, causer. Réactions d'hypersensibilité sont plus fréquentes chez les personnes avec hypersensibilité à l'acide acétylsalicylique.
- Si vous également utilisez métronidazole. Association de ces produits peut entraîner au syndrome de Stevens-Johnson syndrome (grave réaction d'hypersensibilité avec (forte) fièvre, taches sur la peau ,douleurs articulaires douleurs articulaires enof conjonctivite) ou toxique épidermique nécrolyse (grave, soudaine (hypersensibilité) réaction accompagnée de fièvre et et ampoules sur la peau/desquamation de la peau).

Utilisez -vous d'autres médicaments médicamentsUtilisez

-vous en plus de Mebendazole CF 100 mg encore encore autres médicaments, avez vous que récemment fait ou existe la possibilité que vous dans un avenir proche autres médicaments allez va utiliser? Dites que alors votre médecin ou pharmacien.

D'autres médicaments peuvent l' efficacité de mébendazole affecter. Cela s'applique également pour médicaments que vous ne occasionnellement et parfois utilisez, pour médicaments que vous récemment avez utilisé et pour médicaments que vous sans utilisez ordonnance pouvez acheter.

Le absorption de certains médicaments dépend de la quantité d'acide dans l' estomac; mébendazole peut le absorption de ces médicaments affecter.

En cas de utilisation prolongée de fortes doses , il peut y avoir une interaction avec l' antiacide cimétidine.

Grossesse en allaitement

Êtes-vous enceinte, pensez -vous être enceinte de l'envisagez-vous de devenir enceinte ou allaitez -vous ? Prenez alors contact avecvotre votre médecin, avant vous ce médicament utilisez.

Mébendazole peut être utilisé pendant la grossesse, cependant durant les premiers mois seulement sur avis de votre médecin. Les risques possibles lors de la prescription de Mebendazole CF 100 mg pendant la grossesse doivent être pesés être contre le bénéfices attendus du traitement.

Pendant la période de l'allaitement uniquement utiliser après consultation avec votre médecin.

Demandez à votre médecin ou pharmacien pour conseil avant de prendre un médicament ..

et l' utilisation de machines II

n'y a pas de données connues sur l'effet de ce produit sur la capacité à conduire et la réactivité. Un effet est cependant peu probable.

Mebendazole CF 100 mg contient du lactose

Votre médecin vous a-t-il raconté que vous certains sucres ne tolérez? Contactez alors votre médecin avant vous ce médicament prenez.

Mebendazole CF 100 mg contient le colorant jaune soleil (E110)

Jaune soleil peut provoquer des réactions allergiques.

Mebendazole CF 100 mg contient sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé, c'est-à-dire veut dire que le dans essence 'sans sodium' est.

3. Comment utilisez -vous ce médicament?

Utilisez ce médicament toujours exactement comme décrit dans ce notice ou comme votre médecin ou pharmacien vous l' a dit. Vous avez des doutes sur le bon usage? Contactez votre médecin ou pharmacien.

Dosage

Le ci-dessous dosage s'applique tant pour les enfants à partir de 2 ans que pour les adultes. Il n'est pas de régime spécial de laxatif à être prescrit. Si l' infection par les vers accompagnée est de diarrhée, il faut en même temps les symptômes de celle-ci de cela à traiter.

Infections avec oxyures: 1 comprimé et après 14 jours à nouveau 1 comprimé, si nécessaire tous les 14 jours répéter. Infections avec ascaris, trichocéphales et ankylostomes: 1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir, pendant 3 jours consécutifs ..

après trois semaines aucune complète guérison est obtenue, doit le traitement être répété ..

quelle manière prendre ?Les

comprimés comprimés peuvent avec un peu d'eau être pris ou mâchés.

Écrasez le comprimé avant de le donner à un jeune enfant donner. Gardez un enfant toujours dans le trou tandis que le ce médicament prend.

Enfants plus jeunes de 2 ans

En raison données insuffisantes peut aucun conseil de dosage être donné pour pour enfants plus jeunes de 2 ans. Ne donnez mebendazole pas aux enfants de moins de 2 ans sans d'abord consulter votre médecin ou pharmacien consulter avoir consulté.

Consultez un médecin si les symptômes s'aggravent ou dans 14 jours ne s'améliorent.

. En cas remarque que mebendazole trop fort ou juste trop peu efficace, consultez alors votre médecin ou pharmacien.

Avez -vous trop beaucoup de ce médicament utilisé?

Quand vous trop beaucoup Mebendazole CF 100 mg, comprimés avez pris, contactez immédiatement votre médecin ou arts of pharmacien.

En cas de surdosage apparaissent des troubles gastro-intestinaux tels que douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhée . Le patient doit boire de l' eau ou de la limonade . avec là-dedans charbon activé. Si les comprimés peu avant ont été pris , il est utile de faire vomir le patient ..

oublié oublié ce médicament à utiliser?

En cas de oxyures , il est très important que la deuxième dose après 14 jours soit prise. Si cette période plus longue que 15 jours est devez vous probablement encore un troisième comprimé prendre après 14 jours.

Consultez dans que cas votre médecin.

Lors des cures de trois jours cures prenez vous la dose oubliée dose dès que vous y pensez.

Cependant, lorsque il temps est pour le suivant dose, prenez la habituelle dose à et complétez le traitement jusqu'à ce que les comprimés soient terminés sont.

Prenez pas double dose pour une oublié dose pour rattraper ..

des encore questions sur l' utilisation utilisation de ce médicament? Contactez votre médecin ou pharmacien.

4. Effets indésirables

Comme tout médicament peut également ce médicament avoir des effets indésirables, bien que reçoive non tout le monde avec cela à faire.

Ci-dessous sont les effets secondaires énumérés qui peuvent survenir lors du traitement avec Mebendazole CF 100 mg. Les évaluation de la effets indésirables est basée sur les fréquences suivantes:

Très souvent: Chez plus de 1 sur 10 utilisateurs Souvent: Chez 1 à 10 sur 100 utilisateurs

Parfois : Chez 1 à 10 sur 1.000 utilisateurs

Rarement: Chez 1 à 10 sur 10.000 utilisateurs

Très rarement: Chez moins de 1 sur 10.000 utilisateurs

Non connu: Peut avec les disponibles données pas être déterminé

Affections générales

Non connu: fièvre

Sang- et affections du système lymphatique

Rarement: déficit en globules blancs cellules sanguines

Troubles du système immunitaire

Rarement: hypersensibilité, en cas de grave hypersensibilité aux substances dans le médicament peut une grave réaction survenir où le vaisseaux sanguins soudainement très large deviennent, avec comme conséquence que la pression artérielle baisse et le cœur rapide mais faible bat, visible comme pâleur, agitation, et peau moite (réaction anaphylactique). Dans des cas extrêmes perte de conscience une pertede connaissance peut survenir (réaction anaphylactoïde).

Affections du système nerveux
Rarement: convulsions, vertiges

Affections gastro-intestinales
Souvent : douleurs abdominales
Parfois : estomac- et troubles intestinaux, diarrhée, flatulences

Foie- et maladies biliaires
Rarement: inflammation du foie, anomalies tests de fonction hépatique

Peau- et affections sous-cutanées

Rarement: démangeaisons, une affection cutanée où la couche supérieure de peau se détache de inférieures couches et érythème polymorphe, une affection où gonflées rouges taches cloques peuvent se former (syndrome de Stevens-Johnson syndrome ou toxique épidermique nécrolyse), éruption cutanée, gonflé visage (angio-œdème), urticaire, perte de cheveux

Consultez immédiatement votre médecin si un de suivants symptômes survenir:

- Un grave trouble cutané, comme éruption cutanée, ampoules sur la peau et ulcères douloureux dans la bouche, yeux ou ano-génitale région (concerne le anus et organes génitaux), accompagné de fièvre.
- Une réaction qui se produit immédiatement après administration et caractérisé est par éruption cutanée, démangeaisons, détresse respiratoire et visage enflé.
- Une réaction d'hypersensibilité grave qui se produit court après l' administration et caractérisé est par urticaire, démangeaisons, bouffées, évanouissement et difficultés respiratoires, au milieu de autres symptômes.

Le signalement des effets indésirables

Avez-vous des effets indésirables , contactezvotre médecin ou pharmacien . Celas'applique également aux éventuels effets indésirables effets secondaires qui ne dans cette notice sont. Vous pouvez effets indésirables également directement signaler via le Néerlandais Effets secondaires effets indésirables signaler , vouscontribuez pouvez vous nous aider plus d'informations à obtenir sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conservez vous ce produit?

Hors de la vue et portée des enfants garder. Conserver en dessous de 25 °C.

Conserver dans l' emballage d'origine pour protéger contre la lumière et humidité.

Utilisez ce médicament pas après la de date de péremption. Elle est à trouver sur l' emballage après "Ne à utiliser après:" ou "Exp.:". Là indique un mois et une année. Le dernier jour de ce mois est la date de péremption.

Rincez médicaments ne par le évier ou les toilettes et jetez -les pas dans la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire avec les médicaments que vous devez faire que vous ne plus utilisé. Elles sont alors de une manière responsable détruites et ne se retrouvent pas dans l'environnement finalement.

6. Contenu de l' emballage et autres information Quelles substances sont dans ce médicament?

- La substance active dans ce médicament est mébendazole . Chaque comprimé contient 100 mg mébendazole mébendazole.
- De autres substances dans ce médicament sont lactose monohydraté (voir sous rubrique 2 "Mebendazole CF 100 mg contient du lactose"), amidon de pomme de terre, amidon glycolate de sodium, saccharoïde-sodium, polyvidone (E1202), talc, colloïdal anhydre dioxyde de silicium (E551), stéarate de magnésium (E470b), arôme d'orange, jaune orangé FCF laque d'aluminium (E 110) (voir ci-dessous rubrique 2 "Mébendazole CF 100 mg contient le colorant jaune soleil FCF laque d'aluminium (E110)").

Comment apparaît Mébendazole CF 100 mg ? et combien y a-t-il dans un emballage?

Les comprimés sont rose-jaune à orange-jaune, ronds avec un diamètre de 10 mm avec une barre de cassure sur un côté et sur le autre côté optionnel mentionné «mébendazole» et «100». Comprimés dans plaquette thermoformée. Le blister contient 2, 6 ou 10 comprimés, emballé dans multiples de 2, 6 ou 10 comprimés dans une boîte.

Pas tous les tailles d'emballage mentionnées sont sur le marché disponibles.

Titulaire de l' autorisation de la mise sur le marché et fabricant Titulaire de l'autorisation

Centrafarm
B.V. Van de
Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda
Pays-Bas
Fabricant

Centrafarm
Services B.V. Van de
Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda
4814 NE Breda
Pays-Bas

Sanico NV
Veedijk 59
2300 Turnhout
Belgique

Dans le registre inscrit sous numéro
RVG 57042, Mebendazole CF 100 mg, comprimés

Cette notice est pour la dernière approuvé en décembre 2024

Plus d'informations sur ce médicament est disponible sur le site web du CBG (www.cbg-meb.nl).