

Pakuotės lapelis: informacija skirta de vartotojui Mebendazolas CF 100 mg, tabletės mebendazolas

Perskaitykite atydžiai de pakuotės lapelį prieš vartodami šį vaistą pradėsite vartoti, nes yra svarbi informacija joje jums. Naudokite šį vaistą visada tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip jūsų gydytojas nurodė gydytojo vaistininkas jūs kad turi pasakė.

Laikykite šį pakuotės lapelį. Galbūt jums jo vėliau vėl prireiks.

Ar jums dar klausimai? Tada susisiekite su jūsų vaistininku.

Ar jums pasireiškia viena iš šalutinių poveikių kurie skyriuje 4 nurodyti? Arba pasireiškia jums vienas šalutinis poveikis kuris ne į šiame pakuotės lapelyje nurodyta? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Ar jūsų skundas po 14 dienų ne sumažėja, arba ar jis netgi blogiau? Tada susisiekite su jūsų gydytoju.

Turinys iš šio pakuotės lapelio

1. Kas yra Mebendazolas CF 100 mg ir kam šis vaistas naudojamas ?Kada
2. Kada ar galite šį vaistą ne vartoti ar turite būti papildomai atsargūs su juo būti?
3. Kaip naudoti jūs šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikote jūs šį vaistą?
6. Turinys pakuotės ir kita informacija Kas yra

1. Mebendazolas CF 100 mg ir kam naudojamas šis vaistas vaistas naudojamas?

Vaistų grupė

Mebendazolas CF 100 mg priklauso prie grupės vaistų vaistų kurie anthelmintikai vadinamas vadinamas. Mebendazolas yra vaistas vaistas kuris kirminai gali nužudyti. Tai yra veiksmingas prieš infekcijas iš spalinės, askaridės, plaktonės- ir kasyklinės kirmėlės.

Mebendazolas nužudo tiek kirminai, lervos kaip kiaušiniai.

In kai kuriais atvejais (daugiausia sunkios infekcijos su kasykliniais kirminais arba plakstieniniais kirminais) kuriose nėra visišką išgijimą pasiektas yra, vyksta yra tikrai sumažėjimas kiaušinių išskyrimo procesas bent 90 %. Taikymas vaisto

Mebendazolas iš vaistas

Mebendazolas CF 100 mg vartojamas naudojamas nuo infekcijų dėl spalinės, askaridės, trichurės ir kabliukinės kirmėlės.

2. Kada negalite šio vaisto vartoti ? iš turite jūs papildomai atsargus su būti?

Kada negalite šio vaisto ne vartoti?

- Jūs esate alergiškas vienai iš medžiagų medžiagos in šis vaistas. Šios medžiagos galite jūs rasti in skyriuje 6.

Kada turite jūs papildomai atsargus būti su šis preparatas?

Susisiekiite su savo gydytoju arba vaistininku prieš jūs šį vaistą vartojate:

- Vaikams jaunesniems nei 2 metų . Yra mažai patirties su šiuo su vaistas vaikams jaunesniems nei 2 metų ;mebendazolo vartojimas vaikams jaunesniems nei 2 metų todėl nėra rekomenduojamas yra todėl ne prie ar spėti.
- Nereikia specialios dietos ar vidurius laxuojančių vaistų naudoti kai vartojamas mebendazolas . Jei yra. infekcija reikia gydyti lydimis vyksta su viduriavimu, reikia taip pat ir tą viduriavimą gydyti.
- Siekiant pakartotinės infekcijos po gydymo išvengti ,reikia ingredientas prie infekcijos su spalinėmis visą šeimą reikia būti gydoma.
- Pagalbinė medžiaga saulėlydžio geltona (E110) gali sukelti alergines reakcijas, tarp jų astmą, sukelti. Padidėjusio jautrumo reakcijos pasitaiko dažniau tarp asmenų su padidėjusiu jautrumu acetilsalicilo rūgščiai . Jei jūs.
- metronidazolą vartojate metronidazolas Kombinacija. Kombinacija iš šiuos produktus gali sukelti Stevenso-Džonsono sindromą (sunkios padidėjusio jautrumo reakcijos su (aukšta) karščiavimu, raudonos dėmės ant odos, sąnarių skausmai Itof akių uždegimas) arba toksinė epiderminė nekrolizė (sunkus, staigus (padidėjusio jautrumo) reakcija kartu su karščiavimu ir ir pūslelės ant odos/odos lupimasis nuo odos).

Ar naudojate jūs dar kitus vaistus?

Ar naudojate jūs be Mebendazol CF 100 mg dar kiti vaistai, turite jūs tai neseniai padarėte arba egzistuoja galimybė kad jūs artimoje ateityje kiti vaistai vartosite kitas vaistai eina naudoti? Pasakykite tai tada jūsų gydytojui arba vaistininkui.

Kiti vaistai gali paveikti veikimą vaisto mebendazolo poveikį. Tai taip pat taikoma už vaistus kuriuos jūs tik nuo ir kartais naudojate, už vaistus kuriuos jūs neseniai neseniai turėjote naudojote ir už vaistus kuriuos jūs be receptas gali pirkti.

De absorbcija van kai kurių vaistų priklauso nuo skrandžio rūgšties kiekio skrandyje ;mebendazolas gali de de absorbcija iš šiuos vaistus paveikti.

Ilgalaikis vartojimas didelėmis dozėmis gali atsirasti sąveika su skrandžio rūgšties slopikliu cimetidinu. su skrandžio rūgšties inhibitorius cimetidinas.

Nėštumas en žindymas

Ar jūs nėščia, manote jūs nėščia būti , noritenėščia tapti ar žindote jūs žindymas ? Susisiekiite susavo jūsų gydytojas, prieš jūs šį vaistą vartojate.

Mebendazolas gali būti vartojamas nėštumo metu pirmuosius mėnesius , tačiau per pirmuosius mėnesius tik pagal patarimą jūsų gydytojo. Galima rizika skiriant Mebendazolą CF 100 mg nėštumo metu turi būti įvertinta ir apsvastyta prieš vartojimą. te turi būti prieš de tikėtina nauda gydymo procedūros.

Žindymo de laikotarpiu nuo krūtimi tik naudoti po konsultacijos su jūsų gydytoju.

Klauskite savo gydytojo arba vaistininko patarimo prieš vartodami vaistą . Vairavimo ir.

Nėra duomenų apie poveikį vairavimui

ir mašinų naudojimui . duomenys žinomas apie poveikį šio produkto vairavimo gebėjimams ir reakcijos greičiui. Poveikis yra tačiau ne tikėtinas.

Mebendazolas CF 100 mg turi laktozės

Ar jūsų gydytojas jums pasakys, kad jūs kai kurių cukrų netoleruojate? Kreipkitės į savo gydytoją prieš jus šį vaistą vartojate ..

CF 100 mg turi sudėtyje yra de dažiklis saulėlydžio geltona (E110)

Saulėlydžio geltona gali alergines reakcijas sukelti.

Mebendazolas CF 100 mg turi natrio

Šis vaistas turi mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg) vienoje tabletėje, tai reiškia, kad jis iš esmės 'be natrio' yra.

### 3. Kaip naudoti jus šį vaistą?

Naudokite šį vaistą visada tiksliai kaip aprašyta į šią pakuotės lapelį arba kaip jūsų gydytojas arba vaistininkas jums tai pasakė .. dėl teisingo vartojimo? Tada susisiekite su jūsų gydytoju arba vaistininku vaistininkas.

#### Dozavimas

De žemiau dozavimas taikomas tiek vaikams nuo 2 metų amžiaus tiek suaugusiems . Ernereikia specialios dietos specialus dieta iš vidurius laisvinantis vaistas būti skiriamas paskirtas. kirminų infekcija lydi viduriavimas , reikia tuo pačiu metu simptomus šio gydyti vyrai tuo pačiu metu de simptomai šio te gydyti.

Infekcijos su spalinėmis: 1 tabletė ir po 14 dienų vėl 1 tabletė, prirėikus kas 14 dienų kartoti.

Infekcijos su apvaliosiomis kirmėlėmis, plaktoninėmis kirmėlėmis ir kabinėmis kirmėlėmis: 1 tabletė ryte ir 1 tabletė vakare, 3 3 dienas ..

po trijų savaičių savaitės nėra visiškai išgyjimas yra pasiektas, reikia gydymą gydymas pakartoti turi būti.

#### . Kaip būdas vartoti?

Tabletės tabletės gali su šiek tiek vandens būti prarytas arba kramtomas.

Sutraišykite tabletę prieš ją duodant jaunam vaikui duoti. Laikykite vaiką visada prižiūrint į skylės kol tas šis vaistas vartojamas.

#### Vaikai jaunesni nei 2 metų

Dėl nepakankamų duomenų negali būti dozavimo rekomendacija pateikta duomenys už vaikams jaunesniems nei 2 metų. Neduokite mebendazolo ne vaikams jaunesniems nei 2 metų be pirmiausia pasikonsultavę su gydytoju ar vaistininku pasitarti turėti pasitarė.

Pasitarkite su gydytoju jei simptomai pablogėja arba per 14 14 ne pagerėja ..

atvejis jūs u pastebėta kad mebendazolas per stipriai arba būtent per silpnai veikia, pasitarkite tada savo gydytoją arba vaistininką.

Ar jūs per daug iš šio vaisto vartojote?

Kada jūs per daug Mebendazol CF 100 mg, tablečių išgėrėte, nedelsdamikreipkitės nedelsiant savo gydytoją arba menų vaistininkas.

Prie perdozavimo atsiranda virškinimo trakto sutrikimai tokie kaip pilvo skausmas, pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Pacientui duoti vandens arba limonado gerti gerti su juo aktyvuota anglis. Jei tabletės trumpai prieš tai buvo išgertos, vertaprasminga pacientą priversti vėmti. Ar jūs pamiršote.

Ar jūs pamiršti šį vaistą naudoti? Esant

spalpinėms yra svarbu, kad antra dozė po 14 dienų būtų suvartota 14 dienos tampa išgertas. Jei ši laikotarpis ilgiau nei 15 dienų yra turite jūs tikriausiai dar vieną trečią tabletę išgerti po 14 dienų.

Pasitarkite su kad atvejis jūsų gydytojas.

Prie trijų dienų gydymo kursai vartojate jūs pamirštą dozę kai tik kai tik jūs apie tai pagalvojate.

Tačiau, kai tai laikas yra skirta kitai dozei paskirta, vartokite įprastą dozę dozė ir užbaikite kursą iki kol tabletės bus suvartotos tabletės ant yra.

Vartokite ne dvigubą dozę tam, kad pamirštą dozę kompensuotumėte. Ar turite.

klausimų apie vartojimą? apie naudojimas iš šio vaisto? Susisiekite su savo gydytoju arba vaistininku.

#### 4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir kiekvienas vaistas gali taip pat šis vaistas šalutinį poveikį turėti, nors gauna ne kiekvienas su tuo į padaryti.

Žemiau yra de šalutiniai poveikiai išvardyti kurie gali pasireikšti gydant de gydymą su Mebendazol CF 100 mg. vertinimas dėl šalutinių poveikių yra pagrįstas pagal šiuos dažnius:

Labai dažnai: Daugiau nei vienam iš 10 vartotojų Dažnai: Nuo 1 iki 10 iš 100 vartotojai

Kartais: 1 iš iki 10 iš 1.000 vartotojų

Retai: 1 iš iki 10 iš 10.000 vartotojų

Labai retai: Mažiau nei 1 iš 10.000 vartotojų

Ne žinoma: Gali su turimais duomenimis ne būti nustatyta

Bendrieji sutrikimai

Nežinoma :: Kraujo

ir limfinės sistemos sutrikimai Retai

:: baltųjų kraujo kūnelių kraujo ląstelės

Imuninės sistemos sutrikimai

Retai: padidėjęs jautrumas, esant sunkus padidėjęs jautrumas medžiagoms medžiagoms vaisto vaisto gali pasireikšti sunkus reakcija reakcija kai kai kraujagyslės staiga labai plačiai tampa, su kaip pasekmė kad kraujo spaudimas krenta ir širdis greitai bet silpnai plaka, matomas kaip blyškumas, neramumas, ir drėgna oda (anafilaksinė reakcija). Ekstremaliais atvejais gali prarasti sąmonę ( anafilaktoidinė reakcija ).

Nervų sistemos sutrikimai

Retai: traukuliai, galvos svaigimas

Virškinimo sistemos sutrikimai

Dažnai: pilvo skausmas

Kartais: skrandžio- ir žarnyno sutrikimai, viduriavimas, vidurių pūtimas

Kepenų- ir tulžies ligos

Retai: uždegimas kepenų, nenormalūs kepenų funkcijos tyrimai

Oda- ir poodinės ligos

Retai: niežulys, odos liga kai viršutinis sluoksnis nuo oda atsiskiria nuo apatinių sluoksnių ir eritema multiforme, liga būklė kurioje patinę raudonos dėmės pūslelės gali susidaryti (Stevens-Johnson sindromas arba toksinė epiderminė nekrolizė), odos bėrimas, patinęs veidas (angio-edema), dilgėlinė, plaukų slinkimas

Kreipkitės nedelsiant į gydytoją jei vienas iš šiuos simptomus pasireiškė:

- Sunkus odos sutrikimas odos sutrikimastoks kaip odos bėrimas odos bėrimaspūslelės ant odos ir skausmingos opos burnoje į burna, akys arba anogenitalinė sritis (susijusi su išange ir lytinių organų), lydima karščiavimo ..
- reakcija kuri įvyksta nedelsiant nedelsiant po vartojimas ir būdingas yra dėl odos bėrimo, niežulio, dusulio ir patinęs veidas.
- Sunki padidėjusio jautrumo reakcija kuri įvyksta vyksta trumpai po skyrimo vartojimo ir būdingas yra dilgėlinė dilgėlinė, niežulys, patinimas, alpimas ir kvėpavimo sunkumai, tarp viduryje kiti simptomai.

Het pranešimas apie nepageidaujamas reakcijas

Ar jums pasireiškia nepageidaujamos reakcijos, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taikoma taip pat galimoms nepageidaujamos reakcijoms šalutinis poveikis kurie ne šiame šiame pakuotės lapelyje nurodyti. Jūs galite nepageidaujamas reakcijas taip pat tiesiogiai pranešti per Nyderlandų Nepageidaujamų reakcijų Centras Lareb, svetainė: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Pranešdami nepageidaujamas reakcijas apie pranešti, galite jūs mus padėti daugiau informacijos gauti apie saugumą šio vaisto . Kaip.

5. jūs šį vaistą ? vaistas?

Laikyti nepasiekiamoje ir neprieinamoje vaikams vietoje .. žemiau 25 °C. Laikyti

originalioje pakuotėje apsaugai nuo šviesos ir prieš šviesa ir drėgmė.

Naudokite šį vaistą nebe po ne galiojimo pabaigos datos. Ji yra rasti ant pakuotės po " Nenaudotipo ar naudoti po." arba "Exp.:". Ten yra mėnuo ir metai . Paskutinėdiena to mėnesio yra galiojimo pabaigos data galiojimo data.

vaistus vaistai ne per kriauklę ar tualetą ir išmeskite juos ne į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko ką daryti su vaistais turite daryti kurių ne daugiau naudojamas. Jos yra tada atsakingu būdu sunaikinamos ir nepatenka į aplinką . Turinys pakuotės.

6. kiti iš pakuotė ir kiti informacija Kuri medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

- Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra mebendazolas . Kiekviena tabletė turi 100 mg mebendazolo mebendazolas.
- De kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra laktozės monohidratas (žr. žemiau skyrių 2 „Mebendazolas CF 100 mg turi laktozės“), bulvių krakmolas, natrio krakmolo glikolatas, sacharinas-natris, polividonas (E1202), talkas, koloidinis bevandenis silicio dioksidas (E551), magnio stearatas (E470b), apelsinų skonio medžiaga, saulėlydžio geltonasis FCF aliuminio lakas (E 110) (žr. žemiau rubrika 2 “Mebendazolas CF 100 mg turi dažiklį spalvą saulėlydžio geltoną FCF aliuminio laką (E110)”).

Kaip atrodo Mebendazolas CF 100 mg ir kiek yra pakuotėje viename pakuotė?

Tabletės tabletės yra rožinės-geltonos iki oranžinės-geltonos, apvalios su 10 mm skersmens 10 mm skersmens lūžio linija lūžio linija vienoje pusėje ir kitoje kita pusė neprivaloma nurodyta “mebendazolas” ir “100”.

Tabletės į lizdinę plokštelę. lizdinė plokštelė turi 2, 6 arba 10 tablečių, supakuota į daugybiniai iš 2, 6 arba 10 tablečių į dėžutę dėžutė.

Ne visos nurodytos pakuotės dydžiai yra prekyboje pateikiami ..

turėtojas leidimo leidimo gauti į prekybą išleisti ir gamintojas

Leidimo turėtojas  
Centrafarm B.V.  
Van de Reijtstraat 31-E  
4814 NE Breda  
Nyderlandai

Gamintojas  
Centrafarm Services B.V.  
Van de Reijtstraat 31-E  
4814 NE Breda  
Nyderlandai

Sanico NV  
Veedijk 59  
2300 Turnhout  
Belgija

Registruota įrašyta po numeriu  
RVG 57042, Mebendazolas CF 100 mg, tabletės

Šis pakuotės lapelis yra paskutinį kartą atnaujintas patvirtintas į gruodžio 2024

Daugiau informacijos apie šį vaistą yra prieinama CBG svetainėje ([www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl)).