

Ulotka: informacja dla użytkownika Mebendazol CF 100 mg, tabletki mebendazol Przeczytaj

dokładnie ulotkę przed użyciem tego leku zanim zaczniesz go stosować, ponieważ znajduje się ważne informacje w dla Ciebie.

Stosuj ten lek zawsze dokładnie tak jak opisano w tej ulotce lub tak jak Twój lekarz farmaceuta pan/pani że powiedział powiedział.

Przechowuj tę ulotkę. Może będziesz go później ponownie potrzebować.

Czy masz jeszcze pytania? Skontaktuj się z swoim farmaceutą.

Czy masz problemy z jednym z działań niepożądanych wymienionych w sekcji 4 występują? Lub czy masz działanie niepożądane które umrzeć nie w tej ulotce znajduje się? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.

Czy twoja dolegliwość po 14 dniach nie zmniejsza się, lub czy ona nawet gorzej?

Skontaktuj się z twoim lekarzem.

Zawartość tej ulotki Co to jest

1. Mebendazol CF 100 mg i do czego jest ten lek stosowany ?Kiedy
2. Kiedy nie wolno tego leku nie przyjmować lub musisz być szczególnie ostrożny z nim być?
3. Jak stosować ten lek ?Możliwe
4. działania niepożądane działania niepożądane
5. Jak przechowuje się ten lek?
6. Zawartość opakowania i inne informacje Co to jest

1. Mebendazol CF 100 mg i do czego służy ten lek środek używany?

Grupa leków

Mebendazol CF 100 mg należy do grupy leków leki które antyhelmintyczne jest nazywany.

Mebendazol jest środek lek który robaki może zabijać. Jest skuteczny przeciw infekcjom jelitowym owsików, glist, włosogłówki- i tęgoryjców.

Mebendazol zabija zarówno robaki, larwy jako jaja.

W niektórych przypadkach (głównie ciężkie zakażenia z tęgoryjcem lub włosogłówką) w których brak pełne wyleczenie uzyskane jest, znajduje się jednak spadek wydalania jaj miejsce co najmniej 90 %. Zastosowanie leku

Mebendazol z lekarstwo

Mebendazol CF 100 mg jest stosowany przy infekcjach przez owsiki, glisty, włosogłówki i tęgoryjce.

2. Kiedy nie wolno tego leku nie przyjmować z musi musisz dodatkowo ostrożny z tym być?

Kiedy nie wolno ci tego leku nie używać?

- Jesteś uczulony na jeden z składników w ten lek. Te substancje można znaleźć w rubryce 6. 6.

należy zachować szczególną ostrożność z tym lekiem środek?

Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą zanim użyjesz tego leku ::

- dzieci młodszych niż 2 lata . Jest mało doświadczenia z tym środkiem u dzieci młodszych niż 2 lata; jego stosowanie u mebendazolu u dzieci młodszych niż 2 lata jest dlatego nie do stosowania radzić.
- Nie trzeba żadnej specjalnej diety ani środka przeczyszczającego stosować przy stosowaniu mebendazolu . Jeśli infekcja. występuje u pacjenta towarzyszy idzie z biegunką, należy również także tę biegunkę leczyć.
- Aby ponowne zakażenie po leczeniu zapobiec ,należy składnik przy zakażeniu z owsikami cała rodzina powinna być leczona.
- Substancja pomocnicza żółcień pomarańczowa (E110) może powodować reakcje alergiczne, w tym astmę, powodować. Reakcje nadwrażliwości występują częściej u osób z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy kwas acetylosalicylowy.
- również metronidazol metronidazol Kombinacja. Kombinacja z tych produktów może prowadzić do zespołu Stevens-Johnson zespołu (ciężka reakcja nadwrażliwości z (wysoką) gorączką, czerwone plamy na skórze, bóle stawów enof zapalenie oka) of toksyczna epidermalna nekroliza (ciężka, nagła (nadwrażliwości) reakcja związana z gorączką i w pęcherze na skórze/łuszczenie skóry).

Czy używasz innych leków ? Czy używasz oprócz

Mebendazol CF 100 mg jeszcze innych leków ? inne leki, czy Pan/Pani to niedawno zrobił/a czy istnieje możliwość że możliwość najbliższej przyszłości inne leki będzie leki idzie używać?

Powiedz to wtedy swojemu lekarzowi lub farmaceutce.

Inne leki mogą wpływać na działanie z mebendazolu wpływać Dotyczy to również również dla leki które używasz tylko od i czasami stosujesz, dla leki które niedawno używałeś i stosowałeś dla leki które bez bez recepta możesz kupić.

De wchłanianie niektórych leków zależy od ilości kwasu ilość żołądka ; mebendazol może wpłynąć na może de przyjęcie z tych leków wpływają.

Przy długotrwałym stosowaniu z wysokich dawek może wystąpić interakcja interakcja wystąpić z cymetydyna cymetydyna.

Ciąża i karmienie piersią

Czy jesteś w ciąży, myślisz że jesteś w ciąży , chcesz zacząć w ciążę lub karmisz piersią ?

Skontaktuj się z swoim karmienie piersią? Skontaktuj się z twój lekarz, zanim Pan/Pani ten lek używa.

Mebendazol może być stosowany podczas ciąży ciąży, jednak w trakcie pierwszych miesięcy ciąży tylko na zalecenie lekarza twojego . możliwe ryzyka przy przepisywaniu Mebendazol CF 100 mg w trakcie ciąży powinny być rozważone . zrównoważony herapeutische indicaties: Dit geneesmiddel is geïndiceerd voor de behandeling van hypertensie en angina pectoris. Dosering en toediening: De aanbevolen startdosering is 5 mg eenmaal daags. De dosering kan worden aangepast op basis van de individuele respons van de patiënt, met een maximum van 10 mg per dag. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen. Gebruik bij patiënten met ernstige hypotensie, shock, of hartfalen is gecontra-indiceerd. Bijwerkingen: De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, duizeligheid, en vermoeidheid.

In geval van ernstige bijwerkingen, raadpleeg een arts. Bewaarcondities: Bewaren bij een temperatuur beneden 25°C, buiten het bereik van kinderen. być przeciw de oczekiwane korzyści z leczenia.

Podczas de okresu z karmienia piersią wyłącznie stosować po konsultacji z Twoim lekarzem.

Zapytaj swojego lekarza lub farmaceuty o poradę zanim zażyjesz lek lekarstwo przyjmuje.

obsługa maszyn Nie ma żadnych

danych są brak dane znany na temat wpływu tego produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i zdolność reakcji. Wpływ jest jednak mało prawdopodobny.

Mebendazol CF 100 mg zawiera laktozę

Czy twój lekarz ci powiedziano że Pan/Pani niektóre cukry nie toleruje? Skontaktuj się z swoim lekarzem zanim Pan/Pani ten lek zażyje.

Mebendazol CF 100 mg zawiera te barwnik żółcień pomarańczowa (E110)

Żółcień pomarańczowa może alergiczne reakcje powodować.

Mebendazol CF 100 mg zawiera sól

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, to oznacza że że w istocie 'bez sodu' jest.

### 3. Jak stosować Pan/Pani ten lek?

Stosować ten lek zawsze dokładnie tak jak opisano w ten ulotka lub jak twój lekarz lub farmaceuta ci to powiedział .. prawidłowego użycia ? Skontaktuj się z twoimlekarzem lub farmaceutą sztuka farmaceuta.

Dawkowanie

De poniższe dawkowanie dotyczy zarówno dla dzieci od 2 lat jak dla dorosłych. Er nie trzeba specjalnej diety of środek przeczyszczający do być przepisany. Jeżeli infekcja robakami towarzyszy idzie z biegunką, należy jednocześnie równocześnie objawy tego tego te leczyć.

Infekcje z owsikami: 1 tabletkai po 14 14 ponownie 1 tabletki, w razie potrzeby co 14 14 powtórzyć .. Infekcje z glistami, włośogłówkami i tęgoryjcami: 1 tabletki rano i 1 tabletki wieczorem, przez 3 kolejne dni.

Jeśli po trzech tygodniach brak pełne wyleczenie jest uzyskane, należy leczenie powtórzyć jeśli nie zostało.

. W jaki sposób przyjmować?

Tabletki tabletki mogą z wodą być przyjmowane lub żuć.

Rozgnieć tabletkę zanim ją podasz małemu dziecku daj. Trzymaj małe dziecko zawsze w dziury podczas to to lek przyjmuje.

Dzieci młodsze niż 2 lata

Ze względu na niewystarczające dane nie można zalecić dawkowania może być dla dzieciom młodsze niż 2 lata. Nie podawaj mebendazolu nie dzieciom poniżej 2 lat bez najpierw skonsultowania się z swoim lekarzem lub farmaceutą się herbata mieć skonsultowano.

Skonsultuj się z lekarzem jeśli objawy pogarszają się lub w ciągu 14 14 nie ulepszają się ..

przypadku gdy ty zauważa że mebendazol zbyt silnie lub właśnie zbyt słabo działa, skonsultuj wtedy swojego lekarza lub farmaceutę.

Czy masz zbyt wiele z tego leku użyto?

Kiedy Pan/Pani za dużo Mebendazol CF 100 mg, tabletki przyjął , skontaktuj się natychmiast natychmiast swoim lekarzem lub sztuka farmaceuta.

Przy przedawkowaniu występują dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak ból brzucha, nudności, wymioty i biegunka . Pacjentowi należy podać wodę lub lemoniadę do picia z w tym aktywowany węgiel. Jeśli tabletki krótko wcześniej przyjęte zostały, to jest sensowne pacjenta pacjenta do wywołać wymioty.

Czy zapomniałeś zapomniałeś ten lek używać ?Przy owsikach jest to bardzo ważne że druga dawka po 14 dniach 14 przyjęta . Jeśli. Jeśli ten okres dłużej niż 15 dni jest musisz się prawdopodobnie jeszcze jedną trzecią tabletkę zażyć po 14 dniach.

Skonsultuj się w że przypadek twój lekarz.

Przy trzydniowej kuracji przyjmujesz zapomnianą dawkę jak tylko o tym pomyślisz .

Jednakże, kiedy to czas czas jest dla następna dawka ,przyjmij Pan/Pani zwykłą dawkę w i dokończ kurację aż tabletki się skończą de tabletki na są.

Weź nie podwójną dawkę aby zapomnieć zapomnianą dawkę w do nadrobić.

Czy masz jeszcze pytania dotyczące użycia van ten leku? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.

#### 4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek może również ten lek działania niepożądane mieć, choć otrzymuje nie każdy z tym do zrobić.

Poniżej są de działania niepożądane wymienione które mogą wystąpić przy de leczeniu z Mebendazol CF 100 mg. ocena z działania niepożądane jest oparta na następujących częstościach:

Bardzo często: U więcej niż 1 na 10 użytkowników Często: U 1 do 10 na 100 użytkowników

Czasami: U 1 do 10 na 1.000 użytkowników

Rzadko: U 1 do 10 na 10.000 użytkowników

Bardzo rzadko: U mniej niż 1 na 10.000 użytkowników

Nie znane: Może z dostępnych danych nie zostać określony

Ogólne dolegliwości

Nie znane: gorączka

Choroby krwi i układu limfatycznego

Rzadko: niedobór białych krwinek komórki krwi

Zaburzenia układu odpornościowego

Rzadko: nadwrażliwość, przy ciężkiej nadwrażliwości na substancje w leku może wystąpić ciężka reakcja w której de naczynia krwionośne nagły bardzo szeroko stają się, z jako skutek że ciśnienie krwi spada i serce szybko ale słabo bije, widoczny jako bladość, niepokój, i wilgotna skóra (anafilaktyczna reakcja). W skrajnych przypadkach może wystąpić utrata przytomności (reakcja anafilaktoidalna ).).

Choroby układu nerwowego

Rzadko: drgawki, zawroty głowy

Choroby układu pokarmowego

Często: ból brzucha

Czasami: żołądek- i dolegliwości jelitowe, biegunka, wzdęcia

Wątroba- i choroby pęcherzyka żółciowego

Rzadko: zapalenie wątroby, nieprawidłowe testy czynności wątroby

Skóra- i choroby tkanki podskórnej

Rzadko: świąd, choroba skóry w której górna warstwa z skóry oddziela się z dolnych warstw i rumień wielopostaciowy, choroba schorzenie w której spuchnięte czerwone plamy pęcherze mogą tworzyć się (zespół Stevens-Johnson syndrom lub toksyczne naskórkowa martwica), wysypka, spuchnięta twarz (angio-obrzęk), pokrzywka, wypadanie włosów

Skonsultuj się natychmiast z lekarzem jeśli jeden z następujących objawów wystąpić:

- Poważne zaburzenie skórne zaburzenie skórnetakie jak wysypka wysypka skórnepęcherze na skórze i bolesne wrzody w ustach usta, oczy lub anogenitalna okolica (dotyczy de odbyt i narządy płciowe), towarzyszy gorączka ..
- reakcja która występuje natychmiast natychmiast na podanie i charakteryzuje się jest przez wysypkę, świąd, duszność i opuchniętą twarz.
- Poważna reakcja nadwrażliwości która występuje odbywa się krótko po podaniu podanie i charakteryzuje się jest przez pokrzywka, świąd, uderzenia gorąca, omdlenie i trudności w oddychaniu, w środku inne objawy.

Het zgłaszanie działań niepożądanych działania niepożądane

Czy masz problemy z działaniami niepożądanymi, skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą. To dotyczy również możliwych działań niepożądanych działania niepożądane które nie w tej ulotce są. Możesz zgłaszać działania niepożądane również bezpośrednio zgłosić przez Niderlandzkie Działania niepożądane działania niepożądane możesz zgłosić „, możesz pan nas pomóc więcej informacji uzyskać na temat bezpieczeństwa tego leku . Jak.

5. pan ten lek ? środek?

Poza zasięgiem i dostępem dzieci trzymać .. poniżej 25 °C. Przechowywać

w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i w wilgoć.

Używaj tego leku nie dłużej niż de data przydatności. Ta jest do znalezienia na opakowaniu po "Nie do używać po:" lub "Exp.:". Tam znajduje się miesiąc i rok . Ostatnidzień tego miesiąca jest ostateczną datą ważności . Wyplucz.

Płucz leki nie przez zlew lub WC i wyrzucaj ich nie do kosza na śmieci. Zapytaj swojego farmaceutę co zrobić z lekami które należy zrobić nie więcej używane. Ze są następnie w odpowiedzialny sposób zniszczone i nie trafiają do środowiska . Zawartość opakowania.

6. inne elementy opakowania i pozostałe informacje Jakie substancje są w tym leku?

- Substancja czynna w tym leku to mebendazol . Każda tabletkazawiera 100 mg mebendazol mebendazol.
- De inne substancje w tym leku to laktoza jednowodna (patrz poniżej punkt 2 „Mebendazol CF 100 mg zawiera laktozę”), skrobia ziemniaczana, sodu skrobioglikolan, sacharynian-sodu, polividon (E1202), talk, koloidalny bezwodny dwutlenek krzemu (E551), stearynian magnezu (E470b), aromat pomarańczowy, żółcień pomarańczowa FCF lak aluminiowy (E 110) (patrz poniżej rubryka 2 "Mebendazol CF 100 mg zawiera de barwnik żółcień pomarańczowa FCF lak aluminiowy (E110)").

Jak wygląda Mebendazol CF 100 mg i ile jest w jednym opakowaniu opakowanie?

Tabletki tabletki są różowo-żółte do pomarańczowo-żółte, okrągłe z średnicą 10 mm z linią podziału na jednej stronie i na inne strona opcjonalnie wymienione „mebendazol” i „100”.

Tabletki w blisterze. Blister zawiera 2, 6 lub 10 tabletek, zapakowane w wielokrotności z 2, 6 lub 10 tabletek w pudełku ..

wszystkie wymienione wielkości opakowań są w obrocie . Posiadacz.

na dopuszczenie do obrotu w handel wprowadzenie i producent

Posiadacz pozwolenia  
Centrafarm B.V.  
Van de Reijtstraat 31-E  
4814 NE Breda  
Holandia

Producent  
Centrafarm Services B.V.  
Van de Reijtstraat 31-E  
4814 NE Breda  
Holandia

Sanico NV  
Veedijk 59  
2300 Turnhout

Belgia

W rejestrze zarejestrowany pod numerem  
RVG 57042, Mebendazol CF 100 mg, tabletki

Ta ulotka jest ostatni raz zaktualizowana zatwierdzony w grudniu 2024

Więcej informacji o tym leku jest dostępnych na stronie internetowej CBG ([www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl)).

Transtoyou