

Folheto informativo: informação para o utilizador Mebendazol CF 100 mg, comprimidos mebendazol

Leia cuidadosamente o folheto informativo antes de utilizar este medicamento começar a usar, pois há importante informação neste para você. Use este medicamento sempre exatamente como descrito neste folheto ou como seu médico lhe partes de farmacêutico você que tem informado.

Guarde este folheto. Talvez tenha você ele mais tarde novamente preciso.

Tem você ainda perguntas? Entre em contato com seu farmacêutico.

Sente algum desconforto devido a um dos efeitos colaterais mencionados na seção 4 listados? Ou sente um efeito colateral que a não em este folheto informativo está? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

Se seu sintoma após 14 dias não diminuir, ou ficar ele mesmo pior? Entre em contato com seu médico.

Conteúdo deste folheto informativo

1. O que é Mebendazol CF 100 mg e para que é este medicamento usado?
2. Quando pode você este medicamento não tomar ou deve você ter cuidado cautela com ser?
3. Como usa você este medicamento?
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazenar você este medicamento?
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Mebendazol CF 100 mg e para que é este medicamento usado?

Grupo de medicamentos

Mebendazol CF 100 mg pertence ao grupo de medicamentos que anti-helmínticos é chamado. Mebendazol é um agente que vermes pode matar. É eficaz contra infecções de oxiúros, lombrigas, tricocéfalos- e anquilostomídeos.

Mebendazol mata tanto vermes, larvas como ovos.

Em alguns casos (principalmente infecções graves com ancilostomídeos ou tricocéfalos) em que nenhum completa cura obtida é, ocorre er uma redução da excreção de ovos de pelo menos 90%. Aplicação do

medicamento Mebendazol medicamento

Mebendazol CF 100 mg é usado para infecções por oxiúros, lombrigas, tricocéfalos e anquilostomídeos.

2. Quando não deve este medicamento não tomar de deve você deve ter extra cuidado com ser?

Quando você não pode este medicamento não usar?

- Você é alérgico a um dos componentes em este medicamento. Este substâncias pode você encontrar em seção 6.

Quando deve você extra cautela estar com este medicamento?

Entre em contato com seu médico ou farmacêutico antes de você este medicamento usar:

- Em crianças menores de 2 anos. Há pouca experiência com o meio em crianças menores de 2 anos; o uso de mebendazol em crianças menores de 2 anos é portanto não recomendado para adivinhar.
- Não precisa de uma dieta ou laxante ser usado ao aplicar de mebendazol .. a infecção por vermes infecção por vermes acompanhado vai com diarreia, deve se também essa diarreia tratar.
- Para reinfecção após tratamento evitar ,deve serve em infecção com oxiúros toda a família deve ser tratada.
- O excipiente amarelo-sol (E110) pode causar reações, incluindo asma, causar. Reações de hipersensibilidade ocorrem mais frequentemente em pessoas com hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ácido acetilsalicílico.
- também usa metronidazol .. Combinação de estes produtos pode levar à síndrome de Stevens-Johnson síndrome (grave reação de hipersensibilidade com (alta) febre, manchas vermelhas na pele, dores nas articulações enof conjuntivite) ou tóxica epidérmica necrólise (grave, repentina (hipersensibilidade) reação acompanhada de febre e em bolhas na peledescamação da pele).

Usa você outros medicamentos medicamentosUsa

você além de Mebendazol CF 100 mg ainda ainda outros medicamentos, tem você isso recentemente feito ou existe a possibilidade de você no futuro próximo outros medicamentos vai vai usar? Informe isso então seu médico ou farmacêutico.

Outros medicamentos podem a ação de mebendazol afetar. Isso aplica-se também para medicamentos que você apenas ocasionalmente e às vezes usa, para medicamentos que você recentemente tem usado e para medicamentos que você sem sem receita pode comprar.

O absorção de alguns medicamentos depende de da quantidade ácido no estômago; mebendazol pode o absorção de estes medicamentos afetam.

Em uso prolongado uso de altas doses pode haver uma interação ocorrer com o antiácido cimetidina.

Gravidez e amamentação

Está grávida, pensa que está grávida ou quer engravidar ou está amamentando ? Entre em contato com seu médico . médico, antes de você este medicamento usar.

Mebendazol pode ser usado durante a gravidez, no entanto durante os primeiros meses apenas em conselho do seu médico. Os possíveis riscos ao prescrever Mebendazol CF 100 mg durante a gravidez devem ser considerados antes de ser contra o esperados benefícios do tratamento.

Durante o período de amamentação exclusivamente usar após consulta com seu médico.

Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para aconselhamento antes de tomar um medicamento

..

Aptidão para conduzir o uso de máquinas Não

há dados disponíveis . conhecido sobre o efeito de este produto na capacidade de condução e a capacidade de reação. Um efeito é no entanto não provável.

Mebendazol CF 100 mg contém lactose

O seu médico lhe contou que você alguns açúcares não tolera? Entre em contato com seu médico antes de você este medicamento tomar.

Mebendazol CF 100 mg contém o corante amarelo-sol (E110)

Amarelo-sol pode alérgicas reações causar.

Mebendazol CF 100 mg contém sódio

Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por comprimido, ou seja, quer dizer que o em essência 'isento de sódio' é.

3. Como usa você este medicamento?

Use este medicamento sempre exatamente como descrito em este folheto ou como seu médico ou farmacêutico lhe disse lhe contou. Tem dúvidas sobre o uso correto ? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico farmacêutico.

Dosagem

De abaixo dosagem aplica-se tanto para crianças a partir 2 anos como para adultos. Não é necessário nenhuma dieta especial de laxante a ser prescrito. Se a infecção por vermes acompanha com diarreia ,deve se simultaneamente os sintomas desta disto te tratar.

Infecções com oxiúros: 1 comprimido e após 14 dias novamente 1 comprimido, se necessário cada 14 dias repetir. Infecções com lombrigas, tricocéfalos e anquilostomídeos: 1 comprimido de manhã e 1 comprimido à noite, durante 3 dias consecutivos ..

após três semanas semanas nenhum completa cura é obtida, deve o tratamento ser repetido ..

qual maneira tomar ?Os

comprimidos comprimidos podem com um pouco de água ser ingeridos ou mastigados.

Esmague o comprimido antes de o dar a uma criança pequena dar. Mantenha uma criança sempre sob buracos enquanto o este medicamento toma.

Crianças menores de 2 anos

Devido insuficientes dados pode nenhuma recomendação de dosagem ser dada para crianças mais jovens que 2 anos. Não administre mebendazol a crianças com menos de 2 anos sem primeiro consultar seu médico ou farmacêutico para chá ter consultado.

Consulte um médico se os sintomas piorarem ou dentro 14 dias não melhorarem.

Em caso você observa que mebendazol muito forte ou pouco eficaz funciona ,consulte então seu médico ou farmacêutico ..

você muito chá muito de este medicamento usado?

Quando você demora muito Mebendazol CF 100 mg, comprimidos tomado ingerido, entre em imediatamente contato com seu médico ou farmacêutico.

Em superdosagem ocorrem problemas gastrointestinais como dor abdominal, náusea, vômito e diarreia . O paciente água ou limonada deve beber com nele ativado carvão. Se os comprimidos pouco antes ingeridos foram, é útil o paciente a fazer vomitar.

Esqueceu-se de este medicamento usar utilizar?

Em oxíuros é de grande importância que a segunda dose após 14 dias seja tomada. Se este período mais longo que 15 dias é deve você provavelmente ainda um terceiro comprimido tomar após 14 dias.

Consulte em que caso seu médico.

No tratamento de três dias cursos tome você a esquecida dose assim que você pensar nisso . No entanto, quando o tempo tempo é para o seguinte dose, tome a habitual dose em e complete o tratamento até que os comprimidos acabem são.

Tome nenhuma dose dupla para uma dose esquecida para compensar ..

Se você tem mais perguntas sobre o uso de este medicamento? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como qualquer medicamento pode também este medicamento efeitos colaterais ter, embora receba não todos com isso a fazer.

Abaixo são os efeitos colaterais listados que podem ocorrer durante o tratamento com Mebendazol CF 100 mg. Os avaliação do efeitos colaterais é baseada nos seguintes frequências:

Muito frequente: Em mais de 1 em cada 10 usuários Freqüente: Em 1 a 10 em cada 100 usuários

Às vezes: Em 1 a 10 de 1.000 usuários

Raramente: Em 1 a 10 de 10.000 usuários

Muito raramente: Em menos de 1 de 10.000 usuários

Desconhecido :: Pode com o disponível dados não ser determinado

Condições gerais

Desconhecido :: Sangue-

e doenças do sistema linfático Raramente

:: de glóbulos brancos células sanguíneas

Doenças do sistema imunológico

Raramente: hipersensibilidade, em grave hipersensibilidade a substâncias no medicamento pode uma grave reação ocorrer em que o vasos sanguíneos de repente muito amplo ficam, com como resultado que o pressão arterial cai e o coração rápido mas fraco bate, visível como palidez, agitação, e pele úmida (reação anafilática). Em casos extremos pode ocorrer perda de consciência (reação anafilatoide).).

Doenças do sistema nervoso

Raramente: convulsões, tontura

Doenças do sistema gastrointestinal

Frequentemente: dor abdominal

Às vezes: estômago- e distúrbios intestinais, diarreia, flatulência

Fígado- e doenças da vesícula biliar

Raramente: inflamação do fígado, anormais testes de função hepática

Pele- e doenças subcutâneas

Raramente: prurido, uma doença de pele em que a camada superior da pele se solta da camada inferior e eritema multiforme, uma condição em que inchadas vermelhas manchas bolhas podem formar (síndrome de Stevens-Johnson síndrome ou tóxica epidérmica necrólise), erupção cutânea, rosto inchado (angio-edema), urticária, queda de cabelo

Consulte imediatamente seu médico se um de seguintes sintomas ocorrer:

- Uma grave doença de pele, como erupção cutânea, bolhas na pele e úlceras dolorosas na boca, olhos ou ano-genital região (refere-se o ânus e genitais), acompanhado de febre.
- Uma reação que ocorre imediatamente na administração e caracterizada é por erupção cutânea, coceira, falta de ar e rosto inchado.
- Uma grave reação de hipersensibilidade que ocorre curto após a administração e caracterizado é por urticária, prurido, inchaço, desmaio e dificuldades respiratórias, no meio de outros sintomas.

O relato de efeitos colaterais

Se você tiver efeitos colaterais, entre em contato com seu médico ou farmacêutico. Isso também se aplica a possíveis efeitos colaterais que não neste folheto estão. Você pode efeitos colaterais também diretamente relatar através do Holandês Centro de Efeitos Colaterais Lareb, site: www.lareb.nl. Ao efeitos colaterais relatar ,, pode você nos ajudar mais informações a obter sobre a segurança do este medicamento.

5. Como guarda você este medicamento?

Fora do alcance e acesso de crianças manter. Conservar abaixo 25 °C.

Conservar na embalagem original para proteger contra luz e umidade.

Uso este medicamento não mais após a data de validade . Ela está para encontrar na embalagem após " Não para chá usar após indica um mês e um ano . Último dia desse mês é a data de validade data de validade.

medicamentos medicamentos não pela pia ou o vaso sanitário e jogue os não no lixo. Pergunte ao seu farmacêutico o que fazer com medicamentos deve fazer que você não mais usado. Elas são então de uma forma responsável destruídas e não entram no meio ambiente acabam no meio ambiente Conteúdo.

6. embalagem e outros em outros informação Quais substâncias estão no este medicamento?

- A substância ativa no este medicamento é mebendazol . Cada comprimido contém 100 mg mebendazol mebendazol.
- De outras substâncias em este medicamento são lactose monoidratada (ver sob seção 2 “Mebendazol CF 100 mg contém lactose”), amido de batata, amido glicolato de sódio, sacarina-sódio, polividona (E1202), talco, coloidal anidro dióxido de silício (E551), estearato de magnésio (E470b), aroma de laranja, amarelo crepúsculo FCF laca de alumínio (E 110) (ver abaixo rubrica 2 “Mebendazol CF 100 mg contém o corante amarelo-sol FCF Laca de Alumínio (E110)”).

Como parece Mebendazol CF 100 mg parece e quanto contém um embalagem?

Os comprimidos são rosa-amarelo a laranja-amarelo, redondos com um diâmetro de 10 mm com uma ranhura em um lado e no outro lado opcional mencionado “mebendazol” e “100”.

Comprimidos em embalagem blister. A blister contém 2, 6 ou 10 comprimidos, embalado em múltiplos de 2, 6 ou 10 comprimidos em uma caixa.

Nem todas as mencionadas tamanhos de embalagem são no comércio colocados.

Titular da autorização de na comercialização colocar e fabricante

Titular da Autorização

Centrafarm B.V.

Van de Reijtstraat 31-E

4814 NE Breda

Países Baixos

Fabricante

Centrafarm Services B.V.

Van de Reijtstraat 31-E

4814 NE Breda

Países Baixos

Sanico NV

Veedijk 59

2300 Turnhout

Bélgica

No registro inscrito sob número

RVG 57042, Mebendazol CF 100 mg, comprimidos

Este folheto é para a última aprovado em dezembro 2024

Mais informações sobre este medicamento está disponível no site do CBG (www.cbg-meb.nl).