

Prospect: informații pentru utilizator utilizator Mebendazol CF 100 mg, comprimate mebendazol

Citiți cu atenție prospectul înainte de a utiliza acest medicament a începe să utilizați, deoarece există informații importante în pentru dumneavoastră.

Utilizați acest medicament întotdeauna exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum vă medic de farmacist dumneavoastră că a spus.

Păstrați acest prospect. Poate aveți nevoie de el mai târziu din nou nevoie.

Aveți dumneavoastră încă întrebări? Atunci contactați dumneavoastră farmacistul.

Aveți probleme cu un dintre efectele secundare menționate în secțiunea 4 sunt? Sau aveți dumneavoastră un efect secundar care nu în acest prospect scrie? Contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul.

Se dumneavoastră simptomul după 14 zile nu scade, sau devine el chiar mai rău?

Contactați medicul dumneavoastră. medicul dumneavoastră.

Conținutul acestui prospect Ce este

1. Mebendazol CF 100 mg și pentru ce se utilizează acest medicament ? Când?
2. Când aveți voie acest medicament nu luați sau trebuie să fiți precaut cu fiți?
3. Cum utilizați acest medicament ?Posibile
4. efecte secundare efecte secundare
5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații Ce este

1. Mebendazol CF 100 mg și pentru ce se utilizează acest medicament utilizat?

Grupa de medicamente

Mebendazol CF 100 mg aparține de grupa de medicamente care anthelmintice este numit.

Mebendazol este un agent care viermi poate ucide. Este eficace împotriva infecțiilor de oxiuri, ascarizi, tricocel- și ancilostomi.

Mebendazolul ucide atât viermi, larve ca ouă.

În unele cazuri (în principal infecții severe cu ancilostomi sau trichocefali) în care nu completă vindecare obținută este, are loc acolo totuși o scădere a eliminării ouălor loc de cel puțin 90 %.

Aplicarea a medicamentului

Mebendazol CF 100 mg este utilizat pentru infecții cauzate de oxiuri, ascarizi, trichocefali și ancilostomi.

2. Când nu trebuie să acest medicament nu luați de trebuie să fiți extra precaut cu fiți?

Când nu aveți voie să acest medicament nu utilizați?

- Sunteți alergic la un dintre substanțe în acest medicament. Aceste substanțe puteți să găsiți în rubrica 6.

Când trebuie să fiți precaut cu acest medicament medicament?

Contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament ::

- copii mai mici de 2 ani . Există puțină experiență cu acest medicament la copii mai mici de 2 ani; utilizarea mebendazolului la copii mai mici de 2 ani este de aceea nu recomandată a fi utilizat a sfătui.
- Nu este necesar niciun regim special sau laxativ să fie utilizat în aplicarea de mebendazol. Dacă infecția cu viermi însoțit merge cu diaree, trebuie să de asemenea acea diaree trata.
- Pentru reinfectare după tratament a preveni, trebuie la infecție cu oxiuri întreaga familie să fie tratată.
- Substanța adjuvantă galben de soare (E110) poate provoca reacții alergice , inclusiv astm, cauza. Reacții de hipersensibilitate apar mai frecvent la persoane cu hipersensibilitate la acid acetilsalicilic acid acetilsalicilic.
- de asemenea metronidazol metronidazol Combinație. Combinație de aceste produse poate duce la sindromul Stevens-Johnson sindrom (reacție de hipersensibilitate severă cu (febră ) mare , pete roșii pe piele, dureri articulare enof inflamație oculară) of toxic epidermal necroliză (severă, bruscă (hipersensibilitate) reacție însoțită de febră și în bășici pe piele/descumare a pielii).

Utilizați dumneavoastră alte medicamente medicamente Utilizați dumneavoastră în afară de Mebendazol CF 100 mg alte încă alte medicamente, ați dumneavoastră asta recent făcut sau există posibilitatea că în viitorul apropiat alte medicamente veți lua alte medicamente utiliza? Spuneți asta atunci medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Alte medicamente pot afecta efectul al mebendazolului afecta Acest lucru se aplică de asemenea pentru medicamente pe care le utilizați doar ocazional și uneori utilizați, pentru medicamente pe care le-ați recent utilizat de curând utilizat și pentru medicamente pe care le fără rețetă poți cumpăra.

De absorbția a unor medicamente depinde de cantitatea de acid în stomac ;mebendazolul poate să de absorbția a aceste medicamente afectează.

În cazul utilizării îndelungate a dozelor mari de poate apărea o interacțiune cu cimetidină cimetidină.

Sarcină și alăptare

Sunteți însărcinată, credeți că sunteți însărcinată să fiți, doriți să rămâneți însărcinată sau alăptați ? Vă rugăm să contactați medicul dumneavoastră medic, înainte de dumneavoastră acest medicament utilizați.

Mebendazolul poate fi utilizat în timpul sarcinii sarcinii, totuși în primele primele luni doar pe sfatul medicului dumneavoastră. Posibilele riscuri la prescrierea medicamentului Mebendazol CF 100 mg în timpul sarcinii trebuie să fie evaluate cu atenție. să fie împotriva a așteptate beneficiile ale tratamentului.

În timpul perioadei de alăptare exclusiv utilizați după consultare cu medicul dumneavoastră .

Întrebați medicul dumneavoastră sau farmacistul pentru sfat înainte de a lua un medicament ..

și utilizarea mașinilor Nu există

date disponibile cu privire la acest aspect cunoscut asupra efectului acestui produs asupra capacității de a conduce și a timpului de reacție. Un efect este totuși nu probabil.

Mebendazol CF 100 mg conține lactoză

V-a dumneavoastră medicul spus că dumneavoastră unele zaharuri nu tolerați? Contactați medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament ..

CF 100 mg conține conține de colorant galben de soare (E110)

Galben de soare poate alergice reacții provoca.

Mebendazol CF 100 mg conține sodiu

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per tabletă, ceea ce înseamnă că este în esență 'fără sodiu' este.

### 3. Cum utilizați dumneavoastră acest medicament?

Utilizați acest medicament întotdeauna exact așa cum este descris în acest prospect sau cum dumneavoastră medicul sau farmacistul v-a spus a spus .. cu privire la corecta utilizare ?

Contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul farmacist.

#### Dozare

De de mai jos dozare se aplică atât pentru copii de la 2 ani cât pentru adulți. Nu este necesar niciun regim special de laxativ a fi prescris. Dacă infecția cu viermi este însoțită de diaree, trebuie să se trateze simptomele acesteia te trata.

Infecții cu oxiuri: 1 comprimat și după 14 zile din nou 1 comprimat, dacă este necesar fiecare 14 zile repetați. Infecții cu ascarizi, trichocefali și ancilostomi: 1 comprimat dimineața și 1 comprimat seara, timp de 3 zile consecutive ..

după trei săptămâni săptămâni niciun completă vindecare este obținută, trebuie tratamentul să fie repetat . Cum.

administrați ? Comprimatele a lua?

De comprimate pot să cu puțină apă fi administrate sau mestecate.

Zdrobiți comprimatul înainte să îl dați unui copil mic oferiți. Țineți un copil întotdeauna sub găuri în timp ce the acest medicament ia.

Copii mai tineri de 2 ani

Din cauza datelor insuficiente nu poate fi un sfat de dozare fi dat pentru copii mai tineri de 2 ani.

Nu administrați mebendazol la copii sub de 2 ani fără a consulta mai întâi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dumneavoastră aveți consultat.

Consultați un medic dacă simptomele se agravează sau în 14 14 nu se îmbunătățesc ..

caz că dumneavoastră observați că mebendazol prea puternic sau insuficient prea puțin funcționează, consultați atunci medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Aveți dumneavoastră prea mult de acest medicament utilizat?

Când dumneavoastră prea mult Mebendazol CF 100 mg, comprimate ați luat, contactați imediat medicul dumneavoastră sau farmacist.

În caz de supradozaj apar tulburări gastrointestinale precum dureri abdominale, greață, vărsături și diaree . Pacientul să bea apă sau limonadă . băutură cu în care activat cărbune. Dacă comprimatele recent înainte au fost administrate sunt, este util să pacientul să fie provocat să vomite.

Ați uitat acest medicament a utiliza?

În cazul oxiiurilor este mare importanță ca a doua doză după 14 zile să fie administrată .Dacă acest perioadă mai lungă decât 15 zile este trebuie să probabil încă un al treilea comprimat luați după 14 zile.

Consultați în că caz dumneavoastră medic.

În cazul tratamentului de trei zile cure luați dumneavoastră uitată doza imediat ce dumneavoastră vă gândiți. Totuși, când este timp este pentru următoarea doză ,luați doza obișnuită și finalizați tratamentul până când tabletele sunt consumate . de comprimate pe sunt.

Luați nu dublă doză pentru a o uitată doză pentru a recupera ..

dumneavoastră întrebări despre utilizarea medicamentului ? de acest medicament? Contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul.

#### 4. Posibile efecte secundare

Ca orice medicament poate de asemenea acest medicament efecte secundare avea, deși primește nu toată lumea cu aceasta a face.

Mai jos sunt de efectele secundare enumerate care pot apărea în de tratamentul cu Mebendazol CF 100 mg. evaluarea a efectelor secundare este bazată pe următoarele frecvențe:

frecvent :: mai mult de 1 din 10 utilizatori Frecvent: La 1 până la 10 din 100 10 din 100 utilizatori

Uneori: La 1 până la 10 din 1.000 utilizatori

Rareori: La 1 până la 10 din 10.000 utilizatori

Foarte rar: La mai puțin de 1 din 10.000 utilizatori

Nu este cunoscut: Poate cu disponibile datele nu poate fi determinat

Afecțiuni generale

Necunoscut :: Afecțiuni

ale sângelui afecțiuni ale sistemului limfatic

sistemului limfatic: : deficit de albe celule sanguine

Tulburări ale sistemului imunitar

Rareori: hipersensibilitate, la severe hipersensibilitate la substanțe în medicament poate o severă reacție apărea în care de vase de sânge brusc foarte larg devin, cu ca rezultat că de tensiunea arterială scade și inima rapid dar slab bate, vizibil ca paloare, neliniște, și piele umedă ( reacție anafilactică). În cazuri extreme poate apărea pierderea cunoștinței ( reacție anafilactoidă ). (anafilactoid reacție).

#### Afecțiuni ale sistemului nervos

Rareori: convulsii, amețeli

#### Afecțiuni ale sistemului gastrointestinal

Frecvent: dureri abdominale

Ocazional: stomac- și tulburări intestinale, diaree, flatulență

#### Ficat- și afecțiuni biliare

Rareori: inflamație a ficatului, anormale teste ale funcției hepatice

#### Piele- și afecțiuni subcutanate

Rareori: mâncărime, o afecțiune a pielii în care stratul superior strat superficial de piele se desprinde de straturile inferioare și eritem multiform, o afecțiune în care umflate roșii pete bule pot forma (sindromul Stevens-Johnson sindrom sau toxice epidermică necroliză), erupție cutanată, umflat față (angio-edem), urticarie, căderea părului

Consultați imediat medicul dumneavoastră dacă unul de următoarele simptome apare:

- O afecțiune cutanată, cum ar fi erupție cutanată, bășici pe piele și ulcere dureroase în gură, ochi sau ano-genitală regiune (se referă la zona anală și organele genitale), însoțit de febră.
- O reacție care are loc imediat după administrare și caracterizat este de erupție cutanată, mâncărime, dificultăți de respirație și față umflată ..
- reacție alergică gravă care apare scurt după administrare administrare și caracterizat este de urticarie, mâncărime, umflare, leșin și dificultăți de respirație, în mijlocul alte simptome.

#### Het raportarea a efectelor secundare

Aveți probleme cu efecte secundare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul. Acest lucru se aplică de asemenea pentru posibile efecte secundare care nu în acest prospect sunt. Puteți raporta efectele secundare de asemenea direct raporta prin Olanda Centrul de Efecte Secundare Lareb, site web: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Raportând efectele secundare a raporta, puteți dumneavoastră ne ajuta mai informații să obținem despre siguranța acestui acest medicament.

#### 5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?

În afara vederii și accesului copiilor păstrați .. sub 25 °C. Păstrați

în ambalajul original pentru a proteja de lumină și în umiditate.

Utilizați acest medicament nu mai după de data de expirare. Aceasta este de găsit pe ambalaj după „Nu de utilizați după:” sau “Exp.:”. Acolo este o lună și un an . Dataultimă zi a acelei luni este data de expirare data de expirare.

medicamentele medicamente nu prin chiuvetă sau WC-ul și aruncați le nu în coșul de gunoi. Întrebați farmacistul dumneavoastră ce să faceți cu medicamentele trebuie să faceți pe care nu mai mult utilizat. Ele sunt apoi într-un mod responsabil distruse și nu ajung în mediu deloc în mediu Conținutul.

6. ambalajului și alte informații suplimentare informații Care substanțe sunt în acest medicament?

- Substanța activă în acest medicament este mebendazol . Fiecare comprimat conține 100 mg mebendazol mebendazol.
- De alte substanțe în acest medicament sunt lactoză monohidrat (vezi sub rubrica 2 „Mebendazol CF 100 mg conține lactoză”), amidon de cartofi, glicolat de amidon de sodiu, sacaroid-sodiu, polividonă (E1202), talc, coloidal anhidru dioxid de siliciu (E551), stearat de magneziu (E470b), aromă de portocală, galben de soare FCF lac de aluminiu (E 110) (vezi mai jos rubrică 2 “Mebendazol CF 100 mg conține de colorantul galben apus FCF Lac de aluminiu (E110)”).

Cum arată Mebendazol CF 100 mg și cât conține un o ambalaj?

Comprimatele comprimatele sunt roz-galben până la portocaliu-galben, rotunde cu un diametru de 10 mm cu o linie de rupere pe o parte și pe cealaltă altă parte opțional menționat „mebendazol” și „100”.

Comprimate în ambalaj blister. Blisterul conține 2, 6 sau 10 comprimate, ambalate în multipli de 2, 6 sau 10 tablete în o cutie.

Nu toate dimensiunile ambalajelor sunt pe piață ..

al autorizației de punere în comercializare introducerea și producător

Deținătorul autorizației  
Centrafarm B.V.  
Van de Reijtstraat 31-E  
4814 NE Breda  
Țările de Jos

Producător  
Centrafarm Services B.V.  
Van de Reijtstraat 31-E  
4814 NE Breda  
Olanda

Sanico NV  
Veedijk 59  
2300 Turnhout  
Belgia

În registru înregistrat sub numărul  
RVG 57042, Mebendazol CF 100 mg, comprimate

Acest prospect este pentru ultima oară aprobat în decembrie 2024

Mai multe informații despre acest medicament este disponibilă pe site-ul web al CBG ([www.cbg-meb.nl](http://www.cbg-meb.nl)).

Transtoyou