

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui de vartotojui

Davitamon Melatoninas 1 mg

Davitamon Melatoninas 3 mg

Davitamon Melatoninas 5 mg

melatoninas 1 mg/tabletė

melatoninas 3 mg/tabletė

melatoninas 5 mg/tabletė

Perskaitykite gerai visą pakuotės lapelį prieš jus šį vaistą pradėsite vartoti nes jame yra svarbi informacija apie jums. Vartokite

šį vaistą vaistas visada tiksliai kaip aprašyta in šiame pakuotės lapelyje arba kaip jūsų gydytojas, arba vaistininkas jums tai pasakė ..

- šį pakuotės lapelį pakuotės lapelis. Galbūt turėsite jo vėliau vėl reikės.
- Ar turite dar klausimų? Tada susisiekiite su savo vaistininku.
- Ar jums pasireiškia vienas iš šalutinis poveikis kurie skyriuje 4 nurodyti? Arba jums pasireiškė koks nors šalutinis poveikis kuris nėra šiame lapelyje nurodytas ? Susisiekiite susavo gydytoju arba vaistininku vaistininkas.
- Tampa jūsų skundas po 6 dienų ne mažesnis, arba tampa jis netgi blogesnis? Tada kreipkitės į savo gydytoją.

Turinys šio lapelio pakuotės

1. Kas yra Davitamon Melatoninas ir kam yra šis vaistas naudojamas?
2. Kada negalite šio vaisto vartoti arba turite būti ypač atsargūs atsargiai su yra?
3. Kaip naudojate jus šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikote jus šį vaistą?
6. Pakuotės turinys pakuotė en kita informacija

1. Kas yra Davitamon Melatoninas ir kam šis vaistas naudojamas ?Veiklioji

medžiaga veiklioji Davitamon Melatonine yra Melatoninas yra melatoninas. Melatoninas yra hormonas hormonas kuris natūraliai taip pat organizmo kūno paties yra gaminamas. Melatoninas yra naudojamas dėl de trumpalaikis gydymas nuo lėktuvo laiko skirtumo suaugusiems . Lėktuvo laiko skirtumas yrasutrikimas miego-budrumo ritmo , kuris gali pasireikštijo keliu laiko juostu kirtimo per kelias laiko juostas keliaujiang per per vienas skrydis.

2. Kada galite šį vaistą ne vartoti arba turite būti ypač atsargūs su juo būti?

Kada galite šį vaistą ne naudoti?

- Jūs esate alergiškas vienai iš sudedamųjų medžiagu šiame vaistiniame preparate. Šias medžiagas galite rasti šiame preparate skyrius 6.

Kada turite būti papildomai atsargūs su šiuo vaistu ?Kreipkitės į

šiais atvejais į savo gydytoją, vaistininką ar slaugytoją slaugytoja prieš jus šį vaistą vartojate:

- Jei jūs taip mieguistas esate kad jūsų saugumas dėl to į pavojų gali patekti.
- Jei jūs vieną kepenų liga turi. Ar yra nėra duomenų prieinama apie Davitamon Melatonino poveikį asmenims su kepenų liga ir todėl yra tokiais atvejais naudojimas iš šio vaisto nerekomenduojama ..
- epilepsija turite .Dėl vartojimo melatonino gali padidėti skaičius epilepsijos priepuolių padidėti ..
- Jei turite autoimuninę ligą autoimuninė liga Pacientams su autoimunine liga yra žinomų atvejų apie simptomų pablogėjimą . iš vienas paūmėjimas iš simptomai po het vartojimo iš melatonino. Pasitarkite su todėl su savo gydytoju kai jūs šį vaistą norėtumėte naudoti .. Naudojimas nuo šio vaisto per asmenims su su auto-imunine liga nėra rekomenduojamas ..
- turite per aukštą cukraus kiekį kraujyje kraujas turi arba jei jūs sergate cukriniu diabetu. Jei jūs cukriniu diabetu. Jei jūs melatoniną vartojate per angliavandenių turtingą valgį (pavyzdžiui duona, bulvės , makaronai, cukrus) gali de gliukozės kiekis kraujyje būti sutrikdytas. Vartokite tas preparatą todėl ne į laikotarpį nuo 2 valandų prieš iki 3 valandų po de maistas. Ar jūs turite sunkų sutrikusį gliukozės netoleravimą ar diabetą, tada vartokite vaistą ne mažiau 3 valandas po de maisto .
- Jei jūs rūkote. Kadangi sudedamosios dalys iš tabako dūmų gali suskaldyti melatoniną kepenų veikimu gali pagreitinti, gali pas asmenis kurie rūko de veikimas nuo Davitamon Melatoninas mažiau stiprus būti.

Vaikai ir paaugliai iki 18 metų

Neduoškite šio vaisto ne vaikams .Jis naudojimas jo vaikams vaikams yra ne ištirtas ir todėl saugumas saugumas ir veiksmingumas jo ne žinomas.

Vartojate jūs dar kiti vaistai?

Vartojate jūs be Davitamon Melatoninas dar kitus vaistus, ar jūs tai neseniai darėte ar egzistuoja egzistuoja de galimybė kad jūs artimoje ateityje kitus vaistus pradėsite vartoti? Pasakykite tai savo gydytojui arba vaistininkui.

Tai yra ypač iš svarba naudojant naudojimas iš migdomieji, raminamieji ,vaistai nuo depresijos (pvz. fluvoxaminas, desipraminas, oksaprotinas), estrogenai (kontracepcija arba hormonų terapija), kraujo skiedikliai, vaistai nuo epilepsijos priepuolių prevencijai (pvz. karbamazepinas), chlorpromazinas chlorpromazinas vaistas nuo pykinimo pykinimas en vėmimas), cimetidine (vaistas nuo rėmens), chinolonų antibiotikai ir rifampicinas, kraujospūdį mažinantys vaistai (pvz. nifedipinas), vaistai kurie kofeino turi en vaistai nuo odos problemų (pvz. 5- arba 8-metoksipsooralenas),.

Į ką turite atkreipti dėmesį su maistu ir gėrimais ? Nevartokite

alkoholio prieš alkoholis už, per arba po vartojimo vartojimo melatonino melatonino.

Maistas gali padidinti lygis melatonino kraujyje kraujyje padidinti .vartojimas vartojimas iš melatonino kartu su valgymu angliavandenių turtingų patiekalų (pavyzdžiui duona, bulvės, makaronai, cukrus) gali reguliavimą iš jūsų gliukozės kiekio kraujyje per per keletas valandų paveikti. Nevalgykite ne laikotarpį laikotarpis nuo 2 valandos prieš iki 2 valandos po vartojimo vartojimas melatonino melatoninas. Skirta asmenims su per didelis cukraus kiekis kraujyje kraujas

arba asmenys kurie serga diabetu kenčia, taikoma kad jie negali valgyti valgyti periodas nuo 2 valandų prieš iki 3 valandų po vartojimo vartojimo melatonino ..

ir žindymas Kai

jūs nėščia esate, nėščia nėščia mano kad esate, nėščia nori tapti ar žindote , geriaunenaudoti šio vaisto ne naudoti . Vairavimo.

Vairavimo gebėjimas ir tas vartojimas mašinų

Davitamon Melatoninas gali sukelti mieguistumą sukelti.Jei jaučiatės mieguistas , negalite vairuoti transporto priemonės ar valdyti mašinų mašinų .Jei nuolat jaučiatės mieguistas , pasitarkite tada savo gydytoju.

Davitamon Melatoninas turi laktozės

Vienas Davitamon Melatoninas 1 mg tabletė turi 67,3 mg laktozės monohidrato. Viena Davitamon Melatoninas 3 mg tabletė turi 65,3 mg laktozės monohidratas. Vienas Davitamon Melatoninas 5 mg tabletė turi 63,3 mg laktozės monohidratas.

Jei jūs žinote kad jūs tam tikrus cukrus ne toleruojate, susisiekit su jūsų gydytojas prieš jūs šį vaistą vartojate.

Šis preparatas turi mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg) vienoje 1 mg/3 mg/5 mg tabletėje, tai reiškia kad jis iš esmės ' be natrio' yra.' yra.

3. Kaip naudoti jūs šį vaistą?

Naudokite šį vaistą visada tiksliai kaip jūsų gydytojas ar vaistininkas jums tai pasakė .. Abejoti jūs dėl teisingo vartojimo? Tada susisiekit su savo gydytoju arba vaistininku.

Rekomenduojama dozė yra 1 iki 5 mg per dieną ,trukmė 3 3 iki 6 dienos.

Tabletės gali geriausiai būti nurytos visos su trupučiu vandens . Lūžio linijaskirta tabletei padalyti . tabletę te gali laužyti jei jūs sunku turite visą tabletę nuryti nuryti nuryti.

Vartokite tabletes prieš pat kai norite eiti miegoti į, pradėti pradėti pirmąją pirmąją diena kad tai miego ritmas yra sutrikęs. Vartokite tabletes ne į vietoje nuo paskirties prieš 20.00 val. arba po 04.00 val.. Žr. taip pat po 'į ką reikia jums atkreipti dėmesį valgant ir geriant?'

Vartokite šį vaistą kuo trumpiau galima laikotarpiu dozavimas kuri geriausią palengvėjimą suteikia simptomų simptomų.

Naudojimas vaikams ir paaugliams iki 18 18 Neduokite

šio vaisto ne ne prie vaikams. Jo vartojimas vaikams nebuvo tirtas ir todėl saugumas ir veiksmingumas nėra žinomas . veiksmingumas iš jo ne žinomas.

Ar jūs per daug šio vaisto pavartojote ?Po

vartojimo daugiau nei rekomenduojama dienos dozė galite jaustis blogai jūs sau papildomai mieguistas jausti ir diskomfortas gauti nuo galvos svaigimas, galvos skausmas ir pykinimas. Po vartojimo per vieną perdozavimą nėra specialus gydymas gydymas reikalingas.

Ar jūs pamiršote šį vaistą į vartoti? Jei jūs pamiršote išgerti vieną tabletę vartoti ir jūs esate jūs esate todėl dar pabudęs, vartokite šį tada vis tiek į. Vartokite ne dvigubą dozę tam, kad pamirštą dozę kompensuoti atgauti ..

Jei jūs nutraukite su vartojimu šio šio vaisto

Jūs galite visada nutraukti su vartojimu šio šio vaisto. Nėra nėra jokių neigiamų poveikių žinomas kaip de gydymas yra nutrauktas arba anksti yra baigtas. Apie vartojimą melatonino nėra iki šiol jokių atvejų nutraukimo simptomų nuo nutraukimo simptomai žinomas kuris yra sukeltas dėl nutraukimo gydymo gydymas.

Jūs dar kitų klausimų apie vartojimą šio vaisto? Susisieki su šiuo vaistu jūsų gydytojas arba vaistininkas.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir kiekvienas vaistas gali taip pat šis vaistas šalutinį poveikį turėti, nors ne kiekvienas patiria su tuo susijusį gaminti.

Naudojant vartojimas nuo melatoninas yra šie šalutiniai poveikiai ::

- sapnai Nenormalus
- elgesys Nenormalus
- jausmas Nenormalus
- išmatos išmatos
- Astma
- Naktinis šlapinimasis
- Blyškumas
- Kraujavimas iš nosies
- Vėmimas
- Pilvo skausmas
- Vidurių užkietėjimas
- Depresija
- Depresinė (prislėgta) nuotaika
- Deorientacija
- Viduriavimas
- Galvos svaigimas
- Spaudimas elgesys
- Galvos sukimasis
- Galvos sukimasis priklausomas nuo padėties
- Epilepsija
- Žiovulys
- Trūkumas prie emocijos
- Dirglumas (dirglumas)
- Svorio sumažėjimas
- Svorio padidėjimas
- Haliucinacijos
- Širdies plakimas
- Kosulys

- Galvos skausmas
- Odos dirginimas
- Odos bėrimas
- Verkimas
- Hiperaktyvumas
- Niežulys
- Dusulys
- Šaltis jausmas
- Žemas kraujospūdis
- Lėtumas
- Migrena
- Pykinimas
- Sunkumas su rijimu
- Košmarai
- Diskomfortas pilvo srityje
- Akių liga
- Ausis-/nosis-/gerklės problemos
- rūgštis atpylimas
- padidėjęs jautrumas
- pernelyg prakaitavimas
- pernelyg didelis mieguistumas
- skausmas ant krūtinės
- neramumas
- aštrus apibrėžtas apvalus raudonai rudos dėmės ant odos
- lunatizmas
- nemiga
- Prasta miego kokybė
- Greitas širdies ritmas
- Nuotaikos pokyčiai
- Stipriai niežtinčios dėmės arba gumbeliai (prurigo)
- Padidėjimas epilepsijos priepuolių Drebulys
- Pakitusios
- kepenų funkcijos rodikliai kraujyje į kraujas
- Sumažėjusi kūno temperatūra
- Sumažėjęs apetitas
- Sumažėjęs regėjimo aštrumas
- Nuovargis
- Sumišimas
- Dėmėta oda
- Sunkumo jausmas galvoje Galvos

pranešimas apie šalutinius poveikius Ar
jums pasireiškia jaučiate diskomfortą šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.
Tai taikoma taip pat ir galimiems šalutiniams poveikiams kurie nėra šiame lapelyje paminėti .
Jūs galite šalutinį poveikį šalutinis poveikis taip pat tiesiogiai pranešti per Nyderlandų
Nepageidaujamų reakcijų Centras Lareb. Svetainė: www.lareb.nl.

Pranešdami nepageidaujamas reakcijas apie ,galite padėti mums gauti daugiau informacijos apie gauti gauti apie saugumą šio šio vaisto.

5. Kaip laikyti jūs šį vaistą?

Laikyti nepasiekiamoje ir neprieinamoje vaikams vietoje laikyti.

Laikykite žemiau 25°C. Laikykite originalioje pakuotėje apsaugai nuo šviesos . Galiojimo.

Nenaudokite šio

vaisto po nurodytos datos ant pakuotės de galiojimo data. Ji yra rasti ant plastikinio tablečių konteinerio , dėžutės ir ant lizdinių plokštelių po 'EXP'. Ten nurodytas mėnuo ir metai po 'EXP'. vienas metai. De paskutinė diena to mėnesio yra galutinė galiojimo data.

De galiojimo laikas po atidarymo tablečių konteinerio yra 1 mėnuo.

Vartokite šio vaisto ne į jei jūs matote kad tabletės tabletės pakitusios arba pažeistos yra.

Neskalaukite vaistų ne per kriauklę arba tualetą ir išmeskite jų ne į šiukšliadėžę. Klauskite savo vaistininko ką daryti su vaistais turite daryti kurių ne be naudojate. Jie yra tada į vienas atsakingas būdas sunaikinti ir nepatenka ne į aplinką patenka.

6. Turinys pakuotės pakuotė ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame šiame preparate?

Veiklioji medžiaga yra šiame preparate yra melatoninas ..

medžiagos (pagalbinės medžiagos)šiame) in šis vaistas yra: silicifikuota mikrokristalinė celiuliozė, laktozės monohidratas, natrio krakmolo glikolatas A tipo, talkas ir magnio stearatas.

Kaip atrodo Davitamon Melatoninas iš en kiek yra pakuotėje vienoje pakuotėje?

Davitamon Melatoninas 1 mg, tabletės yra baltos iki gelsvai baltos baltos šešiakampės tabletės, su lūžio linija lūžis brūkšnys prie vienas pusė ir vienas užrašas "MELA 1" prie de kita pusė.

Davitamon Melatoninas 3 mg, tabletės yra baltos iki sulaužytos baltos pailgos tabletės, su lūžio linija vienoje pusėje ir užrašu „MELA 3“ kitoje pusėje . Davitamon Melatoninas kitas kraštas.

Davitamon Melatoninas 5 mg, tabletės yra baltos iki sulaužytos baltos apvalios tabletės, su linija lūžimo vienoje pusėje ir užrašas „MELA 5“ kitoje "MELA 5" prie de kita pusė.

Tabletės tiekiamos : kartoninėje:

- su 10, 15, 20 arba 30 tabletėmis lizdinėse plokštelėse arba plastikiniame indelyje lizdinės plokštelės
- ar į vienas plastikas tablečių talpykla su 30 tablečių.

Registruota įrašyta po

Davitamon Melatoninas 1 mg RVG 124675

Davitamon Melatoninas 3 mg RVG 124676

Davitamon Melatoninas 5 mg RVG 124677

Laikytojas iš leidimo dėl pateikimo į rinką ir gamintojas Turėtojas iš leidimo dėl pateikimo į rinką
prekyba Kralingseweg
201
3062 CE Rotterdam 201
3062 CE Rotterdam

Gamintojas
Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG Benzstraße 25
71083 Herrenberg, Vokietija

Kreipkitės dėl visos informacijos susijusios su šiuo vaistu susisieki su vietiniu atstovu iš iš
laikiklis iš leidimo dėl pateikimo į rinką ..

pakuotės lapelis yra dėl paskutinį kartą patvirtintas paskutinis balandžio 2025 m. Kiti informacijos
šaltiniai

Kita informacijos šaltiniai

Daugiau informacijos apie šį vaistą yra prieinama svetainėje Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Vertinimo vaistų tarnybos: www.cbg-meb.nl.