

Prospect: informații pentru utilizator utilizator

Metoclopramid HCl Noridem 5 mg/ml-soluție pentru injecție
clorhidrat de metoclopramid monohidrat

Citiți cu atenție întregul prospect înainte să acest medicament primește administrat pentru că există informații importante în pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. Poate aveți nevoie de el mai târziu din nou nevoie.
- Aveți dumneavoastră întrebări ?Contactați medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală.
- Nu dați acest medicament altora , deoarece este numai pentrudumneavoastră . la dumneavoastră prescris. Este poate dăunător fi pentru alții, chiar dacă au ei aceleași simptome ca dumneavoastră.
- Aveți probleme cu un dintre efectele secundare care sunt în rubrica 4 sunt? Sau aveți o un efect secundar care nu în acest prospect este? Contactați dumneavoastră medic, farmacist sau asistent medical.

Conținutul acestui prospect Ce este Metoclopramide HCl

1. Noridem și pentru ce se utilizează acest medicament ? Cândnu trebuie să
 2. utilizați poți acest medicament nu administrat primi sau trebuie să fiți extra precaut cu fiți?
 3. Cum este acest medicament administrat?
 4. Reacții adverse
 5. Cum păstrați acest medicament ?Conținutul
 6. ambalajului și alte informații . Ce este Metoclopramide HCl.
-
1. Ce este Metoclopramida HCl pentru ce se utilizează acest medicament ? medicament utilizat?

Metoclopramide HCl Noridem este un medicament împotriva greață (anti- emetic).

Acesta conține substanța activă metoclopramidă. Acesta are efect asupra influenței pe un parte a creierului dumneavoastră. Acesta asigură că nu vă simțiți nu greață sau nu trebuie să vărsați.

Acest medicament este utilizat la adulți:

- pentru a asigura că nu vă simțiți rău și nu trebuie să vărsați un operație
- pentru de tratamentul al greață a fi și vărsături. De asemenea, dacă acest lucru provine din cauza unei dureri de cap severe (migrenă).
- pentru a asigurați că nu nu greață devineți și nu trebuie să vărsați din cauza radiațiilor

Acest medicament este la copii și adolescenți (1 până 18 ani) doar utilizat dacă alte tratamente nu funcționează sau nu pot fi utilizate:

- pentru a asigura că copiii și tinerii nu suferă de mai târziu greață sunt și vărsături după chimioterapie
- pentru tratamentul greaței de greață sunt en vărsături după o operație

2. Când puteți acest medicament nu administrat primi sau trebuie să fiți precaut cu el?

Când aveți voie acest medicament nu administrat primi?

- Sunteți alergic la metoclopramidă sau unul dintre celelalte substanțe din acest medicament. Acestea substanțe puteți dumneavoastră găsi în rubrica 6 din acest prospect.
- Ați avut o sângerare, blocaj sau ruptură în dumneavoastră stomac sau intestine.
- Aveți sau aveți posibil o rară tumefiere a glandei suprarenale (feocromocitom). Glandasuprarenală este aproape închis la dumneavoastră rinichi.
- Ați avut vreodată mișcări făcute fără ca să vă doriți în timpul unui tratament cu un o medicament (tardivă diskinezie)
- Aveți epilepsie Aveți
- boala Parkinson Utilizați levodopa sau agonisti
- dopaminergici (vezi dopaminergic agoniști (vezi mai jos „Utilizat dumneavoastră încă alte medicamente?“). Levodopa este un medicament care este utilizat în boala Parkinson. Dumneavoastră
- ați avut vreodată un cantitate anormală de colorant în sângele dumneavoastră (methemoglobinemie) sau deficiență de NADH-citocrom-b5- deficiență avut.

Nu administrați acest medicament la copii mai mici de dan 1 an (vezi mai jos 'Copii și adolescenți până la 18 ani').

Când trebuie să fiți extra precaut cu acest medicament medicament?

Contactați medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală înainte de a utilizați acest medicament dacă ::

- trecut un ritm cardiac anormal ((prelungire intervalului QT) sau alte probleme cardiace a avut ați avut
- probleme cu cantitatea de săruri în sângele dumneavoastră . Cum ar fi potasiu, sodiu. Cum ar fi potasiu, sodiu magneziu. ați avut
- alte altă medicamente utilizat care influență au asupra ritmului cardiac dumneavoastră
- aveți o boală cerebrală aveți
- aveți probleme aveți cu ficatul sau rinichii. Dumneavoastră doza este atunci posibil redusă (vezi rubrica 3).

Dumneavoastră medicul poate dumneavoastră sângele analiza pentru a determina cantitatea colorantului în dumneavoastră sânge a verifica. Este cantitatea colorant în dumneavoastră sânge nu normală (methemoglobinemie)? Atunci trebuie tratamentul imediat și în permanent a fi oprit.

Copii și tineri până la 18 ani

Copii și tineri până la 18 ani pot avea probleme cu probleme cu a sta, a sta jos și a se mișca (tulburări extrapiramidale). Acestmedicament nu trebuie să fie utilizat de copii mai mici de 1 an .

Ei. Ei au o probabilitate mai mare de a face mișcări fără ca ei să dorească asta (vezimai sus : 'Cândnu trebuie să poți acest medicament nu administrat primi?').

Utilizați dumneavoastră alte medicamente ?Utilizați

dumneavoastră pe lângă Metoclopramide HCl Noridem alte medicamente ? medicamente, ați dumneavoastră asta recent făcut sau veți dumneavoastră acest lucru poate în curând face ?

Informați asta atunci medicul dumneavoastră, medic, farmacist sau asistent medical. Unele medicamente pot afecta modul în care funcționează Metoclopramide HCl Noridem .

Metoclopramide HClNoridem poate de asemenea afecta modul au pe modul în care alte medicamente funcționează. Aceste medicamente sunt:

- levodopa sau alte medicamente pentru tratamentul bolii de Parkinson de Parkinson (vezi mai sus 'Când nu trebuie să acest medicament nu administrat primi?')
- medicamente pentru tratamentul crampelor de spasme sau spasme în dumneavoastră stomac (anticolinergice)
- analgezice puternice analgezice derivați de morfină derivați de morfină medicamente care vă liniștesc sau vă fac somnoros (sedative) sedative)
- medicamente pentru de tratamentul al problemelor psihice
- digoxină (medicament pentru de tratamentul al insuficienței cardiace)
- ciclosporină (medicament pentru de tratamentul al unor boli ale sistemului imunitar)
- mivacurium și suxametoniu (relaxante musculare. Aceste medicamente sunt utilizate în cadrul anestezia pentru o operație.)
- fluoxetină și paroxetină (medicamente împotriva depresiei)

La ce trebuie să fiți atenți cu alcoolul?

Nu aveți voie să consumați alcool consum în timpul tratamentului cu acest medicament . Alcoolul poate face ca acest medicament să vă facă și mai calm și somnoros . face.

Sarcină, alăptare

Sunteți însărcinată, credeți că sunteți însărcinată , doriți să rămâneți însărcinată sau alăptați ca alăptați ? Luați legătura cu? Contactați medicul sau farmacistul înainte de utilizați acest medicament utilizați. Acest medicament poate în timpul de sarcinii fi utilizat dacă este necesar . Medicul medic dumneavoastră va decide dacă vi se va prescrie acest medicament sau nu prescrie sau nu.

Acest medicament nu este recomandat pentru la alăptare a da de alăptare. Acest medicament ajunge în laptele matern. Acest poate avea efect asupra dumneavoastră copil.

Capacitatea de a conduce și utilizarea mașinilor de la mașini

U puteți vă somnoros sau amețit simți după utilizarea acestui medicament . Vă puteți de asemenea avea probleme cu contracția mușchilor de la mușchi fără că dumneavoastră doriți , șocante și contorsionate mișcări și tensiune în mușchii dumneavoastră. Din această cauză puteți să aveți o postură de dumneavoastră corpului obține. Aceste simptome pot influența avea asupra modului în care bine puteți vedea . Ele pot de asemenea influența asupra aveți despre cum bine dumneavoastră vehicule puteți conduce și utilaje puteți opera.

Acest medicament conține sodiu

Fiecare ml conține 3,35 mg (0,1455 mmol) sodiu.

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per fiolă, ceea ce înseamnă că este în esență ' fără sodiu' este. Cum

3. se administrează acest medicament ? Acest medicament

Acest medicament este de dumneavoastră administrat de un medic sau asistent medical. Este administrat ca o injecție lentă în o venă (minim minimal 3 minute) of o injecție în un mușchi.

Utilizare la adulți

Pentru tratamentul de greață și vărsături , de asemenea de asemenea prin toată severă durere de cap (migrenă), și pentru a asigura că nu aveți greață devineți și nu trebuie să vărsați din cauza radiațiilor: de recomandată doza pe dată este 10 mg, de până la 3 ori pe zi repetată.

Doza maximă recomandată pe zi este 30 mg sau 0,5 mg/kg greutate corporală greutate corporală.

Despre te asigurați că nu vă simțiți greață și nu trebuie să vărsați după ooperație : doza recomandată este 1 doză de 10 mg.

Utilizare la copii și adolescenți până la 18 ani (toate indicațiile)

Doza recomandată este de 0,1 până la 0,15 mg/kg greutate corporală , de până la 3ori pe pe zi repetat, administrat prin un lent injecție într-o venă .. maximă în 24 de ore este de 0,5 mg/kg greutate corporală este 0,5 mg/kg greutate corporală.

Tabel de dozare

Vârsta	Greutatea corporală	Doză	Număr ori
1-3 ani	10-14 kg	1 mg	Până la 3 ori pe zi
3-5 ani	15-19 kg	2 mg	Total 3 ori pe zi
5-9 ani	20-29 kg	2,5 mg	Total 3 ori pe zi
9-15 an	30-60 kg	5 mg	Până la 3 ori pe zi
15-18 ani	Peste 60 kg	10 mg	Până la 3 ori pe zi

Sunteți tratat pentru greață a fi și vărsături după o operație ? Atunci tratamentulnu trebuie să dureze mai mult de 48 de ore oră durează.

Este dumneavoastră tratat pentru a asigura că dumneavoastră nu aveți probleme mai târziu greață fiți și vărsături după chimioterapie? Atunci poate tratament nu mai mult de 5 zile dura.

Utilizare la vârstnici

Doza trebuie posibil să fie ajustată . Acest lucrudepinde de de de probleme renale, probleme hepatice și sănătatea generală a organismului.

Alte forme farmaceutice sunt posibil mai bune pentru administrare acestei grupuri de pacienți grup de pacienți.

Utilizare la adulți cu probleme renale

Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți probleme cu rinichii dumneavoastră .. dumneavoastră medie medie până grave probleme cu rinichii dumneavoastră?Atunci trebuie doza să fie redusă ..

forme farmaceutice sunt posibil mai bune pentru pentru administrare la acestui grup de pacienți.

Utilizare la adulți cu probleme hepatice

Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți probleme cu ficatul dumneavoastră are. Are dumneavoastră grave probleme cu ficatul ? Atunci trebuie doza dumneavoastră să fie redusă.

Alte forme farmaceutice sunt posibile mai bine pentru administrare la acestui grup de pacienți.

Utilizare la copii mai mici de 1 an

Acest medicament nu trebuie să fie utilizat la copii mai tineri de 1 an (vezi rubrica 2).

Ați primit prea mult din acest medicament administrat primit?

Contactați imediat contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul. Puteți avea disconfort din cauza problemelor cu statul în picioare ,șezutul și mișcarea (tulburăriextrapiramidale),), somnoros sunt, probleme cu dumneavoastră conștiență, confuz sunt, lucruri văd, simt sau aud care nu sunt (halucinații) și probleme cu inima dumneavoastră. Medicul dumneavoastră poate prescrie un tratament pentru aceste simptome dacă este necesar .

Ați uitat acest medicament să utilizați?

Nu luați niciun dublu doză pentru a compensa o doză uitată să recuperați.

Aveți u încă alte întrebări despre utilizarea acestui medicament ? Contactați medicul dumneavoastră, asistenta medicală sau farmacistul ..

4. efecte secundare Ca orice

medicament medicament poate de asemenea acest medicament efecte secundare avea. Nu toată lumea primește cu acestea de a face.

Aveți probleme cu unul dintre următoarele simptome în timpul utilizării medicamentului acestui acest medicament? Opriti atunci tratamentul. Luați imediat legătura cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistentul medical asistent medical:

- faceți fără fără că tu că dorește (adesea de la cap sau gât). Acest poate la copii sau adolescenți apărea. Mai ales la utilizarea de doze mari doze. U primiți de obicei la începutul tratamentului disconfort aceste simptome. U puteți aici de asemenea după 1 administrare deja disconfort aveți. Aceste mișcări se vor opri cu un tratament adecvat.
- febră mare, tensiune arterială mare , crize de epilepsie(), transpirație sau mult producție de salivă. Acestea pot fi simptome ale sindromului neuroleptic malign ..
- sau erupție cutanată erupție cutanată, umflare de dumneavoastră față, buze sau gât sau probleme cu respirația. Acestea pot fi simptome ale unei reacții alergice . Această poate poate foarte sunt.

Foarte des (apar la mai mult de 1 din 10 utilizatori)somnolent

- sunt Des (

apar la mai puțin de 1 din 10 mai puțin de 1 din 10 utilizatori)

- depresie
- mișcări face fără că dumneavoastră aceasta doriți. Cum ar fi ticuri, tremur ,mișcări rotative sau contracții ale mușchilor ((rigid a fi, rigid a fi)
- simptome care seamănă cu cele ale bolii Parkinson (rigid a fi, tremur)
- neliniștit a fi
- scădere a tensiunii arteriale (în special la administrare prin o venă)
- diaree

- se simțiți slăbit uneori (

aparla mai puțin de 1 din 100 utilizatori mai puțin de 1 din 100 mai mult)

- mai mult prolactină în dumneavoastră sânge. Prolactina este un hormon. Acest poate provoca producerea de lapte la bărbați și la femei care nu alăptează ..
- regulat menstruație au lucruri
- văd, simt sau aud care nu sunt (nu sunthalucinații)
- mai puțin conștiență
- lentă puls (în special la administrare prin o venă)
- alergie
- probleme cu vederea și amețea de dumneavoastră glob ocular fără că dumneavoastră doriți Rareori

(aparla mai puțin de 1 din 1.000 utilizatori mai puțin de 1 din 1.000 confuzsunt

- convulsii de
- convulsii de la epilepsie (convulsii). În special la pacienți cu epilepsie.

Necunoscut (nu poate fi determinat cu datele disponibile nu poate fi determinat)

- anormal cantitate colorant în sângele dumneavoastră. Acest lucru poate provoca la de decolorarea a pielii dumneavoastră.
- umflarea sânilor sâni la bărbați (ginecomastie)
- spasme musculare după utilizare îndelungată. Mai ales la pacienți vârstnici.
- febră mare, mare tensiune arterială, crize de epilepsie (convulsii), transpirație sau producție de salivă . Acestea pot fi simptome ale unei de la unul boală care neuroleptic malign sindrom se numește.
- schimbări în ritmul cardiac. Acestea puteți să vedeți pe electrocardiograma dumneavoastră.
- stop cardiac (în special la administrare prin injecție)
- șoc (scădere severă a tensiunii arteriale. În special la administrare prin injecție)
- leșin (în special la administrare prin o venă)
- reacție alergică care poate fi gravă (în special la administrare prin un venă)
- întreg mare tensiune arterială
- gânduri despre sinucidere

Aveți simptome de efecte secundare? Contactați medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală. Acest lucru se aplică de asemenea pentru posibile efecte secundare care nu în acest prospect sunt.

Raportarea efectelor adverse Efecte secundare

Aveți probleme cu efecte secundare, contactați dumneavoastră medic, farmacist sau asistent medical. Acest lucru se aplică de asemenea pentru efecte secundare care nu în acest prospect sunt menționate. Puteți raporta efectele secundare de asemenea raporta prin Olanda Efecte secundare Centrul Lareb, site web: www.lareb.nl. Raportând efectele secundare să raportați, ajutați ne să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament acest medicament.

5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?

A se păstra departe de vederea și îndemâna copiilor . Păstrați.

În pungă și plic în de cutie păstrați pentru protecție împotriva luminii.

Pentru acest medicament nu există nicio instrucțiune specială de păstrare în ceea ce privește temperatura.

După prima deschidere:

În termen de 2 luni utilizați dacă fiolele fără plicul sunt păstrate . După.

/ diluare/diluare: De chimică și fizică stabilitate în timpul utilizării a amestecurilor cu clorură de sodiu 0,9%, dextroză 5%, Ringer lactat și 4% dextroză în 0,18% clorură de sodiu sunt stabile timp de 48 oră la 15-25oC sub lumină artificială și timp de 48 ore la 5(±3)oC la o concentrație de Metoclopramide HCl Noridem 0,1 mg/ml.

Din microbiologic punct de vedere trebuie al medicamentul imediat după deschidere să fie utilizat. Cu excepția dacă nu există posibilitate de contaminare microbiană contaminare de către metodă care aici este utilizată. Dacă nu imediat este utilizat, sunt condițiile de păstrare și condițiile în timpul utilizării utilizării de responsabilitate a utilizatorului.

Utilizați acest medicament nu mai după data de expirare data de expirareO găsiți pe pachet și pe cutie cutie na EXP. Acolo este o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare.

Nu aruncați medicamentele în prin chiuvetă sau toaletă și aruncați le nu în coșul de gunoi. Întrebați farmacistul dumneavoastră ce să faceți cu medicamentele care nu le mai doriți mai mult utilizat. Dacă dumneavoastră medicamente la modul corect mod eliminați sunt ele la modul corect mod distruse și ajung ele nu în mediu ajung.

6. Conținut al ambalajului și alte informații Ce substanțe sunt în acest medicament?

- Substanța activă din acest medicament este este clorhidrat de metoclopramid monohidrat.

Fiecare ml de soluția conține 5,27 clorhidrat de metoclopramid monohidrat . Acesta esteechivalent cu 5 mg clorhidrat de metoclopramid anhidru . Cele.

- substanțe din substanțe în acest medicament sunt clorură de sodiu, hidroxid de sodiu și/sau acid clorhidric și apă pentru injecții.

Cum arată Metoclopramid HCl Noridem ? și ce conține un ambalaj? Clorhidrat de metoclopramid 5 mg / ml soluție pentru injecție este o clară, incoloră soluție pentru injecție.

Ampule din polipropilenă cu acolo 2 ml soluție. Acestea sunt ambalate în cutii de carton de 5, 10 (2 x 5), 20 (4 x 5), 50 (10 x 5) sau 60 (12 x 5) fiolă.

Fiecare 5 fiole sunt ambalate în un protector plic.

Este posibil că nu toate dimensiunile de ambalaj în comerț sunt disponibile.

Deținător al autorizației pentru punerea pe piață aduce en producător

Deținătorul autorizației de punere pe piață:

Noridem Enterprises Limited. Evagorou & Makariou,
Mitsi Building 3, Office 115,

Nicosia 1065, Cipru

Producător:

DEMO S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICĂ,

21st km Drumul Național Atena – Lamia,

145 68 Krioneri, Attiki, Grecia

T: +30 210 8161802, F: +30 210816158

În registru înregistrat sub: RVG 133746

Acest medicament este înregistrat în statele membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri ::

Cipru	PRIBEKINET 5 mg mL Soluție pentru injecție
Cehia	Metoclopramid Noridem
Germania	Clorhidrat de metoclopramid Noridem 5 mg/ml Soluție injectabilă
Grecia	PRIBEKINET 5 mg mL Injectabil Soluție
Franța	METOCLOPRAMIDE NORIDEM 10 mg/2 mL, soluție injectabilă
Ungaria	Metoclopramid-hidroclorid Noridem 5 mg/ml soluție injecție
Polonia	Metoclopramid hidroclorid Noridem
Slovacia	Metoclopramid Noridem 5 mg/ml injecție soluție
Spania	Metoclopramidă Noridem 5 mg/ml soluție injectabilă EFG
România	Metoclopramid Noridem 5 mg/ml soluție injectabilă
Italia	Metoclopramid clorhidrat Noridem 5 mg/ml Soluție injectabilă
Austria	Metoclopramid clorhidrat Noridem 5 mg/ml Soluție injectabilă
Suedia	Metoclopramid Noridem
Danemarca	Metoclopramid Noridem
Norvegia	Metoclopramid Noridem
Finlanda	Metoclopramid Noridem
Irlanda	Clorhidrat de metoclopramid 5 mg / ml soluție injectabilă
Olanda	Metoclopramid HCl Noridem 5 mg/ml soluție pentru injecție
Portugalia	Metoclopramid Noridem

Acest prospect este pentru ultima dată aprobat în decembrie 2024.

<-----
----->

Următoarele informații informație este doar destinat pentru profesioniști în sănătate:

Preparare și utilizare

Cazuri de incompatibilitate

În lipsa de cercetare privind incompatibilități, poate acest medicament nu cu alte medicamente amestecat fi, cu excepția următoarelor soluții soluții:

- 0,9% soluție ,Dextroză 5 %,
- Dextroză 5 %,
- Soluție Ringer lactat,
- 4% dextroză în 0,18% clorură de sodiu

în o concentrație finală de Metoclopramid HCl Noridem 0,1 mg/ml.

Dozare și mod de administrare

Toate indicațiile (adulți pacienți) Dozare: vezi rubrica 3 din acest prospect.

Durata tratamentului injectabil trebuie să fie cât mai scurtă posibil a fi păstrat și există trebuie cât mai repede posibil trecut la un tratament oral sau rectal tratament.

Frecvența de administrare:

Între două administrări trebuie un interval minim de 6 ore să fie respectat, chiar în cazul de crize sau respingere de doza.

Speciale grupuri de pacienți

Vârstnici

La pacienții vârstnici trebuie o reducere a dozei să fie luată în considerare, pe bazafuncției hepatice și renale funcție renală en generală slăbiciune.

Disfuncție renală

La pacienții cu o boală renală în stadiul final (clearance-ul creatininei < 15 ml/min) trebuie să zilnică doza fie a fi redusă cu 75%.

La pacienți cu o moderată până la severă insuficiență renală (clearance-ul creatininei 15-60 ml/min) trebuie doza să fie redusă a fi redusă cu 50%.

Tulburare a funcției hepatice

La pacienți cu o severă tulburare a funcției hepatice trebuie doza să fie redusă cu 50%. Alte forme farmaceutice sunt posibil mai potrivite pentru pentru de tratamentul al aceste grupuri de pacienți.

Pediatrici pacienți

Metoclopramida este contraindicată la copii mai mici de 1 an.

Îndepărtare

Toate neutilizat medicament sau material rezidual trebuie să fie distrus conform reglementărilor locale.

Supradozaj

Simptome

Tulburări extrapiramidale, somnolență, scăzut conștientă, confuzie, halucinații și cardiorespirator stop pot apărea.

Tratament

În caz de simptome extrapiramidale, fie nu legate la supradozaj, este tratamentul doar simptomatic (benzodiazepine la copii șiF sau anticolinergice antiparkinsoniene la adulți).

Un tratament simptomatic en un continue monitorizarea a cardiovasculare și respiratorii funcțiilor trebuie să fie efectuate în funcție de starea clinică.