

Prospecto: información para el paciente

Metoprololsuccinato Sandoz® retard 25, comprimidos con liberación controlada 23,75 mg

Metoprololsuccinato Sandoz® retard 50, comprimidos con liberación controlada 47,5 mg

Metoprololsuccinato Sandoz® retard 100, comprimidos con liberación controlada 95 mg

Metoprololsuccinato Sandoz® retard 200, comprimidos con liberación controlada 190mg

metoprololsuccinato

Lea cuidadosamente todo el prospecto antes de usted este medicamento va usar porque hay contiene importante información en para usted.

- Guarde este prospecto. Quizás necesite usted más tarde nuevamente necesario.
- Tiene usted aún preguntas? Entonces póngase en contacto con su médico o farmacéutico.
- No dé este medicamento a otras personas , porque essolo para usted a usted prescrito. El puede ser perjudicial para otros ,incluso si tienen ellos los mismos síntomas que usted. ¿Tiene
- usted molestias de tiene molestias de uno de los efectos secundarios que en sección 4 están? O tiene usted uno efecto secundario que no en este prospecto está? Entonces póngase en contacto con su médico de farmacéutico.

Contenido de este prospecto:

1. ¿Qué es Metoprololsuccinato Sandoz retard y para qué se utiliza este medicamento?
2. ¿Cuándo no debe este medicamento no usar o debe tener especial cuidado con ser?
3. ¿Cómo usa usted este medicamento?
4. Posibles efectos secundarios
5. ¿Cómo almacena usted este medicamento?
6. Contenido del empaque y otra información

1. ¿Qué es Metoprololsuccinato Sandoz retard y para qué se este medicamento utiliza?

Metoprololsuccinato Sandoz retard pertenece al grupo medicamentos que betabloqueantes son llamados. Ellos protegen el corazón contra una demasiada gran actividad.

Adultos

Para el tratamiento de una alta presión arterial (hipertensión), en un opresivo doloroso sensación en el pecho (angina de pecho) o arritmias, después de un infarto de miocardio para un nuevo infarto de miocardio prevenir ,en un funcionamiento demasiado rápido de la glándula tiroides glándula tiroides hipertiroidismohipertiroidismo) en ter prevención de ataques de migraña.

Niños y adolescentes de 6-18 años:

Para el tratamiento de una alta presión arterial (hipertensión).

2. Cuándo puede este medicamento no usar o debe tener cuidado con ser?

Cuándo puede este medicamento no usar?

- Usted es alérgico a uno de los componentes en este medicamento. Estos componentes puede usted encontrar en sección 6 de este prospecto.
- Usted es hipersensible a otros medicamentos antihipertensivos medicamentos de el mismo tipo que Metoprololsuccinaat Sandoz retard, es decir los beta-bloqueantes.
- Usted tiene trastornos en la conducción del corazón (bloqueo AV de 2º- y 3er grado).Usted
- tiene insuficiencia cardíaca aguda o insuficiencia cardíaca que no está bajo control , con líquido en los pulmones (edema pulmonar) o una presión arterial baja ( hipotensión).En
- un 'shock' causado por insuficiente función de bombeo del corazón. Usted
- U sufre de graves trastornos circulatorios.
- En un grave ritmo cardíaco lento ( bradicardia).Usted
- es continuamente o con intervalos tratado con con ciertos medicamentos que el fuerza de bombeo del corazón afectan (a saber beta-agonistas).
- Usted tiene un cierto trastorno en el ritmo cardíaco (Síndrome del nodo sinusal) en u tiene para esto ningún marcapasos recibido.
- U tiene un infarto de miocardio (infarto de miocardio) en combinación con una frecuencia cardíaca lenta, un baja presión arterial o está descompensado.
- Usted recibe el medicamento verapamilo por inyección en una vena administrado, porque por eso de presión arterial puede disminuir, trastornos de la conducción cardíaca pueden ocurrir y insuficiencia cardíaca puede desarrollarse.

Cuándo debe tener especial cuidado ser con esto medicamento?

Póngase en contacto con su médico o farmacéutico antes de que este medicamento use. Informe siempre al médico(s) que le tratan sepan sobre qué problemas o enfermedades usted aún más bajo tratamiento está. Metoprololsuccinato Sandoz retard debe con precaución ser administrado.

Tenga especial cuidado con Metoprololsuccinato Sandoz retard:

- si desea suspender. Usted puede de hecho no suspender repentinamente ,porque esto insuficiencia cardíaca crónica (disminución de la fuerza de bombeo del corazón) puede empeorar y el riesgo de un ataque al corazón (infarto de miocardio) y muerte repentina puede aumentar. Consulte para consejos de reducción de sección 'Si usted deja de usar este medicamento ' ;si
- usted otros medicamentos usa para apoyo del funcionamiento del corazón. Hay del corazón. Hay puede es decir un empeoramiento de la función cardíaca ocurrir;
- si usted sufre de ataques ocurren dificultad para respirar por calambre de los músculos y hinchazón de la mucosa de las vías respiratorias a menudo acompañado de tos y la expectoración de moco ( asma( bronquial)))) en als u para esto tratado se con p. ej.. terbutalina. Cuando el síntomas empeoran. Puede ser necesario que la dosis ajustar te passen;
- si usted diabetes (diabetes mellitus) tiene. Metoprolol puede los síntomas de un nivel bajo de azúcar en su sangre enmascarar. De probabilidad de esto es sin embargo baja.;
- si su corazón insuficiente fuerza de bombeo tiene y usted no para tratado es. En ese caso
- puede Metoprololsuccinaat Sandoz retard no usar;

- si tiene problemas con una creciente disminución del ritmo cardíaco (bradicardia). El puede es decir necesario ser el dosis a que ajustar o gradualmente que detener;
- si tiene molestias tiene de frío dedos enof pies (también sin uso de medicamentos, síndrome de Raynaud) o claudicación intermitente (claudicación intermitente). Metoprololsuccinato Sandoz retard puede de síntomas empeoran. Het is importante que su médico esto sepa;
- si usted necesita ser operado debe . Het is importante que su su médico sepa que usted metoprolol usa;
- si usted simultáneamente tratado es con digitalis (medicamento que la fuerza de bombeo del corazón mejora). Puede puede necesario son el dosis a que ajustar o gradualmente que detener;
- si usted un grave deterioro funcionamiento del hígado tiene. De dosificación debe si es necesario ser reducida;
- en un tumor de la médula suprarrenal que puede ir acompañado de repentino fuerte aumento de presión arterial, intenso dolor de cabeza, sudoración y frecuencia cardíaca acelerada ( feocromocitoma).si
- tiene síntomas de una grave hipersensibilidad hipersensibilidad ciertas cierta sustancias. El shock (fuerte descenso de la presión arterial, palidez, inquietud, pulso rápido débil, piel húmeda, disminución de la conciencia) por uno repentina fuerte vasodilatación ten debido a esto (anafiláctico shock) puede de hecho ser más grave ser.

Consulte su médico si uno de anteriores advertencias para usted de aplicación es, o que en el pasado ha sido.

No hay ninguna experiencia con el tratamiento de insuficiencia cardíaca en pacientes:

- mayor de 80 años;
- con una restrictiva y agrandado miocardio;
- con una determinada valvulopatía;
- con uno fuerte reducida hígado- y función renal;
- que menos de 3 meses atrás un ataque al corazón han tenido;
- con una congénita anomalía cardíaca.

Usa usted otros medicamentos ?Usa

usted además de Metoprololsuccinaat Sandoz retard otros medicamentos , tieneusted eso u eso corto atrás hecho o va usted esto quizás pronto hacer? Diga eso eso su médico o farmacéutico. Esto aplica también para medicamentos que usted sin receta puede obtener.

Use una tarjeta de medicamentos. Usted anota en ella qué medicamentos usted usa y en cuál dosificación.

Deje también a otros saber cuáles medicamentos usted usa!

Metoprololsuccinato Sandoz retard puede el efecto de algunos medicamentos influir y viceversa. Esto se aplica p. ej. a:

- antagonistas del calcio, como verapamil y diltiazem. Estos medicamentos pueden de hecho la contracción del corazón (contractilidad del corazón) y el conducción del corazón (AV- conducción) negativamente afectar (ver también la sección 'Cuándo no debe esto medicamento no

- usar’);
- rifampicina, un medicamento contra algunas infecciones, porque reduce la cantidad de metoprolol en la sangre reduce;
- medicamentos contra alergia (antihistamínicos), porque aumentan la cantidad de metoprolol en la sangre aumentan;
- medicamentos contra (grave) depresión (depresión) of medicamentos contra grave enfermedad mental (antipsicóticos), porque aumentan la cantidad de metoprolol en la sangre aumentan;
- cierto grupo analgésicos medicamentos con también un antiinflamatorio y antipirético efecto (inhibidores de COX-2), porque aumentan la cantidad de metoprolol en la sangre aumentar;
- bloqueadores de ganglios (medicamentos para trastornos nerviosos), MAO-inhibidores (medicamentos contra depresión) y otros betabloqueantes (también en gotas para los ojos), porque se requiere control adicional ;
- clonidina, porque en combinación con un betabloqueante los síntomas de alta presión arterial en mayor grado puede hacer reaparecer;
- medicamentos contra arritmias cardíacas (anti-arrítmico), como amiodarona y quinidina. Estos medicamentos pueden el tiempo de conducción del corazón (conducción AV)prolongar y tienen tener uno negativa influencia en la fuerza de contracción del corazón;
- anestésicos (ver también la sección ‘Cuándo debe tener cuidado con este esto medicamento?’);
- indometacina (determinado analgésico medicamento con también un antiinflamatorio y antipirético efecto), porque el el efecto antihipertensivo efecto de metoprolol puede reducir;
- insulina y medicamentos orales contra la diabetes, porque el efecto hipoglucemiante de estos medicamentos por betabloqueantes puede ser fortalecido. En ese caso se debe ajustar la dosis de estos medicamentos debe serajustada
- ;lidocaína , un medicamento para, porque metoprolol la excreción de lidocaína del cuerpo puede reducir ;digitalis,
- un medicamento que la fuerza de bombeo del corazón aumenta aumenta, porque simultáneo uso con este medicamento un latido lento puede causar;

¿En qué debe usted prestar atención con alcohol?

El alcohol aumenta de cantidad metoprolol en su sangre.

Embarazo, lactancia y fertilidad

¿Está embarazada, piensa usted embarazada estar , quiere, quiere usted embarazada quedar o da usted lactancia? Entonces contacte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento ..

Embarazo:

médico médico puede Metoprolol succinato Sandoz retard prescribir durante el embarazo si el beneficios del uso para usted superan los riesgos para el el no nacido niño. Si usted Metoprololsuccinato Sandoz retard ha usado hasta el parto su recién nacido niño posiblemente los primeros dos días después del n/a de nacimiento extra ser controlado.

Lactancia materna:

Metoprololsuccinato Sandoz retard debe no utilizarse para ser en el período que lactancia materna se dado, a menos que el uso sea necesario considerado . Metoprololes excretado a través de la leche materna . Endosis normales la cantidad de metoprolol en la leche materna leche materna pequeño. Si su médico le Metoprololsuccinaat Sandoz retard prescribe, entonces será su hijo/a adicionalmente será controlado.

Fertilidad:

Datos sobre la fertilidad indican no en particularidades.

Capacidad para conducir y el uso de máquinas

Hasta donde se sabe hay no ningún efecto adverso en la capacidad para conducir y el capacidad para manejar de operar. En caso de aparición de efectos secundarios como fatiga o mareos debe tener en cuenta que consideración con que esto el capacidad de reacción desfavorablemente puede afectar.

Metoprolol succinato Sandoz retard contiene glucosa, sacarosa y lactosa

Si su médico le ha informado que usted ciertos azúcares no tolera, póngase en contacto con su médico antes de que este medicamento tome.

### 3. ¿Cómo usa usted este medicamento?

Use este medicamento siempre exactamente como su médico o farmacéutico le ha dicho .. dudas sobre el uso correcto uso? Entonces, póngase en contacto con médico o artes de farmacéutico.

El aconsejado dosis es:

Presión arterial alta ( hipertensión):Dosis inicial

Dosis inicial: al día 1 tableta Metoprololsuccinaat Sandoz retard 50. Eventualmente a té aumentar a 100-200 mg una vez al día.

Cuando usted sufre de una función reducida del hígado, puede el médico decidir la dosis reducir disminuir (por ejemplo hasta 1 tableta Metoprololsuccinaat Sandoz retard 25).

Opresivo doloroso sensación en el pecho (angina de pecho):

100-200 mg una vez al día. Máximo 2 tabletas Metoprololsuccinaat Sandoz retard 200 por día.

Arritmias cardíacas:

100-200 mg una vez al día. Así si es necesario puede el médico decidir esta dosis aumentar ..

rápida acción funcionamiento de tiroides (hipertiroidismo):

100-200 mg una vez al día. Si es necesario puede el médico decidir esta dosis a aumentar.

Para prevenir de ataques de migraña:

100-200 mg una vez al día.

Infarto de miocardio:

Después de que primero haya comenzado con metoprolol comprimidos comunes, la dosis de mantenimiento de la dosis de mantenimiento: una vez al día 1 tableta Metoprololsuccinato Sandoz retard 200.

Si nota que Metoprololsuccinato Sandoz retard demasiado fuerte o justamente demasiado poco funciona, consulte entonces su médico o farmacéutico.

Los comprimidos con liberación controlada no deben ser triturados o masticados, sino deben tomarse enteros o partidos por la mitad comprimidos con agua ser tomado.

Uso en niños y adolescentes:

Alta presión arterial: En niños de 6 años y mayores la dosis dependiendo del peso corporal. Su médico calcula la dosis correcta para su hijo.

La dosis inicial habitual es 0,5 mg por kilogramo de peso corporal una vez al día, pero puede no superior ser a 50 mg. Se elige optado por la disponible fuerza del comprimido que más cerca de la dosis calculada está .. Su médico puede la dosis aumentar hasta 2,0 mg por kilogramo peso corporal, dependiendo del efecto sobre la presión arterial. Dosis superiores a 200 mg una vez al día no han sido investigadas en niños y adolescentes.

Uso de Metoprololsuccinato Sandoz retard no se recomienda en niños menores de 6 años.

Duración del tratamiento

Succinato de metoprolol Sandoz retard se generalmente prolongado usado ser.

¿Ha usted demasiado de este medicamento usado ? Cuando

usted demasiado té mucho de Metoprololsuccinato Sandoz retard ha usado, contacte inmediatamente con su médico o farmacéutico. Los síntomas pueden ser: presión arterial muy baja presión arterial (hipotensión), retraso frecuencia cardíaca (bradicardia), trastorno en la conducción del corazón (AV- bloqueo), insuficiencia cardíaca (insuficiente fuerza de bombeo del corazón) (descompensación cordis), shock causado por insuficiente función de bombeo del corazón, paro cardíaco, dificultad para respirar por espasmo de los músculos de las vías respiratorias (broncoespasmo), trastornos de la conciencia (o incluso coma), náuseas, vómitos y azul decoloración de los labios, lengua, piel y mucosas por una deficiencia de oxígeno en el sangre (cianosis).

Simultáneo uso de alcohol, medicamentos en alta presión arterial, quinidina (medicamento en palpitaciones) o barbitúricos (ciertos medicamentos en epilepsia) empeora los síntomas.

¿Olvidó tomar este medicamento en tomar ? No

tome doble doble dosis para una dosis olvidada para recuperar . Si usted olvidó tomar una dosis para tomar , puede usted hacerlo usted esto aún así hacer, a menos que el casi tiempo es para su próxima dosis. Siga en ese caso el normal esquema de dosificación.

Si usted deja de usar este medicamento El

tratamiento con Metoprololsuccinato Sandoz retard no debe generalmente interrumpirse repentinamente , porque suspendido, porque este crónico insuficiencia cardíaca (disminuida

capacidad de bombeo del corazón) puede empeorar y el riesgo de un ataque al corazón (infarto de miocardio) y repentina muerte puede aumentar. El médico deberá como regla la dosis gradualmente reducir durante un período de al menos 2 semanas.

¿Tiene usted aún otras preguntas sobre el uso de este medicamento? Comuníquese con su médico o farmacéutico.

#### 4. Posibles efectos secundarios

Como cualquier medicamento puede también este medicamento efectos secundarios tener. No todo el mundo recibe con eso que ver.

Los siguientes efectos secundarios son muy frecuentes, frecuentes, a veces, raramente o muy raramente reportado:

Muy frecuente (ocurre en más de 1 de cada 10 usuarios )Sistema nervioso  
Sistema nervioso: fatiga.

Frecuente (ocurre en menos de 1 de cada 10 usuarios )Corazón:  
latido lento ( bradicardia),palpitaciones Vasos sanguíneos  
:: por puerta por ejemplo rápido levantarse de una sentada o acostada posición a veces  
acompañado de mareo mareo hipotensión ortostática ),manos frías manos en pies, palpitaciones  
(palpitaciones)

Sistema nervioso: mareo, dolor de cabeza Sistema respiratorio: dificultad para respirar al  
esfuerzo

Tracto gastrointestinal: náuseas, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento

A veces (ocurren en menos de 1 de cada 100 usuarios )Corazón:  
empeoramiento de síntomas de insuficiencia cardíaca ( (insuficiente fuerza de bombeo del  
corazón), cierta trastorno en la conducción del corazón, que lleva a arritmias (bloqueo cardíaco),  
acumulación de líquido (edema), dolor en el región del corazón; un 'shock' causado por  
insuficiente función de bombeo del corazón (shock cardiogénico) en pacientes con infarto  
agudo de miocardio( infartoagudo de miocardio)

Sistema nervioso: percibir de hormigueos, picazón o cosquilleo sin que haya razón para ello  
(parestesia)

Músculos: calambres musculares Tracto gastrointestinal: vómitos General: aumento de peso  
Psique: (gravedepresión depresión depresión disminución de la alerta somnolencia o insomnio  
somnolencia de insomnio, pesadillas

Sistema respiratorio: Dificultad para respirar por espasmo de los músculos de las vías  
respiratorias (broncoespasmo), también en pacientes que no tienen obstrucciones de vías  
respiratorias Piel: erupción cutánea, aumento de producción de sudor

Raramente (ocurren en menos de 1 de cada 1.000 usuarios ) Corazón:trastornos de conducción  
trastornos de conducción, trastornos en el ritmo cardíaco (arritmias) Tracto gastrointestinal:  
boca seca

Hígado: trastornos de la función hepática Psique: nerviosismo, ansiedad

Órganos genitales: impotencia, menos deseo de sexo

Nariz: inflamación de la mucosa nasal caracterizada por una nariz tapada ,estornudos y secreción (rinitis) Ojos: trastornos al ver , visión, secos y/o irritados ojos, inflamación de la conjuntiva (conjuntivitis)  
Piel: pérdida de cabello

Muy raramente (ocurre en menos de 1 de cada 10,000 menos de 1 de cada 10.000 usuarios)  
Piel: necrosis de tejido en pacientes con graves trastornos circulatorios, hipersensibilidad a la luz, empeoramiento de recurrente enfermedad de la piel acompañado en curso con descamación, seca erupción cutánea (psoriasis)  
Tracto gastrointestinal: alteraciones del gusto  
Sangre: anomalía sanguínea (deficiencia de plaquetas) acompañado en curso con azules moretones y tendencia a sangrar (trombocitopenia)  
Hígado: inflamación del hígado (hepatitis) acompañado en curso con ictericia (amarilla decoloración de la piel o ojos)  
Articulaciones: dolor articular (artralgia)  
Psique: pérdida de memoria, confusión, percepciones de cosas que no son (alucinaciones), extrañamiento de sí mismo o de la propia sensación (despersonalización)  
Oídos: tinnitus (tinnitus) Órganos genitales: trastornos de la potencia

El informe de efectos secundarios

Tiene molestias de efectos secundarios, póngase en contacto con su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a efectos secundarios que no están en este prospecto indicados. U puede efectos secundarios también informar a través de Neerlandés Efectos secundarios informar efectos secundarios de informar, ayuda a nosotros a más información de obtener sobre la seguridad de este medicamento.

Nunca por sí mismo la dosis reducir o el tratamiento (temporalmente) interrumpir! Ver 'Si usted deja de tomar este este medicamento'.

## 5. Cómo almacena usted este medicamento?

Conservar por debajo de 25°C

Fuera de la vista y alcance de niños mantener.

Después de abrir del frasco son las tabletas aún 6 meses viable.

No use este medicamento no más después el fecha de caducidad límite. La encuentra en el empaque después de "EXP". Allí indica un mes y un año. El último día de ese mes es la fecha de caducidad fecha de caducidad.

medicamentos no por el fregadero o el inodoro y tire ellos no en la basura .. Pregunta a su farmacéutico qué debe hacer con medicamentos que hacer que usted no más usa. Si usted medicamentos de la manera correcta desecha se ellos de una correcta manera destruido y llegan no en el medio ambiente terminan.

## 6. Contenido del empaque y otra información Qué sustancias contiene hay en este medicamento?

- El activo ingrediente en este medicamento es succinate de metoprolol.  
Succinate de metoprolol Sandoz retard 25: una tableta contiene 23,75 mg succinate de metoprolol, equivalente con 25 mg tartrato de metoprolol.  
succinato de metoprolol Sandoz retard 50: una tableta contiene 47,5 mg succinato de metoprolol, equivalente con 50 mg tartrato de metoprolol.  
succinato de metoprolol Sandoz retard 100: una tableta contiene 95 mg succinato de metoprolol, equivalente con 100 mg tartrato de metoprolol.  
Succinato de metoprolol Sandoz retard 200: una tableta contiene 190 mg succinato de metoprolol, equivalente con 200 mg tartrato de metoprolol.
- El otros sustancias en este medicamento son sacarosa, almidón de maíz, glucosa (líquida), poliacrilato, talco (E553B), estearato de magnesio (E470b), celulosa microcristalina (E460), crospovidona, coloidal óxido de silicio (E551), lactosa, hipromelosa (E464), dióxido de titanio (E171) y macrogol 4000.
- Metoprolol succinato Sandoz retard 100 contiene también óxido de hierro amarillo (E172).

Cómo se ve Metoprolol succinato Sandoz retard por fuera en cuánto hay en un empaque?

Metoprololsuccinato Sandoz retard 25, 50 y 200:

blanca, alargada tableta con ranura en ambos lados. La tableta con ranura puede en dos iguales dosis ser dividido.

Metoprololsuccinato Sandoz retard 100:

amarillo claro, alargada tableta con ranura en ambos lados.

La tableta con ranura puede en dos iguales dosis ser dividido.

Los comprimidos están empaquetados en polipropileno/aluminio o PVC-aclar/aluminio blíster en un cartón caja o en frascos de HDPE.

Metoprolol succinato Sandoz retard 25, 50, 100 y 200: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1 y 90 comprimidos con liberación controlada en blísteres y 30, 100, 250 y 500 tabletas con liberación controlada en frascos.

No todos los tamaños de envase se comercializan . Titular.

autorización para la comercialización del comercio traer y fabricante Titular de la autorización:

Sandoz B.V., Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, Países Bajos

Fabricantes:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben Alemania

Sandoz B.V.

Hospitaaldreef 29

1315 RC Almere

Países Bajos

Lek Pharmaceuticals d.d.  
Verovškova 57,  
1526 Ljubljana  
Eslovenia

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D  
9220 Lendava  
Eslovenia

Este medicamento está inscrito en el registro bajo número número:  
RVG 32376: Metoprololsuccinato Sandoz retard 25, comprimidos con liberación controlada 23,75 mg  
RVG 32377: Metoprololsuccinato Sandoz retard 50, comprimidos con liberación controlada 47,5 mg  
RVG 32378: Metoprololsuccinato Sandoz retard 100, comprimidos con regulada liberación 95 mg  
RVG 32380: Metoprololsuccinato Sandoz retard 200, comprimidos con regulada liberación 190 mg

Este prospecto fue por la última aprobado en enero 2025