

Pakendi infoleht: teave jaoks patsiendi patsient

Metoproloolsuktsinaat Sandoz® retard 25, tabletid koos reguleeritud vabastamine 23,75 mg

Metoproloolsuktsinaat Sandoz® retard 50, tabletid koos reguleeritud vabastamine 47,5 mg

Metoproloolsuktsinaat Sandoz® retard 100, tabletid koos reguleeritud vabanemisega 95 mg

Metoproloolsuktsinaat Sandoz® retard 200, tabletid koos reguleeritud vabanemisega 190mg

metoproloolsuktsinaat

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht enne u see ravim hakkate kasutama sest seal on oluline teave sees teie jaoks.

- Hoidke seda infolehte. Võib-olla vajate seda hiljem uuesti vajalik.
- Kas teil veel küsimusi? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.
- Ärge seda ravimit andke edasi teistele, sest see on ainult teile kuni te välja kirjutatud. See võib kahjulik olla teistele, isegi kui on neil samad kaebused nagu teil. Kas teil tekivad mõned sümptomid üks kohta kõrvaltoimetest mis on jaotis 4 loetletud? Või saate te üks kõrvaltoime mis ei ole selles selles pakendi infolehes loetletud? Võtke siis ühendust oma arst apteeker.

Sisu selle selle infoleht:

1. Mis on Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard ja milleks kasutatakse seda ravimit? Millal ei tohi te kas tohib see ravim mitte kasutama või peate olema eriti ettevaatlik sellega olema?
 2. Kuidas kasutate te seda ravimit?
 3. Võimalikud kõrvaltoimed
 4. Kuidas säilitab te seda ravimit?
 5. Sisu pakendi ja muud teave Mis on
1. Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard ja milleks kasutatakse seda ravimit kasutatakse kasutab?

Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard kuulub rühma ravimite mis beeta-blokaatorid nimetatakse. Nad kaitsevad südant ülemäärase tegevuse eest. suur aktiivsus.

Täiskasvanud

Jaoks ravi alates kõrge vererõhu (hüpertensioon), kui rinnus on suruv valutunne (stenokardia) või südame rütmihäired, (stenokardia) of südame rütmihäired, pärast üks südameatakk et üks uus südameatakk ära hoida, juures üks liiga kiire toime kilpnäärme kilpnääre (hüpertüreoidism) en ter ennetamine van migreenirünnakud.

Lapsed ja noorukid van 6-18 aastat:

Ravi jaoks kõrge vererõhk (hüpertensioon vererõhk (hüpertensioon).

2. Millal tohib te seda ravimit mitte kasutada või peate olema eriti ettevaatlik sellega olema?

Millal tohib te seda ravimit mitte kasutada?

- Te olete allergiline teatud aine selle ainete sees selles ravimis. Need ained leiate te leida rubriigis jaotis 6 selles pakendi infoleht.
- Te olete ülitundlik teiste vererõhku alandavate ravimite samast tüübist nagu Metoprololsuktsinaat Sandoz retard, nimelt Sandoz retard, beetablokaatorid . Te.
- U kogunud häired südame ergutusjuhtivuses (2. ja 3. astme AV-blokaad).
- Te on äge südamepuudulikkus või südamepuudulikkus mis ei ole kontrolli all, koos vedeliku vedelik kopsudes kopsud (kopsuturse) või üks alandatud vererõhk (hüpotensioon).
- Juures üks 'šokk' põhjustatud poolt ebapiisav pumbafunktsioon südame poolt.
- Te kannatab all raske vereringehäired.
- Juures üks raske aeglustunud südamerütm (bradükardia).
- Teid ravitakse pidevalt või vaheaegadega ravitakse koos teatud ravimid mis pumbajõudu südames mõjutavad (nimelt beeta-agonistid).
- Te olete teatud häire südamerütmis (Sick sinus sündroom (Siinussõlme haigus sündroom) en u on selleks pole südamestimulaator saanud.
- Te on üks südameatakk (müokardiinfarkt) koos aeglase südamerütmiga aeglane südamerütm, üks madal vererõhk või teil on dekompenseeritud.
- Te saate ravimit verapamiil süstimise teel süst veeni üks veen manustatakse, sest seetõttu de vererõhk võib langeda, südame juhtivushäired võivad tekkida ja südamepuudulikkus võib ilmned.

Millal peate te olema eriti ettevaatlik olema selle ravimiga ravim?

Võtke ühendust oma arstiga või apteekriga enne kui seda ravimit kasutate. Andke alati arstile(d) kes teid ravivad teada mille vastu probleemid või haigused te veel rohkem all ravi olete. Metoprololsuktsinaat Sandoz retard tuleb ettevaatlikult manustada . Olge eriti.

koos ettevaatlik koos Metoprololsuktsinaat Sandoz retard:

- kui te soovite lõpetada. Te võite nimelt mitte järsult lõpetada, sest see krooniline südamepuudulikkus (vähenenud pumbajõud südames) võib halvendada ja see riski peal südameataki (müokardiinfarktsüdameinfarktja äkilise surma suurendada . Vaata. Vaata jaoks vähendamisnõuane de rubriik 'Kui te lõpetate selle kasutamise selle ravimi ';kui
- te teisi ravimeid kasutate südame toetamiseks toetus toimimist südame toetamiseks. On võib nimelt üks halvenemine südamefunktsiooni tekkida ;kui
- te kannatate all hoogudena esinev hingeldus põhjustatud spasm lihaste ja lihaste ning turse alates limaskestast alates hingamisteede sageli kaasnev kestab köha ja ja röga eritumine alates lima (astma (bronhiaalne)) en kui te selleks ravitakse on koos nt. terbutaliin. Kui sümptomid sümptomid halvnevad. See võib olla vajalik olema annust annus kohandada te sobib;
- kui teil suhkruhaigus (diabetes mellitus) on. Metoprolool võib de sümptomeid alates madal veresuhkru tase suhkruisaldus teie veres veri maskeerima. De tõenäosus selleks on kuid väike.;
- kui teie süda ebapiisav pumbajõud on ja teid ei selle ravita ole. In see juhtum võib te Metoprololsuktsinaat Sandoz retard mitte kasutada;

- kui teil on probleeme koos a suurenev aeglustunud südamerütm (bradükardia). Ravim võib nimelt vaja olla de annustamine kohandada et kohandada või järk-järgult lõpetada ;kui
- teil on probleeme külmade sõrmedega külmade sõrmedega enof jalad (ka ilma kasutamata ravimeid ravimeid, Raynaud' sündroom või vahelduv lonkamine (vahelduv lonkamine).Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard võib võib de sümptomid halvenevad. Het is oluline et teie arst seda teab;
- kui teid tuleb opereerida peab . Het isoluline et teie teie arst teab et te metoprolool kasutad;
- kui sa samal ajal ravitakse digitalisega (ravimmis südame pumbajõudu suurendab). See võib). See võib vajalik on de annustamine kohandada et kohandada või järk-järgult lõpetada ;kui
- teil on raske halvenenud funktsioon maksa on on. De annus peab vajadusel olema vähendatud;
- juures üks kasvaja neerupealise säsis mis kaasneb võib kaasa tuua koos äkilise tugeva vererõhu tõusuga, tugev peavalu, higistamine ja kiirenenud südamerütm (feokromotsütoom).
- kui teil on probleeme tõsise ülitundlikkusega teatud ainete vastu teatud ained. Šokk (tugev langus vererõhu vererõhk, kahvatus, rahutus, nõrk kiire pulss, külm nahk, vähenenud teadvus) põhjustatud üks äkiline tugev veresoonte laienemine tõttu tagajärjel sellest (anafülaktiline šokk) võib nimelt tõsisem olla.

Konsulteerige oma arstiga kui üks kohta eespool nimetatud hoiatused jaoks teile kohaldatav on, või et minevikus on olnud on olnud.

Puudub puudub kogemus raviga ravi südamepuudulikkuse ravimine juures patsientidel:

- vanem kui 80 aastat;
- koos ühe piirava ja suurenenud südamelihasega;
- koos ühe kindla südameklapahaigusega;
- koos üks tugev vähenenud maks- ja neerufunktsioon;
- kes lühem kui 3 kuud tagasi üks südameatakk on olnud ;kaasasündinud
- üks kaasasündinud kaasasündinud südamehaigus.

Kasutate te veel teisi ravimeid?

Kasutate te lisaks Metoprololsuccinaat Sandoz retard veel teisi ravimeid, kas te seda lühike tagasi tehtud või läheb te see võib-olla varsti tegema? Rääkige et et teie arst või apteeker. See kehtib ka jaoks ravimid mida te ilma retseptita saate osta.

Kasutage ravimikaarti . Temärgite sellele milliseid ravimeid te kasutate ja sisse sisse milline annus.

Jätke ka teistele teada milliseid ravimeid te kasutate!

Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard võib mõjutada toimet mõnede ravimite ravimid mõjutada ja vastupidi. See kehtib mh järgnevate:

- kaltsiumikanali blokaatorid, nagu verapamiil ja diltiaseem. Need ravimid võivad nimelt südame kokkutõmbumist südame (kontraktsioonivõime südame) ja juhtivus südame (AV- juhtivus)negatiivselt mõjutada mõjutama vtka jaotis ' Millal ei tohi teseda kas tohib see ravim mitte kasutama');
- kasutama');

- rifampitsiin, üks ravim vastu mõned infektsioonid, sest see kogus metoprolool veres vähendab ;ravimid
- ravimid vastu allergia (antihistamiinikumid), kuna need metoprolooli kogust veres suurendavad ;ravimid
- vastu (raske)masendus masendus depressioon(depressioon) of ravimid vastu raske vaimuhaigus (antipsühhootikumid), sest nad kogust metoprolooli veres suurendavad;
- teatud rühm valuvaigistavad ravimid koos ka üks põletikuvastane ja palavikuvastane toime (COX-2 inhibiitorid), sest nad kogust metoprolooli veres suurendavad;
- ganglioniblokaatorid (ravimid närvihaiguste vastu), MAO-inhibiitorid (ravimid depressiooni vastu) ja muud beetablokaatorid (ka silmatilkades),kuna lisakontroll on vajalik vajalik klonidiin,
- klonidiin, sest see kombinatsioonis koos ühe beetablokaatoriga sümptomid kõrge vererõhu tugevdatud määral võib tagasi tulla ; ravimid vastu;
- ravimid vastu südame rütmihäired (anti-arütmikumid), nagu amiodaroon ja kinidiin. Need ravimid võivad pikendada südame juhtivusaega (AV- juhtivus)pikendada ja omavad on olema üks negatiivne mõju südame kontraktsioonijõule südamest;
- narkoosiravimid (vt ka jaotist ' Millalpeate olema eriti ettevaatlik selle ravimiga koos see ravim?');
- indometatsiin (määratud valuvaigistav ravim koos ka üks põletikuvastane ja palavikuvastane toime), kuna see see vererõhku alandav toime metoproloolil võib vähendada;
- insuliin ja suukaudsed ravimid diabeedi suhkruhaiguskuna see veresuhkrut alandav toime nende ravimite poolt beetablokaatorid võib olla saada tugevdatud. In et juhul peab de annustamine van nende ravimite tuleb olla kohandatud;
- lidokaiin, üks ravim südame rütmihäirete korral, sest metoprolool eritumist of lidokaiin kehast võib vähendada ; digitaalsed,ravim
- mis suurendab südame pumbajõudu de pumbajõud südame suurendab, sest samaaegne kasutamine koos selle ravimiga võib aeglustunud südamerütmi põhjustada põhjustamaMillele

peate tähelepanu pöörama alkoholiga? Alkohol suurendab Alkohol suurendab de kogus metoprolool veres teie veri.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kas olete rase, arvate te rase olevat , kas soovite, kas soovite rase saada või annate te rinnaga toitu? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga enne kui te seda ravimit kasutate.

Rasedus:

Teie arst võib Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard välja kirjutada raseduse ajal kui kasu üle kaalub riskid kasutamise teie jaoks üles võrreldes riskidega lootele jaoks lootele sündimata laps. Kui te Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard on kasutanud kuni kuni sünnituseni sünnitus siis teie vastsündinud laps võib esimesed kaks päeva pärast de sünd extra saada kontrollitud.

Imetamine:

Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard tuleb mitte kasutada et saada perioodil periood et imetamine on antud, välja arvatud kui kasutamine vajalikuks peetakse . Metoprolooleritub läbi rinnapiima . Tavaliste normaalseteannuste korral on metoprolooli kogus rinnapiimas rinnapiimas

rinnapiim väike. Kui teie arst teile Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard määrab, siis kontrollitakse teie last lisaks olema kontrollitud.

Viljakus:

Andmed viljakuse kohta näitavad mitte peal eripärad.

Sõiduvõime ja kasutamine masinate peal

Nii palju kui teada on ei ole mingeid kahjulikke mõjusid sõiduvõimele ja masinate kasutamisele see võime masinaid käsitseda kasutama. Kui esineb alates kõrvaltoimeid nagu väsimus või pearinglus, peate arvestama sellega kuid kaasa et see see see reaktsioonivõime ebasoodsalt võib mõjutada.

Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard sisaldab glükoosi, sahharoosi ja laktoosi

Kui teie arst teile on teatanud et te teatud suhkrud ei talu, võtke ühendust oma arstiga enne kui te seda ravimit võtate.

3. Kuidas kasutate te seda ravimit?

Kasutage see ravim alati täpselt nagu teie arst või apteeker teile seda on öelnud. Kahtlete te õiges kasutuses? Võtke siis ühendust teie arstiga või apteeker apteeker.

De soovitatud annus on:

Kõrgenenud vererõhk (hüpertensioon):

Algannus: üks kord päevas 1 tablett Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard 50. Võimalusel teha suurendama kuni 100-200 mg üks kord päevas.

Kui te kannatate all ühe vähenenud funktsioon maksa, võib arst otsustada annust vähendada tee alandama (näiteks kuni 1 tablett Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard 25).

Ahistav valulik tunne rinnal rind (stenokardia):

100-200 mg üks kord päevas. Maksimaalselt 2 tabletti Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard 200 päevas päev.

Südamerütmihäired:

100-200 mg üks kord päevas. Nii vajadusel võib arst otsustada seda annust suurendada ..

kiire toime toime kohta kilpnääre (hüpertüreoidism):

100-200 mg üks kord päevas. Kui vajalik võib arst otsustada seda annust suurendada ..

ennetada ennetamine vahel migreenirünnakud:

100-200 mg üks kord päevas.

Südameatakk:

Pärast seda, kui te esmalt olete alustanud tavaliste tavaliste metoprolool tablettidega, on säilitusannus: üks kord päevas 1 tablett Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard 200.

Kui te täheldate et Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard liiga tugev või just liiga vähe toimib, konsulteerige siis teie arst või apteeker.

Tabletid tabletid koos reguleeritud vabanemisega ei tohi olla purustatud või närida, vaid peavad olema terved või poolikud tabletid tabletid veega võetakse sisse.

Kasutamine lastel ja noorukitel ::

vererõhk : Lastelvanuses 6 aastat ja vanematel on annus on annustamine sõltuvalt kehakaalust kehakaalust. Teie arst arvutab õige annuse teie lapsele. Tavaline algannus

on 0,5 mg kilogrammi kohta kehakaalust üks kord päevas üks kord päevas, kuid võib mitte kõrgem olla kui 50 mg. Seal valitakse valitud jaoks saadaval olemasolev tableti tugevus mis on kõige lähemal juures arvutatud annus asub .. Teie arst võib annust suurendada kuni 2,0 mg kilogrammi kohta kehakaalu kehakaalsõltuvalt mõjust vererõhule .. üle 200 mg üks kord päevas ei ole uuritud ei uuritud juures lastel ja noorukitel.

Kasutamine alates Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard ei ole soovitatav juures lastel noorem kui 6 aastat ..

kestus ravi

Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard saab enamasti pikaajaliselt kasutatud olla.

Kas te liiga palju sellest ravimist kasutanud ? Kui

te liiga te veel van Metoprololsuktsinaat Sandoz retard on kasutanud, võtke siis kohe ühendust oma arstiga või apteekriga. Sümptomid võivad olla: raske alandatud vererõhk (hüpotensioon), aeglustunud südamerütm (bradükardia), häire südame ergutusjuhtivuses (AV- blokaad), südamepuudulikkus (ebapiisav pumptugevus südames) (dekompensatsioon cordis), šokk põhjustatud poolt ebapiisav pumbafunktsioon südame, südame seiskumine, hingeldus poolt kramp lihaste spasm hingamisteede (bronhospasm), teadvushäired (või (of isegi kooma), iiveldus, oksendamine ja sinine värvimuutus huulte huulte, keele, naha ja limaskestade tõttu puudus hapnikust hapnik kehas kehas veri (tsüanoos).

Samaaegne kasutamine alkoholi, ravimid kõrge vererõhk , kinidiin (ravimsüdamepekslemine) või barbituraadid(barbituraadid (teatud ravimid juures epilepsia) süvendab de sümptomeid.

Kas te unustasite seda ravimit sisse võtta ? Ärge

võtke kahekordset kahekordne annus et üks unustatud annus sisse võtta . Kui te unustasite võtta üks annus sisse võtta , saatete seda te see ikkagi teha, välja arvatud juhul kui peaaegu aeg on teie järgmise annuse .. sel juhul tavalist annustamisskeemi see normaalne annustamisskeem.

Kui te lõpetate selle kasutamise selle ravimi ravim

Ravi Metoproloolsuktsinaadiga Sandoz retard ei tohi üldiselt järsult katkestada , sest saama katkestatud, sest see krooniline südamepuudulikkus (vähenenud südame pumpamisvõime südamest) võib halveneda ja see risk peal ühe südameatakk (müokardiinfarkt) ja äkiline surm võib suurendada. Arst peab kui reeglina annust järk-järgult vähendama üle ühe perioodi vähemalt vähemalt 2 nädalat.

Kas te veel muud küsimused selle kasutamise kohta see ravim? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim võib ka see ravim kõrvaltoimed omama. Mitte kõik saavad sellega kokku puutuda.

Järgmised kõrvaltoimed on väga sagedased ,sagedased ,, mõnikord, harva või väga harva teatatud:

Väga sageli (esinevad juhtudel rohkem kui 1 10-st kasutajast)

Närvisüsteem: väsimus.

Sageli (esinevad juures vähem kui 1 10-st kasutajast)Süda:

aeglustunud südamerütm (bradükardia),südamepekslemine Veresooned

:: tõttu üks näiteks kiiresti tõusmine välja ühest istuvast või lamavast asendist mõnikord koos kaasnev koos pearinglus (ortostaatiline hüpotensioon), külmad käed en jalad, südamepekslemine (palpitatsioonid)

Närvisüsteem: peapööritus, peavalu Hingamissüsteem: hingeldus pingutusel Seedetrakt

Seedetrakt: iiveldus, kõhuvalu, kõhulahtisus, kõhukinnisus

Mõnikord (esinevad vähem kui 1-1 100-st kasutajast)

Süda: süvenemine sümptomite südamepuudulikkuse sümptomid (ebapiisav pumbajõud südame), teatud häire juhtimises südame juhtivuse, viies kuni rütmihäired (südameblokk), vedelikupeetus (turse), valu südames südamepiirkond; üks 'šokk' põhjustatud poolt ebapiisav pumbafunktsioon südame poolt (kardiogeenne šokk) juures patsientidel koos äkiline südameatakk (äge müokardiinfarkt)

Närvisüsteem: tajumine alates kihelus, sügelus või surin ilma et oleks põhjust

(paresteesiaparesteesiaLihased

:: lihaste krampid Seedetrakt: oksendamine Üldine: kaalutõus

Psüühika: (raske) masendus (depressioon), vähenenud valvsus, unisus või unetus, õudusunenäod

Hingamiselundkond: Hingeldus põhjustatud kramp lihaste spasm hingamisteede lihaste (bronhospasm), ka patsientidel kellel ei ole obstruktsioone esinenud on olema hingamisteede haigused Nahk: lenduv nahalööve, suurenemine higistamise tootmises

Harva (esinevad vähem kui 1-1 1 000-st kasutajast) Süda: juhtehäired, häired südame rütmis

(arütmia) Seedetrakt: kuiv suu

Maks: maksafunktsiooni häired Psüühika: närvilisus, ärevus

Suguelundid: impotentsus, vähenenud huvi seksi vastu

Nina: põletik nina limaskest iseloomustatud poolt ummistunud nina ,aevastamine ja eritis (riniit)

Silmad:

häired juures nägemine nägemine ,, kuivad ja/või ärritunud silmad, põletik sidekesta (konjunktiviit)

Nahk

:: Väga

harva (esinebvähem kui 1 inimesel 10 000-st vähem kui 1 10 000-st kasutajad)

Nahk: koosurm alates koe juures patsientidel koos raske vereringehäired, ülitundlikkus

valguse ,ägenemine ägenemine korduvate korduv nahahaigus kaasnev toimumas koos ketendav, kuiv nahalööve (psoriaas)

Seedetrakt: maitsehäired

Veri: verehäire (puudus vereliistakutest trombotsüüdidkaasnev paaritatud kestab koos siniste laikudega ja veritsustendentsiga (trombotsütopeenia)

Maks: maksapõletik (hepatiit) koos kestab koos kollatõvega (kollane värvimuutus naha nahk või silmad)

Liigesed: liigesvalu (artralgia)

Psüühika: mälukaotus, segasus, tajumised asjadest mida ei ei on (hallutsinatsioonid),

võõrandumine iseendast või oma tundest (depersonaliseerimine)

Kõrvad: kõrvahelin (tinnitus) Suguelundid Suguelundid: Teatamine

See teatama kohta kõrvaltoimed

Kas teil esineb kõrvaltoimeid, võtke ühendust oma arstiga või apteekriga. See kehtib ka selliste kõrvaltoimete kohta, mis ei ole selles infolehes kirjas. U võib kõrvaltoimed ka teatada kaudu Hollandi Kõrvaltoimete Keskus Lareb. Veebisait: www.lareb.nl. Teatades kõrvaltoimetest tee annate teada, aitate te meid et rohkem teavet saada saama üle ohutus selle see ravim.

Mitte kunagi ise annust annustamine vähendama või ravi (ajutiselt) katkestama! Vaata 'Kui te lõpetate selle võtmise alates selle ravimi'.

5. Kuidas säilitate te seda ravimit?

Säilitada alla 25°C

Hoida nähtavuse ja hoida laste kaugusel hoida.

Pärast avamist pudeli on need tabletid veel 6 kuud kasutatavad.

Ärge kasutage seda ravimit mitte rohkem pärast de aegumiskuupäeva . See on pakendil leiate EXP järgi . Seal on kuu ja aasta . Viimane päevon märgitud . kuu kuu on aegumistähtaeg aegumiskuupäev.

Loputage ravimeid mitte kraanikausist kraanikaussi või tualetti ja visake neid mitte prügikasti prügikasti. Küsi oma apteekrilt mida sa pead tegema ravimitega pead tegema mida sa enam ei kasuta. Kui sa ravimid õigel viisil kõrvaldada siis need õigesti kõrvaldatakse õige viis hävitatud ja sattuda ei keskkonda sattuda.

6. Sisu pakendi pakend ja muu teave Millised ained sisaldavad selles see ravim?
 - De toimeaine aine selles selles ravimis on metoproloolsuksinaat.
Metoproloolsuksinaat Sandoz retard 25: üks tablett sisaldab 23,75 mg metoproloolsuksinaati, vastav koos 25 mg metoprololtartraat.
Metoproloolsuksinaat Sandoz retard 50: üks tablett sisaldab 47,5 mg metoproloolsuksinaat, vastab koos 50 mg metoprololtartraat.
Metoproloolsuksinaat Sandoz retard 100: üks tablett sisaldab 95 mg metoproloolsuksinaat, vastav 100 mg metoprololtartraat.
Metoproloolsuksinaat Sandoz retard 200: üks tablett sisaldab 190 mg metoproloolsuksinaat, vastav 200 mg metoprololtartraat.
 - De muud ained selles ravimis on sahharoos, maisitärklis , glükoos (vedel), polüakrülaad , talk (E553B), magneesiumstearaat (E470b), mikrokristalne tselluloos (E460),

- krosprovidoon krosprovidoonkolloidne kolloidne ränioksiid (E551), laktoos, hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171) ja makrogool 4000.
- Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard 100 sisaldab samuti kollane raudoksiid (E172).

Kuidas näeb Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard välja välja en kui palju on seal üks pakend? Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard 25, 50 ja 200: valge, piklik tablett koos poolitusjoon mõlemal küljel . Tablett koospoolitusjoon murdjoon võib kaheks võrdseks annuseks jagada ..

Sandoz retard 100: helekollane ,piklik tablett koos poolitusjoonega mõlemal küljel . Tablett koos. Tablett koos murdjoon võib kahte võrdsesse annusesse jagada jaotatud.

Tabletid on pakitud polüpropüleen- alumiinium- või PVC-aklar-alumiinium- blisterpakendisseaclar/alumiinium blisterpakend in üks papp karp või HDPE pudelites.

Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard 25, 50, 100 ja 200: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1 ja 90 tabletti koos reguleeritud vabanemisega sisse blisterpakendid ja 30, 100, 250 ja 500 tabletid koos reguleeritud vabanemisega pudelites.

Mitte kõik nimetatud pakendisuurused on turule viidud ..

omanik loa saamiseks turule viimiseks kaubandus tooma ja tootja litsentsiomanik: Sandoz B.V., Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, Holland

Tootjad:
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke Allee 1
39179 Barleben Saksamaa

Sandoz B.V.
Hospitaaldreef 29
1315 RC Almere
Holland

Lek Pharmaceuticals a.s.
Verovškova 57,
1526 Ljubljana
Sloveenia

Lek Pharmaceuticals a.s. Trimlini 2D
9220 Lendava
Sloveenia

See ravim on registrisse kantud numbri all:

RVG 32376: Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard 25, tabletid koos reguleeritud vabanemisega 23,75 mg RVG 32377: Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard 50, tabletid koos reguleeritud

vabanemisega 47,5 mg on RVG 32378: Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard 100, tabletid koos reguleeritud vabastamine 95 mg on RVG 32380: Metoproloolsuktsinaat Sandoz retard 200, tabletid koos reguleeritud vabastamine 190 mg

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud jaanuaril 2025 sisse jaanuar 2025

Transtoyou