

Pakkausseloste: tietoa potilaalle de potilas

Metoprololisukkinaatti Sandoz® retard 25, tabletit kanssa säädely vapautuminen 23,75 mg

Metoprololisukkinaatti Sandoz® retard 50, tabletit kanssa säädely vapautuminen 47,5 mg

Metoprololisukkinaatti Sandoz® retard 100, tabletit kanssa säädely vapautuminen 95 mg

Metoprololisukkinaatti Sandoz® retard 200, tabletit kanssa säädely vapautuminen 190mg

metoprololisukkinaatti

Lue huolellisesti koko pakkausseloste ennen kuin u tätä lääkettä aiot käyttää koska siinä on tärkeää tietoa sisällä sinulle .

- Säilytä tämä pakkausseloste. Ehkä tarvitset sitä myöhemmin uudelleen tarvitaan.
- Onko sinulla vielä kysymyksiä? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin.
- Älä tätä lääkettä anna eteenpäin muille , koska se onvain vain sinulle sinua määrätty. Se voi vahingollista olla muille ,myös vaikka heillä on samat oireet kuin sinulla. Saatko sinä oireita yksi ei käännettävää sisältöä sivuvaikutuksista jotka kohdassa 4 mainitaan? Tai koet sinä yksi sivuvaikutus joka ei tässä esitteessä mainita ? Ota sitten yhteyttäsinun te lääkäri apteekkari.

Sisältö tästä tämä pakkausseloste:

1. Mikä on Metoprololisukkinaatti Sandoz retard ja mihin käytetään tätä lääkettä käytetään?
  2. Milloin et saa tätä lääkettä ei käyttää tai täytyy olla erityisen varovainen sen kanssa olla?
  3. Kuinka käytetään tätä tätä lääkettä?
  4. Mahdolliset sivuvaikutukset
  5. Kuinka säilyttää te tämä lääke?
  6. Sisältö pakkauksen ja muut tiedot Mikä on
- 
1. Metoprololisukkinaatti Sandoz retard ja mihin käytetään tätä lääkettä käytetään käytetään?

Metoprololisukkinaatti Sandoz retard kuuluu ryhmään lääkkeitä jotka beetasalpaajia kutsutaan . Ne suojaavatsydäntä liialliselta aktiivisuudelta vastaan liian suurelta toiminnalta ..

Aikuiset

Jatkuvaan hoito alkaen korkea verenpaine ( hypertensio),kun on puristava kipu rintakehässä (angina pectoris) tai rytmihäiriöt , (angina pectoris) tai sydämen rytmihäiriöt, na yksi sydäninfarkti om yksi uusi sydäninfarkti tehdä ehkäistä, yhteydessä yksi tehdä liian nopea toiminta kilpirauhasen kilpirauhanen (hypertyreoosi) en ter ehkäisy alkaen migreenikohtauksia.

Lapset ja nuoret 6-18 vuotta:

Hoidon hoito alkaen korkea verenpaine ( hypertensioverenpaine).

2. Milloin et saa tätä lääkettä käyttää tai sinun täytyy olla erityisen varovainen sen kanssa olla ? Milloinet saa

tätä lääkettä käyttää et saa tätä lääkettä?

- Oletko allerginen jollekin yhdelle näistä aineista tässä lääkkeessä .. aineet voit löytää kohdasta 6 tässä asiakirjassa 6 tässä pakkausseloste.
- Olette yliherkkä muille muu lääkkeille samasta ryhmästä kuin Metoprololisukkinaatti Sandoz retard, eli beetasalpaajat . Te olette.
- muulle lääkkeelle häiriöt sydämen johtumisjärjestelmässä (2. asteen- ja 3. asteen AV-katkos).
- Teillä on akuutti sydämen vajaatoiminta tai sydämen vajaatoiminta joka ei ole hallinnassa , ja siihen liittyy nesteiden kertyminen keuhkoissa keuhkot (keuhkoödeema) tai yksi alentunut verenpaine (hypotensio).
- Kun yksi 'shokki' aiheutettu riittämättömästä pumppaustoiminnasta sydämen. Sinä
- U kärsii jostakin vakavista verenkiertohäiriöistä.
- Kun on vakava hidastunut sydämenlyönti (bradykardia).
- Teitä hoidetaan jatkuvasti tai ajoittain hoidettu kanssa tietyt lääkkeet jotka sydämen pumppausvoimaa vaikuttavat vaikuttaa nimittäinbeeta-agonistit ).Teillä
- on tietty häiriö sydämen rytmissä (Sick sinus oireyhtymä (Sairas sinus oireyhtymä) en u on tähän ei sydämentahdistin saanut.
- Teillä on sydäninfarkti sydäninfarkti sydäninfarkti yhdistettyinäyhdistelmä hitaaseen sykkeeseen hidas syke syke, yksi matala verenpaine tai olet dekompensoitunut.
- Sinulle annetaan lääke verapamiili injektiona suoneen sisään yksi laskimo annetaan, koska siten de verenpaine voi laskea, sydänjohtumishäiriöt voivat esiintyä ja sydämen vajaatoiminta voi kehittyä.

Milloin täytyy olla erityisen varovainen ovat tämän kanssa lääke?

Ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin ennen kuin käytät tätä lääkettä . Kerroaina lääkärille ( t) joka sinuahoitaa tietää ennen mistä mille ongelmat tai sairaudet te vielä enemmän alla hoito olet. Metoprololisukkinaatti Sandoz retard täytyy varoen käyttää antaa ..

varovainen kanssa kanssa Metoprololisukkinaatti Sandoz retard:

- jos haluat lopettaa. Sinä voit nimittäin ei äkillisesti lopettaa, koska tämä krooninen sydämen vajaatoiminta (heikentynyt pumppauskyky sydäimestä) voi pahentaa ja se riski päällä yksi sydänkohtaus (sydäninfarkti) ja äkillinen kuolema voi lisätä. Katso lopetusohjeet vähentämisohejeet de osio 'Jos lopetat käytön tämän käyttö tästä lääkkeestä 'jos
- käytät muita lääkkeitä sydämen toiminnan tukemiseen tuki sydämen toiminnan tukemiseen. voi nimittäin yksi heikkeneminen sydämen toiminnassa esiintyä;
- jos te kärsitte kohtauksittain esiintyvistä hengästyneisyydestä johtuen krampeista lihaksissa ja lihakset ja turvotus alkaen limakalvo ei käännettävää sisältöä hengitystiet usein yhdessä esiintyvä kanssa yskä ja se liman alkaen erityis (astma (bronkiaalinen)) en jos sinua tätä varten hoidetaan tulee kanssa esim. terbutaliini. Kun oireet pahenevat . Sevoi olla tarpeen ovat annos muuttaa päällä te soveltaa;
- jos sinä diabetes (diabetes mellitus) on. Metoprolol voi de oireet alkaen liian alhainen verensokeri sokeripitoisuus veressäsi te veri peittää. De mahdollisuus tähän on kuitenkin pieni.;
- jos sinun sydän riittämätön pumppausvoima on ja et ei sitä hoideta tulee. In että tapauksessa

- et saa Metoprololisukkinaatti Sandoz retard ei käyttää;
- jos sinulla on on alkaen lisääntyvä hidastunut syke ( bradykardia). Se). Se voi nimittäin tarpeen olla de annostus sovitaa te muuttaa tai vähitellen lopettaa ;jos
- sinulla on on kylmät sormet kylmä sormet enof jalat (myös ilman käyttöä lääkkeiden lääkkeitä, Raynaudin oireyhtymä) tai katkokävely (klaudikaatio intermittens). Metoprololisukkinaatti Sandoz retard voi de oireet pahenevat. Het is tärkeää että teidän lääkäri tämä tietää;
- jos te täytyy leikata olla . Het istärkeää että teidän te lääkäri tietää että käytät metoprololia käyttää;
- jos sinä samanaikaisesti hoidettu ollaan digitaliksella (lääke joka sydämen pumppausvoimaa lisää edistää). Se voi tarvitaan ovat de annostus sovitaa te sovitaa tai vähitellen lopettaa ;jos
- te yksi vakava heikentynyt toiminta maksan on on. De annostus täytyy tarvittaessa olla alentunut;
- jos on kasvain lisämunuaisytimessä joka voi liittyä voi esiintyä äkillinen voimakas verenpaineen nousu verenpaineen nousu, voimakas päänsärky, hikoilu ja nopeutunut sydämen syke (feokromosytooma).
- jos sinulla on on vakava yliherkkyys tiettyjä aineita kohtaan tietty aineet. Shokki (voimakas lasku veren paine, kalpeus, levottomuus, heikko nopea pulssi, kylmä iho, heikentynyt tietoisuus) johtuen yksi äkillinen voimakas verisuonten laajeneminen kymmenen seurauksena tästä (anafylaktinen sokki) voi nimittäin vakavampi olla.

Kysy sinun lääkäriltä jos yksi alkaen yllämainitut varoitukset ennen sinulle sovellettavissa on, tai että menneisyudessa on ollut aiemmin.

Ei ole kokemusta hoidosta hoidon sydämen vajaatoiminnan alkaen hoidossa kanssa potilaat:

- yli 80 vuotta;
- joilla on rajoittava ja suurentunut sydänlihas ;joilla on
- tietty sydänlappävika ; joilla on;
- kanssa yksi vahvasti heikentynyt maksa- ja munuaistoiminta;
- jotka lyhyempi kuin 3 kuukautta sitten yksi sydänkohtaus on ollut ;joilla
- yksi synnynnäinen synnynnäinen sydänvika.

Käytättekö te vielä muita lääkkeitä?

Käytättekö te lisäksi Metoprololisukkinaatti Sandoz retard vielä muita lääkkeitä, onko te se lyhyt sitten tehty tai aikoo te tämä ehkä pian tehdä? Kerro että että sinun lääkäri tai apteekkari. Tämä koskee myös varten lääkkeet jotka ilman reseptiä voit saada.

Käytä lääkekorttia . Sinäkirjaat tähän mitkä lääkkeet käytät ja käytät ja sisään mikä annostus.

Anna myös muiden tietää mikä lääkkeet käytät !Metoprololisukkinaatti

Sandoz retard voi vaikuttaa vaikutukseen joitakin lääkkeiden jotkut lääkkeitä vaikuttaa ja päinvastoin. Tämä koskee mm. seuraavia:

- kalsiumkanavan salpaajat, kuten verapamiili ja diltiatseemi. Nämä lääkkeet voivat nimittäin supistumista aiheuttaa sydämen (supistuvuus sydämen) ja de johtuminen sydämen (AV- johtuminen) negatiivisesti vaikuttaa (katso myös de kohta 'Milloin et saa tätä lääke ei käyttää');
- käyttää');

- rifampisiini, yksi lääke vastaan joitakin infektioita, koska se määrää metoprololia veressä veri alentaa;
- lääkkeet vastaan allergia (antihistamiinit), koska ne määrää metoprololia veressä lisäävät;
- lääkkeet vastaan (vakava) masennus (depressio) of lääkkeet vastaan vakava mielisairaus (antipsykootit), koska ne määrää metoprololia veressä veri lisäävät;
- tietty ryhmä kipulääkkeet lääkkeet kanssa myös yksi tulehdusta ehkäisevä ja kuumetta alentava vaikutus (COX-2-estäjät), koska ne määrää metoprololia veressä lisäävät;
- ganglionisalpaajat (lääkkeet hermosairauksiin), MAO-), MAO-estäjät (lääkkeet masennusta vastaan) ja muut beetasalpaajat (myös silmätipoissa), koska lisää seuranta tarpeen on; klonidiini,
- klonidiini, koska se yhdistelmä kanssa yksi beetasalpaaja oireet korkea verenpaine voi palata takaisin voimakkaammin kaveri voi tehdä palata;
- lääkkeet vastaan sydämen rytmihäiriöt (anti-arytmiat), kuten amiodaroni ja kinidiini. Nämä lääkkeet voivat pidentää sydämen johtumisaikaa (AV- johtuminen) pidentää ja olla olla yksi negatiivinen vaikutus sydämen supistusvoimaan sydämestä;
- narkoosilääkkeet (katso myös kohta ' Milloinsinun täytyy olla varovainen tämän kanssa ' tämä lääke?');
- indometasiini (määrätty kipua lievittävä lääke kanssa myös yksi tulehdusta ehkäisevä ja kuumetta alentava vaikutus), koska se se verenpainetta alentava vaikutus metoprololilla voi vähentää;
- insuliini ja oraaliset lääkkeet diabetekseen diabeteskoska se verensokeria alentava vaikutus näiden lääkkeiden kautta beetasalpaajat voi olla tulla vahvistaa. In että tapauksessa tulee de annostus van näiden lääkkeiden täytyy olla säädetty;
- lidokaiini, lääke sydämen rytmihäiriöihin kohdalla sydämen rytmihäiriöt, koska metoprololi erittymistä alkaen lidokaiinin kehosta se voi vähentää ;digitalis,
- lääke joka lääke sydämen pumppaustehoa pumppausvoima lisää lisää, koska samanaikainen käyttö kanssa tämä lääke voi hidastunut syke voi aiheuttaa;

Mihin täytyy kiinnittää huomiota alkoholin kanssa? Alkoholi lisää lisää de määrää metoprololi veressäsi sinun veri.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Oletko raskaana, luuletko sinä raskaana olevasi, haluatko, haluatko raskaana tulla tai antaa sinä imetät? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin ennen kuin käytät tätä lääkettä ..

Raskaus:

lääkäri lääkäri voi Metoprololisukkinaatti Sandoz retard määrätä raskauden aikana jos hyödyt käytöstä sinulle ylittävät riskit sikiölle sinä punnita vastaan de riskit varten se syntymätön lapsi. Jos käytät Metoprololisukkinaatti Sandoz retard olet käyttänyt asti synnytykseen saakka synnytys voi sinun vastasyntynyt lapsi mahdollisesti ensimmäiset kaksi päivää jälkeen synnytyksen de syntymä extra tulla tarkastettu.

Imetys:

Metoprololisukkinaatti Sandoz retard ei saa käyttää kun tulla aikana aika että imetys on annettu, ellei se käyttö välttämätön katsota. Metoprololierittyy rintamaidon kautta. Normaalilla annoksillaon metoprololin määrä rintamaidossa vähäinen määrä metoprololi äidinmaito pieni. Jos teidän lääkäriin määrää teille Metoprololisukkinaatti Sandoz retard määrää, niin teidän lapsenne tulee olla tarkkailtavana valvottu.

Hedelmällisyys:

hedelmällisyydestä viittaavat hedelmällisyyteen osoittavat ei päällä erityispiirteet.

Ajokyky ja se käyttö koneiden

Sikäli kuin tiedossa ovat tai ei haitallisia vaikutuksia ajokykyyn ja ja se kyky käyttää koneita tee käyttää. Jos esiintyy alkaen sivuvaikutuksia kuten väsymys tai huimaus on sinun kuitenkin otettava huomioon että tämä tämä se reaktiokykyä epäedullisesti voi vaikuttaa.

Metoprololisukkinaatti Sandoz retard sisältää glukoosia, sakkaroosia ja laktoosia

Jos sinun lääkäri on sinulle kertonut ilmoittanut että sinä tiettyjä sokereita ei siedä, ota sitten yhteyttä teidän lääkäriin ennen kuin te tätä lääkettä otatte.

### 3. Kuinka käytätte te tätä lääkettä?

Käyttäkää tämä lääke aina tarkalleen kuten sinun lääkäri tai apteekkari sinulle sen on kertonut. Epäiletkö sinä oikeasta käytöstä ? Ota sitten yhteyttäsinun lääkäriin tai lääkäri apteekki.

De suositeltu annostus on:

Kohonnut verenpaine (hypertensio):

Aloitusannos: kerran päivässä 1 tabletti Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 50. Tarvittaessa tehdä lisätä 100-200 mg:aan kerran päivässä.

Kun te kärsitte jostakin heikentyneestä toiminnasta maksassa, voi lääkäri päättää annosta alentaa annos pienentää vähentää (esimerkiksi jopa 1 tabletti Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 25).

Puristava kivulias tunne rintakehässä rinta (angina pectoris):

100-200 mg kerran päivässä. Enintään 2 tablettia Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 200 per päivä.

Sydämen rytmihäiriöt:

100-200 mg kerran päivässä. Jos tarpeen voi lääkäri päättää tätä annosta nostaa ..

nopea vaikutus toiminta de kilpirauhanen (hypertyreoosi):

100-200 mg kerran päivässä. Jos tarpeen voi lääkäri päättää tätä annosta korottaa ..

ehkäisyyn ehkäisy alkaen migreenikohtaukset:

100-200 mg kerran päivässä.

Sydäninfarkti:

Kun olet ensin aloittanut tavallisten metoprololilla tablettien , on ylläpitoannos: ylläpitoannos: kerran päivässä 1 tabletti Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 200.

Jos huomaat että Metoprololisukkinaatti Sandoz retard liian vahva tai juuri liian heikko on, ota yhteyttä sitten sinun lääkäri tai apteekkari.

Tabletit tabletit joissa on säädelty vapautuminen eivät saa olla murskattu tai pureskeltu , vaanne on otettava kokonaisina tai puolikkaina tabletteina tabletteina veden kanssa otetaan suun kautta.

Käyttö lapsilla ja nuorilla ::

verenpaine : Lapsilla 6-vuotiaista lähtien ja vanhemmilla on annostus on annostus riippuen kehon painosta. Lääkärisi laskee sopivan annoksen oikean annoksen lapsellesi lapsellesi.

Tavallinen aloitusannos on 0,5 mg per kilogramma paino kerran päivässä päivässä, mutta saa ei korkeampi olla kuin 50 mg. valitaan valitaan sopiva saatavilla oleva tablettivahvuus joka on lähimpänä laskettua annosta . Teidän annos kevyt. Sinun lääkäri voi annosta nostaa jopa 2,0 mg per kilogramma ruumiinpainoa kehonpainoriippuen vaikutuksesta verenpaineeseen .. yli 200 mg kerran päivässä eivät ole tutkittu tutkittu lasten lapsilla ja nuorilla.

Käyttö alkaen Metoprololisukkinaatti Sandoz retard ei suositella lasten lapsilla alle kuin 6 vuotta ..

kesto hoito

Metoprololisukkinaatti Sandoz retard tulee yleensä pitkäaikaisesti käytetty olla.

Onko te liikaa käyttänyt tätä lääkettä ? Kunte

liikaa tästä lääkettä paljon alkaen Metoprololisukkinaatti Sandoz retard on käyttänyt, ota välittömästi yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkiin. Oireet voivat olla: vakava alentunut verenpaine (hypotensio), hidastunut syke (bradykardia), häiriö sydämen johtumisessa (AV- katkos), sydämen vajaatoiminta (riittämätön pumppausvoima sydämessä) (dekompensointi cordis), sokki aiheuttama kautta riittämätön pumppausvoima sydämen sydänpysähdys, hengenahdistus kautta kouristus lihasten lihasten hengitysteiden ( bronkospasmi), tajunnan häiriöt (tai (of jopa kooma), pahoinvointi, oksentelu ja sininen värjäytyminen huulten , kielen, ihon ja limakalvojen johtuen hapenvajauksesta puutteesta hapesta hapesta hapen kehossa veri (sianoosi). Samanaikainen käyttö alkoholin, lääkkeiden korkean verenpaineen ,kinidiini ( lääkesydämentykytykseen ) tai barbituraatit( barbituraatit (tiettyjä lääkkeitä epilepsian hoidossa) pahentaa oireita oireita.

Oletko unohtanut tämän lääkkeen ottaa ottaa ?Älä

ota kaksinkertaista annosta annos klo yksi unohtunut annos sisään ottaa kiinni. Jos olet unohtanut taivutettu annoksen annostus ottaa , voit, sen sinä tehdä silti tehdä, ellei se melkein aika on ennen sinun seuraava annos. Noudata siinä tapauksessa normaalia annosteluajataulua normaali annosteluohjelma.

Jos lopetat tämän käytön tästä tästä lääkkeestä

Hoito hoito Metoprololisukkinaatti Sandoz retardilla ei saa yleensä yleensä ei äkillisesti keskeyttää keskeyttää, koska tämä krooninen sydämen vajaatoiminta (heikentynyt sydämen pumppauskyky sydäimestä) voi pahentua ja se riski päällä yksi sydänkohtaus (sydäninfarkti) ja äkillinen kuolema voi lisätä. Lääkäri tulee yleensä annosta annos vähitellen vähentää yli yksi jakso vähintään vähintään 2 viikkoa.

Onko teillä vielä muita kysymyksiä koskien käyttöä tästä tästä lääkkeestä? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan.

#### 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet voi myös tämä lääke sivuvaikutukset olla. Ei kaikki saa sen kanssa tehdä.

Seuraavat sivuvaikutukset ovat hyvin yleisiä ,yleisiä ,, joskus, harvoin tai hyvin harvoin raportoitu:

Hyvin usein (esiintyy yli 1:llä yli 10:stä käyttäjästä)

Hermosto: väsymys.

Usein (esiintyy alle 1 käyttäjällä 10:stä)

Sydän: hidastunut syke (bradykardia), sydämentykytys

Verisuonet: verenpaineen lasku johtuen esimerkiksi nopeasti nousta pois yhdestä istuvasta tai makaavasta asennosta joskus yhdessä esiintyvä huimauksen kanssa (ortostaattinen hypotensio), kylmät kädet en jalat, sydämentykytys (palpitaatiot)

Hermosto: huimaus, päänsärky Hengityselimistö: hengenahdistus rasituksen yhteydessä

Ruoansulatuskanava: pahoinvointi, vatsakipu, ripuli, ummetus

Joskus (esiintyy alle 1 käyttäjällä 100:sta)

Sydän: paheneminen oireista sydämen vajaatoiminnassa ( sydämen vajaatoiminta (riittämätön pumppausvoima sydämen), tietty häiriö johtumisessa sydämen sydämestä, johtava asti rytmihäiriöihin (sydänblokki), nesteen kertyminen (edeema), kipu sisään sydänalue; yksi 'shokki' aiheutuu johtuen riittämättömästä pumppaustoiminnasta sydämessä (kardiogeeninen shokki) potilailla joilla on äkillinen sydäninfarkti sydäninfarkti akuuttisydäninfarkti sydäninfarkti)

Hermosto: havaitseminen alkaen kihelmöintiä, kutina tai pistelyä ilman että siihen on syytä ( parestesiaparestesiaLihakset

:: lihaskrampit Ruoansulatuskanava: oksentelu Yleinen: painonnousu

Psykye: (vakava) masentuneisuus (masennus), vähentynyt valppaus, uneliaisuus tai unettomuus, painajaiset

Hengityselimistö: Hengitysvaikeudet johtuen kouristuksesta lihaksissa lihaksia hengitysteissä hengitysteiden (bronkospasmi), myös potilailla jotka eivät tukkeumia ole ole hengitysteiden hengitysteitä Iho: haihtuva ihottuma, lisääntyminen hikoilussa Harmaa

( esiintyvätälle 1 1 000:sta käyttäjästä ) Sydän:johtumishäiriöt johtumishäiriöt, häiriöt sydämen rytmissä (rytmihäiriöt) Ruoansulatuskanava: kuiva suu

Maksa: maksaongelmat Psykye: hermostuneisuus, ahdistus

Sukupuolielimet: impotenssi, vähemmän halua seksiin

Nenä: tulehdus nenän limakalvossa jolle on ominaista kautta tukkoinen nenä ,aivastelu ja vuoto (riniitti) Silmät:

häiriöt näkemisessä kohdalla se nähdä, kuivat jaai ärtyneet silmät, tulehdus sidekalvon (konjunktiviitti) Iho

:: Hyvin

harvoin ( esiintyyalle 1 10 000:sta alle alle 10 000:sta vähemmän kuin 1 käyttäjät)

Iho: kuolio alkaen kudot potilailla joilla on vakavia verenkiertohäiriöitä

verenkiertohäiriötyliherkkyys valolle , paheneminen, toistuva alkaen toistuva ihosairaus yhdessä meneillään kanssa hilseilevä, kuiva ihottuma (psoriasis)

Ruoansulatuskanava: makuhäiriöt

Veri: verisairaus (puute verihutaleista verihutaleetyhdessä paritettu jatkuva kanssa sinisiä mustelmia ja verenvuototaipumus (trombosytopenia)

Maksa: maksatulehdus (hepatiitti) yhdessä jatkuva kanssa keltaisuus (keltainen värjäytyminen ihon iho tai silmät)

Nivelet: nivelsärky (artralgia)

Psykye: muistinmenetys, sekavuus, havainnot asioista joita ei ei ovat (hallusinaatiot), vieraantuminen itsestään tai omasta tunteesta ( depersonalisaatiodepersonalisointiKorvat: tinnitus (tinnitus) Sukuelimet Sukupuolielimet: Ilmoittaminen

Se ilmoittaa alkaen haittavaikutuksia

Saatteko haittavaikutuksia, haittavaikutuksia, ottakaa yhteyttä teidän lääkäriin tai apteekkiin.

Tämä koskee myös haittavaikutuksia jotka eivät ole tässä pakkausselosteessa mainittuja seistä. U

kunt haittavaikutukset myös ilmoittaa kautta Alankomaiden Haittavaikutukset Keskus Lareb.

Verkkosivusto: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Ilmoittamalla haittavaikutuksista tee ilmoittaa, autatte meitä

saamaan enemmän tietoa tiedot tee saada yli turvallisuus tämän tämän lääkkeen.

Älä koskaan itse annosta annostusta alentaa tai hoitoa (väliaikaisesti) keskeyttää! Katso 'Jos lopetat tämän ottamisen tästä tästä lääkkeestä'.

#### 5. Kuinka säilytät tämän tästä lääkkeestä?

Säilytä alle 25°C

Poissa näkyvistä ja säilytä alkaen lasten poissa.

Avaamisen jälkeen pullon ovat de tabletit vielä 6 kuukautta käyttökelpoisia.

Älä käytä tätä lääkettä ei lisää jälkeen de viimeinen käyttöpäivä. Se löytyy pakkauksesta kohdasta "EXP". Siinä on kuukausi ja vuosi . Viimeinen päivä. De on päivä kuukauden kuukausi on viimeinen viimeinen käyttöpäivä.

Huuhtelee lääkkeitä ei viemäriin viemäri tai wc ja heitä niitä ei roskakoriin roskakori. Kysy apteekkariltasi mitä sinun tulee tehdä lääkkeiden kanssa joita et enää käytä . Jos lääkkeethävitetään oikealla tavalla ne käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti . oikea tapa hävitetty ja tulevat ei ympäristöön päädy.

#### 6. Sisältö pakkauksen pakkaus ja muut tiedot Mitä aineet sisältävät tässä tässä lääke?

- De vaikuttava aine in tämä lääke on metoprololisukkinaatti.  
Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 25: yksi tabletti sisältää 23,75 mg metoprololisukkinaattia, vastaava 25 mg:lla metoprololitartraatti.  
Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 50: yksi tabletti sisältää 47,5 mg metoprololisukkinaattia, vastaten 50 mg metoprololitartraattia.  
Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 100: yksi tabletti sisältää 95 mg metoprololisukkinaatti, vastaava 100 mg metoprololitartraatti.  
Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 200: yksi tabletti sisältää 190 mg metoprololisukkinaatti, vastaava 200 mg metoprololitartraatti.
- De muut aineet tässä lääkkeessä ovat sakkaroosi, maissitärkkelys , glukoosi (nestemäinen),polyakrylaatti , talkki (E553B),magnesiumstearaatti (E470b), mikrokiteinen selluloosa (E460), krosprovidoni krosprovidonikolloidinen kolloidinen

- piidioksidi (E551), laktoosi, hypromelloosi (E464), titaanidioksidi (E171) ja makrogoli 4000.
- Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 100 sisältää myös keltainen rautaoksidi (E172).

Miltä näyttää Metoprololisukkinaatti Sandoz retard ? en kuinka paljon on pakkauksessa yksi pakkaus?

Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 25, 50 ja 200:

valkoinen, pitkänomainen tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla .Tabletti, jossa on jakouurre voi kahteen yhtä suureen annokseen jaetaan jaettu.

Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 100:

vaaleankeltainen, pitkänomainen tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla .. jakouurre murtoviiva voi kahteen yhtä suureen annokseen jaetaan jaettu.

Tabletit tabletit ovat pakattu sisään polypropeeni/alumiini tai PVC-aclar/alumiini läpipainopakkaukseen in yksi pahvinen laatikko tai HDPE-pulloissa.

Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 25, 50, 100 ja 200: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1 ja 90 tablettia säädellyllä vapautuksella in läpipainopakkauksissa ja 30, 100, 250 ja ja 500 tabletit kanssa säädelty vapautuminen pulloissa.

Ei kaikki mainitut pakkauskoot ole markkinoilla saatavilla ..

haltija myyntiluvan saamiseksi markkinoille se kauppa tuoda ja valmistaja Luvan haltija:  
Sandoz B.V., Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, Alankomaat

Valmistajat:

Salutas Pharma GmbH  
Otto-von-Guericke Allee 1  
39179 Barleben Saksa

Sandoz B.V.  
Hospitaaldreef 29  
1315 RC Almere  
Alankomaat

Lek Pharmaceuticals d.d.  
Verovškova 57,  
1526 Ljubljana  
Slovenia

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D  
9220 Lendava  
Slovenia

Tämä lääke on rekisteröity rekisteriin numerolla numero:

RVG 32376: Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 25, tabletit joissa on säädelty vapautuminen 23,75 mg  
RVG 32377: Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 50, tabletit joissa on säädelty vapautuminen 47,5 mg  
RVG 32378: Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 100, tabletit joissa on säädelty vapautuminen 95 mg  
RVG 32380: Metoprololisukkinaatti Sandoz retard 200, tabletit kanssa säädelty vapautuminen 190 mg

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty tammikuussa 2025 sisään tammikuu 2025

Transtoyou