

Notice: information pour le patient

Métoprolol succinate Sandoz® retard 25, comprimés à libération prolongée 23,75 mg Métoprolol succinate Sandoz® retard 50, comprimés à libération prolongée 47,5 mg Succinate de métoprolol Sandoz® retard 100, comprimés à libération prolongée 95 mg Succinate de métoprolol Sandoz® retard 200, comprimés à libération prolongée 190mg

succinate de métoprolol

Lisez attentivement toute la notice avant de vous ce médicament allez utiliser car il contient des informations importantes pour vous .

- Conservez cette notice. Peut-être en aurez-vous besoin plus tard de nouveau nécessaire.
- Avez vous encore des questions? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.
- Ne donnez ce médicament pas à d'autres , car il est uniquement seulement à vous prescrit. Il peut être nocif être pour autres, même si ont ils les mêmes symptômes que vous.
- Avez-vous des effets secondaires un de effets secondaires qui dans rubrique 4 sont? Ou recevez vous un effet secondaire qui n'est pas dans cette notice est? Contactez alors votre arts de pharmacien.

Contenu de cette notice:

1. Qu'est-ce que Metoprololsuccinate Sandoz retard et à quoi sert ce médicament ?
Quand
 2. pouvez-vous pouvez-vous ce médicament pas utiliser ou devez vous faire attention avec être?
 3. Comment utilisez vous ce médicament?
 4. Effets indésirables
 5. Comment conservez vous ce médicament?
 6. Contenu de l' emballage et autres informations
1. Qu'est-ce que Metoprololsuccinate Sandoz retard et pourquoi est ce médicament utilisé?

Métoprolol succinate Sandoz retard appartient au groupe médicaments qui bêtabloquants sont appelés. Ils protègent le cœur contre une trop grande activité.

Adultes

Pour le traitement d' une haute pression artérielle (hypertension), en cas de une sensation douloureuse oppressante à la poitrine (angine de poitrine) ou arythmies cardiaques, après un infarctus du myocarde pour prévenir un nouvel infarctus du myocarde ,en cas de fonctionnement trop rapide de la thyroïde (hyperthyroïdie)hyperthyroïdie) en ter prévention de crises de migraine.

Enfants et adolescents de 6-18 ans:

Pour le traitement de une haute pression artérielle (hypertension).

2. Quand pouvez-vous ce médicament ne pas utiliser ou devez vous faire particulièrement prudent avec être?

Quand pouvez-vous ce médicament ne pas utiliser?

- Vous êtes allergique à un des composants de ce médicament. Ces composants pouvez vous trouver dans la rubrique 6 de ceci notice.
- Vous êtes hypersensible à d'autres médicaments antihypertenseurs de la même type que Metoprololsuccinate Sandoz retard, à savoir les bêta-bloquants.
- Vous avez troubles dans le conduction du cœur (bloc AV de 2e- et 3e degré).Vous
- avez insuffisance cardiaque aiguë ou insuffisance cardiaque qui n'est pas sous contrôle , avec œdème dans les poumons (œdème pulmonaire) ou une baisse de la pression artérielle (hypotension).
- En cas de 'choc' causé par un fonctionnement insuffisant du cœur.
- Vous souffre de graves troubles circulatoires.
- En cas de un grave ralentissement du rythme cardiaque (bradycardie).
- Vous êtes en continu ou par intervalles traité avec certains médicaments qui affectent la force de pompage du cœur influencent (à savoir bêta-agonistes).
- Vous avez un certain trouble du rythme cardiaque (syndrome du sinus malade) en u a pour cela aucun pacemaker reçu.
- Vous avez un infarctus du myocarde (infarctus du myocarde) en combinaison avec une bradycardie cardiaque, un faible pression artérielle ou vous êtes décompensé.
- Vous recevez le médicament vérapamil par injection dans une veine administré, parce que ainsi de pression artérielle peut baisser, troubles de la conduction cardiaque peuvent survenir et insuffisance cardiaque peut se développer.

Quand devez vous faire prudent être avec ceci médicament?

Contactez votre médecin ou pharmacien avant de ce médicament utiliser. Informez toujours le médecin(s) qui vous traitent savoir pour quel problèmes ou maladies vous encore plus sous traitement êtes. Metoprololsuccinate Sandoz retard doit avec précaution être administré.

Soyez particulièrement prudent avec Métoprolol succinate Sandoz retard :

- si vous voulez arrêter. Vous pouvez en effet pas arrêter soudainement ,parce que cela insuffisance cardiaque chronique (diminution de la force de pompage du cœur) force de pompe du cœur) peut aggraver et le risque de une crise cardiaque (infarctus du myocarde) et mort subite peut augmenter. Voir pour conseils de réduction de rubrique 'Si vous arrêtez d'utiliser l'utilisation de ce médicament';
- si vous autres médicaments utilisez pour soutien du fonctionnement du cœur. Il peut notamment un aggravation de la fonction cardiaque survenir;
- si vous souffrez de crises de difficulté respiratoire due à spasme des muscles et gonflement de la muqueuse des voies respiratoires souvent accompagné de avec toux et l' expectoration de mucus (asthme (bronchique)) en si vous pour cela traité êtes avec par ex. terbutaline. Lorsque les symptômes s'aggravent. Il peut être nécessaire de le dosage ajuster à adapter;
- si vous diabète (diabète sucré) avez. Métoprolol peut les symptômes d' un trop faible glycémie dans votre sang masquer. La probabilité de cela est cependant faible;

- si votre cœur insuffisance de pompage a et vous n'êtes pas pour traité êtes. En ce cas
- vous pouvez Metoprololsuccinate Sandoz retard ne pas utiliser;
- si vous souffrez de une augmentation ralentie du rythme cardiaque (bradycardie). Le). Le peut notamment nécessaire être le dosage à de ajuster ou progressivement d'arrêter ;si
- vous souffrez avez de froid doigts doigts enof pieds (aussi sans utilisation de médicaments, syndrome de Raynaud) ou claudication intermittente (claudicatio intermittens). Métoprolol succinate Sandoz retard peut de symptômes s'aggravent. Het is important que votre médecin le sache;
- si vous devez être opéré . Het isimportant que votre votre médecin sache que vous prenez du métoprolol utilisez;
- si vous en même temps traité êtes avec digitalis (médicament qui la force de contraction du cœur améliore). Cela peut nécessaire sont le dosage à de ajuster ou progressivement de arrêter;
- si vous un grave détérioration de la fonction hépatique avez a. De dosering doit si nécessaire être réduite;
- en cas de une tumeur de la médullosurrénale qui peut s'accompagner de une augmentation brusque de la tension artérielle, intense maux de tête, transpiration et rythme cardiaque accéléré (phéochromocytome).si
- vous souffrez d' une grave hypersensibilité à certaines pour certain substances. Le choc (forte chute de la pression artérielle, pâleur, agitation, faible rapide pouls, peau moite, conscience réduite) par un soudain fort vasodilatation en conséquence de cela (choc anaphylactique) peut en effet être plus grave être.

Consultez votre médecin si un de ci-dessus avertissements pour vous de applicable est, ou que dans le passé a été été.

Il n'y a aucune expérience avec le traitement de l'insuffisance cardiaque chez patients:

- âgés de plus de 80 ans;
- avec une restriction et hypertrophie du myocarde;
- avec une valvulopathie spécifique;
- avec un fortement réduite foie et fonction rénale;
- qui moins de 3 mois passés un infarctus ont eu;
- avec un congénitale malformation cardiaque.

Utilisez vous encore d'autres médicaments?

Utilisez vous en plus de Metoprololsuccinate Sandoz retard encore d'autres médicaments, avez vous cela court il y a fait ou allez vous ceci peut-être bientôt faire? Dites que que votre médecin ou pharmacien. Cela s'applique également pour médicaments que vous sans ordonnance pouvez obtenir.

Utilisez une carte de médicaments. Vous notez dessus quels médicaments vous utilisez et dans quelle dosage.

Laissez aussi les autres savoir quels médicaments vous utilisez!

Métoprolol succinate Sandoz retard peut l' efficacité de certains médicaments influencer et vice versa. Ceci s'applique entre autres pour:

- antagonistes du calcium, comme verapamil et diltiazem. Ces médicaments peuvent en effet la contraction du cœur (contractilité du cœur) et la conduction du cœur (AV-conduction) négativement influencer (voir aussi la rubrique 'Quand pouvez-vous ce médicament ne pas utiliser');
- rifampicine, un médicament contre certaines infections, car il réduit la quantité de métoprolol dans le sang diminue;
- médicaments contre allergie (antihistaminiques), parce que ils augmentent la quantité de métoprolol dans le sang augmenter;
- médicaments contre (sévère) dépression (dépression) of médicaments contre grave maladie mentale (antipsychotiques), parce que ils augmentent la quantité de métoprolol dans le sang augmentent;
- certains groupe analgésiques médicaments avec aussi un anti-inflammatoire et antipyrétique effet (inhibiteurs de la COX-2), parce que ils augmentent la quantité de métoprolol dans le sang augmenter;
- ganglioplégiques (médicaments contre les affections nerveuses), MAO-inhibiteurs (médicaments contre la dépression) et autres bêtabloquants (aussi dans gouttes ophtalmiques), car un contrôle supplémentaire est nécessaire; clonidine,
- clonidine, parce que il dans combinaison avec un bêtabloquant les symptômes de l'hypertension artérielle dans une intensité accrue peut faire revenir;
- médicaments contre arythmies cardiaques (anti-arythmiques), comme amiodarone et quinidine. Ces médicaments peuvent prolonger le temps de conduction du cœur (conduction AV-)prolonger et ont avoir un négatif impact sur la force de contraction du cœur ;
- anesthésiques (voir aussi la rubrique 'Quand devez -vous être prudent avec ce médicament médicament?');
- indométacine (déterminé analgésique médicament avec aussi un anti-inflammatoire et antipyrétique effet), parce que il l' effet hypotenseur de métoprolol peut réduire;
- insuline et médicaments oraux contre le diabète, parce que l' effet hypoglycémiant de ces médicaments par les bêtabloquants peut être renforcé. Dans ce cas la posologie de ces médicaments devra être ajustée ;lidocaïne
- ,un médicament pour les arythmies cardiaques, parce que metoprolol le élimination de lidocaïne du corps peut réduire ;digitalis,
- un médicament qui la force de contraction du cœur augmente augmente, parce que simultanée utilisation avec ce médicament un ralenti rythme cardiaque peut provoquer;

À quoi devez vous faire attention avec l'alcool?

L'alcool augmente de quantité métoprolol dans votre sang.

Grossesse, allaitement et fertilité

Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte , souhaitez-vous enceinteêtre enceinte devenir ou donnez vous allaitement? Contactez alors votre médecin ou pharmacien avant vous ce médicament utilisez.

Grossesse:

Votre médecin peut Metoprololsuccinate Sandoz retard prescrire pendant la grossesse si les avantages de l' utilisation pour vous l'emportent sur les risques pour le non né enfant. Si vous

Metoprololsuccinate Sandoz retard avez utilisé jusqu' à l' accouchement votre nouveau-né enfant peut les premiers deux jours après na de naissance extra être contrôlé.

Allaitement:

Métoprolol succinate Sandoz retard ne doit pas utilisé pendant être dans la période que allaitement est donné, à moins que l' utilisation nécessaire soit jugée . Le métoprolol est excrété dans le lait maternel . À des doses normales , la quantité de métoprolol dans le lait maternel lait maternel petit. Si votre médecin vous Métoprolol succinate Sandoz retard prescrit, alors sera votre enfant surveillé être contrôlé.

Fertilité:

Données sur la fertilité indiquent non sur particularités.

Aptitude à conduire et l' utilisation de machines

Pour autant que l'on sache il n'y a pas d' effets néfastes sur la capacité à conduire et la capacité à utiliser des machines de manipuler. En cas de apparition d' effets secondaires comme fatigue ou vertiges vous devez tenir cependant compte de cela que ceci le temps de réaction défavorablement peut affecter.

Métoprolol succinate Sandoz retard contient glucose, saccharose et lactose

Si votre médecin vous a informé que vous certaines sucres ne tolère, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

3. Comment utilisez vous ce médicament?

Utilisez ce médicament toujours exactement comme votre médecin ou pharmacien vous l'a indiqué .. sur l' utilisation correcte ? Contactez alors votre médecin ou arts of pharmacien.

Le conseillé dosage est :

Hypertension artérielle (hypertension) :

Dose initiale: une fois par jour 1 comprimé Metoprololsuccinate Sandoz retard 50.

Éventuellement à augmenter à 100-200 mg une fois par jour.

Lorsque vous souffrez de une fonction hépatique réduite, peut le médecin décider de la posologie de réduire (par exemple jusqu'à 1 comprimé Metoprololsuccinate Sandoz retard 25).

Oppressant douloureux sensation sur la poitrine (angor):

100-200 mg une fois par jour. Maximum 2 comprimés Metoprololsuccinate Sandoz retard 200 par jour.

Arythmies cardiaques:

100-200 mg une fois par jour. Si nécessaire peut le médecin décider cette posologie à augmenter.

Trop rapide action de thyroïde (hyperthyroïdie):

100-200 mg une fois par jour. Si nécessaire , le médecin peut décider d'augmenter cette posologie ..

prévenir prévention de crises de migraine:

100-200 mg une fois par jour.

Infarctus du myocarde:

Après que vous d'abord avez commencé avec comprimés de metoprolol ordinaires, la posologie d'entretien: une fois par jour 1 comprimé Métoprolol succinate Sandoz retard 200.

Si vous remarquez que Métoprolol succinate Sandoz retard trop fort ou au contraire trop peu efficace, consultez alors votre médecin ou pharmacien.

Les comprimés à libération prolongée ne doivent pas être écrasés ou mâchés, mais doivent être des comprimés entiers ou demi- comprimés avec de l'eau être pris.

Utilisation chez les enfants et les adolescents:

Hypertension artérielle: Chez les enfants de 6 ans et plus , la posologie dépendant du poids corporel. Votre médecin calcule la bonne dose pour votre enfant.

La dose initiale habituelle est de 0,5 mg par kilogramme de poids corporel une fois par jour, mais peut pas supérieure être à 50 mg. Il est choisi pour la disponible dosage de comprimé qui est le plus proche de la dose calculée se trouve .. Votre médecin peut la dose augmenter jusqu'à 2,0 mg par kilogramme poids corporel, selon l'effet sur la pression artérielle. Les dosages au-dessus de 200 mg une fois par jour n'ont pas été étudiés chez les enfants et les adolescents.

Utilisation de Métoprolol succinate Sandoz retard n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 6 ans.

Durée du traitement

Succinate de métoprolol Sandoz retard sera généralement utilisé à long terme ..

-vous utilisé trop de ce médicament ? Quandvous

avez utilisé trop beaucoup de Métoprolol succinate Sandoz retard a utilisé, contactez immédiatement votre médecin ou pharmacien .. peuvent être :: baisse sévère de la pression artérielle (hypotension), ralenti du rythme cardiaque (bradycardie), trouble de la conduction cardiaque (bloc AV- bloc), insuffisance cardiaque (insuffisance de la force de pompage du cœur) (décompensation cordis), choc causé par insuffisance de la fonction de pompage du cœur, arrêt cardiaque, dyspnée par spasme des muscles des voies respiratoires (bronchospasme), troubles de la conscience (ou même coma), nausée, vomissements et bleue coloration des lèvres, langue, peau et muqueuses par un manque d' oxygène dans le sang (cyanose).

Simultané utilisation d'alcool, médicaments pour hypertension ,quinidine (médicamentpour palpitations) oubarbituriques barbituriques (certains médicaments pour épilepsie) aggrave les symptômes.

Avez-vous oublié ce médicament de prendre ?Ne prenez

pas double double dose pour un oublié dose pour rattraper . Si vousoublié avez une dose pour prendre , pouvezvous le vous ce quand même faire, à moins que il presque temps soit pour votre prochaine dose. Suivez dans ce cas le schéma posologique habituel.

Si vous arrêtez de l'utilisation de ce médicament

Le traitement avec Metoprololsuccinate Sandoz retard ne doit généralement pas être interrompu brusquement, car ce chronique insuffisance cardiaque (diminution de la capacité de pompage du cœur) peut s'aggraver et le risque de une crise cardiaque (infarctus du myocarde) et soudaine mort peut augmenter. Le médecin va comme règle la dose progressivement réduire sur une période d'au moins de 2 semaines.

Avez -vous encore autres questions sur l' utilisation de ce médicament? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

4. Effets indésirables

Comme tout médicament peut aussi ce médicament effets secondaires avoir. Pas tout le monde reçoit avec cela à faire.

Les suivants effets secondaires sont très souvent, souvent, parfois, rarement ou très rarement signalé:

Très souvent (surviennent chez plus de 1 sur 10 utilisateurs)Système nerveux
Système nerveux: fatigue.

Souvent (surviennent chez moins de 1 sur 10 utilisateurs)Cœur :
ralentissement du rythme cardiaque (bradycardie),palpitations Vaisseaux sanguins
:: due à par par exemple rapidement se lever d'une une position assise ou couchée posture
parfois accompagné de avec vertiges (hypotension orthostatique), mains froides en pieds,
palpitations (palpitations)
Système nerveux: vertiges, maux de tête Système respiratoire: dyspnée à l'effort
Système gastro-intestinal: nausée, douleur abdominale, diarrhée, constipation

Parfois (se produisent chez moins de 1 sur 100 utilisateurs)Cœur :
aggravation des symptômes de insuffisance cardiaque ((insuffisance force de pompage du cœur), certain trouble dans la conduction du cœur, conduisant à arythmies (bloc cardiaque), rétention d'eau (œdème), douleur dans la région cardiaque; un 'choc' provoqué par insuffisance de la fonction de pompage du cœur (choc cardiogénique) chez les patients avec infarctus soudain du myocarde(infarctusdu myocarde aigu
Système nerveux: perception de picotements, démangeaisons ou fourmillements sans qu'il y ait de raison (paresthésieparesthésieMuscles
:: crampes musculaires Tractus gastro-intestinal: vomissements Général: prise de poids
Psyché : (sévère) dépression (dépression), de la vigilance vigilanceou insomnie de insomnie, cauchemars
Système respiratoire: Oppression due à spasme des muscles des voies respiratoires (bronchospasme), également chez patients qui n'ont pas d'obstructions ont de voies respiratoires Peau: éruptions cutanées éruption cutanéeaugmentation de la production de sueur
Rarement

(se produisentchez moins de 1 sur 1.000 utilisateurs) Cœur : troubles de la conduction, troubles de conduction, troubles dans le rythme cardiaque (arythmies) Appareil digestif: bouche sèche
Foie:

Foie: Psyché: nervosité , anxiété Organes génitaux

Organes génitaux: , diminution de la libidosexuelle sexe

Nez : inflammation de la muqueuse nasale caractérisée par un nez bouché ,éternuements et écoulement (rhinite) Yeux :

troubles de la vision ,, sèches etou irrités yeux, inflammation de la conjonctive (conjonctivite)

Peau: perte de cheveux

Très rarement (se produisent chez moins de 1 sur 10 000 moins de 1 sur 10.000 utilisateurs)

Peau: nécrose de tissu chez patients avec graves troubles circulatoires, hypersensibilité à la lumière, aggravation de récurrent affection cutanée accompagné en cours avec desquamation, sèche éruption cutanée (psoriasis)

Appareil digestif: troubles du goût

Sang : anomalie sanguine (déficit en plaquettes) accompagné en cours avec bleus et tendance aux saignements tendance hémorragique thrombocytopéniethrombocytopénieFoie :

inflammation du foie (hépatite) accompagnée en cours avec jaunisse (jaunecoloration de la de la peau ou yeux)

Articulations: douleur articulaire (arthralgie)

Psyché : perte de mémoire, confusion, perceptions de choses qui n'existent pas sont (hallucinations), aliénation de soi-même ou de son propre sentiment (dépersonnalisation)

Oreilles : acouphènes (tinnitus) Organes génitaux: troubles de l'érection

Le signalement de effets secondaires

Avez-vous des effets secondaires, contactez alors votre médecin ou pharmacien. Cela s'applique également aux effets secondaires qui ne sont pas dans cette notice. U pouvez effets secondaires également signaler via le Néerlandais Effets secondaires signalant les effets secondaires , vousaidez à nous obtenir plus d'informations sur les obtenir sur la sécurité de ce médicament.

Ne jamais soi-même le dosage réduire ou le traitement (temporairement) interrompre! Voir 'Si vous arrêtez de prendre ce médicament '.Comment

5. conservez -vous ce médicament ?Conserver

en dessous de 25°C Hors de la

vue et et portée de enfants garder.

Après ouverture du flacon sont les comprimés encore 6 mois valables.

Utilisez ce médicament pas plus après le date limite de péremption. Vous trouvez sur l' emballage après « EXP ». Il indique un mois et une année. Le dernier jour de mois est la date limite de péremption.

Ne jetez pas les médicaments dans l'évier ou les toilettes et ne les jetez pas dans la poubelle ..

Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire avec les médicaments que vous ne prenez plus . Si vous éliminezles médicaments de la bonne manière , ils seront traités de façon correcte manière détruit et ne pas dans l'environnement se retrouver.

6. Contenu de l' emballage et autres informations Quelles substances sont dans ce médicament?
- Le principe actif dans ce médicament est succinate de métoprolol succinate de métoprolol.
Sandoz retard 25 : un comprimé contient 23,75 mg succinate de métoprolol succinate de métoprololéquivalent correspondant avec 25 mg tartrate de métoprolol.
succinate de métoprolol Sandoz retard 50 : un comprimé contient 47,5 mg succinate de métoprolol, équivalent à 50 mg tartrate de métoprolol.
succinate de métoprolol Sandoz retard 100 : un comprimé contient 95 mg succinate de métoprolol, équivalent à 100 mg tartrate de métoprolol.
Succinate de métoprolol Sandoz retard 200 : un comprimé contient 190 mg succinate de métoprolol,
équivalent à 200 mg tartrate de métoprolol.
 - Les autres substances dans ce médicament sont saccharose, amidon de maïs, glucose (liquide), polyacrylate, talc (E553B), stéarate de magnésium (E470b), cellulose microcristalline (E460), crospovidone, colloïdal silice (E551), lactose, hypromellose (E464), dioxyde de titane (E171) et macrogol 4000.
 - Métoprolol succinate Sandoz retard 100 contient également oxyde de fer jaune (E172).

À quoi ressemble Métoprolol succinate Sandoz retard ? en combien y a-t-il dans un emballage?
Metoprololsuccinate Sandoz retard 25, 50 et 200 :
blanc, oblong comprimé avec sillon sur les deux côtés. Le comprimé avec sillon peut en deux égales doses être divisé.

Métoprolol succinate Sandoz retard 100 :
jaune clair, oblong comprimé avec sillon de cassure sur les deux côtés.
Le comprimé avec sillon de cassure peut en deux égales doses être divisé.

Les comprimés sont emballés dans polypropylène2Faluminium ou PVC-aclar2Faluminium blister dans un carton boîte ou en flacons HDPE.

Métoprolol succinate Sandoz retard 25, 50, 100 et 200 : 10, 20, 28, 30, 50, 50x1 et 90 comprimés à libération prolongée dans plaquettes thermoformées et 30, 100, 250 et 500 comprimés avec libération prolongée en flacons.

Pas tous les emballages mentionnés sont sur le marché ..

de l' autorisation de mise sur le dans le commerce apporter et fabricant Titulaire de l'autorisation:
Sandoz B.V., Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, Pays-Bas

Fabricants:
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke Allee 1
39179 Barleben Allemagne

Sandoz B.V.
Hospitaaldreef 29

1315 RC Almere
Pays-Bas

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57,
1526 Ljubljana
Slovénie

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D
9220 Lendava
Slovénie

Ce médicament est inscrit dans le registre sous le numéro:
RVG 32376: Succinate de métoprolol Sandoz retard 25, comprimés à libération prolongée 23,75 mg
RVG 32377: Succinate de métoprolol Sandoz retard 50, comprimés à libération prolongée 47,5 mg
RVG 32378: Succinate de métoprolol Sandoz retard 100, comprimés à libération régulée 95 mg
RVG 32380: Métoprolol succinate Sandoz retard 200, comprimés avec libération régulée 190 mg

Cette notice est pour la dernière approuvée en janvier 2025